

ఆంధ్రయదైద్యచింతామణి

ఆంగ్లేయాదధ గుణదీపిక, ఆధునిక మానసిక చికిత్స, రోగ్యోపచార బోధిని

ముద్దుల మూట

కపటదేశభక్త పట్టాభిషేకము (నాటకము), లవణసత్యాగహ గీతము,
(ఆంగ్లమున - కస్పెషన్స్ ఆఫ్ యే బోగస్ పేట్రీయట్,
డాక్టర్ పట్టాభి అస్వేడ్, 200లవ్ మాక్సిమ్స్)

గ్రంథకర్తయగు,

చిల్లరిగె సేతుమాధవరావుచే

రచియింపబడినది.

సికింద్రాబాదు

ప్రిమియర్ ముద్రాక్షర శాలయఃకుం ౨

ముద్రితము.

(పునర్విమర్శన సంవత్సరాలవ మార్పు)

1947

కాపీరైట్)

వెల రూ. 6—0—0

(రిజిస్టర్డ్)



ప్రకాశకుడు :

కొండా శంకరయ్య



గ్రంథకర్త:

చిల్లరిగె సేతుమాధవరావు

తొలి పలుకు

అంగ్లేయ వైద్య చింతామణి యను సీగ్రంథమును సమకూర్చిన యువకారకులు శ్రీయుత సేతుమాధవరావుగారి శ్రమమంతయుగృత జ్ఞతాపాత్రము. ప్రస్తుతకాలమున భారతదేశమునం దంతటను అంగ్లేయా షధశాల లేర్పడి యాంగ్లేయ చికిత్సాలయములును, నాంగ్లేయాషధ విక్రయశాలలును వెనవేలుగ గానవచ్చుచున్నవి. ఆయుర్వేదమునఁ జికిత్సావిధానములు పెక్కులుగ నుదహరింపబడియున్న నౌషధములును, దన్మూలకములగు మూలికలును శ్రమప్రాప్తములై విజ్ఞాతలగు వైద్యుల యొద్దగాని, అపణవీధులయందుగాని పెక్కుజౌషధములు సంసిద్ధముగ లభింపమిచే యిట్టియేర్పాట్లు కావింపవలసియున్నవి. కొన్ని ప్రాంతముల యందు లభించినను, వానినుపయోగించు విధానమును తన్మూల రహస్యములు నెల్లఱకును సులభగ్రాహ్యములుగ గానరాకుండుట శోచనీయము. ప్రభుత్వమువారిచే నేర్పఱుపఁబడిన అన్ని జౌషధాలయములందును నాంగ్లేయాషధములు వాడఁబడుచున్నవి, ప్రభుత్వమువారిచే నెలకొల్పఁబడిన వైద్య విద్యాలయములందు అంగ్లేయ వైద్యబోధ గావింపఁబడుచున్నది. అట్టియిక్కలమున నాంగ్లేయాషధములవిజ్ఞానమును బోధించు సీగ్రంథమునకు అసామాన్య ప్రాముఖ్యము గలదనియు, ఇయ్యదియెల్లరకును నత్యంతోపయోగకరమనియుమాయాశయము. ఆయుర్వేదమునాదీయమై దేశమున కత్యంతోపయోగకరమైనన, దానికి దోడుగ బరకీయ విద్యావిజ్ఞాన ప్రదాయకమగు సీగ్రంథము అత్యధికోపయోగకరమనుటకు సంశయములేదు.

ఈమహాగ్రంథమును సర్వస్వామ్యములతో మాకొసంగిన శ్రీయుత సేతుమాధవరావుగారి పంశోద్ధారకులకు మా అభివందనములు.

ఇట్లు

కొండా శంకరయ్య

ప్రకాశకులు

విషయ సూచిక.

—...—

ఈ గ్రంథము యొక్క నాలుగు కూర్పులకును
బీజికలు మొదలగునవి	1-16
వ్యాధిచికిత్స యందుగమనించనగు విషయముల	
యొక్క వివరములు	1-60
వ్యాధులు—చికిత్స	61-280
ఔషధయోగములు	281-323
అంగ్ల ఔషధముల పేర్లు ఆంగ్లములో దెలుపుట	324-329
విష విరుగుడులు	330-334
వ్యాధులు—వ్యాధుల కువయోగింపనగు మందులు	335-349
సౌందర్యరహస్యము—కొన్ని ఔషధముల యొక్క...	
వివరములు	349-354
మఱికొన్ని ఔషధయోగములు	355-358
ఔషధయోగ సూచిక	359-361
వ్యాధి సూచిక	362-365

మొదటికూర్పు—1909—1,000 ప్రతులు
 రెండవకూర్పు—1915—1,500 ప్రతులు
 మూడవకూర్పు—1939—1,000 ప్రతులు
 నాలుగవకూర్పు—1947—2,000 ప్రతులు,

Materia Medica

ఆంధ్రేయశాస్త్ర గుణదీపిక

మా ఆంధ్రేయశాస్త్ర గుణదీపిక ఆంధ్రజేశమందు ప్రజాసురాగమును వడయుటయే
గాక, గవర్నమెంటు ఆనుపశ్రులయొక్క ఉపయోగార్థమై కూడ నీ గ్రంథము నీ క్రింది
విధ్యోగస్తులకు నష్టము చేసియుంటిని.

			ప్రతుల సంఖ్య.
రీసిడెంట్	జిల్లాబోర్డు	ఆనంతపురం	5
డిటా	తాలూకాబోర్డు	డిటా	1
డిటా	డిటా	ఆదోని (బళ్ళారి జిల్లా)	3
డిటా	డిటా	హన్మేట (డిటా)	3
డిటా	డిటా	ఏలూరు	2
డిటా	డిటా	కర్నూలు	1
డిటా	డిటా	కోయిలకుంట్ల (కర్నూల్)	1
రీసిడెంట్,	మ్యూనిసిపల్ కౌన్సిల్,	ఆనంతపురం	1
డిటా	డిటా	ఏలూరు	1
డిటా	డిటా	శ్రీకాకుళము	1
డిటా	డిటా	కర్నూల్	1
డిటా	డిటా	ఆదోని (బళ్ళారి జిల్లా)	2
స్పీర్డ్ మెడికల్ ఆండ్ కౌన్సిలర్ ఆఫీసరు,		బళ్ళారి	1
డిటా నర్స్,		రాజమండ్రి	1
హరిమంట్ ఆండ్, రిఫర్మటరీ స్కూల్,		చెంగల్పట్	2
హి ఆస్పిటల్ నర్స్		కుడ్లగి బళ్ళారి జిల్లా	1
డిటా		సిరిగుప్ప డిటా	1
డిటా		కొల్ బజార్ డిటా	1
డిటా		రాయదుర్గము డిటా	1

కృతజ్ఞత

ఈ గ్రంథమును సిద్ధపరచుటయం దుపయోగించిన యాకించి గ్రంథముల యెడల
ంతయు గృతజ్ఞతను వహించి యుంటిని.

ఫ్లెస్ పిన్సిపిల్స్ ఆండ్ పాక్టిస్ ఆఫ్
మెడిన్

టెక్టుబుక్ ఆఫ్ మెడిన్ - జి.ఏ. గిబ్సన్

హీర్ ఆండ్ డిజీజెస్ ఆఫ్ ఇండియా
(హేహిర్)

మూర్స్ ఫ్యామిలీ మెడిన్ ఆండ్ హై
జీన్ ఫర్ ఇండియా

డాక్టర్ ఫుట్స్ హోమ్ సైక్లోపీడియా
బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా

దుక్టస్ ఫార్మకోపియా - మార్టిండేల్
ఆండ్ వెస్ట్కాట్

క్రెమోర్స్ ఫార్మకోపియా (కెంప్
ఆండ్ కో)

వ్హిట్లీ మెటీరియా మెడికా

ప్రాక్టికల్ నర్సింగ్ - స్టీవార్టు ఆండ్ కఫ్
మాన్యుయల్ ఫర్ హాస్పిటల్ నర్సింగు
(యం. ఏ. నెప్సెట్)

ఎ. బి. సి. ఆఫ్ నర్సింగ్ (ఇ. యం.
క్లార్క్)

గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ సిక్ నర్సింగ్
(డబ్ల్యు. యం. డ్రమ్మండ్)

హెర్బల్ ఆఫ్ హెల్త్ (మాసపత్రిక)

హెర్బల్ ఫిజియన్ టై

జి. యమ్ గ్రెగర్ ఆండ్ రాబర్ట్సన్

Osler's Principles & Practice
of Medicine

Text Book of Medicine
G. A. Gibson

Hygiene and Diseases of
India (Hehir)

Moore's Family Medicine
and Hygiene for India

Dr. Foote's Home Cyclopoe
dia British Pharmacopoeia

Extra Pharmacopoeia -
Martindale and Westcott

Prescribers' Pharmacopoeia
(Kemq & Co.)

Whitla's Materia Medica

Practical Nursing - Stewart
& Cuff

Manual for Hospital Nurses
(M. A. Nisbett)

A. B. C. of Nursing (E. M.
Clarke)

Golden rules of Sick

Nursing (W.M. Drummond)

Herald of Health

Household Physician by

J. M. Gregor & Robertson

మొదటి కూర్పునకు విజ్ఞాపన

వీక్షణ నాకవ్యాధియందుబనిచేయుచుండు గారణము లనేకము లుండుటచే, వైద్యుడు వ్యాధిలోని ప్రధాన ఆస్వస్థతావయవముపై నెక్కువ శ్రద్ధ నుంచును, రోగియొక్క స్థితి గతులన్నిటిని విచారించుట ముఖ్యమయి యున్నదని, అందఱును యొప్పుకొనిన అంశవే అయియున్నది. ఈ హేతుకారణముననే, ఆధిక సామర్థ్యమును వహించియున్న వైద్యకాస్త్రిజ్ఞులుగూడ, వైద్యగ్రంథమును వ్రాయుటయందు, వ్యాధులగు బీజీత్యలలో జాలినంతవిఃరముల నిచ్చుట కశక్తులుగ నున్నారని, ఒకానొక ఆంగ్లేయ వైద్యకాస్త్రిజ్ఞుడు చెప్పియున్నాడు ఇట్టిసందర్భమున, నేనవ్రాసియున్న యీగ్రంథము నందలి వ్యాధులయొక్క చిత్సలు పూర్వములని చెప్పజూచుట కంతయు ఆస్పదములేదు. అయినను, ఆంగ్లేయ భాషయందుగల ప్రమాణములగు వైద్యగ్రంథముల బఠింపించి, అందలి సారాంశముల నవసరమునుబట్టి యొక్కవ విరళముగ నిందుబొందుపరచి యుండుటచే, యీగ్రంథము చాలవరకుపయోగకారిగ నుండగలదని తలంచెదను.

కొనునైన వైద్యసహాయము లేనప్పుడును, వైద్యసహాయ ముండినను, రోగియొక్క రోగియొక్క పరిచారకులును గమనింపవలసిన అంశములను తెలిసికొనుటకును, యీ గ్రంథముపయోగింపబడుట కుద్దేశింపబడినది. కొన్ని ఉచితవ్యాధులయందు, రోగికి నిచ్చు వదులయందు కంటే, రోగికి జేయు కొనుచుగ పరిచారములయందు బీజీత్య యొక్కవగ నిమియున్నదిగాన, నీ గ్రంథమును విద్యార్థుల గృహములందలి స్త్రీలును, జడువుటవలన బయోజనముగ నుండగలదు. విరోషియను ఔషధముల వాడుటయందు దిచ్చగిలిగి, అందచికిత్సాపద్ధతుల గుర్తయంగనట్టియూ, ఆంగ్లేయ భాషయందు బరిచయములేనట్టియు, జీవీవైద్యులకును యీ గ్రంథము ఉపయోగముగ నుండగలదని చెప్పటకు సందియములేదు.

ఆంగ్లేయ వైద్యకాస్త్రిపతనమునందు నాకు జరకాలమునుండియు నుండెడి అభిరుచి నా సంబంధముగ గ్రంథముల దరచుగ జడువుటయందు గుతూహలగడ నగుటవలనను, అంతర మొకానొక సందర్భమున నీ ఔషధముల నెక్కువగ వాడుటయందు గొంత అనుభమును గ్రహించుటవలనను, ఆంధ్రభాషయందు దిట్టి గ్రంథముయొక్క కొంతను గుర్తెరింగి యీ గ్రంథమును రచియించుట కుద్యుక్తుడనై ఆంధ్రులయందు యీవైద్యకాస్త్రి సంపదలును, ప్రావీణ్యమును, ఉండియున్నను, నే నీ పనికి సాహసముతో బూనుకొంటిని.

మచిలీపట్టణము,
15—8—09.

}

ఇట్లు,
గ్రంథకర్త.

మొదటి కూర్పునకు చీరిక.

హిందూదేశ చరిత్రలో గడచిన 10 సం॥ లును దేశీయ భావలయందు సాహిత్య శాస్త్ర సంబంధములగు గ్రంథములను రచించుటకుఁ బ్రసన్నుడైన కాలముగ నున్నది. ఈ మహాత్కార్యమనకుఁ బరోపకార బుద్ధిగల పండితుల పురుషులే గాక, ప్రత్యేకముగ భాషాభివృద్ధికై స్థాపించబడిన సంఘములు గూడ గృహింపబట్ట, ఎంతయు శ్లాఘ్యము. ఆంధ్ర భాషయొక్క పునరుద్ధారణమునకై తమ కాలమును, దమ బుద్ధిని, దమ ధనమును వినియోగించుటచే నిట్టి నత్యుత్సాహమునకు మూలపురుషులనందగిన రావుబహుదూరు కందుకూరి వీరేశలింగముగారు సాహిత్య కాఖ్యాయందు, దాము రచించిన గ్రంథావళికి దోడుగ ప్రకృతి శాస్త్రకాఖ్యాయందుఁ గూడ గొన్ని గ్రంథములఁ బ్రచురించిరి. కాని, హాజిబిద్య దేశమందంతట బ్రబాస మీఁదట దేశభాషలన జనులకెల్లరకు నెక్కువ యభిరుచి లేకుండుటచే శ్రీపంతులుగారి శాస్త్రవిషయిక గ్రంథములు జనుల నాకర్షించకుండుటయే గాక, ఆపృటి నుండియు, నీవిషయమై పునః పఠ్యత్నము లేవీయు జరిగియుండలేదు. ఇప్పుడు దేశమందంతటను గాఢములగు మార్పులు గొన్నిగలిగెను. ఇప్పటివఱకు జీవచ్ఛవంబులై యుండిన దేశభాషలు పునర్జీవము నొంది, నూతన భావములను, నవీన శక్తులను, దేశీయలయందు బ్రసరింపజేసి, దేశాభివృద్ధికి దోడ్పడవలెనని సర్వత్ర గ్రహింపబడినది. శాస్త్రముల నన్నిటిని, దేశభాషలయందే బాలురకుఁ గలుపవలయునను సంశయము గమనింపబడి, విద్యావిధాన మంతయు మార్పు నొందుచున్నది. ఇందు కనుగుణముగ విజ్ఞానచంద్రికా మండలివారు, జీవశాస్త్రమును, వదార్థవిజ్ఞాన శాస్త్రమును, బ్రచురించి యుండిరి. ఆంధ్రభాషాభివృద్ధి సంఘమువా రాకొగ్యశాస్త్రమును ముద్రించుచున్నారు. వీనికి దోడుగ నిప్పుడు మాగ్నేటికులుగ నీ గ్రంథకర్తగా రాంగ్లేయ వైద్యసంగ్రహము నొకదానిని బ్రచురించిరి. దానికి వీరు సన్నుతీతిక వ్రాయ గోరినందున, నేనిందులకు సంతోష పూర్వకముగ నంగీకరించితిని.

ఏదేశములో వైనఁ బ్రకృతి శాస్త్రజ్ఞున మెంతవఱకు సభివృద్ధిలోనున్నను, లేకున్నను, వైద్యశాస్త్రము మాత్రము సర్వత్ర ఆనుదిన మభ్యసించఁ బడుచున్నది. ఈవ్యాధికి బోషధవని చెప్పువారు గొందఱైయుండ, నీవ్యాధికి యావధ మివ్వబంబునఁ బనిచేయు పని చెప్పగలవారు మఱియొకఁడ యుండును. వివిధ దేశములందాచరణములో నున్నవైద్యుని భావంబుల కిదియే భేదము. హిందూదేశ మందంతట సామాన్యముగ సభ్యునింపబడు వైద్య పద్ధతులు పూర్వోక్త కాఖ్యలలోఁ బ్రధమకాఖ్యకుఁ జేరి యున్నట్లు కన్పట్టుచున్నవి. వైద్య శాస్త్రము పరియోగ శాస్త్రములలో నొకటిగ నెంచబడుచున్నది. అనగా నొక్కొక్క యావధియొక్క గుణములు దాని పరియోగము వలననే గమనించవలెను గాని, శీవలము యూహాపద్ధతులచే గ్రహింపఁ బడనాలవు. కానిదేహములలోని వివిధావయవములపైజేయే యావధమునిచ్చిన పిమ్మట నూతనముగా గన్పించు దుర్లక్షణములు, బోషధముల యక్రమ నేవచేసినించెనా, లేకవ్యాధియొక్క సహజదోషములూ, అను సంశయమును నివారించుకొనఁ

గలము. ఆంగ్లేయ వైద్యమునందు వాడబడు నౌషధములలో 'డిజిటాలిను' అనుకొక ట్టుగ
లదు. దీనినుండి రసముదీసియు, లేక దీనియాకును, కషాయమును, హృన్మోగములకువాడబ
డును; కొన్ని దినములు యపయోగించిన పిమ్మట, పూర్వము నిమిషమునకు 72-120 సార్లుసం
చారముగలవాడి, ఇప్పుడు 35-50 సార్లు మాత్రమే సంఘటించుటయు, చెబ్బకు చెబ్బకు
నుండు యవకాశముకొని యొక్కుచుగను, మరియొకసారి తక్కువగను, నుండుటయు, తట
స్థించును. ఇట్టిసూతన దుర్గుణమునకు కారణమాపదమే, యనికొన్నిసమయములులందు నిర్ధారణ
ముచేయగలము. 'ఫెనాసెటి' నను పదార్థము మరియొకటి గలదు. ఇదిజ్వరములను వెంటనే
దగ్గించునను భీమచే దీప్రజ్వరములయందు వాడుటయు, రోగియొక్క శరీరము చల్లవలు
గ్రొమ్మటయు, నొక్కొక్కడ రోగిమృతిజెందుటయు, దట్టస్థించును. ఆధునిక వైద్యమునం
దీయాపదము జ్వరములలో వాడుటయే నిషేధము. ఔషధములునడచు క్రమమును జక్క
గగుర్తెరుగకుండుట యిట్టిసందర్భములో నపాయమునకే హేతువగును. ఆంగ్లేయ వైద్యకాస్త్రీ
మునందెట్టి లోపములున్నను, వ్యాధులకన్నిటికిని దగిన ప్రతికీర్తియు నియమించబడినను,
లేకున్నను, నౌషధములసంచి విరివిగనున్నను, లేక కొంతగ నున్నను, వినియోగింపబడు
నౌషధములన్నియు నడచుకొనుమును, నవి యేయేఅవయవములవయి పెట్టిమార్పులను గలుగఁ
జేయునదియు, నిట్టిమార్పులన నేయేవ్యాధులెట్లు చికిత్సనొందునదియు' ననిస్తరముగ బ్రయో
గప్రమాణముచే నిర్వర్ణింపబడి యున్నది. ఆయుర్వేదమునదిట్టి వివరణమంతయు నుండియుం
డవచ్చుచుగాని, దేనియైద్యులీ కాఖనుగూర్చి యిందుకయిన శ్రద్ధగొనకుండుట ఎంతయు
కోచనీయము.


.....

ఆంగ్లేయ వైద్యకాస్త్రీమును బలించువిద్యార్థుల పృథకుముననికాస్త్రీమున కాధారభూత
ములను బరింపవలెను. పదార్థ విజ్ఞాన కాస్త్రీమును రసాయనిక కాస్త్రీమును జదివి, తరువాత
శరీరకాస్త్రీమునుగూర్చి శ్రద్ధగొనవలెను ఇందు, శరీరనిర్మాణ కాస్త్రీమునయి శరీరవ్యాపార
కాస్త్రీమునియు రెండుకాఖలు గలవు. ఈరెండునుఆరోగ్యదశయందన్న శరీరమునుగూర్చియే
బోధించును. వీనితరువాత ననారోగ్యదశయందుండు శరీరనిర్మాణమును, శరీరవ్యాపారము
లను బరింపవలెను. ఈపునాదులపై వైద్యకాస్త్రీమాధార పడియున్నది. ఆటుపిమ్మటనే వస్తు
గుణాదీపిక చదువబడును. ఈకాస్త్రీమునందే, ఔషధముగ నుపయోగింపఁబడు ప్రతిపదార్థ
మునుప్రతిమానికయును శరీరమునందుండువివిధావయవములపై పెట్టిమార్పులను గలుగ జేయు
నదియు, నామార్పులు వ్యాధిసెట్లుక్షీణంప జేయునదియు తెలియజేయబడును. దీనిజితగ నా
రోగ్యకాస్త్రీము చదువబడును. ఆరోగ్యకాస్త్రీము, వ్యాధులు దేహమున బ్రకటింపక
పూర్వము వానిసెట్లు నివారింపఁగలమా యవిధములనుగూర్చి బోధించును. వీనితరువాత
వైద్యకాస్త్రీము చదువబడును. దీనియందు, వ్యాధియొక్క నిర్వచనమును, గారణములను,

వ్యాధివలన కఠిననిర్మాణ వ్యాపారములందు గలుగుమాడ్పులును, వ్యాధియందుండు లక్షణములును, వ్యాధివలన కోగికిగలుగు భావిగతియు, వ్యాధిచికిత్సయు, సవిస్తరముగ చెలుపబడును. ఇటులనే శస్త్రీకాస్త్రీమును, పరిసవకాస్త్రీమును, నేత్రీచికిత్సయు, గఱపబడును. ఇట్టికాస్త్రీములన్నియు సాంధ్యభాషలో గఱపుటకు సదుపాయములింకనులేవు. కాని భాషాభివృద్ధికొఱకు బ్రారంభకృష్టములే ఎక్కువచిక్కుతో గూడినవిగానుండినవిగావున, నెచ్చటనోయొక్కనొకమున యత్నములను భారంభింపవలెను. సహజముగఁ గనుపించు నావశ్యకతను బట్టితక్కినకాస్త్రీములన్నియుగూడఁ గాలక్రమమున నాంధ్రీకరింపబడును. ఇట్టి సందర్భమున గ్రంథకర్త గారెంతయు వ్యయప్రయాసముల కోర్చియీగ్రంథపూర్వముగ నాంగ్లేయవైద్యకాస్త్రీసారము సాంధ్యులకందజేసి వారికృతజ్ఞతకు బాతులయిరి.

మచిలీపట్టణము, }
10-8-09.

భోగరాజు పట్టాభిసేతారామయ్య,
బి. ఏ., యమ్. బి. ఆండ్. సి. యమ్.



రెండవ కూర్పునకు బీరిక.

వ్యాధియొక్క విశేష విషయములలో గారణములు అత్యంత లోపభరితములైయుండును. కొందరు బహు ఆరుదుగా వ్యాధిగ్రస్తు లగుదురు. దీనికి గారణము వారోగ్యవంతములగు జీవితముల గడపుచు, తమ పరిసరముల యొక్క ఆరోగ్యస్థితియెడ శ్రద్ధను వహించి యుండుదురు. అట్టివారు తాము భుజించు ఆహారము యెడలను, తాము దావులుబలము యెడలను, తాము లోనకుబీల్చు వాయువు యెడలను, తాము ధరించు దుస్తులయెడలను, జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొనుచు, తమ శరీరముల యొక్కయు తమ గృహముల యొక్కయు గృహపరిసరముల యొక్కయు పరిశుద్ధస్థితిని గమనించుచుండుదురు. ఇండియా దేశమునం దిందులకు భిన్నముగా హోటానకోట్లు తరుచుగా వ్యాధిహితు లగుచుండుదురు. ఈస్థితి కొంతవరకు దేశముయొక్క శీతోష్ణస్థితి ఫలితమై యున్నదిగాని, చాలవరకు దైన నూచింపబడిన ఆంశముల యందలి లోపమువలన గలుగుచున్నదని మనము తెలుసుదగి యున్నది.

ఈవ్యాధి సాకస్మిక ఫలితముగ నెన్నడు నెంచరాదు. వ్యాధి యెల్లప్పుడును ప్రత్యేక కారణ ఫలితమై యుండును. వ్యాధిని చాలవరకు రాకుండ జేయవచ్చును. మనము క్రమమగు సాహారము లోనకు దీసికొనుచు, వ్యర్థపదార్థముల సకాలములో వెలిబుచ్చుచు, శరీరములోని అవయవము లన్నియు ననుగుణ్యముగ బనిచేయు చుండినయెడల, శరీరమునం దారోగ్యత వర్ధిలించుండును. ఈకార్య క్రమములయం దే లోపము గలిగినను వ్యాధి సంభవించుచుండును; శరీరము వ్యాధిచే కాదనొందుచున్నపుడు ఆరోగ్య సూత్రముల నతిక్రమించుటవలన గలిగిన ఖిట్టగా నెంచవచ్చును.

మరిషి వ్యాధిగ్రస్తుడై యున్న ప్రతివిషయమునందును కారణ మెద్దియో యుండి యుండును. అకారణ ముండియుండక పోయినయెడల వ్యాధియే లేకపోయెడిది. ఈకారణములలో బ్రధానమగు వాటివిషయమై; అవిమనల నన్వేషింపరచ కుండుటకు బ్రయత్నింప వలయును. ఈకారణములలో గొన్ని నులభ సాధ్యములై మనుజునియొక్క సామాన్య జ్ఞాన దృష్టివలన దొలగింపనగురు. మరికొన్ని కారణములు కష్టసాధ్యములై, అవి యేవిధముగా శరీరముపై బనిచేయునదియు, వాటివెట్లు దొలగింప వలసినదియు, గనుగొనుటకు కొన్ని సంవత్సరములు సహితము పట్టును. ఇప్పటికిని గొన్ని వ్యాధులలో గారణములు అసంపూర్తిగా మాత్రమే తెలియబడి మరికొన్ని వ్యాధులలో బాహ్యముగా చెలియకుండగనే యుండియున్నవి.

ఆరోగ్యసూత్రముల ననుచుచుటకు పద్ధతుల చెలువునట్టి శాస్త్రమున కారోగ్యశాస్త్ర మందురు. ఈశాస్త్రవిధులను గమనించుట వలన వ్యాధులను రాకుండజేయుటకు వీలుగానుండుటయేగాక వ్యాధి ప్రవేశానంతరము సులభముగ వ్యాధి నివారణను జేయుటకు అనుకూలముగ నుండును.

వ్యాధియొక్క కారణములను గ్రహించియుండుటవలన నావ్యాధిని బారదోలుటకు క్రమమయిన మార్గమున భరించేయుటకు వీలుగ నుండును. శాస్త్రీయమగు నీ కారణములను గ్రహించియుండుటవలన వ్యాధిచికిత్స చేయుటయందు మనపూర్వీకలకంబై ననేకవిధములగ మనము చుంచుకొనియుండుండియుంటిమని నవ్వుదగి యున్నది. ఇందులకై దృష్టాంతముగ గొన్ని వ్యాధుల గురించి విచారించి చూచెదము.

చలిజ్వరము.

ఒకవిధమగు శీమిజాలములు రక్తమునందు బ్రవేశించి, అందలి యౌర్జనికణములను ప్రతి జ్వరకాగ్రమునందును నశింపునడచేసి, శరీరములోని కొన్ని అల్లికల యందును ఆవయవములందును యీ జీవాణువులు ప్రవేశించి, వాటికార్యక్రమ ఫలితముగ చలిజ్వరలక్షణములు కలుగుచున్నవని మనము స్పష్టముగ చెలియవచ్చును. ఈవ్యాధి సంబంధములగు జీవాణువులు దోమలు కుట్టుటమాలమున మన శరీరమునందు బ్రవేశమగుచున్నవి. దోమలు చలిజ్వరవ్యాధి పీడితులను గుట్టుటవలన వారలరక్తమునుండి యీవ్యాధి సంబంధమగు జీవాణువులను గ్రహించి వాటిని మరల వేరుమనుజులయందు బ్రవేశ పెట్టుచున్నవి. ఈకారణమున నీవ్యాధి వ్యాప్తత నందుచుండును. క్వినీన్ ను సేవించుటవలన వ్యాధి నివారణ నందుటయేగాక, జ్వరమును గలిగించుటకు జాలినన్ని జీవాణువులు రక్తమునందు పృథ్విగాకపూర్వ మీయకాషధము నుపయోగించుటవలన వ్యాధి రాకుండగూడ జేయవచ్చును. ఈక్రింది అంశములను గమనించుట వలన చలిజ్వరవ్యాధి సాధ్యమగు సంతవరకు వ్యాప్తత నందకుండునట్లుల జేయవచ్చును.

- (1) చలిజ్వర వ్యాధిపీడితులను విడిగా నుంచుట మూలమునను.
- (2) వ్యాధి గ్రస్తులనుండి వ్యాధి సంబంధమగు జీవాణువుల గ్రహించిన దోమలను నశింపుజేయుట మూలమునను.
- (3) చలిజ్వరవ్యాధి సంభవించిన వారలకు క్వినీన్ ను యిచ్చుట మూలమున మరల నా వ్యాధి రాకుండజేయుట మూలమునను.
- (4) దోమలు పశ్చాత్తనందునట్టి స్థలములయందు వాటిగుడ్డు మొదలగువాటిని నశింపు జేయుట మూలమునను.

ఆను విరేచనములు.

ఆను విరేచనములలో నొకజాతియందు యీ సంబంధముగ వ్యాధిహితములగు జీవాణువులు మనుజుడు లోనికిదాగిన జలమార్గమున పేగులయందు బ్రవేశించి వ్యాధిని గలిగించును. ఆరోగ్యస్థితియందున్న పేగులలో నేవిధముగ దుష్ఫలితములను గలుగజేయవు. పేగులలోని ఆను సంబంధముగ పొరలనంటియిండి సహజముగ జరుగుదనమును వహించి యిందు బలములు యీజీవాణువుల దాడులను లక్ష్యపెట్టవు. కాని, సంపూర్ణవచనము కాని ఆహారమువలన గలుగు రేగుదలవలనగాని, జీర్ణమగుటయందు కారిన్యతను వహించిన పదార్థమువలనగాని, అలసట నందినపుడుగాని, చలికాలి సోకినపుడుగాని, మిక్కిటముగ భుజించుటవలనగాని, ఆజీర్ణత ప్రవేశించుటకగు నే కారణమువలనగాని, యీజీవాణువులు పెద్దపేగునందు రేగుదలను గలుగజేసి, ఆను పదార్థమును స్పృధిపరచి, ఆను విరేచనముల బుట్టించును. ఈకారణములనుబట్టి, మనము భుజించు ఆహారముయొక్క స్వభావమును గూర్చియు, దానియొక్క శ్రమకును పచనమును గూర్చియు, జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొనుచు, అజీర్ణమునకు సహకారులగు కారణముల నన్నిటిని గమనించుచుండ వలయును.

టైఫాయిడ్ జ్వరము (గున్నిపాతజ్వరము)

టైఫాయిడ్ జ్వరముయమున నీవిధముగ జీవాణువు తాగిన నీటిమూలమున గాని పాలుమూలమున కాని పేగులయందు బ్రవేశించుచుండును. దీనికి కుదిరికనందినపిమ్మట గొంత కాలమువరకు నీ సంబంధముగ జీవాణువులు మలమూత్రములగుండ వెలువడుచుండును. ఈ మలమూత్రములు విస్తరింపబడు స్థానములందు యీ జీవాణువులు చాలవారమువరకును తీక్షణభావమును వహించియుండును. గృహములయొక్క గాని గుడారములయొక్క గాని నేలప్రదేశముల యందు అరుదల నందియున్న యీ వ్యాధి హితములగు మలమూత్రపదార్థములు వాయుప్రచారమునందు దుమారరూపమున క్వాసమార్గములగుండ శరీరమునందు బ్రవేశించుట మూలమునను, ఈగలు ఆనేకమార్గములగు నీజీవాణువులను వ్యాపింపజేయుటమూలమునను, నీ వ్యాధి వ్యాప్త నందుచున్నదని మనము తెలియవలయును. జలమును మసలగాచి చల్లార్చి తాగుటయందు దీ జీవాణువువలన భయమేమియు నుండనరదు.

కాలరా, మహుచి, ప్లేగ్ మొదలగు నంటివ్యాధుల యందును ఆయా సంబంధములగు కారకములను బుచ్చుకొను చుండుటవలన వ్యాధులయొక్క వ్యాప్తితను తగ్గింపవచ్చును.

ఈ దేశమునందలి వైద్యశాస్త్ర పరిశోధన నాలయములు.

వ్యాధి రాకుండ జేయుటకును, వ్యాధి సంభవించిన పిమ్మట చికిత్స చేయుటకును, ఆనువరింపదగు పద్ధతులను శాస్త్రయుక్త మైనట్టియు నిశ్చితమైనట్టియు రీతుల స్పష్టీకరింపబడి ఇండియాదేశమునందు ఆంగ్లేయవైద్యశాస్త్రజ్ఞులు పరిశ్రమ చేయుచున్నారు. శాస్త్రీ

యచగు జీవాణుపరీక్ష జేయు స్థాపనాలయములు, బొంతాయిలూ లిస్టర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆనియు, చెన్నపురిలో కింగ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆనియు, కసాలీ (పంజాబ్) పట్నమునందు పాస్టర్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆనియు మూడు గలవు. వీరియొక్క కార్యక్రమ ప్రకటనలనుబట్టి వారువారినర్పించున పరిశ్రమ ఫలితముల మనము గనుగొన వచ్చును.

ఆరోగ్యకామ్ర లాభములు.

నాగరిక ప్రపంచమునందు ఆరోగ్యకామ్ర సూత్రముల ననుసరించుటవలన లాభముల నిండింతయుని చెప్పట కలవికాదు. ఇందువలన కోటాన కోట్లయొక్క ప్రాణములు రక్షింప బడుటయేగాక, ప్రపంచమునందలి దురవస్థయు తగ్గింపబడినది. ఐరోపియను దేశములయందును తూర్పుదేశముల యందును టీకాలనువేయుట ప్రారంభించిన దాదిగ మహాభియొక్కు వ్యాప్తతయు, అందువలన మరణములును, యెంతగా తగ్గింపబడిన దానిని బట్టియు నీ టీకాలవలని లాభమును మనము గ్రహింపవచ్చును. పూర్వము మహాచివలన వేలకు వేలు జనులు ఇంగ్లాండునందు చనిపోవు చుండెడివారు; వ్యాధ్యవంతము జీవించిన వారలలోజాల మంది వికలాంగు లగుచుండెడివారు. నేత్రదృష్టి పూర్ణముగ నశించినవారును ఉండెడివారు.

చలిజ్వరము ఒకకాలమునందు నింగ్లాండులో విశేషముగ నుండెడిది. ఇప్పుడింగ్లాండు నందీ జ్వరము కానరాదు. జలదారుల విషయమునం దవలంబింపబడిన నవీనాభివృద్ధి పద్ధతుల వలన నీజ్వరము నశింపు నందిన దని యనుకొన వచ్చును.

కుష్ఠరోగ మింగ్లాండునందు పదుమూడు శతాబ్దముల వరకు వ్యాపించి యిప్పుడు మాయమైనది. ఇండలకు సరియైన కారణములు తెలియరావచ్చువి. వృద్ధి నందిన ఆరోగ్యస్థితులు, మంచి ఆహారము, వ్యవసాయమునం దభివృద్ధి, ఈరోగుల బ్రత్యేక ఆసుపత్రుల యందుంచుట—యీ కారణము వలన నీవ్యాధి రూపుమాసి యుండును.

ఆరోగ్య మన నేమి?

ఆరోగ్యమునందు శరీరమునందలి ప్రతి ఆవయవమును అందలి అంతర్భాగములును తమ నిర్ణీత కార్యక్రమములను సరిగా జేయుచుండును. పృథ్వీయు, మేఘము, క్వాసకోశములు, ఒడలు (చర్మము), కారిజము, జీర్ణావయవములు, స్నాయువులు మొదలగునవి తమ నిర్ణీత కార్యములను ఆరోగ్యస్థితియందు క్రమముగా జేయుచుండును. వ్యాధిస్థితియందు యీ ఆవయవములలో ఏకటిగాని యొకటికంటె వధికముగ గాని తమ నిర్ణీత కార్యక్రమములందు లోపమును సూచించును.

ఆరోగ్యతవలని లాభము,

శరీరము మనస్సుయొక్క చిత్తవృత్తులను నెరవేర్చుట కేర్పడిన ప్రతినిధియై యున్నది. అట్టిశరీరము ఆరోగ్యత నందియుండిన యెడల మనస్సునకును శరీరము నుండునని చేరుగ జేపు హక్కులేదు. శరీరము ఆరోగ్యస్థితియందుండి ముఖానుభవమునకు దగిలులుండిన నే దప్పు మొదటి బుద్ధివైకల్యతయును యెంతటి భవజెల్లవమును ఉపయోగించినరేపు, ఆరోగ్యమున

దన్న భిక్షకుడు వ్యాధిగ్రస్తుడగు ధనవంతునికంటె నిజముగ నెక్కువసౌఖ్యముగ నుండును. జీవితసంగరమున దుర్బలుడుగాని వ్యాధిగ్రస్తుడుగాని జయ మందజేరడు. దృఢమగు మనో బలమునకు దృఢశరీరమే నివాసస్థానముగ నుండనగును. సంపూర్ణాశోగ్యములేకుండ సంపూర్ణ సౌఖ్య మనుభవించుట కెన్నడును ఆస్పదముండ నేరదు.

ధనవంతు లగువారెలు, మిక్కుటముగ భుజించుటవలనను, క్రమమగు శరీరకష్టము తేకపోవుటవలనను, వ్యాధులను గ్రహించు నుండును. నీకేతమునందలి విజయమును ఆనంద మును ఆశోగ్యస్థితి ననుపరిచియే యుండును.

వ్యాధుల రాకుండ జేయుట.

మనుష్యునకు సంభవించు వ్యాధులలో బాలవాటిని రాకుండ జేయుటకు వీలుకలిగి యున్నది. ఆరోగ్య సూత్రజ్ఞానమును తదనుచరణమును మనుష్యుడోటి ఆనుభవించు చున్న వ్యాధులయొక్క సంఖ్యను తగ్గించు ననుటకు సందియములేదు. ఇంగ్లాండు దేశము నందలి కొన్ని భాగములలోని బిడ్డలలో సగము ఆయిదు సంవత్సరములలోపు వయసుననే మరణము నందుదురు. ఇండియాదేశమునందు, కొన్ని పట్టణములందును కొన్ని జిల్లాలయందును యీ సగమువంతు పాప్తిని మించియే మరణములు గలుగుచుండును. ఆరోగ్యకాస్త్రనూత్రములను గమనించుటవలన సమరణములను దగ్గించుటకు వీలుగ నుండుననుటకు సందియములేదు. నివారించదగ వ్యాధులనుండి ఇండియాదేశమునందు ప్రతిసంవత్సరమును యిరువది లక్షల జనము చనిపోవుచుండును. ఆరోగ్యకాస్త్రము, వ్యాధులకు గారణములను దెలిసి, ఆకారణములు సందర్భపడకుండ నుండుటకు మనమవలంబించ వలసిన మార్గములను మనకుబోధించి, వ్యాధులు మనకు సంభవింపకుండ జేయుచున్నది. కొన్ని వ్యాధులలో నడచున కారణము లింకన దెలిసియుండక పోవుటవలన నీ ఆరోగ్యకాస్త్రము సహజ మొనర్చ లేకున్నది. కాని, కాముగతించినకొలదిని యీఆరోగ్యకాస్త్రజ్ఞానము ఆభివృద్ధి నందుచున్నదని మనము తెలిసికొదగి యున్నది.

వ్యాధి చికిత్స.

వ్యాధిచికిత్సవిషయములో అదివర కతిక్రమించిన ఆరోగ్యసూత్రముల గమనించుట గూర్చి ప్రథమమునుజాగ్రత్త బుచ్చుకొనవలయును. వ్యాధిస్థితియందు శరీరముయొక్క స్వభావక్షుణ్ణులు శరీరమును స్వస్థపరచుటకై బ్రయత్నము చేయుచుండును. మందుయొక్క ఉద్దేశ్యము ఆస్వస్థితి వృద్ధిగాకుండ నుండునటుల జేయుటయైయున్నది. స్వస్థపరచుటకై శరీరముగల స్వభావక్షుణ్ణుల విశేషమైయున్నది. అయినను, వ్యాధులు సంభవించిన పిమ్మట చికిత్సయత్నముల జేయుటకంటె వ్యాధులు సాధ్యమగుసంతోషరహిత సంభవించకుండ నుండట ప్రయత్నముల జేయుటయే మంచిది.

సాగరికత, వ్యాపారాభివృద్ధి, విద్య, సాజాకుతనము - యివన్నియు ప్రజలకుకొన్ని లాభములకు దోడుగా నవ్వములను గూడ గొనివచ్చినవి. ఈదినములలో గొందరి విషయమున పెడదూన కుండెడి పరిశ్రమము శరీరమున కుండదు. ఇందుమూలమున గలిగెడి వ్యాధులు విశేషముగ నుండెను.

జాగ్రతలు.

ఆరోగ్యకామ్రువిధుల ననుసరించి, వాయువు, జలము, ఆహారము - వీటినిగూర్చి తగు జాగ్రతలను బుచ్చుకొనవలయును. జలమునుగూర్చి అంటురోగవీరుల ననుమానముండిన యెడల మసలగాచి చల్లారబెట్టి పుచ్చుకొనవలయును. శరీరసాధకము, స్నానము, దుస్తులు - వీటియెడలను శ్రద్ధతో గమనించవలయును. పెంటకుప్పలు, జలదారులు, మొదలగునవి పరిశుభ్ర పరచవలయును. ఇట్టిజాగ్రతలు వ్యాధులను తగ్గించుటయందు సహాయముచేయును.

విజ్ఞాపన

(రెండవ కూర్పునకు)

నేటికి సుమారు ఆరువందలవరకు కిరిందట వెలువరించినట్లు యీగ్రంథము యొక్క మొదటికూర్పును గురించి అంగ్లేయ వైద్యకాశ్రుజ్ఞులును, దేశీయవైద్యులును, మొదలగువా రొసంగియున్న ఆభిప్రాయములనుబట్టి యీగ్రంథ మెంతవరకు సుపయోగించినదియు మాచదువరులే గ్రహించుదుగాక.

అంగ్లేయ వైద్యపద్ధతుల బ్రజలకు చెలువుటయందు అవశ్యకతనుగూర్చి విశేషించి చెప్ప నక్కరలేదు. మనుష్యజాతి అనుననమును లోనగు వ్యాధులయొక్క గారణములను తెలిసికొని యేగాని చికిత్సను బూనుకొనిన బ్రయోజన ముండనేరదు. అట్టికారణముల కాస్త్రియపద్ధతిని తెలిసికొను తెంతయు ముఖ్యమై యున్నది.

ఈరెండవకూర్పునందు అంటువ్యాధులు, వ్యాధిరక్షణశక్తి, మానసికావధము, వ్యాధులనుండి కాపాడుకొను విషయములు, మొదలగువాటిగురించి ప్రశ్నోత్తర ప్రకరణములయందు విపులముగ వ్రాసి, వ్యాధిచికిత్సల కవసరమగు గొన్ని సులభనూత్రమల వెనుకటికంటె పెక్కువగ విశదీకరించి యుంటిమి.

ఈకూర్పును వెలువరుచుటయందు మాకు దోడ్పడిన వికాఖపటణము జిల్లాలోని సాలూరు సంస్థానాధీశ్వరులగు మ. రా. శ్రీ శ్రీరాజా శ్రీ శ్రీ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ సన్యాసి రాజా పెదబలియారు సింహులు బహద్దర్ వారు ముద్రాణ వ్యయముకింద మాకొసంగియున్న రూ 500 ల విరాళమునకు వారియొడ మేమెంతయు కృతజ్ఞులమై యుంటిమి. మాకృతజ్ఞతా సూచకముగ నీగ్రంథమును శ్రీరాజాచారి కంకితమొనర్చియుంటిమి. తమ భావాభిమానమును గార్యరూపమున జూపువారు అంధభేదమునందు ఆరుదై యున్నారు. అట్టిసందర్భమున నీ రాజాచారు గనబరచియున్న ఔదార్యమున కెంతయు సుప్రసాదములు. అంధభేదము వంగు హోదాస్య భేదములనలే వాఙ్మయాభివృద్ధి నందుటకై వీరికను సహమొనర్చుటకు వలయు నాయురారోగ్యైకవ్యముల భగవంతుడు వీరికి ప్రసాదించుగాక!

సెప్టెంబరు 1915

ప్రీతి క

—...—

ఈ గ్రంథ ప్రకటనమును గూర్చి నేనెంత శ్రద్ధనువహించి తొందరపడి నను కార్యసాధనమున కనేక అంతరాయములు కలిగియుండుటచే సకాలములో బ్రచురింప జాలకపోతిని. ఇంతకును నేటికై నను బ్రకటింప గలిగి నందులకా వరమే శ్వేతునికి నావందనముల సమర్పించుచున్నాడను. నేనురచించియున్న వైద్యగ్రంథములలో “ఆధునిక మానసిక చికిత్స”ను గూర్చి మాచదువరులు యద్దాని నిరుపమానోపయోగమును గ్రహించిగట్లు తోచదు. అద్దానిని యిరువదినంవత్సరముల కాలములో ననేక వైద్యగ్రంథరాజముల బరిశీలించి సిద్ధపరచినదానిగా గుర్తెరుంగ గోరెదను. ఈ శాస్త్రము నొక్కదానిననుసరించియే పాశ్చాత్య దేశములయందలి అనేక వైద్యశాస్త్రవేత్తలు చికిత్సాద్విజయముల నందుచున్నారు. ఈ గ్రంథరాజవరమును గూర్చియు, తగుచికిత్సనుచరణమును గూర్చియు మాచదువరులు తమ అత్యంత శ్రద్ధను జూపుదురని నమ్ముచున్నాను.

బె జ వా డ,
ఏప్రిల్ 1939. }

చిత్తరిగె నేతుమాధవరావు.

—



ఆంగ్లేయ వైద్య చింతామణి

వ్యాధిచికిత్సయందలి ముఖ్యాంశములు.

వ్యాధియొక్క సందర్భమును గనిపెట్టుటకు గాని వ్యాధిని నివారణచేయుటకు గాని, ముందుగా నాడి విషయమైనట్టియు, ఊపిరి విషయమైనట్టియు, శరీరముయొక్క ఉష్ణస్థితి విషయమైనట్టియు, నాలొక విషయమైనట్టియు; కొన్ని సంగతులను దెలిసియుండుట మిగుల అవశ్యకమై యున్నది. ఈ విషయముల నొక్క టొక్కటిగ విచారించి చూచెదము.

రోగిని బరిక్షించుట.

రోగిని రెండు విధముల బరిక్షించవచ్చును. మొదటి పద్ధతి యేమన—రోగిని స్వయముగా బ్రశ్నించి తన వ్యాధి యెట్టిదో, తన ఆరోగ్యమునం దెన్నిదినులనుండి యే మార్పులా కలిగినవో, యేయే అవయవములయం దేయే బాధ కలిగియున్నదో—యీ మొదలగు సంగతుల దెలిసికొనవలయును. ఈ విషయముల సన్నిటిని దెలిసికొనిన పిమ్మట శరీరమును బరిక్షించి ఆస్వస్థత కగు మరికొన్ని గుర్తులను దెలిసికొనవచ్చును. సంపూర్ణ వ్యాధినిదానము నందు రోగియొక్క స్వచరిత్రనేగాక, కుటుంబ చరిత్రను గూడ—అనగా కుటుంబమునందలి పూర్వీకులలో నే ప్రత్యేక వ్యాధికై నను నుద్యుక్తత యుండియున్న సంగతిని గూడ—విచారించవలయును. ఈ రెండు విధములగు బరిక్షలను సరిసిన పిమ్మట వ్యాధినిగూర్చి కొంతవరకు వివరముల దెలిసికొనవచ్చును.

శరీరముయొక్క దృష్టి పరీక్ష

శరీరమేగాని, యే ప్రత్యేకావయవము గాని స్వాభావికముగ నుండు రీతిని మారి యున్నదా? శరీరాకారము, వర్ణము, సరిమాణము మొదలైన వానిలో అస్వాభావికముగ నేదైన గమనించుచున్నదా?

శరీరపు బరువు

చాలా వ్యాధులలో శరీరపు బరువు మారుచుండును. అప్పుడప్పుడు గొను తూణికలలో బరువు హెచ్చుచున్నదా? తగ్గుచున్నదా? బరువు హెచ్చుచుండిన యెడల సామాన్యగతులలో నాకోస్యమునే నూచించును; తగ్గుచుండిన యెడల వ్యాధి హితమని గ్రహింప వలయును. ఈ క్రింది పట్టికనుబట్టి మనిషియొక్క యెంత యెత్తున కెంత బరువుండవలసివచ్చియు సిద్ధాంతికరింపబడినది.

అ. ఆం.	అ. ఆం.				
4—6 నుండి	5—0	యెత్తువరకు	బరువు	సుమారు	92 పౌనులు.
5—0	5—1	"	"	"	115 "
5—2	5—3	"	"	"	127 "
5—4	5—5	"	"	"	139 "
5—6	5—7	"	"	"	144 "
5—8	5—9	"	"	"	157 "
5—10	5—11	"	"	"	170 "
5—11	6—0	"	"	"	177 "
6—0	పై యెత్తుకు	"	"	"	218 "

ఈ తూకములయందు దుస్తులయొక్క బరువు కలిసి యుండదు. 45 సం॥ల వయసు వరకు తూకము కొంచెము హెచ్చుచుండవలయును.

అవయవ సౌష్ఠవము

కొందరు మనుష్యులు యెముకల పోగువలె నుందురు. కొందరు స్నాయు పటుత్వమున గలిగి దార్ఢ్యముగ గనవడుచుందురు. కొందరు వదులైన స్నాయువులను గలిగి తాకుటకు మెత్తగనుండి స్నాయుపటుత్వము తక్కువగనుండి బలిసిపట్టు కనబడు చుందురు. ఇందు మొదటి తరగతివారు సామాన్యముగ వ్యాధిదూరులుగ నుందురు. రెండవ తరగతి వారు తరచు వ్యాధుల కుద్యుక్తులుగ నుందురు.

వర్ణము

శరీరవర్ణము పాలిపోయి యుండిన యెడల రక్త పరిమాణమునందు లోపమును గాని రక్త శ్రేష్ఠతయందు లోపమునుగాని సూచించును. ఈ సందర్భమున అజీర్ణ వ్యాధిగాని, మూత్రాశయ సంబంధముగ వ్యాధిగాని, రక్త సంబంధముగ వితరముగ వ్యాధి యొద్దయైన వ్యాధి యుండినట్లు సూచించును. పశువువర్ణము పచ్చగామాల వ్యాధిని సూచించును; బియ్యంపచ్చ వర్ణము కండ్లలో నెక్కువగ గనిపించును. నీలవర్ణము కొన్ని కొశాస్వత్వము సూచించును.

సంజా వాపులు

ఈ వాపులు తరచుగా పాదములపైనను చీలమండల యొద్దను గనబడుచుండును. ఆయా భాగములలో వ్రేలితో గొంచె మొత్తి వేలును దీసినయెడల గుంట పడియుండి క్రమముగా మరల నా గుంట పూడిపోవును. కంటి కడుగుచున్న క్రింద నట్టి వాపు గనబడిన యెడల నిట్టి స్థితి మూత్రాశయ వ్యాధి ఫలితమై యుండును. ఉదరము జ్వంభించి యున్నయెడల సంజా వ్యాధిని సూచించును.

ముఖ వైఖరి

ముఖ వైఖరి బట్టి వ్యాధియొక్క స్థితిని జాలవరకు గ్రహింపవచ్చును. శరీర వర్ణము గూర్చి పైన చెప్పబడియే యున్నది. కొద్ది కొద్దిగా వచ్చుచుండెడి జ్వరములలో ముఖమునం బట్టి సురుకుదనమును లేక, నిర్వికాసముగ నుండవచ్చును. ముఖముయొక్క యొక వైపున నెట్టి ముడతలు లేక రెండవ వైపున మాత్రం లుండవచ్చును. ఈ లక్షణము పక్షవాతమును సూచించును. పిరగా జూచుకొనడ మొనగడు వ్యాధిని సూచించును. మిడిగుడ్డు గండమాలా (Goitre) వ్యాధిని సూచించును.

ప్రీతి

నిలుచుండు, కూర్చుండు, చేతులు కాళ్లు మడుచుకొనియుండు—స్థితులనుబట్టి కొన్ని వ్యాధిగతులను తెలిసికొనవచ్చును. ఉదరభాగము వాచియున్నయెడల నిట్లు ముడుచుకొనుట తటస్థించును. మఱియు బిడ్డలయందు వెన్నపాముతో సంబంధించిన వ్యాధి యున్నయెడల తలను, మెడను, భుజములను గరవకుండ నుండరు.

శరీర వేడిమి

శరీర వేడిమి యొకసారి 103, 104 డిగ్రీలకు పెచ్చి పారంభ జ్వరము వచ్చి నపుడు సామాన్యముగ నిది చలిజ్వరమే, లేక స్వేదనా జ్వరమే అయి యుండును. కాన కొంతాస్పష్టత గనబడినచో స్వేదనా జ్వరముగ నెంచవచ్చును. ఇంకయేకాకుండ స్వేదనా జ్వరమునందు యీ తీవ్రజ్వరము యొకే కట్టుగ నుండును. చలి జ్వరమునందు జ్వరము పూర్తిగా జడిచి మరల వచ్చుచుండును. ఈ రెండింటి భేద మిదియే. ఆరోగ్యశీతియందు శరీర వేడిమి 98.4 డిగ్రీలు అయియున్నది. 105 డిగ్రీలు గాన అంతకు మించిగాని శరీర వేడిమి యుండియున్నపుడు అత్యుద్యత జ్వరమనబడును. 104 డిగ్రీలు ఉద్యత జ్వరము; 102.6 డిగ్రీలు జ్వరమనబడును. 100.4 కొద్దిజ్వరము; 98.4 ఆరోగ్యవంతలి వేడిమి; 97.8, ప్రమాదముకంటె తక్కువ; 96.8 కి తక్కువ, క్షీణస్థితిని సూచించును; ఈ పై కొలతలు తెర్మామెటరును చరిలోపెట్టి చూచుటవలెన గనవచ్చును. శరీరవేడిమిని కచ్చితముగ కనుగొనవలెనని తెర్మామెటరును అనవమునందు బెట్టి చూపించవలెను. శరీర వేడిమి 105 డిగ్రీలకు మించియున్నపుడు పూర్ణపామునకు గురైనవలెనయ్యెను. 101 గాని దాని సమాపవేడిమిగాని కట్టుగా నొకటిగా నున్నపుడు కావ్య

కోశాస్వస్థత యుండి యున్నచో యని అనుమానించవలసి వచ్చును. శరీరవేడిమిని ఉదయమునను సాయంకాలమునను పరీక్షించునను ఒకేగంటకు దీనుకొనుచు వ్యాధియొక్క సదతను గుర్తెరుగవలయును.

నాడి

హృదయమునుండి శరీరమందలి అన్ని భాగములకును రక్తమును గొనిపోవు తుదరక్త నాళములయొక్క త్రాగుడువలన నీ నాడి పుట్టుచున్నది. ఈ నాడి సామాన్యముగ పిలువనునరించి వచికట్టుయొద్ద పరీక్షింపబడుచున్నది. కాని, యీ నాడిని మనము మోహయొద్దను తుంటియొద్దను ఉపరిభాగమునను దగ్గరగానుండు ఇతర తుదరక్త నాళములయందును కనిపెట్టవచ్చును. ఈ నాడి చెబ్బలయొక్క ప్రతి నిమిషమునందలి సంఖ్య ఆరోగ్యస్థితియందు వయసునుబట్టి మారుచున్నది. ఈ క్రింది ప్రకారము, వయసు ననుసరించిన నాడిచెబ్బల సంఖ్యను, మనలెక్కకు ఆధారముగా తీసికొనవచ్చును. నాడియొక్క ప్రాముఖ్యత శరీర వేడిమికి పిమ్మట నేర్పడుచున్నది.

పుట్టుక మొదలు మొదటి సంవత్సరము చివరవరకును	}	నిమిషమునకు 140 చెబ్బలు		
రెండవ సంవత్సరము మొదలు మూడవ సంవత్సరము అంత్యమువరకును		,, 120 చెబ్బలు మొదలు 100 వరకును		
పాల్గవ సం॥ మొదలు ఆరవ సంవత్సరం అంత్యము వరకు	}	,, 100 ,, 90 ,,		
7 సం॥ మొదలు 14 సం॥ వరకును		,, 90 ,, 75 ,,		
14 ,, 21 ,,	}	,, 85 ,, 75 ,,		
21 ,, 25 ,,		,, 75 ,, 65 ,,		
వృద్ధత్వమునందు		,, 85 ,, 70 ,,		

కోడిజనులలో, ఆరోగ్యస్థితియందున్నను, యీ పైన సూచింపబడిన నాడిచెబ్బల సంఖ్యయందు విశేష భేదము గనిపించవచ్చును. మరికొందరిలో, ఆరోగ్యస్థితియందే, నాడిచెబ్బలు యీ సంఖ్యకు కొంచెముగ భేదింపవచ్చును. అయితే, సామాన్యముగ శరీరపరిశ్రమ లేనిదే, పైన సూచింపబడిన పట్టికకు భిన్నముగా, పది లేక యెనిమిది చెబ్బలు మోచుచుగాని తక్కువగాగాని యుండియుండిన యెడల, శరీరమునం దేదియో జబ్బు ప్రవేశించి యున్నదని మనము నమ్మవచ్చును. సంఖ్య యెక్కువగా నున్నయెడల జ్వర తీవ్రత యున్నదనియు, తక్కువగా నున్నయెడల మాంద్యత వహించి యున్నదనియు మనము ఊహింపవచ్చును.

వైద్యుడు నాడిని చేతితో దాకుటవలన, జ్వరతీవ్రతను మాంద్యతను కనిపెట్టుటయే కాక యితరకుగూడ కొన్ని జీవాస్థితులనుగూడ గమనించవచ్చును. నాడి చురుకుగానుండి విశ్రాంతిగాను మృదువుగాను నుండినయెడల జ్వరవ్యాధి రాబోవుచున్నదని సూచించును. నాడియొక్క చెబ్బ క్రమముదబ్బి ఒక చెబ్బకును మరియొక చెబ్బకును యుండిడి మధ్యకాల

మూలు భిన్నములుగా నుండినయెడలను, ఉండిఉండి పోటుపొడిచిపట్టుండినను, హృదయ రోగమును సూచించును. అశీర్షవల్లను, తేయాకు కీర్ణ యెక్కువగ త్రాగుటవల్లను, చుట్టు కాల్చుటవల్లను, నాడియొక్క క్రియను హృదయరోగము నందువలెనే మారును. కాలరా మొదలగు త్వరితముగా గృభింపజేయు వ్యాధులయందు నీగనమయినట్టియు దారము నుబోలి సన్ననైనట్టియు నాడిని గమగొనవచ్చును.

నాడి పరీక్ష

రోగియొక్క శరీరస్థితినిగూర్చి తెలిసికొనుటకు నాడిపరీక్ష ముఖ్యమయిన ఆధారమై యున్నది. తలచిదుగా నీ పరీక్షవలననే రోగికి స్వస్థత గలుగుచున్నదియు లేనిదియు తెలిసికొనుటకు విలగుచున్నది. విశేషముగా ననుభవమువలననే నాడియొక్క స్థితిని తెలిసికొనదగియున్నది. దినమునను దినము రోగి బలమందుచున్నదియు, నీరసమునందున్నదియు నాడినిబట్టి తెలిసికొనవచ్చును. నాడియొక్క స్థితియందు గలుగుచున్న మార్పులను వైద్యుడేగాని రోగియొక్క పరిచారకులేగాని గమనించవలసియుండును. నాడియొక్క వివిధములగు స్థితులను తెలిసికొనుటకు రోగులయొక్క నాడిని దలచుగను పెక్కువ శ్రద్ధగను బరీక్షించుచుండవలయును. ఒక రోగియొక్క ఆస్వస్థతావస్థయందున్న నాడియొక్క భేద గుణములను తెలిసికొనుటకు స్వస్థతయందున్న వాని యొక్క నాడితో పోల్చి చూచుకొనవలయును; ఇందుమూలమున నట్టి ఆస్వస్థతయందున్న నాడియొక్క ప్రత్యేక గుణములను దేలికగ గనిపెట్టవచ్చును. చురుకును బుట్టించు బాగిందీ మొదలగు పదార్థముల నిచ్చిన పిమ్మట నాడిపైన గలుగుచున్న మార్పులను శ్రద్ధతో గమనించుచుండవలయును.

వ్యాధియందుండి నాడియొక్క స్థితిని తెలిసికొనుటకు ముందుగ నారోగ్యమునందు నాడియందు స్థితిని తెలిసికొనవలగును. ఆరోగ్యస్థితియందు నాడియొక్క దెబ్బలు నిమిషమునకు, పురుషులలో దైన్దవారల యందు 72 మేదలు పసిపిల్లలలో 120 వలకు నుండును. నాడియొక్క పరిమాణమును, బిత్తిడివలన సెంత దేలికగ నాడిని ఆపుచేయదగినను విషయమును, గమనించదగిన అంశములైయున్నవి. నాడిని బరీక్షించునపుడు రెండుగాని లేక మూడుగాని వేగిళ్ల నుపయోగింపవలయును. మణికట్టు సమీపమున నీనాడిని పరీక్షింపవలగును. బిడ్డలయందు దొక శ్రేణిలో బరీక్షించినచాలు. నాడిని ఆరంభించుము (30 సెకనులు) వరకు పరీక్షింపవలగును. ఈ కాలమును గుర్తించుటకుగాను కేబుగడియారము నుపయోగింపవలగును. నాడియొక్క క్రియత విశేషముగా దప్పియుండుటవలనగాని, నాడియొక్క పరిమాణము పీనమయి యుండుటవలనగాని, మణికట్టుయొక్క నాడిని బరీక్షించుటకు పిలు లేక పోగునప్పుడు ఎడమచేతు ప్రవాగ్రిమునకు గొందుగ గొంతెము లోభాగమున గుండెయొక్క దెబ్బలును తీర్చింపవలయును. నాడిని బరీక్షించునపుడు రోగియొక్క మోచెయ్యి యొంగుకుండ నుండునట్లు చేయవలయును. ఆట్లుంగియుండినయెడల రక్తప్రచారమునందు బాటంకము కలిగి నాడియొక్క క్రియమయిన పరిమాణమునకు లోపమును సూచించును. రోగి పడుండి యుండునపుటికంటె గూర్పునియున్న స్థితియందు నాడియొక్క తీవ్రతతప్పుక నధికముగ నుండునని తెలియవలయును.

నాడియొక్క శరీరీయందు నాలుగంశములను గమనింపవలయును. (1) నాడియొక్క కొట్టుకొనుట యందలి తఱచుదనము (తఱచుగా కొట్టుకొనుట) (2) నాడియొక్క శరీరమాణము (3) నాడియొక్క ఒత్తిడి కణగు గణము (4) నాడియొక్క క్రమత.

(1) నాడియొక్క తఱచుదనము (Frequency)

ఒక్క కాల పరిమాణములో లెక్కింపనగు డెబ్బలయొక్క సంఖ్యను బట్టి నాడియొక్క తఱచుదనము గుర్తింపబడుచున్నది.

1. శరీరవేడిమి అధికమైన కొలదియు నాడియొక్క చురుకుదన మతిశయమై యుండును: శరీరము నీరసస్థితియుం దున్నప్పుడును నాడియొక్క తఱచుదన మధికముగ నుండును. శరీర వేడిమి నిలుకడగ నుండియున్నప్పుడుగాని, శరీరవేడిమి తగ్గుదల నందు చున్నపుడుగాని, నాడియొక్క కొట్టుకొనుట దినదిన మధికమగుచుండిన యెడల గుండెయొక్క కార్యక్రమత చెడిపోవుచున్నదని గ్రహింపవలయును.

2. పిత్తము రక్తమునందు గలిసి ప్రచారము నందుచున్నపుడుగాని, మజిలైజైన విషము రక్తప్రచారమునందు గలిగినపుడుగాని, నాడి మందమైయుండును. నీరసస్థితియుం దున్న పృథ్వీమయములలో నాడి యీ స్థితి నందియుండును.

3. ఒకప్పుడు నాడి యెడతెగకుండ కొట్టుకొనుచు పరిమాణమునందు హీనమై లెక్కపెట్టుటకు వీలులేకుండ నుండును. ఒక డెబ్బలను మరయొక డెబ్బలను నుండెడి మధ్య కాలము గుర్తించుటకు వీలులేక డెబ్బలను లెక్కపెట్టుటకు వీలులేకుండనుండును. రక్తనాళమునం దొకవిధమగు వణకుదనమును మాత్రమే గమనించుటకు వీలుగ నుండును మరణావస్థయుం దున్న వారలయం దీవిధమగు నాడిని గనిపెట్టవచ్చును.

నాడియొక్క పరిమాణము (Size)

ఈ విషయమున నాడి సంబంధమగు రక్తనాళముయొక్క పరిమాణమును, డెబ్బలయొక్క పరిమాణమును గుర్తింపవలయును.

నాడి, ప్రేరికి ప్రమాణస్థితికంటె పెక్కువ విస్తరింపునందినటుల కనబడినయెడల వైశాల్యగతి నందియుండినటుల జెప్పవచ్చును (Large Pulse). ఇవ్విధములయం దిట్లుండును.

నాడి, ప్రేరికి ప్రమాణస్థితికంటె తక్కువగ గనిపించినయెడల క్షీణగతి నందియుండి నటుల జెప్పవచ్చును (Small Pulse). ఈ స్థితియందు పెరిశుద్ధ రక్తనాళములలో నుండవలసినంత పూర్ణమగు రక్తమును ప్రచారమునం దుంచకపోవుటచే, గుండె దర్బలశక్తియు నందుచున్నదని తెలిసికొనుటకు గుర్రగ పెంచవలయును. ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి ఆరోగ్యమునందున్న వారలకును నిట్టి విధమగు నాడి ఉండియుండుటను మనము మరువరాదు.

మాత్రగ్రంథి యొక్క అస్వస్థతయందును నిట్టివిధముగ నాడిని గమనించవచ్చును. ఆసందర్భమునకు దీనిని గుండెయొక్క అస్వస్థతాఫలితమని నెంచవచ్చును. ఈ పై విధముగ నాడియందు దారమునలే సన్నగ నుండునట్టిది బహు అపాయస్థితిని సూచించును (Thready Pulse).

(3) ఒత్తి నచో నణగునట్టి స్థితి (Compressibility)

నాడి గట్టిగనన్నదా మృదువుగనన్నదా? (Hard pulse or Soft pulse)? అనగా నాడి కొట్టుకొనుటను నిలుపుచేయుటకు గట్టిగ నొత్తవలయునా. లేక తేలికగ నొత్తవలయునా?

మాత్రగ్రంథులు వాపుదల నందియన్న స్థితియందు నాడి గట్టిగనుండును; ఈ గతియందు పరిశుద్ధ రక్తనాళములలో రక్తము పూర్ణముగ నిండియుండును. ఈ కారణమున దెబ్బయొక్క పరిమాణము చిన్నదిగ నుండును. ఈ దెబ్బను ఆపుచేయుటకు గట్టిగ నణచి పెట్టవలసి యుండును (Hard Pulse). మృదువునాడి యనగా ప్రేక్షతో నదిమినయెడల బహు తేలికగా నాగిపోవునట్టిది. ఈ స్థితి గుండెయొక్క దుర్బలత్వమును సూచించును, తుద రక్తనాళములు విస్తరింపు నందుటకు వలసినంత రక్తమును గుండె పంపుటలేదని తెలిసికొనవచ్చును (Soft Pulse).

ద్విత్వనాడి: మృదువునాడియందు శరీరమున్న మరయొక విధమైనది ద్విత్వనాడి యనబడుచున్నది. ద్విత్వనాడియందు రెండు దెబ్బలుండును. ఈ విధముగనాడి సన్నిపాతజ్వరము (Typhoid Fever) యొక్క అంత్యగతులయందు దలచుగ గనబడును. మణి కట్టుయొక్క చక్రి దెబ్బయందును మొదటగ పెద్దదెబ్బయును పిమ్మట చిన్న దెబ్బయును గనబడును. ఈ రెండు దెబ్బలను గలిపి యొకటిగానే గమనించవలయును; ఒక్కొక్కప్పుడు పరిమాణమునూ దీ రెండు దెబ్బలను సమానముగా నుండుటచే గొ దరు వాటిని రెండింటిగా లెక్కించి పొరబడవచ్చును. ఇట్టి అనుమాన మున్నపుడు గుండెదెబ్బలను లెక్కించుటచే ననుమానమును దీర్చికొనవచ్చును. మృదువునాడి యందువలెనే ఈ స్థితియందును తుదరక్తనాళములు అసంపూర్ణముగ రక్తపూరితము లగుటచే నీ ద్విత్వనాడి కలుగుచున్నది. ఇది యెల్లప్పుడును అపాయమును సూచింపనేరదు (Dicrotic Pulse).

(4) క్రమత దస్సిన నాడి

1. నాడియొక్క దెబ్బ ఒకటి బలముగను రెండవది దుర్బలముగను, లేక మొదటిది దుర్బలముగను రెండవది బలముగను, నుండి యిదే విధముగ నడచుచుండును.

2. నాడియొక్క యొక దెబ్బకును పిమ్మటి దెబ్బకును నుండేది మధ్యకాలము భేదించుచుండుట; ఒకసారి త్వరితముగ గొట్టుకొనుచు మరియొకసారి నెమ్మదిగొట్టుకొనును.

దీనిని మిగుల అపాయకస్థితిగ నెంచవలయును. క్వాస సంబంధముగ వ్యాధియందు ఈ విధముగ నాడి జనింపవచ్చును.

ఒక్కొక్కప్పుడు మధ్య నొకచెట్టు గలిచిపోవచ్చును. అతీర్ణమునందును, పొగ చుట్టును కేశేషముగ గాల్చుటవలనను, నీస్థితి కలుగవచ్చును గాన నీస్థితి నెల్లప్పుడును నపాయకరముగ నెంచదగదు (Intermittent Pulse).

నాడి కొట్టుకొనుట విశేషముగనుండి, క్షీణగతి నందియుండి, మృదుత్వమునం దతి శయముగ నున్నయెడల, గుండెయొక్క దుర్బలత్వ మధిక మగుచున్నదనియు, రోగియొక్క స్థితి మిగుల నపాయకర మగుచున్నదనియు, చెలియవలయును.

ఊపిరి

వాయువు క్వాస కోశములలోనికి వచ్చునప్పుడును క్వాస కోశములనుండి బయటికి బోవునప్పుడును గలిగెడి అొమ్ముభాగముయొక్క విస్తరింపువలనను మునుపనము వలనను ఊపిరి యేర్పడుచున్నది. అొమ్ముయొక్క రెండువైపుల కదలికయును భేదమేమియులేక ఒకే విధముగా నుండవలయును. నాడివలెనే ఊపిరియును, దేహపరిశ్రమ వలనను మనోదేర్చి కమువలనను మార్పు నందుచున్నది. శరీర పరిశ్రమయు మనోపరిశ్రమయు లేని సమయ మందు ఆరోగ్యమందున్న యావనుడు ప్రతి నాడుగ నాడిచెట్టులను ఒకసారి ఊపిరిని లోనకు బీల్చుచున్నాడు. కొందరియందు నిమిషమునకు పదునైదునుంచి పదునెనిమిది పర్యాయములవరకు నూపిరి పీల్చుట కలుగుచున్నది. నాడి యందువలెనే ఊపిరియందును చురుకుదనమును మాంద్యమును వహించిన జనులు కొందరుండురు. ఆయితే, సామాన్యముగ విశ్రాంతి దీసికొనియున్న సమయమున పైన గనపరుపబడిన సంఖ్యకు భిన్నముగ నుండిన యెడల దేహముయొక్క అనారోగ్య స్థితిని మనము గ్రహింపవచ్చును. పై సంఖ్యకు అధికముగా నుండినయెడల క్వాసకోశములకు సరాసరిగాని వేరువిధముగాగాని అన్యధ్యత కలుగబోవుచున్నదని మనము తెలిసికొనవచ్చును. పై సంఖ్యకు తక్కువ అయినయెడల నిస్త్రాణిగాని, జీవనత్తువయొక్క నష్టముగాని, సరముల సంబంధముగ అదరుగాని తటస్థిమను.

పెద్దవాండ్రయందుకంటె పసిపిల్లలయందు నాడివలెనే ఊపిరియును త్వరితగతిని నడచుచుండును. రెండు సంవత్సరముల వయసు వరకు బిడ్డలు నిమిషమునకు కిద పర్యాయములు ఊపిరి బీల్చురు; రెండుసంవత్సరములు మొదలు తొమ్మిది సంవత్సరముల వయసు వరకును నిదింపునపుడు 18 పర్యాయములును, మేల్కొని యున్నపుడు 23 పర్యాయములును, తొమ్మిది మొదలు పదునైదు సంవత్సరముల వరకును నిదింపునపుడు 13 పర్యాయములును, మేల్కొని యున్నపుడు 20 పర్యాయములును ఊపిరి బీల్చురు.

ఊపిరి విడుచు వాయువుయొక్క వాసననుబట్టి కొన్ని వ్యాధులయొక్క సంగతులను చూడవచ్చును. అతిమాత్రమునందు ఊపిరి గాలి కొద్దిగా సీమలేగు ఫలము వాసనను గలిగియుండును; అన్నికోశ సంబంధముగ జబ్బులయందు, ముఖ్యముగా బిడ్డలయందు, పుల్ల

వాసన కలిగియుండును; కొన్ని విధములగు అజీర్తులయందు దుర్గంధసహితముగ నుండును; మూత్రాశయ మూత్రాకోశ సంబంధములగు వ్యాధులయందు మూత్రముయొక్క వాసనను గలిగియుండును; సారాయిని విశేషముగా త్రాగుటవలనను పుల్లపైన్టీయు సారాయ వాసనతో గూడినదిగాను ఉండును. చెడిపోయిన పండ్లు ఊరిని దుర్గంధహితముగ జేయును.

ఉష్ణస్థితి

శరీరము ఆనార్గ్య స్థితిలో నున్నపుడు దేహముయొక్క ఉష్ణస్థితిని తెలిసికొనుటకై అందుకేర్పడిన తెర్మామెటరుతో శరీరముయొక్క ఉష్ణతను చెలిసికొనవచ్చును. ఇందులకుపయోగించు తెర్మామెటరుకు “క్లినికల్”, తెర్మామెటరుని పేరు. “క్లినికల్” అనగా “రోగియొక్క పడక సమీపమున నుపయోగింపదగిన” అని అర్థము. ఈ తెర్మామెటరు నందు సామాన్యముగ 95 డిగ్రీలు మొదలుకొని 112 డిగ్రీలవరకును మార్కు చేయబడి యుండును. ఒక్కొక్క డిగ్రీ ఆయిదు భాగములుగా విభజింపబడి అట్టి ఒక్కొక్క భాగము ఒక్కొక్క చిన్నగీతచే గుర్తుపెట్టబడియుండును. పెద్దగీతలు డిగ్రీలకు బహులుగాను, చిన్న గీతలు డిగ్రీలో అయిదవవంతు భాగములకు బహులుగాను నిల్చియుండును. అంకెలతో సామాన్యముగ 95, 100, 105, 110 డిగ్రీలుమాత్రమే గుర్తింపబడి యుండును. మన దృష్టితెక్కచే మధ్యనున్న పెద్దగీతనుబట్టి తక్కిన డిగ్రీల సంఖ్యనున్నూ మనము గమనింప వచ్చును. మనము శరీరముయొక్క ఉష్ణతను తెలిసికొనుటకు ముందుగా తెర్మామెటరు నందలి పాదరసము 95వ డిగ్రీ దగ్గరకు దిగునట్లుగా తెర్మామెటరును కుడికేతితో బట్టుకొని రెండవ చేతిపై తట్టవలయును.

శరీరముయొక్క సామాన్యస్థితియందు ఆనగా, ఆరోగ్యతను దేహవిశ్రాంతిని వహించియున్నపుడు, శరీరముయొక్క ఉష్ణత, ఫారెన్ హీట్ తెర్మామెటరు ప్రకారము 98.4 ఆనగా 98 డిగ్రీలకు రెండు చిన్నగీతలు పైగా నుండవలయును. (శరీరమునందలి ఉష్ణతను చెలియుటకుపయోగించెడి తెర్మామెటరు లన్నియు ఫారెన్ హీట్ తెర్మామెటరులే.) నోటి యందు బెట్టుకొని చూచినచో 99.5 డిగ్రీలుండును. రక్తముయొక్క వేడిమి 99.5 డిగ్రీలకు మించియున్నపుడుగాని, 97.5 డిగ్రీలకు తగ్గియున్నపుడుగాని, అట్టిమార్పులు కొంతవరకు శరీరములైయున్నపుడు దేహమందు వ్యాధి ప్రవేశించినదని నిశ్చయముగా దలపవచ్చును. హెచ్చుగానున్నపుడు జ్వరమునుగాని, జ్వరములోగూడిన యేదో యొకవ్యాధినిగాని సూచించును. తగ్గియున్నపుడు, శరీరమునందలి నిస్సత్తువనుగాని, త్వరితముగ గృహింపజేయు వ్యాధులనుగాని, దీర్ఘవ్యాధక వ్యాధులనుగాని, దేహములోని రక్తస్రావమునుగాని సూచించును.

శరీర వేడిమి

ఆరోగ్యస్థితియందున్నవారలకు శరీరవేడిమి ఫారెన్ హీట్ తెర్మామెటరు ననుగరిం సుమారుగ 98.4 డిగ్రీలుండును. ఇది మనుష్యశరీరముయొక్క సామాన్యవేడిమి (Normal Temperature) అనబడును. దివముయొక్క యిరువది నాలుగుగంటల కాలమునకు

యిదే వేడిమి ఉండక, సాయంకాలము 4 గంటల 6 గంటల మధ్య కాలమునందు 99 డిగ్రీలవరకు హెచ్చువచ్చును. రాత్రివేళయందు క్రమముగ తగ్గి 97½ డిగ్రీలకు దిగవచ్చును. దీనినిబట్టి ఆహార్యస్థితియందున్న మరుమృతకు దినమంతటను శరీరవేడిమి 97½ డిగ్రీలకును 99 డిగ్రీలకును మధ్యగ చలించుచుండునని మనము తెలిసికొన దగియున్నది. శరీరవేడిమి 97½ డిగ్రీలకు తగ్గినను శరీరమును దవ్యస్థత యేర్పడియున్నదని మన మెంచదగియున్నది. వ్యాధియందును శరీరవేడిమియొక్క హెచ్చుటయును గలిగియుండును. సన్నిపాత జ్వరము నందు (Typhoid Fever) రాత్రి రెండుగంటలవేళ శరీర వేడిమి తగ్గుదలనంది సాయం కాలము ఆరుగంటలవేళ హెచ్చుదల నందియుండును. ఈ రెండువేళలకును శరీరవేడిమి రెండు లేక మూడు డిగ్రీలైనను భేదము కలిగియుండును. అస్వస్థతయందలి యిట్టిస్థితి సామాన్యస్థితియందలి గతి నే విశేషముగ సూచించుచున్నదని మనము గ్రహింపవలసియున్నది. కొన్ని ఆరదు విషయములలో మాత్రము రాత్రి రెండు గంటల వేళనే శరీరవేడిమి హెచ్చు గానుండి సాయంకాల మారుగంటలవేళ తగ్గుదల నందియుండును; యిట్టిస్థితి సామాన్య ముగ సంభవించదు.

దినమయొక్క కాలవిశేషమును బట్టి శరీరవేడిమి మారుటయే గాక, మనము శరీరము యొక్క యేభాగమును పరీక్షించుచుంటిమా దానినిబట్టియు శరీర వేడిమియందలి మార్పు గలుగుచుండును. శరీరమయొక్క ఉపరిభాగమునుండి వేడిమి గాలిలోనికి గ్రహింపబడు చుండుటచే శరీరమయొక్క లోభాగములకంటె పై భాగమునందు వేడిమి తక్కువగా నుండును; కాబట్టి నోటియందుకంటె చుకలలోను గజ్జలలోను వేడిమి తక్కువగానుండును. నోటియందుకంటె ఆసనమును చెక్కువేడి యుండును. కాని ఒడలుయొక్క వేడిమికిని ఆసనమునందలి వేడిమికిని యెన్నడును ఒక డిగ్రీకంటె హెచ్చు భేద ముండనేరదు.

వ్యాధియందు శరీరవేడిమి హెచ్చునైన వచ్చును; లేక తగ్గునైన వచ్చును; హెచ్చుటయే మిక్కుటముగ దట్టించును.

సామాన్య వేడిమికంటె హెచ్చుగల నందగనే జ్వరగతి ప్రారంభ మైనదని చెప్ప వచ్చును. 102 డిగ్రీలకు మించకుండినయెడల సామాన్యజ్వరమని చెప్పవచ్చును. 104 లేక 105 డిగ్రీలకు సమీపించినపుడు తీవ్రజ్వరమని చెప్పవచ్చును; 106 డిగ్రీలకు సమీపించినపుడు ఉష్ణద్రవముగా మెంచవచ్చును. కాందరు 105 డిగ్రీలే ఉష్ణద్రవముగ మెంచుదు.

జ్వరము మూడువిధములై యున్నది.

- (1) విడువకుండ నొకే విధముగ నుండెడి జ్వరము. ఉ॥ న్యూమోనియా.
- (2) సాయంకాలమందు హెచ్చుచు తెల్లవారుజామున తగ్గుచుండెడి జ్వరము. ఉ॥ టైఫాయిడ్ జ్వరము.
- (3) జ్వరము పూర్తిగా బోవుచు మరల మరల వచ్చుచుండునట్టిది. ఉ॥ చలిజ్వరము.

జ్వరము తగ్గిపోవుటలో నొకప్పు డొకసారిగ సామాన్య వేడిమికిపాడ తగ్గి వేడిమి నీతికి తేవచ్చును. ఇట్టి విషయములలో బహు జాగ్రత్త గనుండి చుట్టవలెను. పదార్థముల నియంత్రణలనియుండును.

మరియొక్కప్పుడు జ్వరము తగ్గిపోవుటలో రస దినము కొంచెము కొంచెముగా తగ్గుచు క్రమక్రమముగ రాహిత్యము కలుగవచ్చును. స్వస్థావస్థయందున్న రోగిని యొకప్పుడు మనసునకు గలిగిన యే సూక్ష్మ అయాసమువలన గాని మరియే యితర కారణముల వలన గాని రెండు లేక మూడు డిగ్రీలవరకును శరీరవేడిమి హెచ్చవచ్చును గావున, బహు జాగ్రత్త గ గమనించుచుండవలయును.

శరీర వేడిమి 97½ డిగ్రీలకు దక్కువైనపుడు సామాన్య వేడిమికి దక్కువగ నెంచవచ్చును. శరీర వేడిమి 95 డిగ్రీలకు సమాపించినపుడు వీణానీతి సంభవించుట కాస్పదము కలుగును. ఒక్కొక్కప్పుడీ వేడిమియందుపాడ మరేమియు దుర్ఘణములు కనబడకండ నుండి ఆపాయనీతి లేరపోవచ్చును.

ఒక్కొక్కప్పుడు 95 డిగ్రీల వేడిమి రక్తస్రావమువలనగాని యేదైన అదరువలనగాని తటస్థింపవచ్చును. అట్టి విషయములలో మిగుల జాగ్రత్తను వహించియుండవలయును.

శరీర వేడిమిని గొల్పుట

శరీర వేడిమిని తెర్మామెటరుతో గొల్పుటయందు మనము వ్యాధియొక్క స్థితిని గ్రహించుటకై ప్రతిదినమును ఒకే కాలముందును ఒకే స్థలముందును బరీక్షించవలయును. ఒకదినము చంకయందును, యింకొకదినము నోటియందును, బరీక్షించుటవలన మనము సరియైన స్థితిని గ్రహింపజాలము. తెర్మామెటరును శుభ్రముగ దుడిచి, పాదరసపు గుర్తు 95వ డిగ్రీవరకు దిగునట్లు చేసి, రోగియొక్క శరీర వేడిమిని చంకయందు గాని నోటిలోగాని దాని నుంచుటవలన బరీక్షించవచ్చును. చంకయందలి చెమటను దుడిచివేసి మరియు తెర్మామెటరును చిట్టవలయును. శరీర వేడిమిని కొల్పుటకు 5 నిమిషముల కాలము చాలును. ఇంకొక 5 నిమిషములు తెర్మామెటరును చంకలోనుంచిన యెడల శరీర వేడిమి కొంచెము హెచ్చుగా గన్పించవచ్చును. ఒక మిగిలు కాలములోనున్న శరీర వేడిమిని గనబరచు కొన్ని తెర్మామెటరు లుండును గాని, యెన్నడును పారపాటు కలుగకుండు నటుల కొంచె మెక్కువకాలమే యుంచి పరీక్షించుట మంచియైయున్నది.

తెర్మామెటరును నాలుక క్రింద మూడు నిమిషముల వరకును ఉంచి, పెదవులను మూసియుంచి, పిచ్చుట శరీర వేడిమిని గుర్తించుటయు, అచారమైయున్నది. కాని యిట్లు చేయుటచే, బిడ్డలలోను, సంధిగుణమును పహించిన వ్యాధిగ్రస్తులయందును, మిగుల నీరస స్థితియందున్న రోగులయందును, ఒకప్పుడు తెర్మామెటరును పండ్లపండ్లన గొరికివేయుట తటస్థించును, కావున జాగ్రత్త గ నుండవలయును. నోటిలోనుంచి పరీక్షించిన తెర్మామెటరు

సెప్టుడును మఱియొకరు పయోగించుటకు ముందుగా కార్బాలిక్ సోల్యూషను (5 పార్ట్స్ కార్బాలిక్ ఆసిడ్ + 95 పార్ట్స్ నీళ్లు)లో గడిగి తుడిచివేయుట మంచిది.

మనము అనుకూలనయంత హెచ్చు వేడిమినికాని తగ్గు వేడిమినిగాని తెర్చుకొంటుంటే గనుగొనినపుడు, యింకొక అరగంటకు మరల బ్రష్షించుట మంచిది. శరీరవేడిమి హెచ్చుచున్నదియు తగ్గుచున్నదియు గనుగొనుటకు మరల నింకొక అరగంటకును బ్రష్షించవగును. అట్లు చేయకపోయినయెడల రోగిని తగినంత శ్రద్ధతో చికిత్స చేయుచుంటిమని యనుకొనుట కొంతమాత్రమును వీలులేదు.

జ్వరరోగి కుపచారములు

1. విశేషము శ్రమముగా నగుచుండునట్లుల జూడవలయును. విశేషమునం వజీర్గుణ ముండియున్నదేహా చూచి అవసర చికిత్స చేయవలయును.

2. మూత్ర విసర్జనము శ్రమముగా నగుచున్న విషయమును గమనించవలయును.

3. దినమున కథమపక్షము రెండుమారులైనను నోటిని చల్లని నీటితో శుభ్రముగా గడుగవలయును. పెదవులపైనగాని పండ్లపైనగాని కూడుకొనియున్న మలినమును దీని వేయవలయును.

4. చల్లనైనట్టియు, పరిశుభ్రమైనట్టియు, జలమును రోగి కోరినంత యివ్వవగును.

5. డాక్టరుయొక్క సలహా లేకుండ రోగిని లేవనియ్యవద్దు; కూర్చుండటమును నొకప్పుడు హాని గలుగజేయవచ్చును.

6. పిండికట్లు కట్టుటగాని, వేడి కాపడములు కాచుటగాని, అవసరమైనప్పుడు రోగిని పక్కకు దిప్పువలయునేగాని లేవదీయగూడదు.

7. రోగి పరుండియున్న గదియొక్క కిటికీని తెరచియుంచవలయును; కాని రోగిపై మాత్రము గాలిని విసరనియ్యగూడదు.

8. తీక్షణమైన వెలుగురును రోగియొక్క నేత్రములపై ప్రసరింప నీయవలదు. కాని, గదిలోనికి వీలైనంతవరకు ఎండను రానియ్యవచ్చును.

9. జ్వరరోగిని యెంటరిగా వదలివేయరాదు. అట్లు చేసినయెడల తీవ్రజ్వరములో సంధిగుణము జనింపవచ్చును.

10. రోగి పరుండియుండు గదిలో కత్తులు కత్తెరలు మొదలగువాటి నుంచరాదు.

11. గదియంతయు దుమ్ములేకుండ పరిశుభ్రముగా నుంచి కార్బాలిక్ లోషకాలాదులను గుడ్డతో నచ్చటి సామానులన్నియు దుడువవగును.

ఆంగ్లేయ వైద్య చిత్రామణి

పుట 13]

2

1



తెర్మామెటరు.

1. జ్వరమునందు పాదరసము 104 డిగ్రీలకు హెచ్చిన స్థితిని చూపించు చున్నది.

2. జ్వరమును గొలుచుటకు ముందుగా పాదరసమును గ్రిందికి దింపిన స్థితిని చూపించు చున్నది.

80.4° - శరీరమధ్యస్థ సామాన్య వేడిమి.

12. రోగి కుదయోగించిన ధూను, గిన్నె, చెమిచా, మొదలయినవాని నన్నిటిని శుభ్రముగా గిరిగి దూరముగా నుంచవలయును.

13. అవతరము, పూస, కాళ్ళి మొదలయినవాటిని గదిలోనుంచరాదు, బయటగా బలవరము నుంచవలయును. ప్రతిదానికి మూతజేసి రోగికి దూరముగా నుంచవలయును. ఒక్కొక్కచోట ఆగ్రహిణిపొయినను దూరముగ దీసికొనివెల్లి వరల నవసరమైనపుడు తీసికొని రావలయును.

14. రోగిని మాట్లాడనియ్యవద్దు: చూచుట కెవ్వరిని రానియకుండట ఉత్తమము.

15. నీవు రోగిగో మాట్లాడునపుడుగాని, రోగియొద్ద నితరులతో మాట్లాడునపుడుగాని, వెల్లగ మాట్లాడవలసిన గాని గుసగుసలాడవద్దు. గుసగుసలాడట రోగికి విసుగుదలను బుట్టించును.

16. రోగి కుదచూరములు చేయువార అందరును చేతులను గోళ్లను శుభ్రముగా గడుగుగొనుచుండవలయును. రోగి శ్లేషము ఉపచారములు జేసి చేయు కడుగుకొనకుండగ జేచేర్చి జోటిలో పెట్టుకొనునట్టిగాని, చేతితో కండ్లను నలుపుకొనునట్టిగాని, యలవాటులను సూక్ష్మమునవలయును.

తెర్మా పెటరు నవయోగించు విధము

తెర్మా పెటరు నుదయోగించుటకు ముందుగా దానిని కొంచెము వేడిచేసి అందరి చాదరణము తీరిక వీలగునట్లు మూత్రము మించకుండునటుల జూడవలయును. ఆరచేతి అందరి వేడివి దగచుగా మారుచుండునగాన శరీరముయొక్క వేడిమిని గనుగొనటకు తెర్మా పెటరును అరచేతిలో పెట్టుకొని శరీరవేడిమిని గనుగొన యత్నింపరాదు. తెర్మా పెటరును బెట్టుటకు ముందుగా చంకను పోడిగానుండునట్లు దుడిచి చర్మమునకు దగులు నుండునట్లు చేతి మధ్యగా దీని నుంచవలయును. తెర్మా పెటరుయొక్క అడుగు భాగమునకు అన్ని కైపులను చర్మము అంటియుండునట్లుగా చేతిని బాగుగా నెత్తిపెట్టి, ముంజేయిని గొమ్ముపై వేసికొని కండవ భుజమున తెరుచుగా నుంచవలయును. ఈ స్థితిలో 3 మొకలు 5 నిమిషముల వరకును ఉంచవలయును. ఈ సమయములో పంకాలు లాగుట నిలిపివేయవలయును. అప్పుడు తెర్మా పెటరును కలిపించి వేడిమిని గుర్తింపవచ్చును. శరీర వేడిమిని గుర్తు పెట్టుటకు 30 ఆచ్చుపట్టిని ఉంచుకొనట మంచిది. ఉపయోగించినపిమ్మట తెర్మా పెటరును పుచ్చుకును గడుగువలయును కార్పానీల్ అసిడ్ లావనులో కడుగుట శ్రేష్టము.

నిర్దేశ గతులలో సడదుపట్టియు, నిర్దేశ కాలము వ్యాపించునట్టియు, స్కార్లేట్ జ్వరము పొంతు, చుకూది, డైఫ్థెరియా జ్వరము మొదలగువాటిలో శరీర వేడిమి వాటివాటి కనుగొనిరిచి, అమా నిర్దేశ కనులలో మార్పులను తెందుచుండును. ఈ స్థితులను సరిగా దెలిసి

కొడిటకై వ్యాధియంతటను ప్రతిదినమును ఒకేకాలమందు తెర్మామెటరుతో శరీరవేడిమిని బరితీంచుట మంచిది. ఉదయమున 8 గంటలకును, సాయంత్రమును, దీనికొనిక కొంతలు యెక్కువ ఉపయోగముగ నుండును, తెర్మామెటరు పరీక్షకును, రోగి తనంతటతాను చలిగానున్నదనియు వేడిమిగా నున్నదనియు చెప్పవచ్చునని, సంబంధ ముండవలదు. ఏలనన జ్వరతీవ్రతయందు రోగియొక్క శరీరము మిగుల వేడిగానున్నపుడు చలిగానున్నదనియు, శరీరము నిజముగా చల్లగా నున్నపుడు వేడిగానున్నదనియు, రోగి చెప్పుట కలదు.

బిడ్డలయొక్క శరీరవేడిమి పెద్దవాండ్లకంటె కొంచె మధికముగానుండును బిడ్డల యందు, విశేషజబ్బు, యేమియులేక, బహుశః అన్నకోశసంబంధమగు లోపమేమైనను గలిగినపుడు, వెంటనే ఒకసారిగ శరీరవేడిమి అధికముగ హెచ్చును. ఇట్టి సందర్భములలో కొద్దికాలములోనే మరల శరీరవేడిమి తగ్గి మామూలు స్థితికి వచ్చును. ఇంతలోనే యేదియో గొప్పజబ్బు వచ్చినదని తొందరపడకుండ జాగ్రత్తగ నుండవలయును. అయినే, ఆరోగ్య స్థితినుండి యిట్టిమాధుర్య పండెందుగంటల పరిమితకంటె యెక్కువ కాఁ ము ఉండియుండునయెడల అస్పష్టతావధ ప్రారంభమయినదని దృఢముగా నమృతవచ్చును.

శరీరవేడిమి 95 డిగ్రీలు ఉండినయెడల క్షీణతి ప్రారంభమయినదని తలుపవచ్చును: వెంటనే హెచ్చుచేసినదప్పు జీవము నిలువజాలదు.

97.3 డిగ్రీలుగాని అంతకు తగ్గిగాని యుండినయెడల నిస్త్రాణస్థితియందుండినట్లు గ్రహింపవచ్చును.

99.4 డిగ్రీలు ఇది సామాన్యముగ నుండవలసిన వేడిమి.

101 డిగ్రీలు జ్వరము ఆవరించినట్లు చెప్పవచ్చును.

102 డిగ్రీలు పూర్ణమగు జ్వరము.

103 డిగ్రీలు కఠిన జ్వరము.

103.5 డిగ్రీలు మొదలు 106.8 డిగ్రీల వరకును ఉన్నతజ్వర మనబడును.

107 డిగ్రీలు విశేష అపాయము. సామాన్యముగ జీవించుట కష్టము.

నాడికిని, ఊపిరికిని, శరీరవేడిమికినిగల సంబంధము

శరీరవేడిమి, సామాన్యముగ నుండు స్థితినుండి ఒకడిగ్రి హెచ్చినయెడల నాడిబిల్లులు నిమిషమునకు ఐదు సార్లు పది హెచ్చును; ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసములు నమిషమునకు రెండు లేక మూడు హెచ్చును. సామాన్యస్థితియందు నాడిబిల్లులు నిమిషమునకు 75 అయి యున్నపుడును, శరీరవేడిమి 98.4 డిగ్రీలు అయియున్నపుడును, ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసములు 17 అయి

యున్నపుడును శరీర వేడిమి 100 డిగ్రీలకు పెంచుకొనుచు నాడింబులు 90 లేక 95 గాని, యుచ్చాష్టమి నిశ్చయములు సుమారు 23 సామాన్యముగా కావచ్చును.

చల్లని స్నానములు

జ్వరము ఆరికొని స్థితియందుండినపుడు చల్లని నీళ్లలో రోగిని స్నానము చేయించుటవలన నుంచి ఫలితముల నిచ్చునని తెలియజగియున్నది. జ్వరము 107 లేక 108 డిగ్రీలకు వ్యాపించియున్నపుడు చల్లని స్నానమువలన జ్వరమును తగ్గించితిరవలయును; తేనివో రోగి మరణమునందుట నిశ్చయమైయున్నది. జ్వరము 108 డిగ్రీలకు మించియున్నపుడైనను చల్లనినీటిలో దుబ్బిసి గుడ్డలతో ముట్టించుట వేడిమిని దగ్గించుట ముఖ్యమైయున్నది. ప్రథమమున జ్వరమునందు చల్లని స్నానములను జేయించుటవలన వ్యాధిసంధుకు విషమును అంతరింపజేయుటయును, శరీరమునుండి అశ్లేషవిషమును పోలగించుటయును, గలుగుచున్న దగ్ధి మనము గ్రహించవలయును. ఇట్టి చల్లని స్నానములను జేయించుటవలన శరీరవేడిమిని దగ్గించుటయు గలుగుచున్నది గాని ప్రథమమున పై విషయములనే ప్రధానముగా నెంచవలయును.

చల్లనినీటిని ఒడలుపై బ్రయోగించినపుడు అంతరావహములకు జ్వరకుదనమును బుట్టించును. మూర్ఛలగిని విషయములలో నిట్టిగుణమును మనము సులభముగానే గమనింపవచ్చును. అట్టి గిరిని ప్రథమమున జ్వరములో వ్యాధిసంధుకుకు విషమును పోదించుటయందు బనిచేయుచున్న గ్రంథులయొక్క చురుకుదనమునకు చల్లని స్నానములు మిగుల సహాయము చేయును. ఈ గ్రంథులయొక్క చురుకుదనము వ్యాధిసంధుకుకు విషమును ద్వారితముగ శరీరమునుండి వెలుపరింపజేయును. ఈ చల్లని స్నానములను జేయించుటకు పూర్వముకంటె యీ చల్లని స్నానములను జేయించినప్పుడు ప్రథమమున రోగియొక్క మాతృమనందు మూడింతలు జ్వరసంబంధముగ శీతవాసుప్రణండియున్నట్లు పరీక్షవలెనగునగునబడెను. అనగా యితరలక్షణము లట్లుండ జ్వరవిషము రక్తప్రచారమునందు గలిగియున్న దారణముచే వ్యాధియుక్క శీత్రదశ రుక్మదుఃశ్చుదగ్ధి మనము స్థితియందుండు కొనుచు, యిట్లు చల్లనిస్నానములను జేయించుటవలన శరీరమునుండి జ్వరవిషము మూడింతలుగా వెలుపడుచున్నదని మనము గ్రహించవలసియున్నది.

ఇట్టి స్నానదిశ్చవలన మెడకునకు కాంతత గలుగుచున్నదనెడి లాభమునుగూడ మనము గుర్తించవలయును; సంధిగుణమును తగ్గించి నిద్రను బుట్టించును. మఱియు, యీ స్నానము గుండెకు చురుకుదనమును గలిగించి రక్తప్రచారము నిభివృద్ధిజేయును; శరీరవేడిమిని తగ్గించుటవలన శరీరమునందు గలుగుచున్న నష్టమును కొద్దిపరచును.

జ్వరవిషయమునందు చల్లని నీటిని ఒడలుపై ప్రయోగించుటవలన నీ క్రిందిలాభము లున్నట్లు మనము నిశ్చయింపవచ్చును.

1. శరీరమునందలి విషసంబంధముగ సూక్ష్మజీవులను అతిశీఘ్రముగా వెలుపరింపజేయును.

2. తీవ్రమగు శరీరవేడిమిని తగ్గించి గుండెయొక్క కార్యక్రమమునకు భంగము లేకుండజేసి శరీరమునందు జ్వరవేడిమివలన గలుగుచున్న నష్టమును తగ్గింపజేయును.

3. సంధిగుణము తగ్గిపోవును.

4. రక్తప్రచార మధికమగును.

5. అంతరావయవములకు జాతుకుదనమును గలుగజేసి జీర్ణకోశముయొక్క శక్తి అధికపరచును.

జ్వరమును తగ్గింపజేయు మందుల సుపయోగించుట మంచికాదని గొప్ప డాక్టరు యొక్క అభిప్రాయమైయున్నది. ఏలనన, అట్టిమందుల సుపయోగించుటవలన శరీర వేడిమి తగ్గనప్పటికిని మూత్రగంధులు మొదలగువాటియొక్క చురుకుతనము నణచివేసి శరీరమునుండి విషసంబంధమగు సూక్ష్మజీవులయొక్క వెలువరింపున శాటంకము కలుగజేయును, చల్లని స్నానములను జేయించిన విషయములనున్నూ, జ్వరమును తగ్గించుటకు మందుల సుపయోగించిన విషయములనున్నూ లెక్కజేసి చూచినమీదట చల్లని స్నానములను జేయించిన విషయములలో మరణములు తక్కువగా నుండియున్నట్లు స్థిరపరచబడినది. దీనినిబట్టి చల్లని స్నానములయందు జ్వరమును తగ్గించుగుణముమాత్రమేగాక అధిక ఫలిత ముండియున్నట్లు మన మొప్పుకొనక తప్పదు. జ్వరరోగులకు చల్లని స్నానములను జేయుటకు ఫలహానిచుట్ట జ్వరవేడిమియొక్క అధికవ్యయ సమస్యరించి యుండవలెను. వ్యాధియొక్క విషాధి క్యమునుబట్టి శరీరవేడిమియొక్క అధికవ్యయ యేర్పడును గావున శరీరవేడిమియొక్క ప్రతిదేశముబట్టి వ్యాధియొక్క విషాధిని మనము గ్రహించి, చల్లని స్నానములను జేయుటమూల మన సుపకారించి గలుగజేయ యత్నింపవలయును.

చల్లని నీటిస్నానమును త్రైసాయిడ్ జ్వరచికిత్సయందు ముఖ్యముగను పట్టుబడువకుండగను జేయింపతగియున్నది. ఇతర జ్వరములయందును జ్వరతీవ్రత అతిశయస్థితి యందున్నపుడు చల్లని స్నానమువలన నా అతిశయపు వేడిమిని తగ్గించి శరీరము నపాయస్థితి నుండి తొలగింపగలుగును.

నాలుక

అనేక వ్యాధులయందు నాలుక అనేకవిధములైన మార్పులను బిందుచుండును. అందు యీ క్రిందివి ముఖ్యముగా గమనింపదగినవి.

1. పాలిపోయినట్టియు, మొద్దుబారినట్టియు; వెడల్పు అయినట్టియు, వణకునట్టియు; పండ్లచే నొక్కులాపడినట్టియు, నాలుక సీరసమునట్టియు, నిస్సర్తువను జేరినట్టియు, శరీర స్థితిని చెలియజేయుచు, రక్తమునందలి నీటిభాగముయొక్క అతిశయమునుగూడ చెలియజేయును. పాండురోగమునందు నాలుక యిదేరీతిగనుండును.

2. ఎర్రగా మెరయునట్టి నాలుక, శరీరమునకుని రక్తపుష్టిని తెలియజేయును, అట్టి నాలుకను ఉన్నపుడు నాలుక యీస్థితియందుండినయెడల, అన్నకోముకయొక్క పారలును అదే స్థితియందుండియున్నట్లు సూచించును.

3. నీలముట్టిగాని, నలుపు నీలము కలిసినట్టిగాని, రంగు నాలుక శరీరమునందు శక్త్యావశ్యములయందు రక్తప్రవాహమున కాటంకము కలుగజేసినట్టి బోమ్మవ్యాధుల సూచించును.

4. పొడిబట్టిన నాలుక యెల్లప్పుడును వ్యాధిని సూచించకపోవచ్చును. ఆరోగ్యస్థితియందున్న కొందరు నాలుక ఇదివిధముగానుండి, ఉదయపు శేషముఖముగా నట్లుండును నాలుకకు యిట్టిస్థితి, పేడిపోయిన పండ్లవలెనను, నోటియొక్కగాని, గొంతుయొక్కగాని, పండ్ల కుదుర్చుముట్టగాని పొపువలనను, తటస్థించుటయు కలదు. ఇట్టి కారణములు కానవచ్చుచు, పొడిపట్టినట్టియు అరుదలనందినట్టియు నాలుక, యేసొ యొకవిధమగు జ్వరమును సూచించును, అధివాతలయందును, క్షేణావస్థలయొక్క ఉద్రుత స్థితియందును. జ్వరములయందును నాలుకపై తెల్లగా అల్పముండును. ఈ వ్యాధులు దీర్ఘకాలము వ్యాపించి యున్నప్పుడు పయిన గోధుమవర్ణము గలిగినట్టిగాని నల్లనివర్ణము గలిగినట్టిగాని పొగ గమ్మగాని, నాలుక అరుదలకలది, దహింపును పుట్టింపుచు, బిటబిటయుండును. ఈ పారలొనుండి నిగనిగొంటి యొర్రనిచుక్కలు గనుపడినయెడల స్కార్లట్ జ్వరమునకు యదియే మొదటిగుర్తుగా కనుగొనవగును. పచ్చ కామలవ్యాధి యుండినపుడు నాలుక సామాన్యముగా పసుపువర్ణమును వహించియుండును. జ్వరములు మొదలగు వ్యాధులు ఉద్రుతస్థితియందున్నప్పుడు, నాలుకయొక్క చివరనుండియు అంచులనుండియు పార వెల్లుచిగా శోంపడుచున్నయెడల గాని, పుభాగమున పార పల్లవిడుచుచున్నయెడలగాని, వ్యాధి స్వల్పత ఇందుచున్నదని మనము గ్రహింపవచ్చును. ఈ పార అచ్చటచ్చట వెచ్చులుగా మాత్రము డిటిపోయి యొర్ర వెన్నెత్తియు, మనుపైట్టియు, చెమ్మగానున్నట్టియు ఉపరిభాగమును గనుపరచినపుడు, వ్యాధి త్రిమిషమగుదురు బాటునందుట తేదనియు దీర్ఘకాలము వ్యాపించినయెడల తెలియవలయును.

5. అంచులు మొర్రగానున్నట్టియు, మధ్యనున్న మొనలువనున్నూ పారగన్న స్థితియు నాలుక, అజీర్తిని తెలియజేయును. ఈ స్థితిలో నాలుక బయటికి బాదినప్పుడు పగిలినయెడల, అది త్రొగడునుగాని వివధులయొక్క దుర్వాహముగాని సూచించును.

6. మధ్యభాగమందు పొగగ్గమి, అంచులను చివరను యొర్రగా నుండిన నాలుక క్షయజ్వరముయొక్క గుర్తు అయియున్నది.

7. నాలుకను గదల్చుటకు శక్తి లేనపుడును నాలుకను చూచినప్పుడు దానిని ఒక పక్కకు దీయుటయు శక్తి లేకపోయినపుడును, పక్షవాతము గుర్తింపవగును.

నాటి, ఉచ్చాస్యన నిశ్శక్త్యావస్థలు, శరీరోష్ణస్థితి, నాలుక దీర్ఘముండి గ్రహించుట వ్యాధిని గురించిన జ్ఞానముకంటె కొన్నివ్యాధులతో సంబంధించిన యీ కొందఱు బోధించు అనుకూల మొదలవతో గమనింపవలసియుండును. (1) అజీర్తిలేకపోవుట, (2) జ్వర (3)

సూక్ష్మగణము (4) జ్వరము (5) తలతిరుగుట (6) తలనొప్పి (7) ఇతరనొప్పి (8) హృస్యము
రోగము (9) వణగుట (10) గొంతునొప్పి (11) దాహము (12) మూత్ర నిష్ఠి (13)
వాంతి యగుట.

మందులయొక్క గుణములు శరీరతత్వముల ననుసరించి భిన్నముగ గనబడుచున్నవి. వ్యాధులును వేరువేరు మనుష్యులయందు, ఒకానొకప్పుడు స్త్రీల చెప్పబడిన లక్షణముల ననుసరించక భేదించియుండును. ఒకేవ్యాధి వేరుమనుష్యులయందు, లింగము, ఆభ్యాసము కయను, శిరోష్ఠస్థితి, మనోస్వభావము, జాతి, ప్రకృతి...వీరి ననుసరించి వేరువేరు యుగములను వహించి, ఒకానొకప్పుడు ఒకతరగతి లక్షణములు ప్రాముఖ్యము గానుండు వేరొకప్పుడు వేరుతరగతి లక్షణములు ప్రాముఖ్యము గానుండును. దీనినిబట్టి వైద్యుడు వ్యాధివ్యాధిని, ఆయా వ్యాధియొక్క పాముఖ్య లక్షణములనుబట్టి చికిత్స చేయు చుండునవలయును గాని, ఒకే మందు ఒక ప్రత్యేకవ్యాధియందు వెట్టిలక్షణములున్నను నుగము ముప్పని యొంచరాదు.

గుండె వ్యాధియందు చికిత్స

గుండె వ్యాధియందు ముఖ్యముగ జేయవగు చికిత్స రోగియొక్క మనస్సునకును శరీరమునకును గూడ విశ్రాంతి నిచ్చుటయందు దిమిడియున్నది. మనస్సునకు ఉద్రేకము గలుగుదుము, మనస్సునకు విచారము గలుగుటయు, గూడ శరీరాయాసముతో సమానముగ పృథక్యమున కధికమగు బనిని గలుగజేయును. కాబట్టి రోగియొక్క మనస్సున శిథిలము నుజ్జేగియును విచారమును గలుగకుండునట్లుట జాగ్రత్త పెట్టవలయును. రోగి సంతలదాను యేపనిని జేయనొల్లదు. ఒకవైపునుండి మరియొక వైపున దిరుగవలయునను, విచారకులే ఈ పనిని జేయవలయును. రోగి కొంచెముగ మాత్రమే మాట్లాడవలయును.

గుండెవ్యాధియొక్క ప్రారంభగతులయందు గుండెయొక్క స్పాయముపులు గాని, గుండెయొక్క బిలద్వారములు (Valves) గాని, వాపుదల నందియున్నపుడు రోగి యొక్క మను పరుండియే యుండవలయును. అనంతర స్థితులయందు గుండెయొక్క కార్యక్రమముగ శిథిలమై శ్వాసకోశము తెల్లను రక్తమయమైయున్నపుడు శ్వాసానరోధము తటస్థమై, యిక నట్లు పరుండియుండుట కెంతమాత్రమును వీలుండదు. ఈ స్థితియందు రోగి ఒకొనుటకు దిండ్లను వెనుక వైపుననుంచి రోగిపడిపోకుండునట్లుట జాగ్రత్తను వహించియుండవలయును. ఈ పద్ధతివలన శ్వాసకోశములోని శక్కువహాయువును బీబ్బుకోమటకు తగినంత, ఉడరమునందలి ఆవయవము తెవ్వియు, ముఖ్యముగ శార్జము—హృదయము నొత్తిడిని గలిగించుకుండజేయును. సంజావ్యాధి స్పష్టముగ గనబడినపుడు చాలమంది గులు పరుండుటకే శక్తిని గలిగియుండక రాత్రింబవళ్లు పడక కుర్చీలో కూర్చునియుండుదురు. ఈ స్థితియందు శరీరమునందలి ద్రవపదార్థము ఉపరిభాగములనుండి క్రింది గములకు దిగి గుండెయను శ్వాసకోశములను చేరికగా బనిచేయుటకు వీలుగనుండును. గుండెవ్యాధియొక్క అంత్యగతులయందు దేతిరుస పరుండినగాని కూర్చుండినగాని రోగిని ముఖ్యముగ నుండునో ఆతిరే మంచిదిగ నెంచవలయును. ఈ వ్యాధియందలి కష్టమును

ఆసాక్ష్యమును నుండి తేలి వ్యాధియందును నుండనేరదు. గాన, పరిచారకులు రోగికి సాక్ష్యముగ నుండేది పథ్యతనిగుఱించి విశేషముగ శ్రద్ధ నయ్యనలసియుండును.

ఈ వ్యాధియుక్క, దీర్ఘవ్యాధికి న్నిత్యుండును. గుండెకు కొంచెము కొంచెముగ నధికముగ బగిలెను నిచ్చుచు గుండెముక్కు ఆరోగ్యమునకును బలమునకును గ్రహణ వృద్ధిని గలగజేయవచ్చును. ఈ విషయమున నిట్టి పరిశ్రమ ఫలితముల గమనించుచు మఱియు బనిచేయవలయును.

రోగినిచ్చు ఆరోగము తేలికయైనదియు త్వరితముగ జీర్ణము కాదగినదియునై యుండవలయును. నుండు భనుపడిన, దానినిబట్టి శరీరమునందలి ప్రతి ఆవయమునందును రక్తప్రసారమునకు గాఢము గలుగుచున్నదని మనము తెలిసికొనవలయును. ఏదైన నొక అవయవమునకు రక్తప్రసారము జేగవోయినపు డా ఆవయవము వెనుకను జేయగలిగినంత దూరవి ప్రసారమునకును విశ్వయంత్రము ఆయియున్నది. గాబట్టి జీర్ణాశయములు వెనుకటివలె జీర్ణశక్తిని గలిగియుండును. ఆరోగమును జీర్ణము చేసికొన లేనపుడు జీర్ణాశయము కష్టపడుచును ఈ విషయంబులను గుండెయనగాన నొడిగితిని దానియొక్క కార్యక్రమమునకు భంగము కలుగును. ఈ స్థితియందు రోగికి విశేషముగ ద్రవపదార్థము నాహారముగ నిచ్చినచోడల గట్టసాగియున్నప్పుడు పూర్ణభావ మధికమయి సంజాగుణమున కతిశయశక్తి సంభవించును.

పేగులను గుర్చి బహుభాగిత్రగ నుండవలయును. విరేచన మగునపుడు. ముక్కుట లేనంతవఱకు సాధ్యముగ విరేచనమునకుట్లు జూడవలయును. తలబద్ధ పేర్చడి ముక్కుట కటసింబియుటలు గుండెయందు నీ విషయము బహు తివ్రగుణమును గనపరచవచ్చును. విరేచనము సాగిన గాఢాహారములను తేలికగు విరేచనకారి నియ్యవగును. సంజా విశేషముగ నుండినచోడల బలమయిన విరేచనకారి (పల్విస్ జాలప్ కొ Pulvis Jalap Co.) నిచ్చిన కఠినమునందలి విశేషముగ ద్రవపదార్థము వెలువరచబడును. కొడువ విషయములలో కార్బును వృద్ధిని గల సున్నితస్థితియుండుండైనయెడల రసభిస్మము (Calomel) నిచ్చినయెడల కార్బునంబునకు రోగికి హానిచేయుచు అందు సంబంధముగ నొప్పికూడ అంతరించును. పేగులయందు వాతాహారములను సుండినయెడల పల్విస్ జాలప్ కొనినాను యిచ్చవలయును. పల్విస్ జాలప్ కొనినాను యిచ్చుటలో 2గ్రాముల పల్విస్ జాలప్ కొనినాను 15 గ్రాముల కార్బును జానతోగలిపి ఆననముద్వారా పేగులలోనికి యివ్వవలయును. ఈ మూలమున నాయువును విరిచుచున్నయెడల పేగులయొక్క చుట్టలు విస్తరింపవలసి క్షయ (Diaphragm) భాగము గుండెపైపుటకు గొంత యొత్తిడిని గలుగజేయును.

సంజాముల గలగుట కొరవైనను మిగుల ఆహారముగ వైన నితిగా నుండవలయును. డిజిటాలిస్ (Digitalis) ను యిచ్చుచుండిన ముదల, వాంఛించి దీనియొక్క ఫలితమును గుండెయొక్క దుస్థితినిబట్టియు వచ్చియుండినయెడల మిక్కిలి ఆహారముగ నుండవలయును. ఆరోగమును సాధ్యమైనంత తేలికగజేసి కొంచెమొక్కముగ నియ్యవలయును. ఈ పద్ధతి వలంబించి నిద్రవచ్చు మందుల నిచ్చినచో నిద్రయోగముగా గనబడినయెడల నాహారమును ఆననముద్వారా యివ్వవలసియుండును.

కార్లకును ఉదరమునకును సంజ విశేషముగా నుండినయెడల, లోడయొక్క క్రింది భాగమున వెల్లుపలితైపున శత్రుసంబంధముగ సూదితో చూడు నాలుగు గంధ్రములను జేసినయెడల వారంద్రములద్వారా శరీరములోని ద్రవపదార్థము వెలువడిపోవును. ఈ కార్యమునందు మిగుల పరిశుభ్రత అవసరమై యున్నది.

ఈ వ్యాధియందీయ్యదగిన మందులనుగూర్చి, మఱియు మూలమునను తూర్పుయముల మనను శరీరమునుండి మిక్కుటముగ ద్రవపదార్థము వెలువడుట కవసరముగ మందుల నియ్యవలయును. గుండె త్వరితముగ గొట్టుకొనుచు నీరసనియ్యంగుండి క్రియత తప్పి యుండినయెడల టింక్చర్ డిజిటాలిస్ ను (Tincture Digitalis) ఉపయోగించవలయును. డిజిటాలిస్ యొక్క ఉపయోగమును గూర్చి పూర్వముగ చెలియవలెనన్న అంగ్లేయీయులగ గణదీపికను జూడుడు.

పానీయమును నెక్కువగ బీల్చుటకు పీలును గలుగుజేయుట మూలమున రోగిని విశేషముగ సౌఖ్యమును గలుగజేయవచ్చును. గుండెవ్యాధిచే బీడితుడగుచున్న రోగి విశాలమైన గదిలో నుండి ఆ గదిలోనికి పరిశుభ్రముగ గాలి కరివిగ వచ్చుటకు సదుపాయములను జేయవలయును. చలికాలములో నీ గదియొక్క ఉష్ణత 60 డిగ్రీలకు తగ్గియుండగూడదు. ఖలియేగాక వాయువు మిక్కుటముగ రోగిపము ఏచటండ నుండవలయును.

ఉచ్చాస్య సంస్కారములయందు గలిగెడి ఆయాసమును ఆమిల్ నైట్రైట్ (Amyl Nitrite) ను యుపయోగించుటవలన నయము చేయవచ్చును. ఈ మందు చిన్న గాజగొట్టములలో వచ్చును. ఒక గాజగొట్టమును జేబురుమాలలో బిగులగొట్టి అందును నుండి వచ్చెడి ఆవిరిని వాసన బాడవలయును. ఇట్లు వాసన బాడుటవలన చిన్నవగు పరిశుభ్రత నాశములు విస్తరింపునంది రక్తక్రూరమున కనవును కలుగజేసి నొప్పిని వెంటనే గొట్టును. నైట్రోగ్లిసెరిన్ (Nitro-Glycerine) కూడ యిట్టి ప్రయోజనమునే కలుగయును, దీనిని లోని కియ్యవలసియుండును. ఇది కొంచెము నెక్కుదిగా బనిచేయును. ఏదోవధములలో చేసేవలనను ఉపయోగము లేనప్పుడు మార్పియా (Morphia) ను సూదితో రక్త ములానికి యింజువు చేయవలసియుండును; లేదా క్లోరోఫారం (Chloroform) వాసన చూచుటకై నను ఉపయోగించవలయును.

వ్యాధియొక్క లక్షణముల గుర్తించుట

వ్యాధిని తురుర్చుటకు పిలువబడిన ప్రతి వైద్యునియొక్కయు ముఖ్యమయిన లక్ష్యము వ్యాధియొక్క లక్షణములను, గమనించుటయై యుండవలయును.

వ్యాధియొక్క నిజస్థానమును గూర్చియు, వ్యాధి యెంతవరకు వ్యాపించి యున్నదానిని గూర్చియు, వ్యాధియొక్క పుట్టుటకు కారణముల గూర్చియు వ్యాధి వికల్ప స్వభావమునుగూర్చియు సంపూర్ణ యోగ్యతయు, గరిమయి నట్టియు, ప్రాంత్యమునట్టియు, జ్ఞానమును సంపాదించుటయే వ్యాధియొక్క లక్షణజ్ఞానమనవలయును. ప్రతి వ్యాధియందును యిట్టిసంపూర్ణముగ జ్ఞానమును సంపాదించుట విషయకమై గాని, లక్షణజ్ఞానమును సంపాదించుట యందు కొద్ది భాగపాటులను జేసినవాడే

యొక్కన జయముల సందువాడని మనము నమ్మవచ్చును. కొద్ది లక్షణములతో బరిశీలించి యంతటితో సంతృప్తునది, ఆ వానికి అజీర్ణయో వచ్చుకామల వ్యాధియో యని కేరిది పనిచేయ ప్రారంభించుట సామ్యాన్యముగ జరిగిడిలలో పమయి యున్నది.

వ్యాధియొక్క అతిశయమును తీవ్రతను బట్టి, వీలివ్యాధి యొక్కయు లక్షణములను బహు బాగ్రత్తతో గమనించుచు, ఒక విధమయిన బుద్ధినిచారణ చేయుటయందే వ్యాధి యొక్క గుణ లక్షణములను గనిపెట్టుకొని యిమిడియున్నది.

కొన్ని పుష్కల లక్షణములు సమకూడి యుండుటచే కొన్ని వ్యాధులను వాటిగా తేలికతో గ్రహించ వచ్చును. కొన్ని వ్యాధులయందు అనేక లక్షణములు సమానముగా నుండుటచే, యే పుష్కల లక్షణము భిన్నముగా నుండినతో గ్రహించి పనిచేయుట యొక్కన కష్టమయినది. ఈలక్షణ భ్జానమును బొందుటకయి అవసరమగు సంగతి సందర్భముల వన్నిటిని కనుగొని వ్యాధిని గురించి విచారణచేయుట మిగుల మంచిది. అందుల కీ క్రింది సంగతుల తెలిసికొన యత్నింప వగును.

(1) రోగి యొక్కయు రోగి కుటుంబము యొక్కయు, సాంప్రదాయమును వెనుకటి ఆరోగ్యతను గూర్చియు, విచారించవలయును.

(2) పశ్చిమరోగము యొక్క చరిత్ర — యెంతకాలమునుండి యుండి యున్నది యను బహుళజేయేని కారణముచేత వచ్చియున్నదియు, వ్యాధి యేత్రకారము వృద్ధిపండి యున్నదియు విచారించ వలయును.

(3) రోగిని జూచుటచే కనిపెట్టుబడిన వ్యాధిలక్షణములను ముఖ్యముగ గమనింపవగును.

(4) వ్యాధియొక్క స్వరూప, అనగా దివ్యమును యేయేలక్షణములు యెంతెంతకాలము వ్యాపించియున్నదియు గుర్తించ వలయును.

(5) ఇచ్చెడి మందులయొక్క ఫలితములను అనగా యేమందు యిచ్చుట వలన యెట్టి ఫలితము గనిపించినదియు మంచిగుణము నిచ్చినట్టిమందును యింకను వాడుటయు, దుర్గుణముల నిచ్చుట్టిమందును నిలుపుచేయుటయు — యీ అంశములను మెలకువయం దంచవగును.

వ్యాధియొక్క ముందునడకను గు రెంగుట.

వ్యాధియొక్క ముందునడకను జెప్పటకు మిగుల అనుభవమును, మంచి బుద్ధి వుకలతయు గావలయును. వ్యాధియొక్క ముందునడకను సరిగా చెప్పగలుగుటకు వ్యాధియొక్క సహజగమనమును జక్కగా తెలిసినవాడై, ఆరోగియొక్క సహజ తత్వమునున్నా యెరిగి యున్నవాడై, తాను ఉపయోగించు ఒకగుణయొక్క గుణములను క్రమముగా గ్రహించుటయందు మిగుల అనుభవము గలవాడగును, అయి యుండితలయును.

వ్యాధియొక్క ముందునడకను గూర్చి వైద్యుడు తనంతటతాను రోగికి గాని రోగియొక్క స్నేహితులతోగాని చెప్పవచ్చును. ఎవరయినను అడిగితయెడల స్పష్టముగా తెలిపియున్న సంగతిని చెప్పవచ్చును. అనుమానముగా నున్న సంగతిని తెప్పటమందు

బహుళాగ్రతకా నుండవలయును. వైద్యులు చెప్పనంగతులు సాధ్యమయినంతవరకు ఆకాహితములుగా నుండవలయును. ఆట్లుండునచో వైద్యుడు తానుజయమందునను నమ్మకముతో తానుచేయు చికిత్సను నిలిపివేయుట తటస్థించును. స్వచ్ఛముగా మరణము సంభవించు స్థితియందు రోగియొక్క బంధువులు గాని స్నేహితులుగాని యథాగతస్థితిని గురించి యడిగినచో వైద్యుడు తానెరిగియున్న సంగతిని జెప్పట తనవిధియై యున్నది.

దేహపరిశోధన విధానము

రోగి చూచినవెంటనే చేతియందు నాడిని గాని, లోపలనున్న బాధలనుగాని బరీక్షించ బోయిత్నింపకుండ ముఖమును, ముఖమునందుండు కళ్లను, బరీక్షింపవలెను. వ్యాధి 10—15 రోజులనుండి బాధించుచున్నను ముఖమునందు కళ్ల తగ్గియుండక పోవచ్చును. 5 రోజులనుండి మాత్రమే వ్యాధి బాధపెట్టుచున్నను, రోగిమిక్కిలి డస్సిపోయి ముఖవర్చును ఎక్కువగ మారి, వ్యాధి ప్రబలమగు నున్నదను నంశములు స్పష్టపడవచ్చును.

నాలుక చాపించి చూచినయెడల మఱి కొన్ని యంశములు తేటపడగలవు. కషాయములలో నాలుక మెత్తగను, ఎర్రగను, దగ్ధముతో గూడినదిగను ఉండక అనేక మార్పులను గలిగియుండును. ఈ మార్పుల స్వభావమును వాధి యర్థమును వ్యాధి నిదాన విమర్శయందు వచ్చును.

సామాన్యమృగా జను లెల్లదను నిమిషమునకు 18 సార్లు ఊపిరిని కడలి, ఊపిరిని లీల్చుకొనుచుండ, జరిపీడితలగు రోగులు 25, 30 సార్లు పీల్చెదరు కాని కొన్ని సమయములందు ఎక్కువ సార్లు ఊపిరిని దీసికొనుటయేగాక, ఉచ్ఛ్వాస నివ్వాసములలో నెక్కువకాలము పొందుదురు. ఈ మాధిశ్యకృతము ముఖ్యనిదర్శకము ముక్కుల నెగర వేయుట.

హృదయశోధన

వెన్నెముక చేతను ప్రక్క ఎముకచేతను గూడియున్న పంజరములో మూడుముఖ్యనయనములు కలవు. వీనిలో నొకటి గుండె; ఇతయు రెండు ఊపిరితిత్తులు కలవు.

1. గుండెపరీక్ష

గుండె, 2 వ పక్క ఎముకనుండి 5 వ ఎముకవఱకు, వ్యాపించియుండును. కడివెపున మధ్య ఎముకనుండి క్రి అంగురము కడివెపున కందును ఎడమవైపున ప్రసాగము నుండి తిన్నగ నిలుపుగీత గీచియెడల నీ గీతను చూడు. గుండె యెత్తుడును గొట్టుకొనుచుండును. అనగా చిన్నదయి పెద్దదగుచుండును. ఇట్లు నిమిషమునకు 72 సార్లు గొట్టుకొనుచు గొట్టుకొను వపుడెల్ల దీనియగ్గిము ఎడమరొమ్మనకు దగులును. కాని లోపల ఈ ఆయన హిమాయతను పొందుచున్నట్లు ఎవరిమట్టుకు వారికి గోచరము కానేరదు. విశేషముగ పరియాపవదినపుడుగాని, లేక భయమును సంక్షోభమును చెందినపుడుగాని, గుండె ఎడమ రొమ్మపై గొట్టుకొనుచున్నట్లు మనకు దెలియును. తదితర సమయములందు దిట్లు గోచరమునట ఆరోగ్యవహము కాదు. ఆరోగ్యస్థితిలో హృదయముపై ఎడమవైపున కి, కి ప్రక్కయెముకమధ్యను, ప్రసాగముగుండె గీచిన నిలుపుగీతకు ఆరంగురము లొపుగనూటిన

వేణుపట్టి చూచినది, గుండె ఎరుగుకొమ్ముపై గొట్టుకొనుట తెలియును. ఈ స్థానము ఇంకను క్రిందికి గాని, లేక యింకను ఎడమ వైపునకుగాని బోవుట మంచిది కాదు. అట్లుయినచో గుండె పెద్దదనదని యర్థము ; లేక, మట్టునున్న ఇతరాయములందుండు మార్పును, గుండె ప్లస్టానమునుండి బోలినప బడినదియని నర్థము. పాటు ఎక్కువ పడినకొలది గుండె ఎక్కువ పని చేయుచు గాన, గుండె పెద్ద దయ్యెను అలొగ్యమునకు భంగమును గలుగజేయుచుండును. ఇట్లు పెద్దదయినపుడు వైశాల్యము వృద్ధియగుటయే గాక, ఆయనముకూడ గట్టిపడి ఎక్కువ బలముగ నుండును. ఇందు ఎద్దదయినచో గుండెయుక్క వైశాల్యమే ఎక్కువగునుగాని గట్టితనముతో గొప్పగానిపించదు. ఇప్పుడేగుండె బారయినదని చెప్పవకాక ముందును ఇప్పుడే గుండెయొక గలదని చెప్పవలయు. ఏలనన గుండె కృతముగ బనిచేయుచుండుటచే, రక్తప్రవాహము నిర్బంధించి, రక్తములోని నీరు సహజుల (అల్లికల) లోనికి పారి సంజీవింప పనికిమిందును. ఇప్పుడే ఆయా సముత్పత్తి ప్రాణానికి ఆవకాశ ముండును.

I. పరీక్షించి చూచుట.

II. స్పృశ్య: పనిచేతనే చెప్పబడినట్లు గుండె కొట్టుకొనునది గమనింప గలము.

III. తట్టి చూచుట.

ఇందు పరీక్షాము గుండెపై పట్టి చూడవలె నపు మధ్య కేలిలో మొదటివస్త్రపు మధ్యవేణుపట్టి మని గొట్టుట. ఇట్లు గొట్టినపుడు శబ్ద మునేకవిధములుగ నుండును. గట్టి పనుపుపై పట్టు కొననక శబ్దము మందముగను (టక్, టక్ మనుచు) నుండును: బోలువము పుపే గొట్టినచో, పడినదని అనును. టిటిటి టినులయందు గారి ఉండుటచే మోకడ మొదమ అనును. గుండెయందు రక్తముండుటచే గుండెపై గొట్టినపుడు మాతమందముగ నుండును. కావున ఎడమవైపునుండి హృదయమును ఈవిధముగ చేతుల జరుపుచు శోధించునపుడు శబ్దము ఎక్కువయినచో, ఎచ్చట డేమ అను శబ్దము లవ అగునో, ఆచ్చటనే డిజిరిలితి అని గుండె ప్రాగ్భాగమునందుని యర్థము. ఇట్లులే కుడివైపునను పైభాగమునకు అడుగు భాగమునను గుండెయుక్క పరిమాణులను నిర్ణయించవచ్చును. హృదయ నిర్ణయించిన పిమ్మట, క్రమముగ సరిహద్దులను పోల్చిచూచి గుండె స్థానమందున్నది, లేనిది, పెద్దదిగనున్నది, సరిసమానముగ నున్నది, తెలిసికొన గలము.

గ. పరిశీలించుకొని మృదయశోధన పరీక్షముతో (పైకినకోప్) జేయవలయు. ఈ పనియుట్టును గుండెపై పట్టినచో రెండుశబ్దములు వినిపిండును. పీనిలో మొదటిది దీర్ఘము గను మందముగను ఉండును. రెండవది హ్రస్వముగను చురుకుగను ఉండును. మొదటిది “బూ-బ్”వలె నుండును. రెండవది “డబ్”వలె నుండును. ఈ పనియుట్టు వలన నిట్టి శబ్ద ములు వినిపించినచో గుండె క్రమము నున్నదని యర్థము.

ఇట్టిశబ్దములు గోపముగ వినిపించక శబ్దమునకు పూర్వముగాని, పిమ్మటగాని “టక్ టక్” అనుశబ్దము వినిపించనయ్యెనని వాగ్దాని నూచిండును. ఈ పనియుట్టుతో పరీక్షించునపుడు పనియుట్టును గ కు మధ్య ఎముక క్రింద ఇదివరకు పూచించిన స్థానమున నుంటే చూడవలెను, మధ్య ఎముక యొక్క అడుగుభాగముపై పట్టియు రెండవ పరీక్ష ఎముక క్రింద యిరువక్కల పట్టియు గూడ చూడవలెను.

2. శ్యావకోశముల పరీక్ష

1. శిశ్యసహాయముచే హృదయముయొక్క కదలికలూ హెచ్చుతగ్గులను గమనింపవలెను.

II. స్పృశ్య : రెండు ఆరచేతులను, వీపుమీదను, ఎదురురొమ్ము పయినను ఉంచుకొని పక్కలను ఊపిరితీసికొనుటయందు రెండు భాగములను సమానముగ గదలుచున్నచాలేవా యను సంశయను నిరవలచవలెను. ఒకవైపు తక్కువ కదలుచున్నయెడల నావైపు ఊపిరి తిత్తిలోనికి గాలి తక్కువగ బోవుచున్నది యుగము. గాలి తక్కువగ బోవుటకు ముఖ్యకారణము ఏమన ఊపిరితిత్తిలోని రంధ్రములు కల్లిపదార్థముచే నిండియుండుట అప్పుడు ఈ ఆవయవములు బోలువానివలెగాక గట్టివానివలె ప్రవర్తించును. శబ్దము గాలియందుకంటె నీటియందుకంటె ఎక్కువగట్టిగను, నీటియందుకంటె క్రొయించెక్కువ గట్టిగను వినిపిండును. కావున గాలితో నిండిన ఊపిరితిత్తులగుండ కన్న. కల్లితో నిండి గట్టిపడిన ఊపిరితిత్తిగుండశబ్దము ఎక్కువ గట్టిగ వినిపిండును. కావున ఇరువక్కలను చేతు లుంచి రోగిని ఒకటి, రెండు, మూడు అని చెప్పమనిననో, ఒకపక్కను శబ్దము గట్టిగను, మఱియొక పక్కను సూక్ష్మముగను వినిపింపవచ్చును. దీనియర్థ మేమనన, గట్టిగా ననుపించువైపున ఊపిరితిత్తి కల్లితో నిండి, గట్టిపడినది సూక్ష్మముగ వినిపించు పక్కను ఊపిరితిత్తి గాలితోనిండి ఆరోగ్యస్థితియందుండెను. అయినను యిరువక్కలను శబ్దము భేదముగ నున్నప్పుడు, ఏపక్కశబ్దము ప్రమాణమనినదియు, ఏపక్కను మార్పు చెందినదియు చెప్పట అనుభవమువలననే తెలియగలదు. ప్రామాణ్యముగా నుండు శబ్దప్రమాణము అనుభవముచే గ్రహించి, హెచ్చుతగ్గులను దీనితో బోల్చిచే గమనింపవలయును.

3. తట్టి చూడట.

గుండెకేరీయందు చెప్పుబడిన దంతయు ఇచ్చటను వర్తించును. ఊపిరితిత్తు తెప్ప యను దమ్మ దమ్మ శబ్దమునిచ్చును. కల్లితోనిండి రోగముతో గూడియున్నపుడు టక్ టక్ శబ్దమునిచ్చును. వీపును, ఎదురురొమ్మును, సర్వత్ర బరిక్షించి, ఏభాగమున బల్బు ఉన్నదో యాభాగమును గుర్తించవలెను.

4. హృదయకోశసంరీక్షము. (స్టెథోస్కోప్) Stethoscope.

దీనితో బాచిన ఊపిరి తీయునపుడు లోన గలుగు శబ్దము తూటాలోనికి గాలితోయ నపుడు గలుగు శబ్దమువలె నుండును. ఊపిరి వదలనప్పు డింతశబ్ద ముండదు. ఊపిరి తీయునపు డేండు శబ్దము వదలనపు డుండుదానికన్న 4 రెట్లెక్కువ కాలముండును. ఈశబ్దములూ గుండగుండెనను లుండెదాడు. ఇట్టిదృశ్యములు మూడవతరగతులు గలవి. బహు సూక్ష్మముగను, మధ్యతరగముగను, ముతకగను నుండవచ్చును. వీనియర్థ మేమనన నీటిలో మునిగి గాలి వదలితనో నెట్లు గుండగుండెశబ్దము బయటకు తెలియగలనో యట్లుగానే ఊపిరి తీయుటలోనికి బోవుగాలి భారీవలములలోనికిగాక ద్రోవపదార్థము (లేక కల్లి మొదలగు గట్టి పదార్థము) గుండ వ్రేలివేళించుచున్నది. ఇట్టి పదార్థములు ఆరోగ్యస్థితియందు ఊపిరితిత్తు లలో నుండవు. ఉష్ణవత్తుదగ్గరలో నిట్టివరిక చేసినయెడల వీలిమాత్రపంటి శబ్దములు వినిపించును.

మూత్రపరీక్ష

1. మూత్రముయొక్క చిక్కదనము బరిశీలించుట కొక పనిముట్టుగలదు. దీనినియూరీ నోమీటర్ (Urinometer) అందురు. గానియందు అంకెలు జేసియుండును. ఈచిక్కదనము నీటితోబోల్చి తెలిసికొనబడును. నీటియొక్క చిక్కదనము 1000 అంకచే గుర్తింపబడినచో ఆరోగ్యమును మూత్రముయొక్క చిక్కదనము 1003-1015 వరకు నుండును. అంగ్లేయగ్రంథములయందు 1015-1025 అని చెప్పబడును గాని ఈయంకెలు మనదేశమునకు సామాన్యముగ వర్తింపవు.

2. లెబ్బస్ కాగిత మని యొక గుఱుకాగిత ముండును. ఇందులో నీలవర్ణది యొకటి, ఎరువర్ణది యొకటి యుండును. ఆరోగ్యముండున్న మూత్రములా నీలవర్ణ కాగితమును ముంచిన పరిణమిండును. ఒక క్షణపున యెరువురంగు గలిగినట్టియు రెండవ వైపున నీలవర్ణరంగు గలిగినట్టియు లెబ్బస్ పేర్చిలు లుండును. కాగితముపయిన యీ పేర్చిలుతోగీసి, ప్రతిభముననే యీ కాగితము మూత్రమునందు ముంచుటవలన బరీక్షచేయవచ్చును.

3. ఆల్బ్యూమెను (Albumen) శ్లేష్మగ్రాహ్యువు.

నీటిని గాని గొట్టమును గీసి దానియందు ముప్పాతి వరకును మూత్రముపోసి, అనుగుభాగమును బట్టుకొని ప్రభాగమునందున్న మూత్రమును స్పిరిటుదీపముపై కాచవలెను. అప్పుడు కాచినచోట తెల్లగవచ్చులవలె మార్పుగలిగినచో నీ మూత్రమునందు మహాద్రావకము (Nitric Acid) ఒకనాట్టును మెల్లగా పోయవలెను. ఈవచ్చు కరగని యెడల ఆల్బ్యూమెను గలదు. కరిగినయెడల ఫాస్ఫేటసును లవణములు గలవు. వచ్చులేని యెడల మూత్రము ఆరోగ్యముగ నున్నది.

(4) చక్కరపరీక్ష (Sugar Test) పేవీసు నెల్యూదనునుగాని ఫేలింగ్సు నెల్యూదనునుగాని కొంచెము గాజునాట్టుములలో పోసి, స్పిరిట్ దీపముపై మరగజెట్టి, అందు మెల్లగ 5, 6, జాట్లు మూత్రమును గొట్టము పక్కనుండి వారబోయవలయును. పిమ్మట తిరిగి కాచవలెను. అప్పుడు నీలవర్ణదగ్గముగల ప్రైద్రావకము కాచిన పండిటుగ వర్ణమునొందినచో మధుమేహ మున్నదని యర్థము. ఇట్టి సందర్భమున మూత్రముయొక్క చిక్కదనము సాధారణముగా 1010, 1030, 1040, గూడ నుండును.

5. అన్ని మూత్రముల యందును ఒక పెరియవలె మధ్యము నీలుండును. ఇది సోదలక్షణము గాదు.

మూత్రమును పాఠికాలమున బరిశీలనవలెను.

వ్యాధిచికిత్స తెన్ని విధములు ?

వ్యాధి శేమార్గమున గుదిర్చి యెత్నించినను అయ్యట చికిత్స నాగుదును. ఈచికిత్స నీక్రింది విధములుగ విభజింపవచ్చును.

(1) కర్రమునుండి కొద్ది క్షణముల దీని యంత్రమును మూత్రదర్శిని యంత్రము

క్రింద బర్తీంచి యందలి మూలపదార్థలోపమును గ్రహించి యాలోపమును పరిశ్రాంతి చేయుట మూలమున.

(2) దేహమనందలి యే యముక యైనను బ్రహ్మాదము వలనగాని మరియేయింక; కారణము వలన గాని, విరగుటగాని స్వస్థానముగండి నొలగుట గాని తటస్థించిన యెడల నట్టిలోపమును “యక్స్రో” సహాయమున బర్తీంపించి దానిని సరిపెట్టుట.

(3) ఆరోగ్య సూక్ష్మముల ననుసరించి నడుచుకొనుట మూలమున.

(4) ఏ ఆవయవము యద్దాని సర్వానుచరణలోపమున వ్యాధిని గలుగుచున్నదో సురైంగి, యితర జంతువులకు సంబంధించిన ఆ ఆవయవములకు సారమును సమకూర్చి లోని కిచ్చుటవలన.

(5) శరీరారోగ్యమున కనుపూలముగు ఆహారనియమముల నేర్పరచుటవలన.

(6) టీకాలను వేయుట - అనగా - సిర - (రసి)ను గాని, తత్సంబంధముగ దానిని గాని, మహాచిక్కిరి విషముమనందనునది యింజక్తిచేయుట మూలమున.

(7) జలచికిత్స - జలమును విరివిగ లోనికిచ్చుట మూలమునను వివిధములగు స్నానములు చేయుట మూలమునను.

(8) వేడిమిని గలిగించి చేయు చికిత్స. డి. వాపువలనయందు వేడికావడముల నిచ్చుట మూలమున.

(9) వెలుతురు మూలమున వేయు చికిత్స. డి. సూర్యకిరణచికిత్స. ఇందు వెలుతురును వేడిమియును గలిసియుండును.

(10) విద్యుచ్ఛక్తి ప్రయోగమూలమున చేయు చికిత్స.

(11) వెన్నపూస ననుసరించి వైభాగమున - అనగా - వెన్నపూస మెడకుతో కలిపెడి స్నానమునుండి వెన్నపూస క్రిందివరకును నుండెడి నరములను సవరించుట మూలమున వేయుచికిత్స. ఇయ్యది పృత్యేక కాస్త్రమైయున్నది.

(12) స్నాయువులకు ఒత్తిడిని గలుగుచేసి - అనగా - పట్టుచిడుపుల మూలమున మర్దనచేయుటచే ఆయా ఆవయవధర్మముల క్రిమిపరచుటవలన (Massage).

చాలవ్యాధులలో వాటియొక్క నిర్ణీతకాలము గలిగినసేగాని వ్యాధులు నయము కానేరవు. ఈ మధ్యకాలములో ఆహారాధినియమముల జాగ్రత్తగ నడపుచు చిక్కునీకుల గలుగకుండ జూచుచు ఒకవేళ నేదైన చిక్కునీతి తటస్థించినదో నందుకగు పరిచర్యలను చేయుచు, సుశుప్తను గలుగుజేయు మార్గములను అవలంబింపవలయును.

ఆహారనియమము లేమి?

ఆహారము తీర్ణముగుటకు ఈ క్రింది కార్యానుకూలముల వసనములు:—

(1) మనుష్యుడు జాగ్రత్త వస్త్రధారణచేయుట; ఏలనన, నిద్రించునపు ఆహారముతీర్ణము కానేరదు. (2) తీర్ణకోశమునం దంతటను ఆహారమునకు కదలిక కలుగుట (3) నూర్మ్య వేడిమి, వెలుతురు. (4) తీర్ణకోశమునం దుత్పత్తియగు వివిధ రసములు. (5) బీర్హాశయము (Stomach) నిలువుగా నుండునీతి.

గాని పడుచునపుడు వైద్యశయను వ్రాలియుండును. గరుక యొక్కవ జీర్ణక్రియము జరుగజేరదు. అట్టి పనుయమున నేమాహారమైనను కడుపులో నిలువ యున్నయెడల నది క్షుల్లి వ్యాధులకను వును గలుగజేయును. ఇది గాక జీర్ణాశయమునకు గొంత విశ్రాంతి కావలయును. జీర్ణాశయమునందు బరువుపదార్థములు లేకుండిన నుభినిద్రకలుగను. నిద్రలేచినపిమ్మట నాలుగయిదు గంటలవరకు యెట్టి ఆహారమును లానికీ దీసికొనరాదు. ఉదయముననే కాఫీ మొవలయునని దీసికొనుట దుర్లభవాన్తయిండి ఆరోగ్యమునకు భంగము కలిగించును.

ఒకసారి లానికీ దీసికొనిన ఆహారము పూర్తిగ జీర్ణము గాకముందు మరలనే ఆహారమును దీసికొనరాదు. ఇట్లుచేయుట ఉడుకుచున్న ఆహారము లా కొత్తగా మరికొన్ని వియ్యము పోసి వంటజేసినట్లు యుండును.

ఆహారమును పూర్తిగా నవలవలయును. ఇట్లుగా శేయుటవలన గొంత జీర్ణక్రియము నోటియందే జరుగఁచుండును. కాక హఠమే ముంచి. మాంసమును ద్యజింపవలయును. ఇతర జంతువులు విశేష ఆహారము దినను. గాని మనస్సున కట్టి ఆశక్యకత లేదు. మనస్సుడు ప్రాణాననరమున కగత్యమును ఆహారమును మాత్రమునే భుజింపవలయును. జీవించుటకుగాను దినవలయును గాని తినుటకుగాను జీవింపరాదు. ఎక్కువగా దిననచో శరీరమునందు క్రొవ్వు పదార్థ ముభిజును. క్రొవ్వుపదార్థ మధిక వైనచో అసారోగ్యతకు విత్తనము నాటిపట్టి యని యర్థము చేసికొనవలయును.

ఆహార సూత్రములు

1. నీకొంత ఆహారమునరమే అంతఆహారమును ఒక్కసారిగనే వడ్డింపించుకొనుము. దానిని దిన పిమ్మట మారు వడ్డనను జెయ్యి నట్లుము. ఇదియే పథమ సూత్రము.
2. ఇంకను కొంత ఆకలి యుండగనే విస్తరియుననండి లెమ్ము.
3. నీ కొంత ఆహారము కావలసియుండునో దానిని నీలగుది నానుభవమువలన నిశ్చయించుకొనుము. ఎక్కువ నాశింపకుము.

4. భోజనమునకు గూర్చుండి నపుడు మనము కుక్కుటాశునమును వహించవలయును గాని పదార్థాశునమును వహించరాదని మన కావ్యములు చెప్పుచున్నవి. కుక్కుటాశునమున గూర్చున్నచో శిష్టాశయమును బూర్తిగా నింపుటకు నీలు లేకుండును ఇందుల కిదియే కారణము. తక్కువగా దినుట కిదియే ముఖ్యోద్దేశము.

5. వడ్డించిన భోజనపదార్థముల సంఖ్యలూ సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువగా నుండుట మంచిది.

6. ఒక ముద్దను బాగుగా నమలి దిగింగిన పిమ్మట మరయొక ముద్దను నోటిలోనికి పోనిచ్చుచుండు వలయును. ఇందువలన నాహారము ఉమ్మి దగ్గవమునో గతిని జీర్ణమున కనువగును.

మన పూర్వులు దినమునకు రెండు భోజనములను మాత్రమే నియమించి యులదిరి. కాని, నలుగురి సంవత్సరముల నునును దాటినవారు దినమున కొకసారి భుజించుటయే

మంచిది, గీర్వాణులు, రోమనులు, పర్షియనులు — వీరిందరును పూర్వకాలములో దినమున కొక్క భోజనమునే చేయుచుండెడివా రనుమాట చరిత్రాంగికమే అయియున్నది. దేవతలు దినమున కొక్కమారే భుజించుట ! మనుష్యుడు రెండు సార్లు భుజించవలెనట! కావున మనుష్యులు మృగములబోలి నడచుకొనకుండుట శ్రేయస్కరము.

మానసిక చికిత్స

మానసిక చికిత్సయన బౌద్ధసేవనములు మొదలగు పదమూలవలన చికిత్స శేయమెంచు తక్కిన చికిత్సకాస్త్రము లెట్టివో యిదియు నట్టిదేగాని దీనిని మతసంబంధ మైనదనిగాని, భూతవైద్యమువంటి దనిగాని యెంచదగదు. ఇందలి పద్ధతులు ప్రకృతి సూత్రముల ననుసరించి యుండుటచే నట్టి సూత్రముల కీయనగును గౌరవమునే దీనికిని యిచ్చునగును.

సృష్టియందుండెడి శక్తిబలములు ప్రాణబోధితములై యున్నవి. ప్రాణమును పెంతునంటియే మనస్సుగూడ నుండి యున్నది. బ్రహ్మాండమున కంతకును గూడ మనస్సు గలదు.

శరీరమునకు వర్తించు కొన్ని ప్రకృతీనూత్రములు గలవు. ఆ ప్రకృతి సూత్రముల నుల్లంఘించినయెడల వ్యాధి కలుగుచుండును. రోగికి వ్యాధిని గుఱుర్చుటను యత్నించుటలో నీమనశ్చక్తిని నీ పుష్కరయోగింప వలయును. రోగియు దనవ్యాధి కుదరగలదను నమ్మకమును గలిగియుండవలయును. యిట్టిమనశ్చక్తులు చనిచేయనిదే యెట్టి వ్యాధియును కుదిరక నందజాలదు. వైద్యునకుండెడి యిట్టి శక్తికే మనవారలు హస్త వాసం యని చెప్పచుందురు! పాతకమహాశయా !

నీ మనశ్చక్తియందును నీ చికిత్సాశక్తియందును నమ్మకమును గలిగియుండుము. ఇట్టి సహజశక్తిని భగవంతుడు ప్రతిమానవునికిని పారితోషికముగ నిచ్చియున్నాడు. ఈశక్తిని నీ పుష్కరయోగించిన కొలదియు నద్దాని బల మధిక మగును. శరీరసాధకము జేసిననీ కండగము లెట్లు వృద్ధిపడెనో అటులనే యీ విషయమునను సుపకరింపగలదు.

నీవు చేయు చికిత్సలయందు జయ మందినయెడల గర్వము నందకుము. ఇట్టి శక్తి నెవరు బ్రయత్నించినను బడయగలరు. ప్రకృతి సూత్రముల హస్తములందు నీహాక సాధనముగా వర్తించుచున్నావు. అంతకు మించి మోమియులేదు. బ్రహ్మాండమునందలి శక్తులు నుండి నీవు నీ శక్తిని గ్రహించుచున్నావు. నీ స్వక క్రియలనీవు జేయునదేమియును లేదు.

రోగి కిచ్చునట్టి అహోరవధార్థ విషయమై ప్రభువు జాగృతను బుచ్చుకొన వలయును. రెండవ ముఖ్యవిషయము శరీరమున కవసర మగు జలమును క్రమముగా సుపయోగించుట. ఆరోగ్యమున కగు మూడవ అవశ్యకత క్రమ డోషిరి. డోషిరి దీయుట క్రమముగా లేక పోయినయెడల రక్తము కరిక్కుభ్రష్టమగును. ఇందు మూలమున ఆరోగ్యతనమును, దీర్ఘజీవితమును సాధకములమున ముందుగా నీవు నేర్చుకొని పిమ్మట నీ పద్ధతిని యవలంబింప రోగికి బోధించుము.

శరీరసాధకము, స్నానముచేయుట మొదలగునవియు నావశ్యకములే. నిద్ర-అనగా శరీరమున కంతకును విశ్రాంతి — ప్రకృతి సూత్రముల ననుసరించి యిదియును వలసినదే. దీనికే మహాప్రకారంగిక గూడ భావించవచ్చును.

పీని కన్నిటికంటే ముఖ్యము మనశ్శాంతి లేనిదే శరీరము కృమారోగ్యమును పహించి యుండనేరదు. ఈ మనశ్శాంతి రోగికిని వైద్యునకుగూడ నవసరమే. వైద్యునియొక్క చికిత్సావిధానము ఈ శ్వరాంతశ్రవణోధిత మైనదియు పవిత్రమైనదియు నయియున్నది. ఈ ఆశయము నెప్పుడును మనమనం దుంచుకొన్నచో వైద్యవృత్తి అనందదాయక నైవేదియు జయప్రదమైనదియు నగును. పృథ్వీ మాతనుండి దూరముగ జనిన సోదరలకు శరీరారోగ్యబల మయొక్క సంతోషవార్తను చెలిపి వారల ఋజుమార్గమునకు దే బ్రయత్నింప వలయును. (ఆధునిక మానసిక చికిత్సయను వేలు గ్రంథమునందు యీ చికిత్సావిధానము గూర్చి వివరములు గలపబడియున్నవి.

సూర్యకిరణ స్నానము.

ఈ సూర్యకిరణస్నాన చికిత్స గ్రీకుల రోమనుల బౌద్ధతత్వస్థితి నాటినుండియు నుండి యున్నది. ఆర్యులు అదినుండియు నూర్మణిమహిమ నెరిగియుండిరి. అను దినమును ఆర్యులు తమ సంధ్యావందనమునందు సూర్యుని కభిముఖులై అర్ఘ్యమును విడచుటను బట్టియే వారి యొక్క నమ్మకమును మనము గ్రహింపవచ్చును.

వ్యాధిహితములగు గ్రీకులు జీవితో బెరుగును. విశేషవెలుతురున్న విశేషఆరోగ్య మేగాక దీర్ఘజీవితము సంతోషమైనట్టియు జీవితమున కనుకూలతయని మనము గ్రహింప వలయును. మనము దుస్తులను ధరించుచుండుట మూలమున మన శరీరములు కొంతవరకు మాత్రమే యీ సూర్యకిరణస్నాన యవకాశమును బొందుచున్నవి.

సూర్యకిరణమును విభజించి చూచియుండుట నందు యేదరంగు గాండును; ఒక వైపున యెర్రనివరంగును రెండవ వైపున నీలమును ఊదారంగును నుండును. ఈ రెండవ వైపుననుండు ఊదారవర్ణముగల కిరణములగు 'అత్యంత ఊదారరణములు' (Ultra-violet rays) అని పేరు. ఇవియే రసాయన సంబంధమగు కిరణములు, పెక్కు, దుమ్ము, వాయువు నందుండెడి జంతువదార్థములు—యివన్నియు నీ చికిత్సాకిరణముల ధ్వంసమున చేయును. వేడికిరణముల యొక్క నీవర్తిత యొక్క వైద్యో ఆ రాయకరములగు ఫలితములు కలుగగలవు. ఇందుమాత్రముననే యుండినగా జీవమునందు చుండెల్పు తగిలిజనులచనిపోవుచుండుదు. సూర్యకిరణములన్ని బంతువులను అన్ని భాగములను ఆవిశ్లేష మయియున్నది. చర్మమునందలి నిలములును చర్మము యు గ్రహమునకు అగ్నికలయందాశ్రవారము నందున్న రక్తమును ఈకిరణములనాకర్షించి శరీరమునందలి పరిసరములలో చూర్మమును కలుగజేయును. పిన్న బిడ్డలలో యెటుగలు గట్టిపడకుండ నుండు వ్యాధిజనుడు ఈ కిరణవలన బ్రయోజన ముండగలడు. ఈ వ్యాధియందు "పిట్యుని దీర్ఘిని గోగమును కాడివలదు కమరును పెన్నును గూడనియును. శ్మయవ్యాధియందును, అశ్మి బిచ్చవ్యాధియందును, బట్టతలయందును, క్షిర్మోష్టియందును, అనేక విధములగు ఆరోగ్యదోషకలయందును, నాడిబలక్షయమునందును ఈ సూర్యకిరణ చికిత్సా పద్ధతివలన పర్యయోజనము లందబడి యుండెను.

స్విట్జర్లాండు దేశములోని రెయిసిన్ పట్నమునందు 'బార్బర్' తొలిమిదొ యను నాయకు యీ చికిత్సామార్గమున వాలసంవత్సరము లనేకవ్యాధుల గురుద్యునుండెను.

ఈ సూర్యకిరణస్నానమువలన వ్యాధులను రాకుండ గూడ కేసికొనవలయు. ప్రియ స్నానాభ్యాసమువలన శరీరమునకు బలము కలిగి వ్యాధి ఆవహింపకుండ నడ్డగించును గలిగించును.

సూర్యకిరణ స్నానమువలని జౌహధవిలువ యొప్పుకొనబడియుండుటను బట్టియు చీకటిలో వ్యాధిహితకీర్తిములు వృద్ధిపండుచుండుటను బట్టియు, యీ చికిత్సాపద్ధతి ననుచరణ యందుంచుట కంతమాత్రము సుసంజేహింపవలదు. శరీరమునకును సూర్యకిరణములకును యంత మాత్రము అడ్డుయున్నను ఈ “అత్యంత ఊదాకిరణములు” పనిచేయజాలవు. కాబట్టి యీ చికిత్సవలని అధికారోగ్యదీపనల నందుటకుగాను వూర్తిగ దిగింబరియై యీ స్నానము నొనర్పవలయును.

మధ్యాహ్న సమయమున అనగా సుమారు ఒంటిగంటవేళ ఒక చాపనుగాని మరియే యితరపక్కినుగాని బరచుకొని దుస్తుల నన్నిటిని తొలగించి అందుపైన పదినిమిషములపాటు శరీరమున కంతకు సూర్యరశ్మి తగులునట్లు చొరలుట మాలమున నీచికిత్సను గావించ వచ్చును. ఇట్టి చికిత్స 16 నిమిషములకు మించి చేయరాదు. వేడిమి అధికముగ పోకిన యెడల జబ్బుచేయగలదు. కావున వాగ్రతను వహించియుండవలయును.

ఈ క్రింది పరిస్థితులయందు సూర్యకిరణస్నాన మాచరింపదగదు ఒకవేళ ఆచరించినను తక్కువ కాలమును దీసికొనవలయును.

1. వేడిమి అతిత్వంతముగ నాకర్షించుకొను చర్మమును గలిగినట్టి రోగులు.
2. హృదోగములకుండలి తీవ్రస్థితులయందు.
3. స్పష్టమగునట్టి ధాతునష్టమానందు.
4. జ్వరముతో గూడిన తయవ్యాధియొక్క తీవ్రస్థితియందు;

తయ చికిత్స.

1. ఆహారమును విరివిగా నీయవచ్చును. పాలు, నుగ్గిడ్లు, రొట్టె, కేసె, కాకపదార్థములు. పండ్లు, మాంసాహారములు — యివన్నియు నివ్యవచ్చును.
2. ఒకే చికిత్సమును గమనించవలయును.
3. శరీరమునకు చలిగాలి సౌకర్యండునట్లు దుస్తు లుండవలయును.
4. స్నానమును క్రమముగా చేయవలయును. ఒడ లంతటిని గోరుకెచ్చని నీటితో స్పృశచేసి, నిమ్మట గట్టిగా తుడువవలయును. స్నానమును బహిరంగస్థలములో చేయరాదు.
5. ఆయాసమును గలుగజేయు పని చేయరాదు.
6. శరీరసౌఖ్యము మించిదేగాని అదువలన దగ్గును, శరీరవేడిమియును, కలుగుకుండు ట్లి మాడవలయును.
7. రోగియుండు గదిలోనికి సూర్యరశ్మియును వెలుతురును గాలియును బాగుగా వచ్చుచుండ వలయును.

9. సముద్రగోమందుగాక లోప్రదేశమునం దుండుట మంచిది, లేమలేని ప్రదేశమై యుండవలయును. ఉయ్యవ్యాధులలో గొన్నిటియందు సముద్రప్రయాణము మేలు చేయును. ఆంధ్రప్రదేశమునందు మదనపల్లి త్రయోంగులకు మంచి నివాసస్థానముగ నెంచబడుచున్నది.

9. బృహస్పతి మందుల నియ్యనక్కురలేదు. ఫారన్ హీట్ 74 డిగ్రీల వేడిమిగల ఫిటిన్ వేచేలు కావచ్చుగాని, మన లింతయు గాని, సుడువలయును. ఈ భరించగలిగిన యెడల యీ వీధి వేడిమిని 60 డిగ్రీలవఱకు నింపవచ్చును.

10. పొడిదగ్గ గానుండి నీసయున్నయెడల, టింక్చర్ వెంజాయిస్ కోనుగాని, వెంజాల్ నుగాని, క్రియోసోల్ నుగాని, కర్బూరమునుగాని, కలిపిన ఉడుకునీటి నుండి వచ్చుడిబరిని నీల్చుటవలన నుపయోగముగ నుండగలదు.

11. చెమట అధికముగ నున్నయెడల యష్టాగ్ని క్షయమౌ నాను ఆరగ్నియును మెండులు ఒక గ్రెయిసువరకు మూత్రగా చేసి యివ్వావచ్చును.

12. ఆశ్లేష్టచేదనములకు ఒక టీ స్పూన్ నిట్టాముదము నియ్యవచ్చును.

13. ఎడరోమ్మలో నొప్పి యుండినయెడల పట్టును వేయవలయును.

14. రక్తస్రావ ముండిన యెడల ఆట్రాక్ట్ 1/100 గ్రెయిసు $\frac{1}{2}$ మార్పియతో గలిపిగాని కలపవలసిన గాని రక్తములోని కింజత్వ చేసినయెడల తరచుగా చక్కని గుణము నిచ్చును.

అంతు వ్యాధులు.

ఇండియా దేశమునందు వ్యాప్తతనందియున్న వ్యాధులలో గొంతువరకు అంతు వ్యాధులును ఉండియున్నవి. ఈ వ్యాధులు జీవానుసంబంధములై యున్నవి. ఇందుల కుదాహరణములు— టైఫాయిడ్ జ్వరము, అమనికదనములు (పిటిలోకోక తరగతి) అంతుసంబంధముగ అతినిరేచనములు, చలిజ్వరము, ప్లేగ్ (బాక్టీరియా) న్యుమోనియా, కలరా— టీసికోన వచ్చును.

అంతు వ్యాధులలో రెండుతరగతులుగ నేర్పరచవచ్చును. ఒకవిధమగునది ఒక మిషి నుండి యింకొక మనుష్యునికి కరీమయొక్క అస్పష్టకా భాగస్పర్శ వలననే గాని వేరువిధముగ వ్యాప్తతనందగలదు. రెండవవిధమగునది వాయుమార్గమునగాని జలమార్గమునగాని వ్యాప్తత నందును. మొదటిదాని కుదాహరణముగ గవోరియాను టీసికోనవచ్చును. రెండవదాని కుదా హరణముగ కాలరాను టీసికోనవచ్చును, అంతు వ్యాధుల విషయమునందు విశేష అనుభవము వలనగాని పరిశీలనలనగాని వ్యాధిని నిర్ణయింప వీలుగనుండదు. మహాచివ్యాధివిషయములో ప్రారంభలక్షణముల బట్టి వైద్యుడు ఆ వ్యాధినిర్ణయపరచి కుటుంబములోని తక్కినవారలందఱకును సమీపనివాసులకును టీకాణ చేసి వ్యాధియొక్క వ్యాప్తతను నిలుపుచేయవచ్చును. కాలరాని విషయము లాగునాడ నవసరమగు ముందువాగ్రితలను బుచ్చుకొనుచు వ్యాధియొక్క వ్యాప్తతను ఆట్రచేయవచ్చును.

అంతు వ్యాధుల విషయములో తగువాగ్రితలను బుచ్చుకొనుటవలన వ్యాధుల యొక్క వ్యాప్తతను తగ్గింపవచ్చును. విటియొక్క ఉదాహరణములనూడ తగ్గింప చేయవచ్చును.

ఇంగ్లాండునందు కొన్ని శతాబ్దములక్రింద కలిగిన "బ్లాక్ డెత్" (Black Death) అను అంటువ్యాధి యిప్పుడెచ్చటను గానరాదు.

కొన్ని అంటువ్యాధులయందు ప్రత్యేకములగు జీవాణువులు శరీరమునందు బ్రకటింపబడి ననేతప్పు వ్యాధులు కలుగజేరవు. చలిజ్వరమునది ఆ జ్వరసంబంధముగ జీవాణువు గలదని నందు బ్రకటింపబడేగాని చలిజ్వరము కలుగజేరదు.

అంటువ్యాధులన్నియు, మార్గమేదయినను, ఒకమనిషినుండి యింకొక మనిషికి వ్యాప్తత సంభవవే ఆయియున్నవి. ప్రతివ్యాధియను కొంతనియమిత కాలము శరీరము సాశ్రయించి యుండును. ఈ నియమిత కాలము అనేక కారణములబట్టి వ్యాధిగ్రస్తులయందు మార్పు నందు చుండవచ్చును. వ్యాధిసంబంధముగ జీవాణువు శరీరమునందు బ్రకటింపబడినట్లు కొంతకాల మువరకు వ్యాధిలక్షణము లేనియు కనబడవు. ఈ మధ్యకాలమునకు వ్యాధిపరివర్తన కాలమని పేరీడవచ్చును. అనంతరము వ్యాధిచిహ్నములు కనబడి వ్యాధియొక్క ఉద్రుతస్థితియందు మరణము సంభవింపవచ్చును. లేక వ్యాధియొక్క ఉద్రుతస్థితి కడచినపిమ్మట వ్యాధినివారణ కావచ్చును.

అంటువ్యాధి యొక్కసారి సంభవించి నెవ్వరినిబి నమిదట సామాన్యముగ మరల కొంతకాలమువరకు అనేవ్యాధి సంభవించజేరదు. వ్యాధిరక్షణశక్తి దానంతట అనియు రోర్పడును కాని, యీ విషయమున చాల మివహాయింపులు కలవు. ఒకే మనిషియందగు కాలరా మరల సంవత్సరములొక్కసారి రావచ్చును. ప్లేగ్ వ్యాధి కూడ ఒకే మనిషికి రెండు సార్లు రావచ్చునుగాని యిట్లు బహు ఆరుదుగా తటస్థించును.

ఈ అంటువ్యాధులలో ప్రతిదాని విషయమునందును భేదముగ జీవాణువు శరీరము నందు బ్రకటింపి వ్యాధిని గలుగజేయుచున్నదని మనము గ్రహింపవలయును. ఈ వివిధము లగు జీవాణువులను శరీరమునందు బ్రకటింపబడినట్లు, నవి సంఖ్యయందు భిన్నమై నందును, వ్యాధిని బ్రకటి గనబరచునట్టికి గొంతకాలమువట్టును. పిమ్మట నీ జీవాణువుల యొక్క బలము తగ్గిపోయి వ్యాధి అంతరించుటకు మరికొంతకాలము నడచును.

ఈ జీవాణువులయొక్క అంటు సౌకినంత మాత్రమున వ్యాధి కలుగకపో వచ్చును. శరీరమునందు బ్రకటింపబడి జీవాణువులయొక్క సంఖ్య హింసయైయుండి వచ్చును; లేక శరీర మునందు జొచ్చిన జీవాణువులయొక్క బలము మిక్కిలి తక్కువగైన నుండువచ్చును; ఇది యందుగాక, యీ జీవాణువులయొక్క దాడులకు లోబడకుండుంధంత బలమును శరీరము కలిగి యుండనైన వచ్చును.

ఈ దేహమునందు సామాన్యముగ వ్యాప్తతనందియున్న అంటువ్యాధులును, వాటి యొక్క ప్రత్యేకకాలమును, రాగినుండి వ్యాధిరహితమైన కాలమును, యీక్రింది పట్టికయందు తెలుపబడినది. చలిజ్వరకాలము అనగా శరీరమునందు జీవాణువులు ప్రకటింపబడిన పిమ్మట వ్యాధి పైకెదిలుటకు బట్టుకాలము. రోగినుండి వ్యాధింపదగిన కాలము అనగా, వ్యాధి కుదురుకొంటు నందిన పిమ్మట వ్యాధింపచుటకు విలగమగునట్లు కాలము.

వ్యాధి	పరిపక్వ కాలము	రోగినుండి వ్యాపింపదగిన కాలము
మకూడి	12 దినములు	6 వారములు (సామాన్యముగ)
ఆటతమ్మ	10 మొదలు 12 దినములు	3 " " "
పొంగు	8 మొదలు 12 దినములు లేక రెండువారములు	4 " " "
డెంగ్యుజ్వరము	3 మొదలు 6 దినములు	2 " " "
గవదలు	10 మొదలు 22 దినములు	3 " " "
కోరింత దగ్గు	4 మొదలు 14 దినములు	8 " " "
వెన్నూరుగుండా	కొద్దిగంటలు	1 మొదలు 2 వారములు
పునఃపురోహజ్వరము	కొద్దిగంటలు మొ 12 దినములు	4 వారములు (సామాన్యముగ)
మైఫాయిడ్ జ్వరము	5 మొదలు 21 దినములు	6 " " "
కాలరా	కొద్దిగంటలు మొదలు 5 దినములు	2 " " "
చలిజ్వరము	1 వారము మొదలు 3 వారములు	ఒకరినుండి యింకొకరికి వ్యాపించదు
మేగ	3 మొదలు 10 దినములు	3 వారములు లేక రెండువారములు
మయ	3 వారములు	ఎన్నఁదగినది
మచ్చ	2 మొదలు 3 దినములు లేక రెండువారములు	వ్యాపించదు
మోలికొక్క కాటు	14 దినములు మొదలు కొన్ని మాసముల వరకును ; సామాన్యముగ 6 వారములు	వ్యాపించదు

వ్యాధిపరిష్కారము పగిలున లెక్కపేసి చెప్పినదైయున్నది. కొన్ని విషయములలో దీని కచ్చుతగ్గు లుండవచ్చును.

అంటువ్యాధి ప్రకటించినపుడు దానిని సావ్యమైనంత శీఘ్రముగ గుర్తరింగి వ్యాప్తత జెందకుండుటలు జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొన వలయును, ఇట్టి జాగ్రత్తలను జైలుభాసాణు, విద్యాలయములు మొదలగు బహిరంగ వాస్తవ్యములందు మిగుల ముఖ్యముగా గమనించ వలయును.

వ్యాధులయొక్క వ్యాప్తత.

1. వాయువు ద్వారా:— మశూచి, పొంగు, గవడలు, ఇన్ఫ్లూయెంజా, ష్యుమ్మర్ వ్యాధి మొదలగు వ్యాధులు వాయువు ద్వారా గొంపోబడును. అనేకమగు అంటువ్యాధులలో వ్యాధిహితములగు జీవాణువులు కొద్దిదూరము మాత్రమే సంచ రింపగలవు. మశూచి, ఇన్ఫ్లూయెంజా విషయములో మాత్రము యొక్కవ దూరమునకు యీ జీవాణువులు సమర్థులు చుండును.

2. జలము, ఆహారము, ద్వారా:— టైఫాయిడ్ జ్వరము, కాలరా, ఆరువిరేచనములు — యీ వ్యాధులు జలము ద్వారా విశేషముగ గొంపోబడును. అంటుదలచిందిన పాలమూల మున గూడ నీ వ్యాధులు వ్యాప్తత నందివచ్చును; పాలమూలమున ష్యుమ్మర్ వ్యాధియు పొంగును గూడ వ్యాపింపవచ్చును.

3. బట్టల ద్వారా:— మశూచి ప్లేగ్ సంబంధములగు జీవాణువులు చాలకాలము తోగితో సంబంధించిన బట్టలు మొదలగు వాటియందు చలనములేని స్థితిలో నుండి మిమ్మల్ని వ్యాధులను వ్యాప్తత నందజేయును.

4. మనుష్యుని ద్వారాయను, కీటకముల ద్వారాయను:— మనుష్యుని యొక్క క్యానకోకముల మార్గమునను, దిడలు మార్గమునను, మలమూత్రముల మార్గమునను కొన్ని వ్యాధులు వ్యాప్తత నందును.

ఎలుకలు మూలమున ప్లేగ్ వ్యాధి వ్యాప్తత నందును, నల్లలమూలమున కాలరా అజూర్ వ్యాధియును, దోమలమూలమున చలిజ్వరవ్యాధియును, ఈగల మూలమున టైఫాయిడ్ జ్వరమును, కాలరాయను, ఆరువిరేచనములును వ్యాప్తత నందుచుండును.

అంటువ్యాధులయొక్క వ్యాప్తతను నిలుపుచేయుటకు మార్గములు:—

అన్ని విధములగు అంటువ్యాధులను వ్యాప్తతనందకుండ జేయుటకు శ్రద్ధవహిత ప్రత్యేక పద్ధతిని జెప్పటకు వీలైనది కాదు. సోపానమున కవలంబించదగు పద్ధతులు ప్లేగ్ వ్యాధికి బని కిరావు; ప్లేగ్ వ్యాధికై ఉపయోగింపదగిన పద్ధతులు కాలరాకు ఉపయోగింపవు. అయావ్యాధి ధులక్రియ జెప్పబడు ముందు జాగ్రత పద్ధతుల నవలంబించుచు వ్యాధులయొక్క వ్యాప్తత నణచివేయవలయును.

1. అంటువ్యాధియందైనను యొక్కింది బంకములను ముఖ్యముగ గమనింపవలయును.

1. వ్యాధిగ్రస్తుని యంతటలనుండి విడిచి. ప్రత్యేక స్థలమునం దుంచవలయును.

2. వ్యాధిగ్రస్తునినుండి అంటుదలను సోకినటుల అణచివేయవలగిన వారిని విడిగా నుంచి వ్యాధిపరిష్కారము పాటినంతవరకును అట్టివారిని విడిగనే యుంచవలయును.

3. రోగి వసించియున్న స్థలమునకు సంబంధించిన గొడలు, పెల, తివాచులు, పని ముట్లు వగయిరాలనన్నిటిని ఆయా నిర్ణయపద్ధతులపైన ఆంటులేకుండ శుభ్రపర్చి వలయును.

4. మహాబి సంభవించిన విషయమునందు సమాపస్తులందరును టీకాలను వేయించు కొనవలయును. ఇట్లుగాజేయుటవలన నీ వ్యాధిని పారదోలవచ్చును. ప్లేజ్ ప్రవేశించియున్న పుడు ఆంగుసంబంధమగు టీకాలను వేయించుకొనటవలన ఆరుమాసములవరకు వ్యాధి రాకుండ జేసికొనవచ్చును. టైఫాయిడ్ జ్వరము 18 మాసములవరకును రాకుండ టీకాలను వేయించుకొనవచ్చును. కాలరామాడ గొన్ని మాసములవరకు రాకుండ టీకాలను వేయించు కొనవచ్చును.

కాలరా విశేషముగా వ్యాప్తత నందియున్నపుడు త్రాగునీటియందు దోషముండి యున్నదని గ్రహించవలయును. మహాబి విశేషముగా వ్యాపించినయెడల చాలవంది టీకాలను వేయించుకొని యుండలేదని యెంచవలయును. టైఫాయిడ్ జ్వరము యొక్కవగ వ్యాపించి యున్నపుడు, యీ రోగులయొక్క మలములైము లేవిధముగ పరిష్కరింప బడుచున్నదియో నీటిసప్తయి పాలసప్తయి విషయములయం దేమయన దోషయలున్నదియో, విచారింపవలయును.

ఆన్నివిధములగు ఆంటువ్యాధులును ఆరోగ్యవగుజీవితములను గడపువారియందెక్కువ వ్యాప్తత నందజేరవు. శరీరమును పరిశుభ్రముగానుంచుట, పరిశుభ్రమగు నీటి సుపయోగించుట ఆరోగ్యహితమగు నాహారమును భుజించుట, పరిశుభ్రమగు గాలి వచ్చునట్టి గృహములందు నివసించుట, గృహములకు చుట్టుపట్ల పెంటకుప్పలు మొదలగునవి శేఖండజేయుట — యీ విషయములందు జాగ్రత్తను వహించి యుండవలయును.

ఆంటువ్యాధి దేదయిన ప్రవేశించినపుడు ఆనుదిన జీవితమునందలి మఱాలుతల వాటుయం జీవిధమగు మార్పులను జేయరాదు. ప్రైవియమును గమనించుట యేగాక, అల నటను గలంగజేయు పనులను జేయరాదు. చలిగాలి సోకరాదు. ఆ మావ్యాధులయెడ భయ కంటికి లగుటవలన వ్యాధియొక్క ప్రవేశమున కెక్కువ ఆపుదము కలుగునుగాన అట్టి భయము సంతిమాత్రిమును మనసునందు జొరనియ్యగూడు.

కొన్ని జబ్బులపైనను నిర్లక్ష్యము చేయదు. తగినవిధిత్వ చేయవలయును. ఏదయినను వ్యాధియొక్క ప్రారంభముననే తగువిధిత్వ జేసిగయెడల శిశుముగ మదిని నందగలదు. నూత్యవ్యాధులయందు విశేషవిషయములలో విశ్రాంతియును తగు ఆహారమార్పును కదిలినను గలంగజేయగలవు. శరీరము వ్యాధిహితమ యినశుభ్రమ పనిసాపిజేసి విశ్రాంతిని దీసికొనుచు తేలి కగు నాహారము (అనగా పాలు మొదలైనవి) ను బుచ్చుకొనవలయును.

వాయువు.

శరీరమునకు, ఆహారము, జలము, దుస్తులు, సూర్యుని న్ని కావలయును. దీనిలో నెల్ల వాయువు మిగుల ముఖ్యమైనది. తక్కినవి అప్పుడప్పుడు గావలసియందును. వాయువు మాత్రిము యెల్లప్పుడును ఆవసరమయియున్నది. మన శ్వాసకోశములలోనికి వాయువును బిల్చుకొండ జీవించుటయే కష్టమైయున్నది. బహిర్యాయువునందు మాత్రాగమగు వాయువా యువు మనుష్యుడొక్క జీవితాధారమయియున్నది.

మనము లోనకు బీల్చునట్టి వాయువు పరిశుద్ధిమయివచ్చును, నవీనమైనదియు నైయుండు వలయును. శరీరమునందలి పోషకమునకును, ఉష్ణతకును, అనుకూలముగు గమలకు హఠాత్పదనమును బుట్టించుటకును, సరములకును సామాన్యముగ శరీరమునకుంతును యిటుమును గలంగజేయుటకును, పరిశుద్ధిమగు వాయువు మిగుల నవసరమయి యున్నది. వాయువు చలనము లేక పోవుటవలన దుష్టత్వమును గ్రహింపవచ్చును. ఒకప్పుడు మరీకిలో గూడియుండును. విషయుతమైగూడ నుండవచ్చును. ఆపరిశుద్ధమగు వాయువును బీల్చుటవలన నీదేశమందు గొన్ని మరణములు గలుగుచున్నవిని నిసంశయముగ చెప్పవచ్చును.

క్వాసకోశములలోనికి వాయువు సోటిదార్ద్రమునను నానీకాద్భాగమునను తొన్ని మధ్యమార్గములగుండా క్వాసకోశములలోనికి బోవును. బహిర్వాయువు నోటియందును, ముక్కునందును బ్రవేశించినవిచ్చుట క్వాసకోశములలోనికి బోవుచుండగ గొంత చెప్పబడనమును ఉష్ణతను జెందును.

వాయువు స్వాభావికముగ క్వాసకోశములలోనికి ముక్కుద్వారా పోవలయును. గాని నోటిద్వారా పోకూడదు. ముక్కునందలి యెముకలు ఒకవిధముగ నీవాయువునందలి మరీకి పదార్థములను వెలిజేయుటకు వీలుగ చేర్చడి యున్నవి. ఇదియునుగాక, నానీకారంధ్రములు విశేషముగ రక్తనాళములచే నావరింపబడి యుండుటచే చలికాలమునందు యీ వాయువు క్వాసకోశములలోనికి బోవుచుండగ కొంతవెచ్చదనము నందుట ప్రయోగముగ నుండును.

క్వాసకోశములు.

ఉదరముయొక్క ప్రాధాన్యమునందు క్వాసకోశము లిమిడియున్నవి. ఈ క్వాసకోశములయందు ఆపరిశుద్ధరక్తము లోనకు బీల్చబడు ప్రాణవాయుసహాయమున పరిశుద్ధపరచబడుచున్నది. పూర్తి క్వాసకోశమునందును, వాయుబిలుగులు అల్లికలచే బంధంపబడియుండును. సరములు, పరిశుద్ధరక్తనాళములు, ఆపరిశుద్ధరక్తనాళములు, మేదస్సు పారెడు నాళములు—యవన్నియుగూడ క్వాసకోశము నావరించియుండును. సగటున కుడిక్వాసకోశము 22 ఐన్సులును యెడమక్వాసకోశము 20 ఐన్సులును తూకముడుండును. క్వాసనాళములయొక్క అంతర్భాగములు పారసంబంధముగ పదార్థముతో గప్పబడి బహుమిశ్రితముగ నుండి వాయువుతప్ప తక్కిన యేవదాగ్తముయొక్క స్పృశ్యతగిలినను దగ్గును బుట్టించి అట్టి దోషపదార్థములను వెలువరింపజేయును.

మనము లోనకు బీల్చునట్టి గాలి క్వాసకోశములయొక్క అంతర్భాగములగు గాలిసంచలలో బ్రవేశించును. ఈ గాలిసంచలయొక్క ప్రాకారస్థానములు బహుమిశ్రితమగు సున్నితముగనుచుండి, సూక్ష్మమగు రక్తనాళములతో గూడియుండును. క్వాసకోశములలోనికి తొమ్మిదవ వాయువు యీ గాలి సంచలయందు బ్రవేశించి ఆసంచలయొక్క ప్రాకారస్థానములయొక్క పల్పదనముచేత—బహుమిశ్రితమగు పారమాత్రమే ఆద్భుతముండుటవలన—ఆ ప్రాకారస్థానములయందలి రక్తనాళములకును యీ గాలిసంచలయొక్క పారలకు గలుగుచున్న సంస్థిత కార్యక్రమమునందు రక్తమునందలి ఆవసరములగు వ్యర్థపదార్థములు యీ ప్రారల మార్గమున వెలువరింపబడుచు, గాలిసంచలలోని ప్రాణవాయువు రక్తముతోని

శ్వాసరొగమున బడుచున్నది. ఈ రక్తమువలన నాశరొగమునబడిన పాణివాాయువు గుండె యొక్క యెడమవశునుండి శరీరముయొక్క నానాభాగములకును దీసికొని పోబడుచున్నది. ఇట్లుగా ప్రవహించుచున్న రక్తనాళములనుండి పాణివాాయువును శరీరమునందలి నానా అవయవములయొక్క అల్లెలను గ్రహించుచు, తమతమ వ్యర్థములగునట్టియు అపాయహిత ములై ఊర్పిర్చునునట్టియు పదార్థములను ఆ రక్తమునందు ప్రవేశపెట్టుచు, యీ అవసర పదార్థములలో గొన్ని మరల శ్వాసకోశమునకు గొంపోబడి అచ్చట ఊపిరి గాలిమార్గమున శరీరమునుండి బయటకును బడుచున్నవి. ఈ వ్యభాషికపద్ధతి మూలముననే నల్లనైనట్టియు అపరిశుద్ధమైనట్టియు రక్తము యొద్దొనట్టియు పరిశుద్ధమైనట్టియు రక్తముగ మారుచున్నది. ఈ పద్ధతిని పీల్చియందులను నిర్వహించు శరీరమునందలి అన్ని అవయవములకును బోషణను గలుగజేయును. పీల్చి నిర్వహమునందును యీ శ్వాసకోశములలోని గాలిసంపూర్ణ యుగదలి వాయువుతో యొనిమిది పెంట్ల రక్తము స్పర్శగతి నందుచున్నది.

శ్వాసకోశములలోని రక్తము యెల్లప్పుడును ప్రాణవాాయువును బిల్చుకొనియిందులకు బదులుగా సంగారత్నానవాయువును వెలిబుచ్చుచున్నది. ఈ శార్యక్రిమమును నడపుటకు గాను శ్వాసకోశములయొక్క వాయుబిలములలోని వాయువు తరచుగ మార్పు నందుచుండ నలయును. ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసముల యందు యీమార్పు గలుగుచుండును.

ఆరోగ్యమునందున్న మనిషి విశ్రాంతి సమయమున నిమిషమునకు 15 మొదలు 18 పర్యాయములును, బిడ సుమారు 25 పర్యాయములును, పరీబిడ్డ 35 మొదలు 40 పర్యాయములును, శ్వాసను బిల్చుచుండును.

రక్తము వాయుబిలములందలి సూక్ష్మరక్తనాళముల యందు బ్రవహించునపుడు, అపరి శుద్ధ నీరునుండి పరిశుద్ధనీటికి మార్పునందుచున్నది. ఈ వాయుబిలములయొక్క సున్నితమగు ప్రాకృతికస్థాన మార్గమున యిరువైపుల వాయువులును మార్పునందుచుండును. హృదయము యొక్క నుడి పైపురుండి ప్రవహించు అపరిశుద్ధరక్తము అంగారత్నానవాాయు పూరితమై యుండును. హృదయముయొక్క యిరువైపునుండి ప్రవహించు పరిశుద్ధరక్తము ప్రాణవాాయు పూరితమై యుండును. వాయుబిలముల కిరువైపుల నుండి వాయువులయొక్క వరస్పర మార్పువలల వలన ఆంగారత్నానవాాయు నిశ్వాసమునందు బయటికి వెడలుచు ప్రాణవా యువు ఉచ్చాస్యనమునందు లోనికి వచ్చుచుండును.

శ్వాసకృచ్ఛము.

ఏ కారణము నల్లనైనను శ్వాసకోశములలోని వాయుప్రవేశ మాటంకపరచ బడిన యెడల, శరీరములో రక్తమపరిశుద్ధి జెందును. ఈ ఆటంకమును దొలగించుటకు దగ్గు గలుగును. ఈ దగ్గువలన నీ ఆటంకము దొలగించబడనియెడల రక్తమునందు అంగారత్నానవాాయు వధికమగుచు నపరిశుద్ధత జెందును. ఈ అపరిశుద్ధ రక్తము పెడదాపై బనిచేయుచు ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసముల సధికముగను బలయంతముగను జేయుచు, ఆయాసములో గూడిన ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసము తేల్చుదును. ఈస్థితి శ్వాసకృచ్ఛ మనబడును. ఈ శ్వాసకృచ్ఛస్థితి అధికమైతేలోది శరీరముయొక్క స్నాయువులన్నియు మడుచుకొని, మార్పులు ప్రవేశించును. శ్వాసాటంకము

యిప్పటికిని దీరకపోయిన యెడల గుండెదెబ్బలు బలహీనతనంది రక్తప్రచారము గుర్బలత్వము నందును. ఈ సందర్భమునందు హృదయము నీరసతతో గూడిన కొన్ని దెబ్బలను గొట్టిన పిమ్మట దానియొక్క కార్యక్రమము నిలచిపోవును. మన హృదయందు శ్వాసావసాధము తటస్థించిన పిమ్మట మూడు మొదలు ఆయిదు నిమిషముల లోపల మరణము దటస్థించును. శ్వాసకోశముల యందలి రక్తము పాణివాయువుతోగూడ కార్యక్రమముయొక్క పరిపూర్ణత ననుసరించి, శరీరమునందలి అన్ని అవయవములకును అర్థికలకును బలమును గలుగ జేయు గుణావళిములు రక్తమునం దిమిడి యుండును.

హృదయము.

హృదయము రక్తప్రచారమునకు మధ్యస్థమైన యొకవస్తువి. దీనినము మొదలు మగ యము పరకును పరిణీయించును, హృదయము (Heart) నిప్పుడు మునులగునది (హృదయము యంత్రము) వలె పనిచేయును. ఈ కాలమునం దంతటను రక్తమును పరిక్రమింపజేయుట లోనికి బంపుచుండును.

నాడి.

హృదయముయొక్క యెడమపార్శ్వమునందు కిందికిర మడుచుకొనినపు డందలి కొంతరక్తము ఆభాగము ననుసరించియున్న బృహద్ధమని (Aorta) నాబడు బిడ్డ వంతును రక్తనాళములోనికి జొచ్చుచున్నది. ఈ రక్తము మరల పనుకకు పోవుటకు పీల్చునందు నొకమాత్ర పడిపోవును. ఈ సందర్భమునందు ఈ పరిక్రమ రక్తనాళములలో నిదివరకు పూర్ణముగ రక్తముండియుండుటచే నొకొత్తరక్తమును దీసికొనుటకు యీ రక్తనాళము విస్తరింపు నుండును. ఈ రక్తనాళము విస్తరింపు నంది మరల యధాస్థితిని వహించు గుణమును గలిగియున్నది. ఇట్లు మరల యధాస్థితిని వహించుటయందు, యీ రక్తనాళమునకు కాళులుగా నున్న చిన్న చిన్న రక్తనాళములలోనికి యీ రక్తము గొంపోబడుచున్నది. ఆ చిన్నరక్తనాళములును యిదేపద్ధతిని మడుచుకొని మరల యధాస్థితి నందుచుండును. ఈ రక్తము తయి వివిధావయవములకును జేరి మరల నపరివహర రక్తనాళముల మూలమున శ్వాసకోశముల జేరుచుండును. ఇట్లుగా మడుచుకొని మరల విస్తరింపునంది యధాస్థితిని వహించుట గుండె గలుగు పరివహర రక్తనాళములయొక్క కార్యక్రమమనకే నాడియని చెప్పబడును. మణికట్టు యొక్క యెడటివైపునను, కణతమీదను, చెవియొక్క మందుభాగమునను, యీ నాడినిమనము స్పృశించవచ్చును.

ప్రధాన పరివహర రక్తనాళములందు రక్తము నెకనుకు 12 అంగుళముల చొప్పున ప్రవహించుచుండును. ఈ రక్తనాళములు చిన్నవైనకొలదియూ యీ పరిమితి తగ్గిపోవును; మిక్కిలి నూత్న నాళములకు జేరనప్పటికి యీ పరిమితి యింకను హీనతజెందును. ఎట్లైనను, ఈ నూత్న నాళములయందు రక్తమయొక్క పారుదల శక్తు వశాలము పట్టుక మరల నపరివహర రక్తనాళముల మూలమున కీర్ణముగనే ప్రచారము నందుచుండును. శరీరమునం దంతటను రక్తమయొక్క ప్రచారమునకై మూడు 30 సెకనులకాలము మాత్రమే పట్టును. ఒక పరివహర రక్తనాళమును మనము గోపినయెడల ఆందునుండి రక్తము ఉలికి ఉలికి వచ్చుచుండును.

ఇది నాడి యొక్క చిట్ట ననుసరించి యుండును. పరిశుద్ధ రక్త నాళమునుండి ప్రవించుచున్న రక్తమును నిలిపి వేయవలెనన్న మనము యీ రక్తనాళమును హృదయమువైపున బంధింపవలయును ; ఏలననగా, యీ రక్తనాళములలోనికి రక్తము హృదయమువైపుల నుండి వచ్చుచున్నది. ఒక అపరిశుద్ధ రక్తనాళమునుండి రక్తము ప్రవించుచున్న యెడల నీ ఊబుకుదల లేకుండ నొకేధారగ రక్తము ప్రవించుచుండును.

రక్తమెట్లు పరిశుద్ధత నందును ?

రక్తము నూడువిధములుగ పరిశుద్ధత నందును. (1) క్వాస్కోశములయొక్క రక్తనాళములందు రక్తము ప్రచారము నందుటవలన, రక్తమునందలి అంగారక్షారవాయువును, అందధికముగ నుండు అవిరహితమునకు, ఊపిరి గాలిమార్గమున బయటికి వెదలిపోవును. (2) ఒడలు యొక్క ఉపరిభాగము ననుసరించి గుండు స్వేదగ్రంథులలో రక్తము ప్రచారము నందుటవలన, అవిరహితమున అధికముగ జలమును, కొంచెము అంగారక్షారవాయువును యులియగా ఆనెడును నొకవ్యర్థిపదార్థమును, బయటపెడలిపోవును. (3) మూత్రగ్రంథులయొక్క రక్తనాళములయందు రక్తము ప్రచారము నందుటవలన అధికముగ జలమును, మూత్రమునందు గలిసియుండి విడిచియీగ, యూరిక్ ఆమ్లములును, వెలువరింపబడును.

రక్తముయొక్క ఉపయోగములు.

శరీరమునందుండునున్న నూనావిధములగు కార్యక్రమములందును ఉపయోగపడుచున్న పదార్థములయొక్క వ్యర్థమును పోల్చుచేయుట రక్తముయొక్క పనియై యున్నది. అవరోపదార్థములనుండి పోషణమును గ్రహించి యీ పోషణమును అవయవములయొక్క అల్లికలకు గొంపోవుట రక్తముయొక్క ధర్మమై యున్నది. శరీరమున కంతకును రక్తమును బలమును ఆచుచ్చును. అన్ని అవయవములయందును ఉండి అల్లికలయొక్క కార్యక్రమములకు ఆవసరముగ పోషణ చేయుచు రక్తము క్వాస్కోశములనుండి గొంపోయి అయాఅవయవములకు చేర్చును. ఈ కార్యక్రమములందు ప్రాణవాాయువు నెక్కుదిగ నుపయోగము నందును వేడిమిని నశింపజేయును. ఈ కార్యక్రమములందు దుద్భవమందు వ్యర్థపదార్థములును-అల్లికలగుట, క్వాస్కోశములు, చర్మము-మూలమున వెలువరింపబడును. శరీరమునందు పోషణవాయువుకేతమున గలుగుచున్న వేడిమిని సరిపమానముగ శరీరమున కంతకు వ్యాపింపజేయుటయందు రక్తము పని చేయుచున్నది. చలిదేశములయందు గృహములలో వేడిమిని గలుగజేయుటకు ఉడుకునీటి గొట్టములను ఉపయోగించుపద్ధతిని, యీ రక్తము శరీరమునందుండుటకు ఒకే సమానముగ వేడిమిని ప్రసరింపజేయును. శరీరమునందు నోటిలోని ఉష్ణి నీటిని స్రవించజేయు గ్రంథులకును, బ్రేణాశయమునందలి స్రవములకును, కారిజమునందలి విత్తద్రవమునకును, యింకను శరీరములోని యితర స్రవములకును, అవసరముగ పదార్థములను రక్తముచేర్చి పెట్టుచున్నది.

ప్రపంచమునందలి వాయువులో 100 కి 79 వంతులు పారజంక వాయువు (Nitrogen) యును 21 వంతులు పోషణవాయువు (Oxygen)ను ఉండియున్నది; అనగా, మొదటిది పోషణవాయువుకు చాదావు నాలుగువంతు లధికముగ నున్నది. ఈరెంటి యందును ప్రాణ

వాయువు ముఖ్యమైనది యున్నది. ఈ ప్రాణవాయువు జీతాధారమైనదియు మిక్కిలి చురుకైనదియునై మన రక్తమును పరిశుద్ధస్థితి యంగుండుట కాధారమై యున్నది. ఈ ప్రాణ వాయువు దెనితోజేసిన దానిని భస్మీభవంపజేయును. అది లేకుండవునకు వేడిమిగాని వెలు తురుగాని కలుగజేరదు. మన శరీరములలోపల ప్రాణవాయువు అహరివనార్థ ములతోజేరి భస్మీభవంపజేసి, శరీరముయొక్క వేడిమిని గాపాడుచుండును ఈ కార్యక్రమము నెమ్మదిగ జరుగుచుండును గనుక మనము ఆ వేడిమిని దెలియలేకున్నాము. వాయువునం దంతయు ప్రాణవాయువే ఉండియున్నయెడల మనలను దహింపజేయుచు గనుక సుప్తియందీ వాయువులో నింకొక విధమగు వాయువు గలిసియుండుట జంతుకాలముల యొక్క మేలుకొరకే అయియున్నదని మనము తెలిసికొనవలయును.

దుర్వాయువు మనల ననుసరించి యుండినయెడల రక్తమును ఆపరిశుద్ధపరచి శరీరము లోని పృతి ఆవయవమునకును హాని గలుగజేయును. ఒకసారి ఊపిరివదలిన గాలిని మరల లోనకు బీల్చుటవలన వ్యాధి జనించి మరణము కలుగును. ఈ కారణముచే పరిశుద్ధమగు వాయువును బీల్చుట మిగుల ముఖ్యమై యున్నది.

దుర్వాయువు గలుగుటకు మార్గములు.

(1) మనము నివసించు స్థలములందు వంటలు చేయుట మూలమునగాని వంటలు చేయుట మూలమున గాని మిక్కిలముగ పొగబెట్టుట వలన అగోగ్యమునకు భంగము గలుగగలదు. చమరుదీపములన బెట్టినపుడు వాటినుండి వెడలెడు అంగాగ తొరలొగుచు పొపుటకు సరియైన మార్గము లుండవలయును.

(2) జంతుసంబంధ మగునట్టిగాని వృక్షసంబంధ మగునట్టిగాని పదార్థములు కున్న నపుడు దుష్టమైనవాయువు లుద్భవించి చుట్టుపట్లనుండు వాయువుతో మిశ్రమ మగును. వాసననుబట్టి మనము యీ సంగతి గ్రహించి అట్టివాటిని వంటనే తొలగింప వలయును. నిలవమాంసము, ఉచ్చిష్టము, కాయగూరల యొక్కయు ఫలముల యొక్కయు పైచర్మములు, మామిడిపెంకెలు, చెఱకుపిప్పలు మొదలగువాటిని యింటిలోనిలువ యుంచరాదు.

(3) నివాసముచేయునట్టి గదులలో వంటచేయుట వలన మనము లోనికి బీల్చు వాయువునందు బరువుయేర్పడి ఆకలికి మాంస్యకను గలుగజేయును.

(4) గదులలో గుడ్డల సెప్పడును ఉడుకనియ్యరాదు. ఈ పనివలన చెడుసీక్కుయింటి నంతయు అకుభ్రాపరచుటయేగాక చెమ్మ గలుగునట్లు గూడ చేయును.

(5) ఇంటిలోపలను, యింటిలోని పామానులమీదను, గోడలపైనుదుమ్ముయొందు టవలన నొకవిధముగ ననవ్యమును బుట్టించు వాసనను గల్గించును. మాసిపోయిన బట్టలు చెప్పలుగూడ దుర్వాసనను కల్గించును. మనము నివసించు గదులను వాటిలోనుండు వస్తువులన్నిటిని పరిశుభ్రముగా నుంచవలయును. కిటికీలను తలుపులను తెరచి యుంచుటవలన పు కుభ్రమగు గాలి లోనకు వచ్చుటయే గాక దుమ్ము యొచ్చుట నున్నదియగునాడ దెలు జేయును.

వేసవికాలమునం దనవ్యముగా నుండినయింటిలో ఈగలు ముగురుకొనును. ఈగలు అంటువ్యాధులను దీసికొనివచ్చుటయేగాక ఆస్వాస్థ్యమునకును అనవ్యమునకును గారణము

అగును. ఇంకొకటి, మనకు వచ్చినప్పుడు నిలవమనినట్లు చేసి నిలవమనినట్లు నను ఈగలు విశేషముగా గుంపులు కూడను. ఈగలయొక్క గుంపులనుబట్టి మట్టుపట్టు అనారోగ్యమును బట్టియు తెలిసికొనవచ్చును.

(6) కుక్కోళ్ళు పోవుటకు జలదారులు లేకపోవుటవలనను జలదారులున్న విషయములలో నీటిపోవుటకు క్రిమయమున మృత్యుములు లేక పోవుటవలనను, గృహములయందును గృహసమీపములందును సంబంధహితముగ వాయువు ప్రవేశించుటకు పిలుగ నుండును. జలదారుండి యుప్పుడు వాసన యందు చేరినను దుర్వాసను సంబంధమైనదని మనము గ్రహింపవలయు. జలదారులను నీటినిబోసి పరిశుభ్రముగా గడుగుటవలన వాసనయు వచ్చును. జలదారులను పరిశుభ్రపరచిన వియ్యుటను గూడ చెడ వాసన ఉండినయెడల, సంబంధమైన నట్టియు పుష్కలసంబంధ మైనట్టియు దుర్వాసలయొక్క నుట్టదలవలన నెట్లైన నిట్లువాసన గలుగుచున్నదని మనముగ్రహింప వలయును. ఇట్టి దుర్వాసలవలన ప్రత్యేకవ్యాధి కలంగక పోయినను క్రిమయ సంబంధము అన్నట్లుగా చిత్తవృత్తి కలంగక మానదు. పాపము మూలముగ నై యుండగల అన్నట్లును గలగట్టి, పుష్కలముగాను అయ్యుండగల మరణము నెట్లు కలంగగలదు, అనభిధముగ నీ దుర్వాసలవలనను మన శరీరములకు బనిచేయుచుండును.

(7) రింగువాండ్లు, తోళ్ళను పడుచుచే రుచారలు, తోళ్ళవ్యాపారము చేయు వారలు, రింగువాడ చేయువారలు, మొదలగువారు తమవ్యాపారములను నివాసప్రదేశములకు నుత్తరముగా నేరుటవలన దుర్వాసలుపులను వ్యాపింపజేయుదురు. ఇట్టివారు తమశరీరును ఊరి బయట నేరగానున్నట్లును జేయవలెను; లేదా, ఎప్పటికప్పుడు తమవ్యాపార స్థానములను పరిశుభ్రత చేయుటకు నియమించ బడవలయును.

(8) వ్యాధి గ్రస్తులనుండి వెడలు దుర్వాసలుపులను, వ్యాధి సంబంధముగ వీచాటువులను, విషములుగ వర్తించును. ఆరోగ్యులను వహించిన వారలయందు కంటే వ్యాధిగ్రస్తులయందు వెడలు దుర్వాసలుపు లెక్కువ ప్రాంతములై యున్నవి. సూక్ష్మము లైనట్టియు అదృశ్యము లైనట్టియు పుష్కలసంబంధముగ జీవాణువులు శరీరమునందు బ్రవేశించుటచే వాలవ్యాధులు గలుగుచున్నవి. ఈజీవాణువులను వ్యాధిశోకముల మూలముగా గాని యితర విధముగాని శరీరమునుండి తెలియచ్చుటకు సాధ్యమైన ప్రయత్నములు జరుగుచుండును. అంటువ్యాధి సంబంధముగ జీవాణువులు శరీరమునం దొకసారి ప్రవేశింపగనే వీటిలోకొన్ని కరగటము లనగా క్షయగతిని పుట్టించుచుండును. మరొకవిధముగ వ్యాధులయందురోగులయొక్క శరీరమునుండియు వ్యాధిశోకములనుండియు నీవ్యాధిసంబంధముగ జీవాణువులు విశేషములుగ వెలువరింపు నందుచుండును. రోగి వసించుచున్న గదియందు యీ జీవాణువులు వ్యాధి కరమగును. మరొక విషయములో నైనయెడల మన మాజీవాణువులలోని బీజములను—అవివర కావ్యాధి కలిగియుండు విషయములలో గాని, క్రిమయముగా వీరాలన చేసికొని యుండుని సంబంధములలో గాని—వ్యాధి ప్రవేశము నుండును. పొంగు, పునఃప్రవేశము, గడవలు, అటలమ్మ మొదలగు వ్యాధులయందును ఇట్టి వ్యాధి త్రను ముఖ్యకారణమునందుండును.

(9) శ్మశానస్థలసమీపముల వాయువు చెడియుండును. కాబట్టి శ్మశాన వాటికిలు నివాసస్థలములకు దూరముగ నుండవలయును. ఇటుక ఆవములు గూడ గ్రామములకు దూరమున నుండవలయును.

(10) ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, కుక్కలు, గొర్రెలు మొదలైన గృహజంతువులు యింటిసమీపముల నుండుటవలన వాయువును అపరిశుద్ధ పరచును, ఇవి, ఊపిరిని విడుచుట వలననే గాక, పెంటవేయుట మొదలగు పనుల మూలమున వాయువు నపరిశుద్ధత నందజేయుచు, ఈ పెంటలు ఆరుదల నందినపుడు మెత్తని పొడిగి మారి మనము లోనకుబీల్చి వాయువుతో శరీరమునందు బ్రవేశించును. కాబట్టి ఈ గృహజంతువుల నన్నటిని మనము నివసించు గృహములకు దూరముగ నుంచుచు ఆర్థములను పరిశుభ్రస్థితియందుంచుచుండవలయును.

(11) పాయిఖానా దొడ్లు : ఈ దొడ్లనుండి వెడలు దుర్వాసలువు శరీర ఆనారోగ్యతను గలుగజేయును. కాబట్టి, వాటిని కట్టునివయమునందును, పరిశుభ్రముగా నుంచు విషయమునందును యెక్కువ జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనవలసి యుండును.

వాయువుయొక్క యేకరీతిస్థితి.

వాయువు అపరిశుద్ధత నందుచున్న మార్గములలో ముఖ్యమగునవితవరకు విచారించి యుంటిమి. వాయువుయొక్క స్థితిగతులను గూర్చి కూడ గమనించితిమి వాయువునందునానా విధములగు దుర్వాసలువులు మిళితమగుచున్నను, దానియొక్క స్థితిగతులయందే మార్పును గలుగజేయుట స్వభావమునందలి విచిత్రాంశమై యున్నది. ప్రపంచము నావరించియున్న వాయువు క్రమక్రమముగా మాలిన్యత నందుచునే యుండినయెడల మనము జీవించుటకే పిలు లేకుండెడిది. వాయు పీఠముగ నేకరీతి స్థితియందుండుటకు బనిచేయుచున్న కారణములను గూర్చి ముందు ప్రకరణమునందు జెప్పబడును.

వాయుప్రచారము

శరీరమునుండి వెలువడు దేనినైనను — ఊపిరిమూలమున వెలువడు దుర్వాసలువును గాని, మలము మూత్రము మొదలగు వాటిగుండ వెలువడు వ్యర్థపదార్థములను గాని విముక్తిజేయుట ఆరోగ్యసంరక్షణ యందలి ప్రధానాంశమై యున్నది.

శ్మశానములనుగాని యితరవిధముగ గాని మనము మలినపరచిన వాయువును సాధ్యమైనంత శ్రమముగ పారదోలుట ముఖ్యమైయున్నది. వాయుప్రచారమువలన నీడుగ్వాసలువు దూరమై పరిశుద్ధముగ వాయువే మనకు వచ్చుచున్నది. వాయుప్రచారము స్వాభావికమనిగనుక శక్తితపనియు పెండు విధములై యున్నది.

స్వభావజన్య వాయుప్రచారము స్వభావమునందలి శక్తులవలన గలుగుచుండును. ఈ స్వభావజన్య వాయు ప్రచారము ననుసరించి మనుష్యుడు వాడొకచేయు ఉపకరణములవలనను యేర్పాటుల వలనను కల్పిత వాయుప్రచారము ఆనుచరింపబడును.

వాయుప్రచారము మూడువిధములుగ గలుగుచుండును. ఆ మూడువిధములు యేమనిన:-

(1) అన్ని విధములగు వాయుప్రచారము, ఒకదానియం దింకొకటి కలియుగణమును గలిగియుండును. (2) ఉష్ణహితములగు వాయువులు తేలికగ నుండుటవలన బైకిదేలుచు చల్లనివాయువులు బరువుగనుండుటచే క్రిందికి (భూమిపైపునకు) దిగుచుండును. (3) వాయువు పీచుటయందలికర్తి.

(1) అన్ని వాయువులును ఒకదానియం దింకొకటి కలియు కారణముచేతనే మనమనాపి రివివేచనప్రాయం యితరుగనునట్టియు దుర్వాయువులు శీఘ్రమున నీ బహిర్వాయువునందు గలిసి వాతాయుక్కు- ఆపాయగుణమును పోషకము మన్నవి.

(2) మనము నివసించు గృహములందు తృప్తియగుదు ర్వాయువులు ఉష్ణహితముల గుటచే తేలికయై యింటికప్పువైపుల కెగయును. ఈ కారణముచే గోడలయొక్క పైపైపున కిటికీ లుండినయెడల నామగ్గమునకదుర్వాయువులు బహిర్వాయువునందు గలిసిపోవును; అట్టి కిటికీలుగాని, తలుపు మార్గములుగాని తేకపోయిన యెడల నీ దుర్వాయువులు చల్లకై, బరువు, మరల క్రిందికి దిగి మనము పీల్చుకొని యందు ప్రవేశించును. కాబట్టి గృహముల యందు పుట్టిందలి యిండుటవలన ఉపయోగముగ నుండుగలదు. పొగ పై కెగసిపోవుట జూచు టను బట్టి యీవిషయమును మనము చక్కగ గ్రహించ వలెను.

(3) పీచుచుండెడికొలి, తుప్పుదల నందలి వస్తువునుండి వెడలు దుర్వాయువులను గొం పోవుచు, మంచివాయువును గొనివచ్చుచు, మనము నివసించు గృహములందు నవ్విమనస్థియు పరుకుపై పడియు గాల్గి బ్రహ్మపక్షేయను; కాని వాయుప్రచారమునందీ కార్యక్రమము జరుగుటకు పీలుగనుండునట్లుల మనము కిటికీలను తలుపులను యేర్పాటు చేసికొన వలయును. గాలియొక్క రాకపోకలకు పీలుగనుండునట్లుల కిటికీలను, తలుపులను, ఒకదానికొకటి యెదు రుగ గాని, వాయుప్రచారము విశ్చితముగ జరుగుటకు ఒకదానికొకటి యెదురుపైపున కొంచెము పక్కన గాని యేర్పాటు చేసికొనవలయును.

సూర్యకిరణముల యొక్క కార్యక్రమము వలనను, వృక్షములు వాయువు నందలి అంగారకనిద్రవాయువును గ్రహించుటవలనను, వర్షముచే వాయుప్రక్షారన మగుటవలనను, వాయువు పరిశుద్ధత నందుచుండును.

వాయుప్రచారమునకు కిటికీలు, తలుపులు, పొగ గొట్టములు, మాత్రామేగాక, తలుపు నందులు, పెంకుకప్పులుకూడ సహాయపడుచుండును.

గృహమానందలి వాయువును బహిర్వాయువును ఒకే పరిశుద్ధస్థితియందున్నపుడు వాయుప్రచారమున కవసరముగ సంపూర్ణ యేర్పాటులను జేసియున్నట్లుల నెంచ వచ్చును.

పంకాలు.

వాయుప్రచారమునకు పంకాలు సహకారులుగ నుండును. ఒడలు నుండి వెడలు అదిరి విడలింపజేసి కఠినమునకు చల్లకనము గలుగజేయును. పంకాయొక్క ప్రతిఘోషమునకు గదిలోనికొలి ఒక కైపునుంచి బయటికిపోవును; పెంకుపై కైపునుంచి కొత్తగాలి తొలికి వచ్చుచుండును.

పట్టివేళ్ల తడకలు.

వేసవి కాలమందు పట్టివేళ్ల తడకలను గట్టి నీళ్లు పోయినట్లవలన వాయువునంగలి వేడి మిసి తగ్గించవచ్చును. ఈ తడకలయొక్క ఉపయోగమువలన వేడిమిని తగ్గించుటమీగాక, దుమ్మును ఆకర్షించుటచే వాయువును గొంతవరకు పరిశుద్ధ పఱచును.

నిద్రించు గదులు.

మనము నిద్రించు గదులయందు పరిశుభ్రముగ గాలియుండుట మిగుల ముఖ్యమై యున్నది. మనము జీవిత కాలమందలి మూడవ భాగమును నిద్రయందు గడపుచున్నాము. కొందరు నిద్రించుమందు తలుపులను కిటికీలను మూసి నిద్రించుదురు. ఇట్లు చేయుట చాల చెడుగాలిని లోన నుంచుకొనుచు మంచిగాలిని రానియ్యకుండ చేయుచున్నారు. ఇట్లు చేయుటచే నిద్రలేచునప్పటికి, చురుకుగను, అనుష్ఠ కృత్యములను చేయుటకు సంశోషముగను నుండుటకు బదులుగ, శరీరము బరువుగను పనిచేయుటకు అయిష్టముగను, నుండును. బహిర్యామిపు లోనకు జొరకుండుటవలన మన ఊరిగాలి గదిలోని వాయువు నశుభ్ర పఱచు చుండును. ఈ దుర్వాయువునే మనము లోనకు బీల్చుచుండు సెడల మన ఆరోగ్యత చేడి పోవుటకు సందియములేదు. కాబట్టి మనము నిద్రించు గదులలోనికి పరిశుభ్రముగ గాలి యొక్క వీచనకు దగు మార్గముల వేర్వేరుచేయుండవలెను. చలిగాలి రాకుండగను ఉద్రేక మగు గాలివీచనలు లేకుండగను జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొన వలయును. ఈ జాగ్రత్తల వలన నశుభ్రనిద్రను గలిగి, నిద్రనుండి సంశోషముగ లేవవచ్చును.

బిడ్డల ముఖ్యముగ పరిశుభ్రముగ వాయువును గలిగియుండ వలయును. బిడ్డలు అప్పుడప్పుడు బయట దిరుగుచుండ వలయును. పునఃగెట్టుటకును అటలాడుటకును వారల మన మాటయిచ్చెట్టరాదు. వారు నివసించు గదులయందు పరిశుభ్రముగ వాయువు ప్రసారము నందుటకు వసతులు గల్పింపబడి యుండవలయును. వృద్ధులను తమ ఆరోగ్యతను గాపాడు. కొనుటకు పరిశుభ్రముగ వాయువును సదా గలిగియుండ వలయును. పీరిగదులలో చలిగలి వీచకుండ జాగ్రత్తలను మాత్రము బుచ్చుకొనవలయును.

విద్యాలయములు.

బిడ్డలయొక్క వయస్సునందు చాలకాలము విద్యాలయములయందు గడుప బడును. ఇండియాదేశము నందలి యీ విద్యాలయముల యొక్క స్థితి బహు అసంతృప్తికరముగ నున్నదిని చెప్పటకేమియు నందియములేదు. విద్యార్థి జీవితమునందు పరిశుభ్రవాసమును యొక్క అవశ్యకతనుగూర్చి విశేషముగ దెప్పునక్కరలేదు. శరీరముయొక్క పెంపునకును విశాసము నకు పరిశుభ్రవాయువు అవసరమైయున్నది. దీనిని భోగముగ నెంచదగదు. ఇయ్యది స్వభావ మునందు వెలలేకుండ నుచితముగ ప్రతిమానపునకి నొసంగబడునదై యున్నది. కాబట్టి ప్రతి పాఠశాలనంతయు కొల్లలగ నావరించునట్లు యీ వాయుభవము ప్రతివిద్యాలయము నందుగూడ విద్యార్థులకు దక్కునటుల చేయుట మన విధానకృత్యమయి యున్నది.

రోగినిగూర్చి జాగ్రత్తలు.

ఇండియా దేశమునందు సామాన్యముగ పేదవారల గృహములలో, వ్యాధులకు దోడుగనుండు అనారోగ్యహిత పరిదేశములను గూర్చియు, రోగి జరుగుచుండు అసౌఖ్య విషయములను గూర్చియు, తగు జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొనవలయును. రోగి పరుండియుండు గదిలోనికి ఒకతలుపు తిప్పు సామాన్యముగ కట్టికొనిన నుండును. రోగియొక్క బంధువు లందరును జుట్టి యుండునుచేత లోనికి బిల్లుట కవసరమగు గాలియైనను సరిగానుండును. రోగి యొక్క శరీర పరిమళాన్నిగూర్చి యెవరును జాచువారే యుండును. రోగియొక్క అన్ని వైపులను గంద్రగోళముగ నుండును. రోగి తిచ్చువట్టి అహారస్థితిగూర్చి విచారించనే అక్కరలేదు. శరీరవ్యాధిని బాగుగ చరిసికొని, యిచ్చుచున్న దోషములయొక్క గణాభివృద్ధిలను బక్కగ గనపెట్టి, మందులనుచ్చ వైద్యు డెక్కు వసరమై యుండును. ఇట్టి స్థితిగతుల యందు పేదవారలు వ్యాధిహితులైనప్పుడు ఆసుపత్రిలో ప్రవేశించుట వలన త్వరలో మదిలిక నుండలను. ఆసుపత్రి అందుబాటునందు లేనపుడు బుద్ధికారియగు వైద్యుని యొద్దనుండి మందువుచ్చుకొనుచు, కీమత్తగ్గతకు సహాయవాడేయు గొన్ని విషయములను గమనించుట ముఖ్యమైయున్నది.

ఈ క్రింది విషయములను గమనించుట వలన నెక్కువ ఉపయోగముగ నుండగలదు.

1. రోగి పరుండియుండు గది, ఇంటిలో నెల్ల వెలుతురు వచ్చునదియు, సౌఖ్యముగ నుండునదియు, నై యుండవలయును.

గదిలో సాధ్యమైనంత వరకు సామానుల నుంచరాదు. అవసరమగు సామానుల నుంచుటవలన విరవగు వాగుంప్రచారలోపమేగాక, దుమ్మునకును వ్యాధిహితమగు జీవాణువులకును స్థానమేర్పడును. గదిలో ముఖ్యముగ నుండవలసినవస్తువు లేమనిన:—రోగియొక్క ప్రక్క కవచమును నుంచము ముందరైనది. రోగియొక్క భోజనమున కవసరమగు వస్తువులు, రోగిని గొంతెము దూరమున నుండుట నుంచుటకు బల్ల, వైద్యుడను మరియొకరైనను గూర్చుండుటకు చెండు మద్దీలుగాని బల్లలుగాని ఉండిన చాలును. రోగిని జూచుటకు ప్రతివారిని రాలియ్య గూడదు. రోగిని జూచుటకు ముఖ్యవసరమైన వారును, రోగి జూడగోరిన వారును, రోగి యొక్క ఉపచారకులను, నప్ప యితరులను సామాన్యముగ రాలియ్యరాదు. రోగిని జూచుటకు వచ్చినవారు గొంతెమునేపు మాత్రమే ముట్టించవలయును గాని రోగిని అలసటను గలుగజేయు దీర్చి యొక్కవగ మాట్లాడరాదు. ప్రభావక సంతోష కరమైనదిగ నుండవలయును గాని రోగియొక్క మనస్సున కాయాసము గలంగ జేయునదిగ నుండరాదు. సీతక గది పట్టిరాదు. చీతకమైన వెలుతురు రాగూడదు. ఇట్టి వెలుతురు పెడకువకు అనవసరమైనట్టియు అబద్ధమైనట్టియు జాతకుడనమును బుచ్చించును. వైద్యుని యొక్క ఉద్దేశపుల ప్రకారముగాని, వైద్యుడు లేనిచో రోగియొక్క ఇష్టమును అనుసారము బట్టిగాని, వెలుతురుయొక్క ప్రవేశమును గమనించవలయును.

2. రోగి నివసించు గదిలోనికి సాధ్యమైనంతవరకు పరిశుద్ధమగు వాయువు వచ్చుచుండునట్లు జాగ్రత్తపెట్టవలయును. వ్యాధిగ్రస్తులు, తమ వ్యాధిశాశముల నుడియు, శరీర

ములనుండియు, మాలిన్యముల వెలువరచుచుండును. ఆరోగ్యస్థులకుండు వ్యాధిగ్రస్తములకుండుండుండు వాఱువును గోరుచుండును. చలిగాలియును వర్షమును ఉండిననే తప్ప కఠినములను తలచువులను దెరచియుంచవలయును. చలిగాలి వీచుచున్నపుడైనను, గాలి పూర్తిగా గాఢండు నట్లుగ తలచువులను మాయరాదు. గాలి రోగికికి సరాసరిగ వీచకుండునట్లు జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనవలయును.

3. రోగియొక్క ముఖమును, చేతులను, అనుదినము గడగవలయును. తక్కిన శరీర మంతయును దినమున కొక్కసారియైనను. ఉడుకునీళ్ళతో స్పృశించేయవలయును. ఈకనలును కృమముగాను, రోగి కాయాశ్రయ గలుగకుండగను — ఒక్కొక్క పర్యాయ మొక్క అవ యవము చొప్పునను — జేయవలయును. రోగి మిక్కిలి అస్వస్థునియందుండి, యిట్లు చేయుటవలన వ్యాధి ఉద్ధృతగతిని వహించునని తోచినయెడల, నెలుపు చేయవలసియుండును రోగికి పశుభృమగు దుస్తుల నియ్యవలయును.

4. రోగినుండి వెడలు అన్ని సాగ్రవములను, మయిలబట్టలను, గదిలోనుంచి తీసివేసి కార్పాలిక్ అసిడ్ లోషన్ వగయిరాలతో శుభ్రపరచవలయును.

5. రోగి. నెప్పడును క్రింద పడుండబెట్టరాదు. ఏదైన బట్టనుగాని మంచమునుగాని వెచ్చి, అందుపైన కృమమైన ప్రక్కవేసి రోగికి పొఖ్యముగ నుండునటులు చేయవలయును.

6. అనవసరముగ ధ్వనులను జేయరాదు. ఇట్టిపనులు రోగియొక్క విశ్రాంతికి భంగ మును గలుగజేయును. రోగియొక్క ప్రక్కసమీపమునగాని గదిలోగాని యేవిధమైన గడ విడను జేయరాదు.

7. మందుసీసాలనుగాని, నివిధముగ నాహారపదార్థములను గాని, రోగికి సమీప మున నుండుండురాదు. గదియందు పట్టినందర్భమునను మంచుపల్లెను ఉండనియ్యరాదు.

8. గుణభూతముల చెలియని మందుల నియ్యరాదు. శాస్త్రబ్జ్జన ముండిన వైద్యునిచే చికిత్స జేయింపవలయును. ప్రతివారియొక్కయు, స్నేహితులయొక్కయు, స్థలవాల ననున విధి చికిత్స జేయింపగూడదు.

రోగికి ఆహారము.

వ్యాధియందు రోగులు సామాన్యముగ నాహారము నేవగింతురు. ఈ రోచగింపు గుణము, శరీరమున కాహార మక్కురలేదనునట్టి గాని, శరీర మాహారమును తీర్చింప జేసికొనజే దనునట్టిగాని, స్వభావసిద్ధముగ సూచనను చెలియజేయును. దాదాపుగ అన్ని వ్యాధుల యం చును ఆకలి లేకపోవుట తలచించును. కొద్దివిషయములలో దప్ప తక్కిన అన్ని పరిస్థితుల యందును ఆకలి ఆరోగ్య సూచనయే ఆయియున్నది. అన్ని వ్యాధులయందును, ముఖ్యముగ తీవ్రదశయందున్నపుడు, గట్టిపదార్థముల నాహారముగ మన్నివేసి, ద్రవపదార్థములను మత్రిమే యియ్యవలయును. ద్రవపదార్థములైనను ఒకేసారి విశేషముగ నియ్యరాదు. వివిధమునందును మామూలు ఆహారమును యియ్యరాదు. ఒకవేళ మొప్పుడైన యిచ్చినను తక్కువగ నియ్యవలయును. దీర్ఘవ్యాధిగలవగు జ్వరములలోను, కొంతకాలము జబ్బుగా ముండిన వారలయందును, యీ పద్ధతి పనికిరాదు. అట్టివిషయములలో దేలికగ జీర్ణముగ నాహారము వివిధ నియ్య నవసరమై యున్నది.

ఒకరోగి మిక్కిలి జబ్బుగా నున్నయెడల, ద్రవాహారమును కొద్దిపరిమాణములలో నెక్కువ తరచుగ నియ్యవలసియుండును. దీర్ఘ వ్యాధక వ్యాధులలో—మఖ్యముగా జ్వరము లందు—శరీరముయొక్క బలము గాపాడవలసి యుండును.

రోగి మిక్కిలి బలహీనము గా నున్నయెడల, ఆహారమును దినుటకుగాని, త్రాగుటకు గాని, శేవనియ్యరాదు. పరుండనిచ్చియే ద్రవాహారమును నెప్పుడగును జాగ్రత్తగను యియ్య వలయును, రోగిని ఆహారమును బుచ్చుకొనుటకు దరచుగ తొందర చేయగూడదు.

వ్యాధియందు విశ్రాంతియును నిద్రయును బలమును గలగజేయును. గాబట్టి ఆహార మనకుగాని వందునకుగాని అగత్యపైసపుడు మాత్రమేదప్ప యితర కాల ములందు రోగిని నిద్రలేపరాదు. అప్పుడైనను మిక్కిలి ఆవసరపైనప్పుడే నిద్ర లేవలయును. ఇతర సందర్భ ములందు రోగిని యిచ్చనచ్చినటుల నిద్రొంప నియ్యవలయును.

రోగులలో నెప్పుడును సంతోషముగను సాధువుగను మాట్లాడవలయును. రోగులు తరచుగ పడసరగణమును కోపస్వభావమును వహించియుండురు. ఈ స్వభావము వారి యొక్క లోపముగ నెందరాదు. ఈగుణము వారు ఆనుభవించుచుండు వ్యాధిభరితమై యున్నది. మనము వారియెడల దయగను ఓర్పుదలగను నుండవలయును. రోగుల కుపచారము చేయువారిలం, దిగులాందునట్లుగాని, రోగియొక్క వ్యాధి తీవ్రదశ నందియున్నదనెడు సూచననుగాని, రోగికి గలియనియ్యరాదు. ఈకొద్ది విషయములందు మనము జాగ్రత్తను వహించియుండటవలన రోగియొక్క సౌఖ్యమునకు మనము పహాపదిన వారలమేగాక వ్యాధి యొక్క కుదిరికకు విరోధముగ దోడ్పడినవార మగుదుము.

ప్రతిసుటుంబమునందలియు శ్రీలు రోగులచూర్చి యెట్టిజాగ్రత్తల బుచ్చుకొనవలసి నదియు గ్రహించి యుండవలయును. కొందరు స్వభావనిర్ధముగ నీపనియందు నేర్పునలిగిన వారుండురు. మనము నొకళ్ల నెందరనుంచినను రోగులకు జేయనగు ఉపచారములచూర్చి చక్కగ చదివి పనిచేయువారలు దొరకుట శుభము.

రోగుల గనిపెట్టియుండువార శిష్యులును చిగ్గరగా మాట్లాడరాదు. రోగిలో మాట్లాడు నపుడు స్వచ్ఛముగాను విరళముగాను మాటలాడవలయును. గుసగుసలాడుట కూడదు. రోగి విసగూడని దెప్పుడును రోగి వశించియుండు గదిలో మాట్లాడరాదు.

రోగులయొక్క చుట్టుపట్ల నెప్పుడును సంతోషహితముగా నుండవలయును. సంబ్రా హితమైన సందడులను జేడుకులును బుణిరావు. కాంతత, సుస్వభావము, మాట్లాడుట కూడినపుడు సద్విషయములగుంర్చి మాట్లాడుట, రోగి అడుగు ప్రక్కలకు ఉల్లాసరముగ బహులు చెప్పుట—ఇవన్నియు రోగియొక్క సౌఖ్యమున కాదరపు లగుటయేగాక వ్యాధియొక్క శ్రుమగు కుదిరికకు దోడ్పడును.

దుర్వాసన అన్నయెడల వాటిని గలిగించు కారణముల దొలగింపవలయును. సామాన్యముగ నెప్పుడును సువాసన ద్రవములు నుపయోగించరాదు. ఇందువలన దుర్వాసన అన్నయెడల గనబడకుండుటకు వీలగు నుండును. పుష్పముల నలంకరించుటవలన రోగియొక్క నవ్వికి అలంకరణగనలగు గలగజేయును.

హిస్తీరియా.

ఈ వ్యాధియుక్కు లక్షణములు శోకచోట వివరింపబడి యున్నవి. ఈ వ్యాధిగ్రస్తులను జీర్ణశ్రేయముటయందు శరీరమునకును మనస్సునకును గూడ వలయు వైద్యోపచారములను జేయవలెను. రోగికి వైద్యునియందు నమ్మకము కలుగునట్లు చేసికొనవలయును. తేనియొకటి పెట్టిచికిత్సయు నుపయోగించ నేరదు. ఈ వ్యాధి చికిత్సయందు వైద్యునికి పరివ్రాజ్యకాశలమును, శాంతమును, దయాగుణమును, ఉండియుండవలయును. వ్యాధిలక్షణములు మరేమియు తొందరతో గూడి యుండలేదని రోగికి తెలియజేయుచు, రోగియుక్కు నిడుతోడ్పాటు కూడ నుండినచే గాని వ్యాధి కుదిరిక నందనేరదని రోగికి చెప్పవలయును.

రోగికి సానమార్పుదలయును, బంధువులకును స్నేహితులకును దూరముగ నుండుటయును, సహాచారులను జేయగలవు. విశ్రాంతి, సాధువగు చల్లనిస్నానములు, విద్యుచ్ఛక్తి పోయోగము, అనుదినమును ఒడలు మర్దనముచేయుట, బలగునటియు చురుకునగునటువహింపనట్టియు సాహారము, విరవగు పరిశుభ్రవాయ్యు—యివన్నియు వ్యాధి స్వస్థతకు దోడ్పడును. నరములకు బలమును గలుగ జేయుటకుగాను గోరువెచ్చని తేక చల్లని నీళ్ళతో చేతులపై దోముటవలన నుపయోగించగలదు.

ఆహారము.

ఆహారవిషయమున బలమగునట్టిది చాలినంతమాత్రమే యియ్యవలయునుంగాని మిక్కిలముగ నియ్యకూడదు. మిక్కిల భోజనము ఆస్వస్థతను వృద్ధిపరచును. గనుక యిందుకు యమై జాగ్రత్తను వహించి యుండవలయును.

చురుకునుబట్టిను బ్రాందీమొదలగు వాటినిగాని, నిద్రను బుట్టించు నల్లమందు మొదలగు వాటినిగాని ఉపయోగించరాదు. కాఫీ, తేయాకునీర్లు, కోకో—వీటినిగూడ నియ్యరాదు. మాంసాహారమును ద్యజించవలయును. వీలనన, యిదిగుత్తును గలుగ జేయుటయేగాక, నుతబద్ధమును గూడ బుట్టించును.

ఈ రోగులకు ఫలముల సాహారముగ నిచ్చుటవలన మంచిగుణము కలుగును. ఇవి తేలికగ జీర్ణముకూడ నగును. సామాన్యముగ నన్నిఫలములను సాధువిధచన గుణమును గలిగియుండును. ఫలములు వివిధ నుపయోగించ నగును. నిష్కర్షకముతో జేసిన పచ్చడులను ఉపయోగించ వచ్చును. కాకపదార్థములు, కాయధాన్య సంబంధములగు ఆహారములు, పాలు, పెన్న, మిగడ, గుర్రధ్దు—వీటిని భుజింపవచ్చును. ఆహారపదార్థములు పూర్ణముగా పచనము చేయబడి, యొక్కోకసారి కొద్దితరగతుల పదార్థముల మాత్రమే తినవలయును. దినమునకు ఘోధుపర్యాధములు భుజింపవచ్చును. ఒక భోజనమునకును యింతొక భోజనమునకును మధ్య కాలమందు ఉపహారములను మానివేయవలయును. మిఠాయి, మురబ్బాలు, చక్కెరతో గూడిన ఆహారములు, జీర్ణమునకు బరువగు పదార్థములు—వీటిని ద్యజింపవలయును. ఆహారముతో తేలికగ నుండిన నీరకు మంచిది. డోరుగాయల నుపయోగించ దగదు. ఉప్పును కొద్దితరగతులతో వాడక చేయవలెను.

మందులు.

ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు మందులను విశేషముగ సేవించుటవలన తమ ఆరోగ్యతమ హానిగలుగజేసి కొనుచుండురు. ఈ రోగులు వైద్యుడిచ్చు మందులనే గాక పృథకులన పత్రికలయందు గన బడు మందులను బుచ్చుకొనుట కలవాటుపడి యుండురు. ఈ బౌద్ధములవలన ఘటితమే మింకూ గానకున్నను తాము ఆమందులవలన పర్యయోజన మందుచుంటిమని వారు తేజించుండురు. బాగ్రిందీ, నల్లచుండు, బాగ్రిమైద్యు, రోశేస్, క్లారల్ — యీ మందుల సుపయోగించుట వలన సంతమాత్రమును పర్యయోజన ముండజాలదు. బలవర్ధకౌషధములని వికృత్యింపబడు వానియందు వికృత్య ముంచదగదు.

హిస్టీరియా వ్యాధిగ్రస్తులు నిద్రారాక బాధ నొందుచుండురు. సుఖనిద్ర నొందుచు వ్వును అట్టి నిద్రారామిచే బాధ నొందుచున్నటుల వారు దలంతురు. పీరు తరచుగా బలహీనతను గూర్చి చెప్పుచుండురు. రాత్రికాలములయందు సమయా సమయములు లేకుండ భుజించుట కలవాటుపడి యుండురు. రాత్రి భోజనములు నిద్రాభంగమునకును దుస్వప్నములకును సోకావులగును. పరుగుడుటగు ముందుగా పదినిమిషములు మొదలు ముప్పది నిమిషములవరకు ఉడుకునీటి స్నానమును జేయుటవలన నిద్రకలుగ గలదు. పాదములను ఉడుకు నీటిలో బెట్టి కొలదికాలము వరకు నుంచుటవలన శిరస్సునందు గూడియున్న రక్తమును తొలగింపజేసి రక్తప్రచారమును సమపరచును. కొన్నివైసగాని మెడవైపుల గాలి చిన్నీర్లలో తడిసిన గుడ్డను అడ్డుటవలన పై పద్ధతికంటె రక్తప్రచారమున కెక్కువ అనుభూతమును గలుగజేయును. పాదము నెక్కుడును శరీర ఉష్ణతను వహించియుండునటుల జూడవలయును. పక్కబట్టలు పొడిగ నుండునటులను, విశేషవేడిగ నుండకుండునటులను, బాగ్రిత బుచ్చు విసవలయును.

పరుండిన పిచ్చుట, వస్తువైపులగాని, శిరమువైపులగాని, చేతులు కాళ్లవైపులగాని, సాధువుగ నొత్తుటవలన నిద్రకనుకూలమగు స్థితిగతు లేర్పడును. నిద్రను రప్పించుటకు తక్కిన పద్ధతులన్నియు నుపయోగించనపుడు, బాగ్రిందీ సుపయోగించి సాధువగు విద్యుచ్ఛక్తి ప్రవాహమును జొప్పించ జేయుటవలన నొకప్పుడు పయోగించ వచ్చును. సుఖనిద్రకు ప్రాణవాయుపరిపూర్ణత యెల్లప్పుడును ఆవశ్యకము గనుక రోగి పరుండియుండు గదిలోనికి పరిశుద్ధ వాయువు విరివిగ వచ్చుటకు మార్గము లేర్పడి యుండవలయును.

నిద్రారాకట్టి యీ రోగులుపైన తెప్పబడిన కాఫీ ముదలగు పదార్థములను బుచ్చుకొనరాదు. పొగాకున కలవాటు పడియున్నవారు అట్టి అలవాటును మాన్పుకొన వలయును. నిద్రావచ్చుటకు గాను మందుల సామాన్యముగ నెన్నడును సేవించరాదు. ప్రద్యునియొక్క పలకపైన నెన్నదైన సేవించినయెడల బహు అరుదుగ సేవించవలయును.

రోగి బయట విరుగుటకు శక్తి గలిగియుండిన యెడల గాలిలో దిరుగునటుల జేయవలయును. తనదకవలన గలుగు శరీరసాధకము నిద్రావచ్చుటకు నవాయ మొనర్చును.

మూర్ఖగతి కలిగిన యెడల దాని నుండు యెక్కువ లక్ష్యముంచినటుల రోగికి గనబడరాదు. రోగికి మూర్ఖత టటస్థించినపుడు దుస్తుల నన్నిటిని వదులుచేయ వలయును. ముఖముపైనయును యెదురు రొమ్మపైనయును చల్లని నీళ్లను గొట్టుటవలసి జాల విషయములలో మేలు కలంగగలదు. మూర్ఖలవలన మరేమియు పాఠాపాయములేదు. సోగి క్రిందపడిన యెడల తలకింద నొక దిండును బెట్టి చలిగాలి తగులకుండ నొక దుప్పటిని గప్పించువలెను. ఒకటి రెండు గంటల పిమ్మట రోగి తనంతట తానే లేచును. రోగి మూర్ఖముండి లేచినపిమ్మట మూర్ఖ బహుసాధువైనదని రోగితో జెప్పవలయును.

రోగి చికిత్సకై యెప్పటికైనను వెల్చి మరలి వచ్చినపుడు, ఆమె యెక్కువ పునరములన్నియు సంపాదించితిమిగా జేయవలయును. విశ్రాంతివలని లాభముల నొనగ వచ్చుట మనస్సున కాయాసము దోచకుండు నటుల సోగికి యెన్నియొనని లక్ష్యము వలయును. సోమరిగ నుంచినయెడల వ్యాధి తిరుగబెట్టుట కాన్పించును గలగును. పుష్టినిగా వ్యాధి పుట్టి జీవంబరమును లేక పోవుటవలన సంపాద్యముగనుది గాని విశేషించి పాటుపడుటవలన వచ్చునట్టిది కాదని తెలియవలయును.

జలుబు

కొందరు జలుబు జలుబుచే తరచుగా బాధ నొందుచుండురు. ఈ జలుబు మూలముననే మరణము తటస్థించదుగాని, ఈ ఆస్పత్తయందుండి గలుగు బాధయును, చిర్రును, యిండుల ఫలితముగ గలుగు వ్యాధులును, విచారణీయములు; ప్రపంచము నెదురింతులు గలుగు మరణములలో నగమవంతు యేవ్యాధుల వలన గలుగుచున్నవో ఆవ్యాధులను యీ జలుబుగఱము యిరవును గలుగ జేయుచున్నది. ఆవ్యాధులు, న్యూమోనియాయును, క్షయవ్యాధియును అయియున్నవి.

బహిర్యాయువునందు శీతలత యేర్పడినపుడు న్యూమోనియా వ్యాధియొక్క ప్రబలత యేర్పడును. ఈవ్యాధియందు కంటే న్యూమోనియా వ్యాధియందు మరణము తక్కువగ నుండును. కేవలము చలిగాలి వీచునప్పటికంటే, నొకనాడు ఎండయును మరునాడు వర్షమును గలుగుచు, బహిర్యాయువునందలి శీతోష్ణతలయందు అకస్మికమగు మార్పులు కలిగినపుడు, న్యూమోనియాయొక్క వ్యాప్తత తక్కువ పిలుగనుండును. ఈవ్యాధి హితములగు జీవాణుగర్భితముల ధూని మనము లోనకు చీల్చినపుడు వ్యాధిని గ్రహింతుము.

న్యూమోనియావ్యాధి జీవితమునందలి అన్నిగతులయందు—ఆనగా, పరితనమునందును విడగా నున్నపుడును, వృద్ధవయస్సునందును—యేమియు విచిత్రత లేక గలుగుచుండును. క్షయవ్యాధి, వయస్సులోనుండి సంసారభారమును మోయుచు న్నటులబియు నంతయు సందర్శించువారిని, గొంపోవును. పడుచుతనమునందు 45 సంవత్సరముల లోపుగ నీవ్యాధి తటస్థమగును. ఈ వ్యాధికిని న్యూమోనియా వ్యాధికిని మార్గమును జాగ్రత్త జలుబును గురించి మన మెక్కడ జేయరాదు.

జలుబు యొకత్వము అంటువ్యాధిగ బ్రసరించును. జలుబుచే బాధనొందువారి నాని కారణములనుండి వెలువడు అవకాశమును విశ్లేషించిన యెడల నొకప్పుడు వ్యాధిహిత

మలగు బీజాబువుల కనుగొనవచ్చును. ఎట్టి దుర్బలత్వము నందిన క్వాసా వ్యాధివములు న్యూమోనియా యొక్కయు, టీబ్యూరియోక్కియో టీబాబువులను గ్రహించుట కుద్యోగతమ నహించియుండును.

జలుబు కలుగకుండుటకుగాను యీక్రింది మాత్రములను గమనించవలెను.

పెండలకడ నిద్రలేప వలయును. పరిశుభ్రస్నాన మెన్నవలయును. సకాలములో భోజనము చేయుటయు, భోజనమును జేయుటయందు వెన్నుదిగ జేయుటయు, అనుచరింప వలయును. వాయుప్రసరణముగల స్థలమందెక్కువకాల మందవలయును. ఒక భోజన మనకును యింకొక భోజనమునకును మధ్యకాలమందు చలనీనంతవరకు నీటిని విరివిగ దాగ నగును. మట్టుగలుగజేయు పదార్థములను, పాగాను, తేయాకునీటిని, ఉపయోగించరాదు. దుగ్ధాహారముగాని ధూళియుతమగు వాయువునుగాని, చెమ్మదనము గలిగినట్టి వాయువును గాని, బీల్చకందునటుల జాగ్రత్తను బుచ్చుకొన నలయును. రాత్రులందు పెండలకడ నిద్రించుచు అధమపతము ఎనిమిది గంటలైనను నిద్రించవలయును. శేనవికాలమనందు సన్ననైవేటియు చలికాలమునందు ముద్దగనైవేటియు గుస్తులను ధరించవలయును. నిద్రించు నపుడు కీటికీలను తెరచిపెట్టుకొనవలయును. కాని యొక్కవ దార్ధ్యవంతులైనవారు దప్ప తక్కినవారలు దీద్రుత గలిగినవలకు లోను గారాదు. సాధ్యమైనంతవరకు బహుజీవాలిలో దిగుట వలన, అలసట శేకుండగ బనిజేయుటకును, ముద్దగైన ఆహారమును భుజించినను జీర్ణము చేసికొనుటకు బిలుగను, నుడును పరిశుద్ధమగు వాయువునందు సంచరించుటవలన సాధ్యమగునంతవరకు విశేషమగు పీఠావాసము సంసర్గము కలుగుచుండును. ఇందువలన రక్త క్షయము శరీరమునందలి అన్ని అవయవములయొక్క కార్యక్రమతయు కలుగును. ఈస్థితి గతులు రోహిణ్యుతకు సహాయ మొర్చి శరీరబలమునకు దోడ్పడును.

మిక్కుటముగ భుజించుటయు, నులభజీర్ణము కాని పదార్థముల భుజించుటయు, జలు బుద్ధితి దోడ్పడును. విశేషించి తినువారలకు జలుబున కాస్తదము కలుగుటయేగాక యీ జలుబు పీఠవాసాధిగ జేగ్పడితమ న్యూమోనియా వ్యాధులకు మార్గమును చూపించును.

ఈ పెండగ్గుమన స్నానవిషయమై కొంచెము విచారించవలసి యున్నది. శరీరము యొక్క ఉడిలిభాగము నాశ్రియించియున్న చక్కమూనకుగల కార్యక్రమములు ప్రధానము లైయున్నవి. బహిర్భాగము నాశ్రియించుటయు, శరీరమున కవసరమగు స్రావముల సుద్ధ వింపజేయుటయు, వ్యర్థపదార్థముల బెలుచుటయు, గొంతెనరకు దీని విధానకృత్యములై యున్నవి. ఈపెండగ్గుకార్యముల జేయుటకు దగిసిస్థితియందుంచుటకుగాను పరిశుభ్రస్నానము జేయుటవలన మోడలుకు శ్రమిస్థితిలోను దుగించవలయును. సర్దుము నాశ్రియించియున్న రక్తరేఖలు లాగుండు విశేషరక్తము వారుచుండును. ఈరక్తము సంతోషరీతునస్థితి నుం గంచిన నంత అరోగ్యత జేహమనందు జలయుచుండును. నిద్రలేచినపిమ్మట స్పందని చన్నిళ్లలో ముంచి ఒడలంతయు రుద్దగలగు చక్కమ యొక్క కార్యక్రమములు సరియగును. తలికాలి విరుచునన్న స్థితియులందు యీ పరిణామ గృహమయొక్క లాభాగమునందు జేయవలెను. రుద్దట ఆయన పిమ్మట ముడుగు తవ్వలువో గట్టిగా ముడుచుకొనవలయును. ఇందువలన

రక్తప్రసారమునకు సహాయముగనును. మిక్కిలి చలిగానున్నపుడు గోరువచ్చని నీటి నువ్వురొగింపవచ్చును. బలహీనులకు యీ విధముగా చచ్చిన శ్మితో స్పృశించేయవలెననిన చీలమండల పరకును వేడినీళ్ళతో నంచి యిట్లు స్పృశి చేయవలసిన సామాన్యమందజేరదు.

అంటువ్యాధులు వ్యాప్తతయం దున్నపుడు నాటకములు మొదలగు జనసమూహ భృషేకములకు బోవకుండవలస జలుబున కాస్తపదము గలుగకుండ జేసికొన వచ్చును. ఎల్ల పుడును నాసికాద్వారముననే ఊపిరిని చీల్చవలయును. మాస్తమలను గడిగి కొనకుండ నెప్పుడును భుజింపరాదు.

దీర్ఘ ఊపిరియొక్క ఆరోగ్యత.

పాడుట, ఏడ్చుట, ఆరచుట, దగ్గులు, నిట్టూర్పు విడచుట, మాట్లాడుట — ఈ కార్యక్రమములలో, క్వాసావయవములయొక్క స్వాభావిక కదిలికలయందు మార్పు కలుగుచు, వరములయొక్కయు సామ్యపులయొక్కయు విశేషబలవ్యయము నను హేతువగుచు శరీరమునందలి కార్యధర్మముల కనుకూలగతుల గల్పించును.

ఈమైన జెప్పబడిన కార్యధర్మముల నాటంక పరచుటవలన నొకప్పుడు ఆపాయకరముగ బరిణమింపవచ్చును. ఏడ్చు నణచిపెట్టుట యెప్పుడును మంచిదికాదు. డాక్టర్ కామెల్ గారు శ్రీలలో ముఖ్యముగ — క్వాసకోశములయొక్క క్రమమును నిర్దుష్టమగుచును, రక్తప్రసారముయొక్క అధిక్యతను, బాధయొక్క ఉద్యోగవస్థను తగ్గించుటను, ఏడ్చు సహాయముచునని అభిప్రాయపడుచున్నారు. కన్నీటిని అణచిపెట్టువారికంటే కన్నీటిని వెలిబుచ్చి మనశ్శాంతిని బొందు శ్రీలు తమ యావనమును విశేష కాలము నిర్వహించుచు రని యొక డాక్టరు గారి అభిప్రాయమై యున్నది. పాటుకులయొక్క గుండెభాగము అభివృద్ధి నంది క్వాసకోశములయొక్క వ్యాధులనుండి సురక్షణ కాస్తపదము గలుగును. సంగీతమును పృథ్విగా ననువరించు వారు సామాన్యముగ క్వాసవ్యాధులకు దూరులై యుండుదురు.

ఆరచుట మనోవికాసఫలితమై యున్నది. ఆటయందుగాని పనియందుగాని ఆరచుటను బట్టిగాని బిగ్గరగా మాట్లాడుటను బట్టిగాని, ఆటయొక్కయు పనియొక్కయు చురుకుదనమును మనము గ్రహింపవచ్చును.

అవులింత క్వాసావయవ సాధకములలో నొకటియైయున్నది. సంఘమునం దావులింతుట తప్పిదముగా నెంచబడుచుగాని, అవులింత, శరీరము బడలికగలియందున్నపు డట్టి స్థితి నుండి లేపి, చురుకుదనమును బట్టించేయుటకు శరీరమొనర్చు స్వాభావిక ప్రియత్నమై యున్నది. నిద్రలేచిపీవ్వుట, పిల్లి అవులించి శరీరమును విస్తరింపు నందజేయును. మనుష్యేతరజంతువులు సామాన్యముగ నస్వాభావిక కార్యములను జేయవు.

నవ్వుటవలన శరీరమునందలి కార్యక్రమములకు జాదుకుదనము కలుగుటచేగాక క్వాసవిషయమున మంచిమార్పుదలను బుట్టించును. నవ్వు, అంతరావయవములకు సాధకమును గలుగజేసి, మనస్సున కానందమును బుట్టించుట శేర్పడిన స్వభావ సిద్ధమగు తంత్రముగ నెంచ వచ్చును. నవ్వు, క్వాసకోశములయందును అందుకొని క్లామము నందును ప్రారంభమై, కారణమునకును, జీర్ణాశయమునకును, యితర అంతరావయవములకును శ్రీకుమగు కంఠ

నము గలుగజేసి, మనస్సున కొకవిధమగు ఆనందమును బుట్టించి శరీరమునకంతకును గుర్రపు సవారి చేసినంత సాధకమును గలుగజేయును. నవ్వు, నేత్రమునకు వికాసమును గలుగజేసి, స్వేదము నభివృద్ధిపరచి, గుండెభాగమును విస్తరింపు నందజేయును. నిద్రలేకపోవుటవలన శరీరమునకు గలుగు ఆయాసమును, దుర్వార్తను వినుటవలని విచారమును, చిత్తచికాంతతను మనో ఆందోళనమును, మనస్సున్దీయగు నొక్క నవ్వువలన బారదోలవచ్చును. “నవ్వి బలమును పెంచును” (Laugh and grow fat) అని ఆంగ్లేయభాషయందు దొక సామెత గలదు. నవ్వునట్టియు సంతోషమును వహించునట్టియు మనిషి తనచెంతకు వచ్చునట్టి ప్రతి వానిని ఆనందింపజేయును. నవ్వు వైద్యునకును రోగినిగూడ మంచుచుండు యొక్క గుణఫలితము నిచ్చును.

మాట్లాడుట వలన శ్వాసకోశములకు సాధకము కలుగును. కంఠస్థనిని విశేషముగ సుపయోగించు నుపాధ్యాయునికి శరీరసాధక మెక్కువగ నవనరములేదు. నవ్వుట, పాడుట, అరచట, ఏడ్చుట — యీగతులయందు వలెనే మాట్లాడుట యందును లోఁజొప్పిరి హృస్వమై బయటిఁజొప్పిరి దీర్ఘమై శ్వాసకోశములకు మంచి సాధకమును గలుగజేయును. డాక్టర్ కామెల్ గారు సంభాషణ దీర్ఘజేయుటగ జేయునని ఆభిప్రాయ పడుచున్నారు.

దీర్ఘ ఁజొప్పిరి రక్తమునందు విశేషముగ భస్మీభవించ జేసి శరీరమునుండి వ్యర్థపదార్థముల వెలువరింపజేయును. లోఁజొప్పిరియందు ప్రాణవాయువు రక్తము లోనికి గ్రహించుటచే, బయటి ఁజొప్పిరియందు అంగారజ్ఞానవాయువు వెలువరింపబడును.

దీర్ఘ ఁజొప్పిరివలన మెకడనందు మార్పుగలిగి తలఁచిప్పుటను గలిగించుట కున్నభవతను బుట్టించును. కాని అలవాటువలన నీ తలఁచిప్పుట నిలిచిపోవును.

సామాన్యముగ నూపిరి బీల్చుట నుండు నాలుగు పావులు తూకమును వరుసగ 20కి పర్యాయములు యెత్తినట్లునంటి మనిషి, కొంచెమువిక్రొంది తీసికొని పెంచుమీదముల కాలము దీర్ఘ ఁజొప్పిరి బీల్చినపిమ్మట అదే తూకమును 700 పర్యాయములు యెత్తుటకు సమర్థుడై యుండెనని డాక్టర్ మాస్సెట్ గారు చెప్పుచున్నారు.

దీర్ఘ ఁజొప్పిరి నరములకు కాంతతను గలుగజేసి మనోనిశ్చయశక్తి (Will Power) నభివృద్ధి నందింపజేయును. నిద్రాపుట్టక బాధకొందునుండి నపుడు గాలి ప్రసరించుచున్న కటికి యొడ్లకు వెళ్ళి అయిదు నిమిషములకాలము దీర్ఘ ఁజొప్పిరి దీసికొనుటవలన నిశ్శక్తిగనట్లు డాక్టర్ క్రోమిగారు చెప్పుచున్నారు.

దీర్ఘఁజొప్పిరిని గమనించుటవలన క్లోమము (Diaphragm) పై శ్వాసముచక్రిందికి బడుట మూలమున ముఖ్యస్థమును అదీర్ఘతయును తరచుగ వ్యసత నందగలవు. మరియు యీ కార్యక్రమమువలన ప్రాణవాయు పూరితమైన రక్తము పేగులయందలి కడలికల నభివృద్ధిపరచి జీర్ణతకు దోడ్పడును. సాంధ్యవ్యాధియందును, నరముల యొక్కయు జీర్ణత యొక్కయు అన్వయముండను, రక్తప్రచారా స్వస్థలయందును; దీర్ఘఁజొప్పిరి సాధకములు పనిచేయునట్లు చెప్పుటకుచున్నది.

. శ్వాసకోశముల యందలి విశేషములగు వాయుబిలములు సామాన్యగతియందు మాండ్యముగనుండి దీర్ఘఁజొప్పిరి బీల్చునపుడు మార్త్రమే చురుకుదనమును వహించును. దీర్ఘఁజొప్పిరి

బిల్చుట కలవాటు చేసికొనినయెడల సామాన్యముగ మాంద్యతను పహించియుండు యీ వాయుబిలము లెల్లప్పుడును చురుకుదనమును పహించుట యేర్పడును. శ్వాసలేసపుడు ప్రాణములేదని యెట్లెంచుదురా అటులనే యీ ఊపిని బిల్చుటయం దే లోపముండినను మనము కృమముగ జేపించుట లేదనియే యెంచవచ్చును.

శ్వాసకోశముల కిచ్చువలసిన యీసాధకమునుగూర్చి, మనసి తాను భుజించు ఆహారము నెట్లు నిర్ణయించుకొనునూ, అటులనే నిర్ణయించుకొన వలసియుండును. ఈసాధకమును జేయుటకు నిద్రలేవగనే ఉదయపువేళ బహు అనుహలముగ నుండును. ఈ సాధకమును దీసికొనునపుడు శరీరమునకు యేకపైసనట్టియు చిగువగు దుస్తు లుండరాదు. ఈసాధకమును యెప్పుడును జేయకుండ నూరకుండుట కంటే దినమునం దెప్పుడో యొకప్పుడు వీలైన సమయమునందు జేయుట మంచిదైయున్నది.

ఉదరమెప్పుడైనను బరువుగ నుండినపుడుగాని ఆస్వస్థతా మాచకముగ నుండి నపుడుగాని యీ దీర్ఘఊపి సాధకమును జేసినయెడల వెంటనే దీనియొక్క సౌఖ్యమాను గనిపిట్ట వచ్చును.

దీర్ఘ ఊపిరియుండు యీ క్రింది ఫలితములకై మనము ప్రయత్నింప వలయును:— సామాన్య ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములయందు బనిచేయున్న యువుల బలపరచుట, దీర్ఘ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములయందు బనిచేయు భజములయొక్కయు బాహువులయొక్కయు పెన్నయొక్కయు స్థాయువుల బలపరచుట; శ్వాసకోశముల ముకుళనము యొక్కయు విస్తరింపు యొక్కయు స్వభావమును వృద్ధిపరచి యీస్థితి అశరీతిగ నుండునటుల జేయుట; శ్వాసకోశములయొక్క అంతర్భాగముల నన్నిటిని సమభావముగ వృద్ధిపరిచివేసి వాటియొక్క వైకల్యతను స్థిరముగ నుండునట్లు జేయుట; ఎదురొప్పును విస్తరింపు నందజేయుట; సామాన్య ఊపిని దీర్ఘపరచి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములయొక్క సంఖ్యను తగ్గించుట; రక్తప్రచారమునకు జారుకును పుట్టించుట.

దీర్ఘ ఊపిరియుండు మనమెంత శ్రద్ధచేయవలసి యుండనో పరిశుభ్రవాయువును గురించియు మనమెంత జాగ్రత్తను బుచ్చుకొన వలసియుండును. నిద్రాసమయమున మన క్రాంతి సావములయందు పరిశుభ్రవాయువు వీను ముండునటుల దగు యేర్పాటులు జేసికొనుటయం దెంతమాత్రము నశ్రద్ధ పహించరాదు.

ఈ గ లు.

ఇంటియుండు ఈగలు యెంత తక్కువగనున్న నంత ఆరోగ్యతా విశేషమునుజూపును. ఈగలు లేకుండా నుండిన పరిపూర్ణ ఆరోగ్యతను సూచించును.

అన్ని విధములగు ఈగలు వ్యాధిని వ్యాప్తుక నందజేయుటకు శక్తిని కలిగి యుండును. ఫిరంగిగుండుర కన్న వ్యాధిహితములగు శీవాణుగర్భితమగు ఈగ యొక్క వ ఆపాకు కరమై యున్నది.

25. ఆడుఈగ ఒకమాసము కాలములోన 506,250,000 క్రొత్తఈగలను ఉత్పత్తి చేయుగలదు.

ఈగలు గుర్తుపట్టి వృద్ధిసంకుచలములు పెంతుకుప్పలయ్యును. కావున గృహ సమావేశమున పెంతుకుప్ప నుంచరాదు.

ఈగలు, 'బుఫాయిడి', కాలగంఠము, మెనింజైటిసు, ఆవవిరేచనములు, కొన్ని విధములగు ఆధిరేచనములు, మహాబల మొదలగు వ్యాధులను గొంపోయి వ్యాప్తత సందజేయును.

ఈగలు, యెంతసూరమువలకు బోవునో కనుగొనుటకుగాను కేంబ్రిడ్జ్ వైద్యాలయము లందు 35,000 ఈగలను రసాయనశాస్త్ర సరిపరీక్షకు గురైననువేసి వదలివేసిరి. వీటిని సరిపరీక్షించుకొనుటకుగాను 50 పరీక్షాలయములను బెట్టిరి. వీటిలో 191 ఈగలను 'రెండు పర్యాయముల సూములో' బట్టుకొనిరి. ఈ ఆంశమునుబట్టి ఈగలు వాయుప్రచారమును బట్టి యో తేజ వాటి కాక్షణముగవంతు ఆహారపు వాసనను బట్టియో కొంతదూరమువరకు ప్రయాణములు చేయును. సూర్యుని మనము దూరించి వలసియున్నది. ఈ ప్రయాణములందు వ్యాధులను గొంపోయినను గొంపోవచ్చును.

విటమైన్స్ [Vitamines]

కొన్ని సంవత్సరముల క్రిందట పోస్టెల్ ఐక్మన్ ఆను నొక జర్మను వైద్యశాస్త్రజ్ఞుడు జావాద్యీపమునందు వ్యాధిపరిహరమును తియ్యువాయు వ్యాధిని గూర్చి విచారిత హరించెను. మరలలో తియ్యుచేయుచుండిన తియ్యుమును వండుకొని భుజించు వారలయందు మాత్రమే నూవ్యాధి ముఖ్యముగ వ్యాప్తత సందయుండెనని ఆయన కనగొనెను.

వివరమును గూర్చి పరిశోధనల జేయుటయందు దాయక పాపురములకు తెల్లబియ్యమును మేతగా మార్చువారముల కాల ముపయోగించెను. అంతట నవి నీరసతనందితలై గొల్గొనుట కసమ్యక్మయై, మింగుటకు నశక్తులై, ఒకటి రెండు దినములలో మరణము నందునట్టి స్థితిలో నుండెను. మనుష్యులయందు గలగు తియ్యువ్యాధి లక్షణములయూ పాపురములయందు గొంభవరకు గనబడెను. ఆప్పుడు ఆయన యీ తెల్లబియ్యమునుండి తొలగించబడిన పొట్టను (ఆనగా తవుడును) నీటిలో గలిపి యీడ్రోవము నొక చిన్నిగొట్టముద్వారా మిక్కిలి బిట్టుగానున్న పాపురముల గొంతులో బోసెను. మింగుటకు శక్తి కలిగియున్న వాటికి తవుడును మేతగా చేసెను; ఆప్పుడు బహువింతయైన ఫలితము కాన్పించెను. మూడు గంటల కాలములో నవి స్వస్థత సందజొచ్చెను. దివాంత్యమునకు ఆరోగ్యతను పొందుచు యెప్పటియట్లు గనబడెను. ఇది యంతయు బహుచిత్రముగా నుండెను.

ఈ పత్తులయొక్క జీవితాధాగమునకుగాను నలయు పదార్థము ఆతవుడు సందహర్చి యుండెను. ఒక అధిగ్రహము తవుడును ఉపయోగించిన మాత్రముననే వాటియొక్క ఆరోగ్యత స్వస్థత నొక సారంభించెనని చెప్పబడుచున్నది. ఇండియాదేశమునం దంతటను మరలలో తెల్లపు చెయ్యబడిన బియ్యమును దినుట ఆరంభించిన పిమ్మట స్పష్టమంటి వ్యాధులు ప్రబలత సందుచున్నవని కొందరి డాక్టర్ల అభిప్రాయమై యున్నది. చండ్లు భూమిముగ వచ్చునై డోడిపోవుచున్నది. సరముల యొక్క ఆస్వస్థతయును వ్యాప్తత సందుచున్నది. ఉప్పుడు బియ్యమును దినుట నారంభించిన పిమ్మట నీవ్యాధి స్వస్థత సందుచున్నది.

విటమెన్స్ అనగా నేమి!

ఇదవదైదు సంవత్సరముల క్రిందట నింగ్లాండులో డాక్టర్ కాసిమీర్ ఫంట్ గారు ఉప్పుదూదియ్యుచు నందున్న యీ విచిత్ర పదార్థ మెద్దియో దానిని విడదీయుటను, యీ పదార్థమింకే యోహారుముతయం దుండియున్నదియు, అది యొక్క సకల సందునున్నదియు దేహోగ్యతయం దది యేమి పనిచేయు నున్నదియు, కనుగొనుటను బ్రయత్నించుటనేసెను.

ఈయన ప్రయత్నములు సఫలము అయ్యెను. ఈ ప్రధానావశ్యక పదార్థమునకు “విటమెన్స్” అని పేరిడెను. ఈ పదమునకు “జీవితమునకు ప్రధానాధార పదార్థము” అని అర్థముగా మనము గ్రహింపవచ్చును. కోళ్ళకు తెల్లని గోధును పెండిని మేతగా నుపయోగించినపుడు పైన చెప్పబడిని రీతిని పావురములకు వలెనే విటికెని జబ్బు సంప్రాప్తమయ్యెను. అనగా, గోధునులనుండి విడదీయబడిన ప్రధానమునందలి పొప్పునలో నీ “విటమెన్స్” యుండియుండెనని మనము గ్రహింప వలసియున్నది. తెల్లని మైదాపిండితో జేయబడిన రొట్టెయందు యీ ప్రధాన పదార్థ ముండుట లేదు.

పూర్వపు దినములలో నోడలపైన బియాణముల జేయునపుడు చాల కాలము వరకు కాకావళములు దొరకక పోవుటచే స్పర్శివ్యాధి ప్రవేశించుండెడిది. వీరును పైనచెప్పబడిన పావురములవలెనే అస్వస్థత జెంది, జీర్ణక్రియము చెడి, మిక్కిలి నీరసత నొందుచున్నారు. వీరైన నొక రేవువట్టణమునందు జేరి కాయగురలను గాని నిమ్మకాయలను గాని నుపాదించినాటిర ధినివెంటనే మరల స్వస్థత నందుచుండెడివారు.

ఆమెరికాదేశములోని చికాగో పట్నమునందు కొంతకాలము క్రింద ఆరోగ్యోద్యోగి గ్రుడుగనున్న డాక్టర్ ఇవాన్సుగారు జనసామాన్యమునం దంతటను ఆహార లోపమునలసి కొద్దియో గొప్పయో అస్వస్థతలు గలుగుచుండునని అభిప్రాయపడి యున్నారు. కొందరకు నోటియందు దుర్వాసవతో గూడియుండు ఊపిరితోడనే అంత్యమగును. మరికొందరకు శీర్ష నొప్పి, తుంటినొప్పి, గొట్ మొదలగు వ్యాధులు జననమందును. ఇంకొందరకు ముఖము పాలిపోయి, నేత్రముల చుట్టును డిబ్బుదల ప్రవేశించి మండ్ల చిగుళ్లు వాపుదల నందును.

మనుష్యుని గొతుయందుండెడి “తైరాయిడ్” అనబడి యొకగ్గింధి శరీరమునకు మిక్కిలి అవశ్యకమగు నొకసానము నుద్భవించ జేయును. ఈ గ్రంధి మిగుల చిన్నదై యుండుటగాని, లేక అసలే లేకపోవుటగాని, తటస్థించినయెడల నట్టివిడ్డవకు గురీముల లోలి పెండ్రుకలు కలుగును. వారలకు మేధాక క్తి బహుమీనముగనుండి వానరములకంటె పెక్కుడు జ్ఞానము గలిగియుండదు. వారిముఖములు ముడుచుకొని యుండును.

గ్రానలకును మేకలకును గలిగియుండు “తైరాయిడ్” గ్రంధులనుండి తయారగు సారమును యి ఐడ్లకు కువయోగించిన మీదట స్వస్థులై యితరవిడ్డలవలెనే వీరును ఆరోగ్యతను నందినటుల గనుగొనబడెను.

దేవుడు సృష్టించినట్టి ఫలములు, భాస్యములు, కాకపదార్థములు మొదలగు వాటిని మనము విశేషముగ పూర్వపంజరేయక, అందలి ప్రధాన పదార్థములు చెడిపోకుండ భుజించుటవలన భవేక వ్యాధులు తటస్థించుటంద జేసికొనవచ్చును.

1830 వ సంవత్సరమున సిల్వెస్టర్ గ్రోహం అను నాయన సాధ్యమైనంతవరకు వ్యాధులు కలుగజేయుదుటకు గాను తెల్లకొట్టెను మానివేసి పొట్టుతో గలిగియున్న పిండితో చేయబడినొట్టె నుపయోగించుటను బోధింపజేసెను. స్వాభావికమైనట్లయి, సాధారణమైనట్లయి నాహారమును భుజించుచు నవసరము కాకాహారముల నారగించుట వలన ఉపయోగమును గూర్చి ఆయన విశేషముగ బోధించెను. ఆహారవిషయమున నీపద్ధతుల నవలంబించుటవలన నదివరకు స్వస్థతను గూర్చి నిరాశజేసికొనిన వారలలో జాలమంది ఆరోగ్యవంతులై యుండిరి. ఆప్పటికి "విటమెన్స్" యొక్క ఉపయోగము తెలియక పోయినప్పటికిని, యామూలపదార్థ మందునట్టి ఆహారముల భుజించుటచే ఆరోగ్య సాధకముగ నాయన జెప్పి యుండెను. ఆ ఆహారములనే మన మిప్పుడు కాశ్రియ పద్ధతుల బరిక్షించి ఉపయోగము లుగ గనుగొను చున్నాము.

పచ్చిపాలయందు విటమెన్స్ ఉండును. ఆవులు పచ్చిగడ్డిని తినునట్టికాళము నందిచ్చునట్టి క్షీరములలో విటమెన్స్ విశేషముగ నుండును. పచ్చిమాంసము నందును విటమెన్స్ యొక్కరేగా నుండును; ఎండవల్లననగా నీజంతువులు విటమెన్స్ ఉండునట్టి ఆహారమును భుజించియుండును. ఇదియుగాక యీ విటమెన్స్ వృక్షప్రపంచమునందు మాత్రమే సృష్టి నందును. ఆన్నివిధములగు ధాన్యములయందును, గ్రుడ్లలోని తెలుపుభాగమునందును, నీరుల్లి బటూణీలు, చిక్కడు మొదలగు వాటియందును, విటమెన్స్ ఉండును. బంగాళా దుంపల యందు విశేషముగ నుండును. అవరదినుసుల యందును ఉండును. నిమ్మకాయలు నారింజ కాయల యందును ఉండును.

తెల్లలియ్యమునందునతే విటమెన్స్ను తొలగింప నైన వచ్చును; లేక విశేష వేడిమి తగులుటవలన నది నశింపునైన నందవచ్చును. ఈ కారణముననే జీర్ణింపునందిన రొట్టెలను మాత్రమే భుజించువారలు శ్రీఘ్రముననే ఆతస్యముననే అస్వస్థతను గ్రహింతురు.

విదేశములనుండి వచ్చు దబ్బాలలోని పాలను కిడ్లలకు యిచ్చుటవలన నొకప్పుడు వ్యాధి సంభవించవచ్చును. ఈ దబ్బాలను తమరు చెయిట యందు మిగులవేడిమికి లోనగునుగాన వాటియందలి విటమెన్స్ నశింపు నందుటచే నీవ్యాధి తలస్థింపవచ్చును.

శరీరపోషణమునందు లోప ముండుటవలననే తయవ్యాధి హితములగు నీవాలు పులు శరీరమునకు దళివృద్ధి నందునను అభిప్రాయమును వహించియు చాల వైద్యులొర్రుజ్ఞులు గలరు. శరీరమునందలి స్వాభావిక కార్యక్రమములకు మిగుల సగత్వముగ నీ మూలపదార్థ లోపమును వహించినట్టి ఆహారములయొక్క ఉపయోగము వలన నింకను యితరవ్యాధులకును నుద్యుక్తత తోడ్పడునని మనము భిక్రకాలముననే జెలిసికొనుటకు దగినంత బలియియగు కాణములు కనబడుగలవు. ఇట్టి స్థితియందు మందులను మింగుటయందుకంటె నాహారము నందలి మార్పువలన నెక్కువ లాభముండగలదని తెలియవలయును.

మనదేశమునందు పచ్చికొన్నింటి దొంగతుచుండగా విటిని పిండికొట్టి ఉపయోగించుటకు బదులుగా: విటినుండి విటమెన్స్ను విడిచి, తెల్లని పిండిగా దంచి, నీసారేకు దబ్బాలలో పొట్టుములను గట్టి, అగ్నిలియోదేశమునండి రవాణా చేయుచున్న నీ పిండికి ఆనేక తగులు బడులను యిచ్చి మనము గొనుచున్నాము.

వ్యాధి వచ్చినదనగానే డాక్టరుయొద్దకు బోయి మందులను వచ్చికొని మ్రింగుచుందురు. ఎన్ని దినములకును వ్యాధిలాపిత్యత కలుగని విషయములను చునము జూచుచుండును.

మనస్సుపైయిత మైనట్టియు జ్ఞానవంతమైనట్టియు డాక్టరు రోగము కారణమువలన గలిగినదియు ఇలిసికొనుటకు బ్రయత్నించును. వ్యాధి, యే కారణ ఫలిత మైనదియు, త్యజంప వలసినదాని దేని ననుసరించుట వలన గలిగినదియు, అనుచరింప వలసినదాని దేని త్యజించుటవలన సంభవించినదియు — నీ విషయముల జక్కగ జెప్పించి వ్యాధియొక్క సరియైన కారణముల గ్రహించుట వైద్యుని విద్యుక్త భర్తమై యున్నది. వ్యవసాయకుడు భూసారము లేకుండ పంట నెట్లు పండింప జాలడో వైద్యుడు గూడ నారోగ్యహితములగు సుందర్భములు లేకుండ వ్యాధిని సుదర్భపాలడు.

కాకభక్షణము,

ప్రపంచమునందు భూమిపై నివసించు జంతువులలో మిగుల బలమైనవి కాకాది ఆహారములను మాత్రమే భుజించి జీవించుచున్నవి. అట్టివాటి కుదాహరణముగ, ఏనుగు, గుట్టము గొరిల్లా య నెడి కోతి, దుప్పి, ఒంటె, వ్రద్దు మొదలగు వాటిని దీసికొనవచ్చును. ఈ ఆహార మయొక్క ఫలితముగ నీ జంతువులకు విశేషముగ నోపిక కలుగుచున్నది ఒంటలకును, గుట్టములకును, ఏనుగులకును, నుండెడి పీర్పు బహువంతము బుట్టించునట్టిది యున్నది. మాంసభక్షకులగు జంతువులు తమ పరాక్రమమును బాపి అచ్చెగువందింప జేయునుగాని పని యందోర్పు తక్కువను గలియుండును. సింహము ఘోరయుద్ధమునందు బోరాడి, పోరాటము ముగిసిన పిమ్మట తనకత్తు కభేదముపై విందారగించి, మరల నాకలిచే బీడింపబడు వరకును దన కాలమును సోమరితనముగ గడపుచుండును. కాకభక్షకునియొక్క సహజముగగిర స్వభావము పీర్పుదలతో గూడియుండును. ఈదుట తుండుగాని, నడచుటయందు గాని, పండుముల వేసినపుడు సామాన్యముగ కాకభక్షకులే జయప్రదు లగుచుందురు. బలమునందును, పాతపు నందునువిశేషము గాకపోయినను, కాకభక్షకులగు చీనాదేశపు కూలీలయొక్క ఓపిక అద్భుతమైయుండును. వరిఆన్నమును, మత్స్యములను మాత్రమే భుజించునట్టి జపానీయుల అద్భుత కృత్యముల జూచి ప్రపంచమునం దేజాతివారలు ఆశ్చర్యమంది యుండలేదు!

ఇండియాదేశమునందు గవర్న మెంటువారి తపాలాసంచులను మోయుట శీర్షకు కూలీలు మధ్యభోజనమునకు ఆస్తిపుమాటలను మాత్రము గట్టుకొని ప్రతిదినమును ముప్పు దిమైశ్శూదారము వరకు బోవుచుండురు.

కాయకూరలను నల్లరొట్టెలను పాలను మాత్రమే భుజించునట్టి రువ్వగుదేశపు వ్యవసాయకులు దినమునకు పదునారు మొదలు పదునెనిమిది గంటలవరకును బుగ్గిచేయుట కోపికను గలియుండురు.

నాన్టీజయినదేశపు వ్యవసాయకులు మాంసాహారము నెన్నడును భుజించి యుండురు. దేశయాత్రికుల బండ్లవెంటి వది పండ్లొందుమైళ్ల దూరమువరకు నోకేటియగ వీరు పరుగెత్తుటకలవాటుపడి యుండురు.

బుగ్గిచేశము నందలి కూలివాండ్లు పుచ్చకాయలు, నీరుల్లి, చిక్కుళ్లు, ఖగ్గెగ్గులు, పచ్చబొన్నలు మాత్రమే భుజింపుచు, సొప్పియబలమునకు బ్రసిద్ధిజెందియున్నది.

దక్షిణ ఆసియా దేశమునందు మాంసము పెచ్చుడును భుజింపనట్టియు సారాయములను సేరించనట్టియు గనులలో బసెయే యు వారలు తమ భుజములపై రెండువందల పానుల బరువున త్తికొని నిలువు నిచ్చులల్లన రెండువందల అడుగుల యొడ్డువరకు దిగనునకు బండ్రొందుసారలు పైకి బోవుచుండును.

బుదివిశేషమును వహించి జాలామంది పురుషులును స్త్రీలును మాంసాహారమును ద్యతించి ఆహారదాగ్ధముల భుజించుట మొదలుపెట్టి తమబలమునందును ఆరోగ్యమునందును యెట్టిలోపమును జందియుండలేదని అభిప్రాయము సంపాదించుచున్నారు.

కాకాది పదార్థభోజనమువలన, యూరిక్ ఆసిడ్, గోట్, క్రిక్లనోప్పులు — వీటి యెడల నుద్యుక్తత తగ్గిపోవును. స్వభావము మృదువైన, మనస్సునకు శాంత మేర్పడి, బుద్ధి సూక్ష్మత కలుగును.

మాంసభక్షకులు కొన్నిపోరాటములలోగాని, కొన్ని పందెములలోగాని, గెలుపునంద వచ్చునుగాని, ఓర్పు విశేషము వలనయున్న విషయములలో కాకభక్షకులే జయమందుదురని కొందరి యాక్షర్య అభిప్రాయమై యున్నది.

1901 వ సంవత్సరమునందు బర్మినిదేశమునందు డ్రైస్లేన్ పట్టణమునకును బర్లిన్ పట్టణమునకును గల 125 మైళ్ళదూరమును నడచుటకు పందెమును బెట్టిరి. ఈపందెమునందు అన్ని బాతులవారును వచ్చిరి. పందెమునకు వచ్చిన 40 మంది యందును యెనిమిదవది కాకాహారును, ముప్పదియిద్దరు మాంసాహారులును అయి గెలుచుండిరి. ఈపందెమునందు జయమందిన మొదటి ఆరుగురును కాకాహారులే అయి యుండిరి.

ఈపై ఆంశములనుబట్టి కాకభక్షణము వలన నెక్కువ ఓషితో గూడిన పట్టుదల కల గుసని నిశ్చయింపదగి యున్నది.

క్షయ వ్యాధి.

క్వాసకోశ సంబంధమగు క్షయవ్యాధి విషయమున వ్యాధి రాకుండ జేయుటకును, వ్యాధ్యనంతరము స్వస్థత నందుటకును, వ్యాధ్యుద్యుక్తత గలుగకుండుటకును, బుచ్చుకొనదగిన బాగిత్ర లొంగియున్నది.

క్వాసకోశములయందు దుశ్చక్రతను గలుగజేయునట్టి — ముడుచుకొనిన క్వాసవిలములుగాని, క్వాసకోశవయవ భాగములయందలి రక్తహీనతగాని — క్వాసకోశముల కెచ్చునట్టి సాధకమువలన స్వస్థత నందును.

కరీరసాధకమును, దీర్ఘజీవీ పద్ధతులును, యీవ్యాధి రక్షణకై నధిక పరమము.

క్వాసకోశములను విస్తరింపు నందజేయుటగాను, ఉదరమునందలి క్రింది భాగములొని స్నాయువులను లొంగి దీర్చి, దీర్ఘజీవీని లోనికి దీసికొని, భుజములకు క్రమేణ వెనుక పైపులకు దోసి, ప్రక్కయొముకలను సాధ్యమైనంత వరకు ముందుకు దోసి, ఊపిరిని కొద్ది సేకనుఃపాటు విగి యట్టి, పెనవులకు మధ్యగా సన్నని మార్గమునుజేసి ఆమార్గముగుండ ఊపిరి గాలిని బలముతో బయటికి విడువవలయును. ఈ పద్ధతిని జేయుటలన క్వాసకోశములలోని అన్ని భాగముల యందలియు వాయువిలములు విస్తరింపునంది ఆరోగ్యకరియందుండును.

నిమ్మఫల చికిత్స.

పండ్లెండు నిమ్మకాయలను చచ్చిల్పటావేసి మెత్తబడు నరగును నుడుకి చిట్ట వలయును. పిమ్మట నీకాయలనుండి రసమునుదీసి, వలనినంత వరకును చక్కని ను గలిపి త్రాగవలయును. ఈ త్రాగుటయుండు పండ్లకు దగులకుండు త్రాగవలయును. 'శీనీగ' పండ్లుపులిసి పండ్ల కన్నునత కలుగును. నివముసకు పండ్లెండు నిమ్మకాయల నుపయోగించ వచ్చును. వీరై భాధ తటస్థమైన గాని, విరేచనములు పొందగలిగినదనిగాని, నిమ్మకాయల సంఖ్యను దినమునకు ఆయిదారుసకు తగ్గింపవలయును. స్వస్థత నందిన పిమ్మట నిమ్మకాయలను మరల పండ్లెండు సంఖ్యకు పెంచుకొనవచ్చును. అయిదు లేక ఆరు డబ్బనుల నిమ్మకాయల నుపయోగించునదికి బలముపట్టి ఆకలి పుట్టును. స్వస్థత కలిగినకొలదియు నిమ్మకాయల సంఖ్యను తగ్గింపవచ్చును.

ఆమెరికా దేశమునందలి వాషింగ్టన్ పట్టణములోని యొక పత్రికాయందు మిసెస్ విల్సన్ ఆమనామె యిపై చికిత్సాపద్ధతిని తెప్పియుండెను. పై పద్ధతిని క్రియముగా నవలంబించి చేసినయెడల ఉపయోగ ముండకపోదని ఆమె చెప్పచున్నది. ఈదిగువ సంగతిని గూడ ఆమెయే వ్రాయుచున్నది.

“ఈ వ్యాధిగ్రస్తులలో నిద్రియెడల వైద్యులు నిరాశను జేసికొనిన విషయమును నే నెరిగియున్నాను. వారిద్దరును వ్యాధియొక్క అంత్యగతులయందుండి యున్నను యీవ్యాధుల ప్రకారము నిమ్మకాయల నుపయోగించుట వలన స్వస్థత నందియున్నారు. ఆ ఇరువురిలో నొకరగు యొక స్త్రీ తక్కువ నంటుకొని బహు సీరససీతియందుండెను. ఇట్టి స్త్రీ నిమ్మకాయల నుపయోగించుట వలన రెండు మాసములలో స్వస్థతనంది 140 పౌనుల తూకమును వహించెను.”

ఈపైన చెప్పబడిన చికిత్సయందు డెంతవరకు నుపయోగముండునదియు గనిపెట్టుటకు గాను అనుచుంచి చూడవచ్చును. అట్లు ప్రయత్నించి చూచుటవలన నష్టముండ నరదు.



ఆంగ్లేయ వైద్య చింతామణి

వ్యాధులు—చికిత్స

అజీర్ణ వ్యాధి

అజీర్ణ వ్యాధి ఇండియన్ దేశము నందు వ్యాప్తి చెందియున్న, దాని వివిధ అస్థులును దును యొద్దయో యొక యాకృతిని, తరచుగా గనబడుచున్నది. ఒక్కొక్కప్పుడు, యితర వ్యాధులతో గూడిన తేజ కలుగుచున్నది. ఇంకొకప్పుడు, వాత్సలిక మయిన దైనను తేజ స్థిరమయినదైనను, అన్నకోశము, కారిజము, కేగులు - వీటియొక్క అవస్థకా ఫలితముగ గలగుచున్నది.

అజీర్ణ వ్యాధిని గూర్చి సరిగా విలిసికొనుటకు ముందు, జీర్ణతయొక్క క్రియమును గూర్చియు, జీర్ణక్రియమునందు బనిచేయు వివిధ అవయవములను గూర్చియు, కొంత జ్ఞానమును గలిగియుండుట అవశ్యక మయియున్నది. అజీర్ణ వ్యాధిని గూర్చి విచారించుట యందు, ప్రోయ: పండు, సోటిలో డిశిరడు ఉమ్మి నీరు (Saliva) - వీటియొక్క పనులను విచారించ వలసి యున్నది.


(జీర్ణత యొక్క క్రియమును గూర్చి వ్రస్తముగా యీక్రింద వ్రాసినట్లెనెడి:—

జీర్ణక్రియము.

అహారమును పండ్లతో నమలుటచే, ఆఅహారము సోటి యందూరెడి ద్వివము (జిమ్మి) తో గలియుటచే ఆహారపదార్థముల యందుండెడి “స్టార్చ్” అనబడు ఒకవిధమగు మూల పదార్థము చక్కెరగా మార్పబడుచున్నది. అంతట నీ ఆహారము గొంతు మార్గమున అన్న కోశమునందు బ్రకిరించుచున్నది. అన్నకోశము నందలి మౌంసగ్రింథులచే స్రవించబడు “గ్యాస్ట్రిక్ జాస్” అను ద్వివపదార్థముతో యీఅహారము కలియు చున్నది. ఈ ద్వివ పదార్థమునందు ఫెస్ఫిక్ యును హైడ్రోక్లోరిక్ ఆసిడ్ (కంఠిద్రావకము) యును గలిసి యు న్నవి. ఈ ద్వివ పదార్థము సారజనక సంబంధమగు (Nitrogenous) భోజన పదార్థ ములు, అనగా మౌంసము, చేపలు, గుడ్లు, మీగడ, వెన్న, గోధుమలు (కొంతవరకును)

మొదలగు వాటిపైన పనిచేయును. ఇదిగాక అన్నకోశము వరుసక్రమముగా ముత్యములు వలనను విస్తరించుట వలనను ఆహారమంతయు కలవరపర్చబడును. రసవాద సంబంధముగ మార్పుయును కొంత కలుగుచున్నది. ఈకారణములచేత ఆహారమంతయు పలుచని ముద్దగా జేయబడి, అన్నకోశము ముత్యములు వలన, చిన్న పేగుల లోనికి ప్రవేశించి, అందులోనికి కారిజమునుండి వచ్చు పిత్తద్రవముతోడను, వృక్కము (Pancreas) నుండి వచ్చు మధురముతోడను, గలియును. పిత్తద్రవమునకు జీర్ణతయందు సహాయముజేయు గుణముడు టయేగాక, పులియునట్టి మార్పులను ఆటంకపెట్టు నట్టియు స్వాభావికముగ విరేచన కారక బనిచేయునట్టియు, గుణములు కలవు. మధురసము, స్టీప్సిడ్ నా బియ్యము అందలి మూలపదార్థ సహాయమున కొవ్వుపదార్థములపై బనిచేయగలదు; మధురసము నందలి అమిరాపిప్సిడ్ నా బడుకొండొక మూలపదార్థము ఆహారమునందలి స్టార్చ్ భాగముపైన బనిచేయును. నోటి యందు ఉమ్మిచే యేకారణముననైన, స్టార్చ్ చక్కెరగా మార్చబడుట సంపూర్ణి చేయ బడక జరిగిన యీలోపము పేగులయందు యీమధురసముచే సవరింప బడుచున్నది. చిన్న పేగులలో మొదటిభాగమునం దీహార్పులు జరిగిన పిమ్మట ఆహార పదార్థముయొక్క రూపమును లక్షణములును మారుచున్నవి. అంతట నీపదార్థము చిన్న పేగులయందలి కొదవ భాగమున బ్రవేశించి, అచ్చటి కొన్ని మాంస గ్రంథులనుండి నీరించు ద్రవములతో గలి యటవలన జీర్ణక్రియను సంపూర్ణియగుచున్నది. ఈకుని ద్రవపదార్థమునకు కైల్ అని పేరు. పేగుల యందలి లోపలి భాగములయందు దుండు చిన్ని ఉన్నత ప్రదేశముల నావరించియున్న అశేకములగు (చిన్న) బిసనాళముల యొక్క నూత్నద్రావ్యములగుండ నీ ఆహార పదార్థము ప్రవేశించిన పిమ్మట, నీ బిసనాళములన్నియు జేరియొక పెద్దనాళముగా నేర్పడి, అందలి ద్రవపదార్థమంతయు, వెన్నెముక కెదురుగా నెడమచేతినుండి నల్లరక్తమును గొంపోవు అపరీకుద్ధ రక్తనాళములనందు జేర్చబడుచున్నది. ఈ అపరీకుద్ధ రక్తనాళము మరల నొక కొన్ని అపరీకుద్ధ రక్తనాళములతో జేరి హృదయమునందలి కుడిభాగమునందు బ్రవేశించు చున్నది. ఇదియే ఆహారము జీర్ణమగుటయొక్క అంతిమోద్దేశ్యము. మనము భుజించెడి ఆహారపదార్థము లివ్వలముననే రక్తమునందు గలిసి దేహమునకు సమస్త నిచ్చుచున్నవి.

ఆహారము పోవుమార్గము



1. పైత్యశయము. 2. కంఠ నాళము. 3. 4. రక్తనాళములు
 5. అన్నాశయములోనుండి ఆహారము పేగులలోనికి పోవు రంధ్రము.
 6. చిన్న పేగులయొక్క ప్రారంభము. 7. అన్నాశయము 8. పైత్య
 వాహిక 9. పైత్యవాహిక చిన్న పేగులలో గలియు స్థానము 10. ప్రే
 మాము 11. పెద్దపేగులు 12. చిన్న పేగులు 13. అపెండిక్స్ (అపెండి
 సైటిస్ వ్యాధి దీనికి కలుగును.) 14. మలాశయము.

నీళ్లవంటి పదార్థములును, నీళ్లలో కరిగిపోవు బదార్థములును, అన్నకోశము యొక్క యు పేగులయొక్కయు అపరిశుద్ధ రక్తనాళముల యందలి రక్తములోనిదీ గ్రహించు కొన బడును. చిన్న పేగులయందే జీర్ణక్రియవంతయు బూర్తియయి, శరీరావసరములకు దగియు న్నవన్నియు ఆకర్షించుకొన బడుచున్నవి. ఆరోగ్యస్థితియందు, అన్నకోశమందుగాని, చిన్న పేగులయందుగాని ఆహారపదార్థము ఛేదించుట తటస్థమి. జీర్ణతనుబోధింపజేయు, జీర్ణమునకు బనికెరానట్టియు, ఎముకముక్కలు, పొట్టుసంబంధములు, కాకపదార్థములయొక్క నారసం బంధములు మొదలగునవి పెద్దపేగులలో బ్రవేశించును. ఈపదార్థములయందలి నీరువిశేషించి అదివరకే శరీరముచే గ్రహింపబడి యుండుట వలన నవి ఆరుగుదల నందియుండును. పెద్ద పేగుల యందలి కొన్ని పదార్థములయొక్కయు, కొన్ని కృమికాలముల యొక్కయు, మలల వలన నీ మిగతపదార్థమునకు మలసంబంధమగు గుణములును వాసనయును గలుగుచున్నవి. ఒక విధమగు కొన్ని వాయువులును యిందు ఉద్భవించును. మలమున కుండేటి వాసన, మను ష్యునియందును యితర జంతువులయందును భేదించును. పెద్ద పేగులయందు గలిగిడి యీ మార్పులన్నియు మలబద్ధమయొక్క దుర్బాసములకు కారణము లగుచున్నవి.

అజీర్ణవ్యాధిని రెండు తరగతులుగా విభజింపవచ్చును. ఏమన, (1) ఆకస్మికమయిన అజీర్ణవ్యాధి. (2) స్థిరమైన అజీర్ణవ్యాధి, ఆనగా దీర్ఘ కాలము వ్యాపించినట్టియు, శరీరమునకు ఆలవాటు పడినట్టియు, అజీర్ణవ్యాధి.

ఆకస్మిక అజీర్ణవ్యాధి,

కారణములు.

భోజనమునందలి లోపమువలన, ఆనగా బరువైనట్టిగాని ఉద్రేకతను బుట్టించునట్టి గాని, పదార్థమును భుజించుటవలన నీ ఆకస్మిక అజీర్ణవ్యాధి తటస్థించును. తొందరగా భుజించుటవలనను దటస్థింప వచ్చును. శరీరమునకు చలిగాలి సోకుటవలనగాని అధ్యాసము లేని పరిశ్రమమువలనగాని (ఆనగా నొక మోటుబండిలో ప్రయాణము చేయుట మొదలగు నట్టి వాటివలన) స్నానముచేయుట వలనగాని, సంపూర్ణ భోజనమైన వెంటనే కఠినమయిన మనఃకలకము చేయుటవలనగాని, యిట్టివ్యాధి తటస్థించును.

లక్షణములు.

ఈ వ్యాధియొక్క కొద్దిపాటునందు నాలుకమీదను లేక నోటి మీదను బొట్టలు కనబడుటగాని లేక ముఖము యెర్రవారుటగాని నటస్థించును. అన్నకోశము వాయువులంత మగుటయు లేక భోజనానంతరము అరుచిగలిగిన తేవులు వచ్చుటయు, ఒకానొకప్పుడు పులి తేవులు వచ్చుటయు, కొద్దిగా తలనొప్పి గలుగుటయు, కొద్దిగా అజీర్ణవిశేషము లగుటయు దటస్థించి దానంతట అదియే సర్వకొనును. తలతిరుగుటయు, నిస్సౌఖ్యము, వాంతినచ్చు నట్లుండుటయు, వాంతిగలుగుటయు, మలబద్ధము గలుగుటయు, విశేషము గాతెవననియుం డుటయు—యిట్టి గుణములతోనున్నా గూడుకొనియుండును. ఒకప్పుడు దుగ్భావనగల తేవులతో గూడి కడుపునొప్పియు దటస్థించును. ఇంకొకప్పుడు విశేషమయిన తలనొప్పి, వాంతినచ్చునట్టి అసహ్యతతో గూడి గాని, కూడకగాని, తటస్థించుటయు గలదు.

స్థిర అజీర్ణ వ్యాధి.

కారణములు.

సహజముగా దుగ్బలముగు జీర్ణకర్తని గలిగియుండుట వలనను, ఉత్కృష్టమైనట్టియు యుష్మతెగని జీవనముయొక్క ఫలితముగను — సుఖ్యముగా చాలసేపు కూర్చుండి పనిచేసెడి పుష్టలతో గూడియుండినను, పేగులను అణచిపెట్టునట్టి పల్లపుమర్చిలలో గూర్చుండి యుండుట వలనను — ఈ స్థిరఅజీర్ణవ్యాధి సంభవించును. శరీరసాధనము నశ్శీర్ణజేయుట వలనను, పనిచేయునపుడు విశేషముగా పొంగియుండుట వలనను, వెలుతురును గాలియు చక్కగా ప్రక్షేపించని యింట్లో నివసించుటవలనను, జనసమృద్ధముగు గదులలో నివసించుటవలనను, యేకారణము వలననైనను గలిగిడి ఆపరిమిత వాయువు వలనను, యీ వ్యాధి గలుగఁజుచును. మనశ్శుద్ధిల యొక్క నిశేష పరిశ్రమవలన నీవ్యాధి మొక్కుటముగ సంభవించును. సోమరితనము యీ వ్యాధిని వృద్ధిపరచును. ఎక్కువగా చుట్టరు గాల్చుటయు దీనికి కారణము గావచ్చును. మలబంధము దీనికి కారణము కావచ్చును; దీని యొక్క ఫలితము గావచ్చును. చెడిపోయినపప్పులు ఉండటవలన నాహారమును బాగుగా నమలుటకు వీలులేకపోవుటచేత గూడ నీవ్యాధి తటస్థించవచ్చును. చెడుపండ్లనుండియు, పండ్లచిగుళ్ళు నుండియు, న్యవించు దుర్బంధ ద్రవముల వలనను శీర్ణమున కాటంకము కలుగుచున్నది. స్త్రీలయందు గర్భాశయము యొక్క ఆవృత్తతవలన నొకానొకప్పుడు యీ స్థిరఅజీర్ణవ్యాధి సంభవించుచున్నది. జీర్ణతో శమున దుండెడి పురుగులవలన నొకానొకప్పుడు నీవ్యాధి తటస్థించుచున్నది. శీతాస్థితి యందు ఈ పాముగా మూర్ఛలు గలిగినయెడల యీ వ్యాధిగ్రస్తులకు కష్టముగా నుండును. ఉష్ణచక్షుమలందలి అధివేడిమివలన శరీరమునకు గలిగిడి రక్తహీనతయందు జీర్ణావయవము లును గొంతవరకు పోకాటు పడుచున్నవి.

లక్షణములు.

స్థిర అజీర్ణవ్యాధియందు ఆన్మకోశము, కారిజము, పేగులు — యీ ఆవయవము లన్నియు అస్వస్థతావృత్త గాండు పడుచున్నవి. ఎప్పుడైన నరుదుగా యీ ఆవయవములలో నేడయిన యొక్కటి మాత్రమే ఆస్వస్థతను దుందునుగాని, తలుచుగా మాత్రము యీ వ్యాధియందు యివిఅన్నియు ఒకేసారిగ నారోగ్యస్థితి యందుండుట తటస్థించుచున్నది. ఈ వ్యాధి చిరకాలముండుటచే నన్నకోశముయొక్క సములు ఆతిసున్నితమలై కడుపులో నీర్వృన్దతయు, నదులునట్టియు, మందునట్టియు, బాధను పుట్టించును ఇట్టిస్థితియందు దాహ మాత్రో గూడిన యాకలి జనించును. ఈ ఆకలి పుట్టినపుడు రోగి యెక్కువగా దినుట తటస్థించినయెడల. అంతకు కందురెట్లు యెక్కువ బాధనందును. వెన్నుపైపులను బోటు పాడు పుటయు దటస్థించును. ఇందువలన కారిజము జబ్బుస్థితియందున్నదని కొంద రుకొందురు. రొమ్మయందు నొప్పియును; క్రియమాదప్పిన నాడియును, బుట్టుటవలన హృదయరోగమును గూర్చి కొందరు ఆనవసరముగ భయపడుదురు. మాత్రము వెలువడినప్పుడు వేడిగా నుండ వచ్చును. ఇట్టి మూత్రమును నిలువయుంచునన్నప్పుడు ఆడుగున యెర్రని గనిలేరును. ఆన్మకోశములోని జీర్ణక్రియములు సరిగ్ గరుగకపోవుటవలన ఆహారమంతయు పులియజేయుటచే

దుర్వాసనగల తేవులువచ్చును. ఒకానొకప్పుడు వాంతి కలుగుటయు గలదు. క్రమముగా జీర్ణముకాని ఆహారమే పేగుల లానికీబోయి అచ్చటనుగూడ క్రమయిన జీర్ణత గలుగక పోవుటచే పేగులనుండియు దుర్వాసనగల తేవులుపుట్టి, ఆహారమంతయు మిక్కిలి ముగ పులి యబడి, పేగులయందు నొప్పిగన్నట్టిరోగికి మిగుల అసౌఖ్యముగనుండి, యీ పందగ్గ మున అజీర్తి విరోధనములు పుట్టినను పుట్టును. నోరు జిగటలు సాగుటయు, గొంతు పచ్చిపుండు గానుండుటయు, శరీరమునందనేక స్థలములలో నొప్పలును, నిస్త్రాణము, చటసించును. నాలుకయొక్క చివరను, అంచులను, యెర్రగా నుండును. మధ్యభాగమునందు మాలిన్య ముతోగూడిన గీతయుండును. చెడిపోయిన పండ్లభాదవలన రోగి యొకవైపున మాత్రమే నమలునుండిన యెడల, యీగీత రెండవవైపున మిగుల స్పష్టముగా కనబడును. మూత్రము ఉపరి భాగమున దరచుగ పంచవర్ణములుగల తెల్లను, గనపట్టజేయును.

కారణమునుండి వచ్చు పిత్తముయొక్క గుణలక్షణములుగాని, కరిమాణముగాని మారి నప్పుడు, ఆహారము పేగులనుండి శరీరములోనికి గ్రహించబడుట కర్మమైనదిలో నుండ జాలదు. కారిజ మీదిధముగ నస్వస్థతయందుండినప్పుడు పిత్తముండలి మూతపదార్థములు రక్తములో గలిసి, రోగి పాలిపోయినట్టియు, కొంచెము పసుపురంగును, గలిగినట్టియు వర్ణ మును వహించును. ఇట్టివ్యాధి దీర్ఘవ్యాపకమైనప్పుడు నాలుకయొక్క వెనుకతట్టుననుండు పొక్కుల వంటివి, మిగులవృద్ధిజెంది చిన్ని పులిపిరి కాయలవలె నుండును.

అజీర్తివ్యాధియొక్క మిగిలిన కొన్ని చిహ్నములు—పెదవులపై పొక్కులు లేచుట, కనురెప్పలు ఉబ్బుట, కడుపులో నులివేయు నొప్పి, కడుపులో కదిలికను పుట్టించు యొక నొప్పి యేర్పడి శరీరమంతటను వ్యాపించుట, గుండెలు క్రమముదప్పి కొట్టుకొనుట, కీళ్ల నొప్పులు, ఉబ్బినము, మలబద్ధము, మూత్రకృచ్ఛము, అతిమాత్రము — యీ వ్యాధులతో కూడ నజీర్ణవ్యాధి కనుపించును.

చి కి త్న

అజీర్తివ్యాధియొక్క చికిత్స బౌద్ధసేవ యందుకంటె వధ్యమునందును, ఆరోగ్యశాస్త్ర మంత్రముల ననుసరించుట యందును గలదు. మితభోజనమును జేయుట మిగుల యావశ్య కము. అజీర్ణవ్యాధిపీడితులు నెమ్మదిగా భుజింపవలయును. ఒక భోజనమునకును మరొక భోజనమునకును మధ్యకాలము విరివిగనుండవలయును. అధమపక్షము ఆరగంటలైనను యెల పవలయును. మధ్యకాలములం దేమియు దినరాదు. భోజన పూర్వముగాని, భోజనాంత రముగాని, అధికమైనట్టిగాని. దీర్ఘమైనట్టిగాని మనఃపరిశ్రమనుగాని శరీరపరిశ్రమనుగాని, బుచ్చుకొనగూడదు, అజీర్తిరోగులకు బాగుగా వండిన మాంసపదార్థముల యొక్కయు, కారి పదార్థములయొక్కయు మిశ్రమ ఆహారము నుంచిది. బంగాళాదోషలు, పండివంటలు, పిప్ప పదార్థములు, పండ్లు, చక్కెర, కాల్యబడనిరొట్టె—పిటిని త్యజింపవలయును. చక్కెరను వడలివేసి సాకరిక్ అనుపదార్థమును ఉపయోగింప వలయును. ఉద్రేకమును, మత్తును బుట్టించు తాగినదలను మానివేయ వలయును. తేయాకునీళ్లు విశేషముగా త్రాగవూడదు. ఇతర ద్రావకపదార్థములను విశేషముగ బుచ్చుకొనగూడదు. తిన తాగిన విషయములను గూర్చి

రోగికి స్వాభుభవమువలననే సంగతులు తలెత్తెను. అజీర్ణవ్యాధియొక్క చాలతరగతుల యందు మందులు పుచ్చుకొన నవసరములేదు. జాగ్రత్తతో నుండుటయు, మందుజాగ్రత్తను గలిగి నుండుటయు, మితిభోజనము చేయుచుండుటయు, యివియన్నియు, రోగికి మందుల కంటెయెక్కువ ఉపకాంతిని గలుగజేయును. ఇతర అవయవములకు విశ్రాంతివృత్తి నటులే, అన్నకోశమనకును విశ్రాంతినియవలయును ఈవ్యాధియొక్క ఉద్యోగస్థితియందు, పెద్దవాండుగాని పిల్లలుగాని యిరువది నాలుగు గంటలవరకు భోజనమును మానినయెడల శరీరమునకు ఆయాసము కలుగజేరదు. ఆజీర్ణత అన్నభోజనముతో మాత్రమే సంబంధించినదై యున్నది యెడల భోజనము మానివేసి సాంతియగుటకు మంద పుచ్చుకొనవలయును. ఆజీర్ణత తీగుల తోగూడ సంబంధించినదై యుండినయెడల విశేషవమగుటకు మందుపుచ్చుకొనుట అవసర మయినట్లున్నది. దీర్ఘకాలమునుండి యుండియున్న ఆజీర్ణతకు, భోజనమునందు జాగ్రత్తగా నుండుటయు, శరీరమునకు సరికదని పదార్థములను లోనకు బుచ్చుకొనకుండుటయు మిగుల మంచిది.

ఆజీర్ణవ్యాధియందు, ఆరోగ్య శాస్త్రనిధులను బట్టి సబ్బు ఉపయోగించి స్నానము చేయుటకులను సర్వభాగముల యందలి రోమ రంధ్రములను పరిశుభ్రముగా నుంచవలయును, ఆలసట జేసకుండ శరీరసాధకమును బుచ్చుకొన వలయును. మనఃపశ్చిమను తగ్గించవల యును. చలిగాలి తగలకుండు స్థలములలో నిద్రించవలయును. స్థిరఆజీర్ణ వ్యాధిగ్రస్తులు, శివోష్ణస్థితిని మార్చునట్టి ప్రదేశమున కరుగవలయును.

కడుపులో మంటగానున్న పుడు 10 గ్రెయినుల వై కార్బనేట్ ఆఫ్ సోడాను ఒక అరజొన్ను జలములో గలిపి పుచ్చుకొనచో ఉపకాంతి గలుగును. సోడామింట్ బిల్లను చిన్న సీసాలగా ఆమ్ముచురు. ఈబిల్లలను ఉపయోగించినను ఉపయోగించ వచ్చును. అన్న కోశము వాయుపూరితమయి ఉబ్బరముగా నుండినపుడు ఒక జొన్ను జలములో ౪ పెప్ట ర్మింట్ ఆయిల్ చుక్కలను వేసి పుచ్చుకొనవలయును. కడుపు ఉబ్బరముతో నొప్పికూడా కలిసియున్నపుడ, ఒక డ్రాము స్పిరిట్సు ఆమ్మోనియా ఆరోమేటికను ఒక జొన్ను జల ములో కలిపి పుచ్చుకొన వలయును. కడుపు ఉబ్బరము పూరితమయి, దుర్వాసన యుత మయి యుండినపుడు క్రియోసోట్ గాని కాగ్నాలిక్ ఆసిడ్ గాని ఒక చుక్కను చక్కెరపై వేసి లోనకు పుచ్చుకొనవలయును. ఆజీర్ణవ్యాధితోగూడ మతిబద్ధమువలన బాధకొందుచున్న కొందరు శోగులకు, రాత్రివరుండ బోవునపుడు ఒకటొబ్బరు చల్లని నీళ్లును, ఉడయమున నిద్రలేచగానే మరియొకటొబ్బరు చల్లనినీళ్లును తాగుటవలన గుణమునిచ్చును.

అతిమాత్రము.

అతిమాత్రవ్యాధి (1) డయరీటిస్ మెంటిస్ (2) డయరీటిస్ ఇన్ ఫిసిడస్ అని రెండు విధములయి యున్నది. ఇందులో మొదటితరగతి వ్యాధి యందు, మాత్రము ద్వారా గ్రేవగుగర్ అనబడు ఒక విధమగు తీవ్రవ్యాధియు తలచుగా వెలువబడుచుండును. ఈ తీవ్ర పదార్థము మాత్రము ద్వారా అప్పుడప్పుడు కొంచెము గ్రేవగుగర్ మాత్రమే వెలువడు

వ్యాధికి గ్ల్యుకోసురియా అని పేరొక పేరు ఉండియున్నది. కండవ తరగతి వ్యాధియందు దాహము అధికముగానుండి, సుగర్ (చక్కెర) యను ఆల్బుమిన్ అనబడు స్వేద గ్రాహ వును లేకుండ మాత్రము విశేష పరిమాణములుగ వెలువబడును.

(1) డయబీటిస్ మెలిటస్.

కారణములు.

అంగా రసంబంధమయినట్టియు, జలవాయువు ప్రాణివాయువుల సంబంధ మయినట్టి యు, ప్రాణివాయువు కంటే రెట్టింపు జలవాయువు యుండునట్టియు ఆహారపదార్థములకు శారోచ్ఛైద్యేట్లు అని పేరు. ఈ ఆహార పదార్థమువలననే శరీరములో రక్తమునందుండి చక్కెరపదార్థము యేర్పడుచున్నది. కారణముయొక్క వ్యాపారములలో నొకటి యీ చక్కెరను చేసి రక్తమునందు బ్రవేశ పెట్టుట అయియున్నది. అధిక మనః పరిశ్రమవలన గాని, యెక్కువ భయమునందుట వలనగాని, త్రాగు మోతుతనము వలనగాని, స్వప్నమైన రూ, ఇన్ ఫ్లూయెంజా, ఉద్రేకత్వవలనయు, కొఱుకు, మొదలగు వ్యాధుల సిన్పుటగాని, మొదల నందు ఒకవిధమగు మార్పుగలిగి రక్తమునందలి యీ చక్కెర పదార్థము పుష్టియగుట కను గుణ్యమగు పనులు జరుగుచున్నవి. కారణము క్రిమముగా బనిచేయు చక్కెరను మెక్కువగా ఉత్పత్తిచేయుట వలనగాని, శరీరమునందలి నానా ఆహారమలములయొక్క పనిగాలము వలన శరీరమునందుత్పత్తియగుచున్న చక్కెరను గ్రహించుచుండు తగ్గింపుట వలనగాని, ఈ అతిమాత్రవ్యాధి సంభవించుచున్నది. ఈ రెంటిలో యేలోపము వల్లనైనను సరియే, జేహమందలి రక్తిప్రచారమునందు చక్కెర ప్రవేశించి చు త్రగిగిని వ్యాధి నివర్తించు బడుచున్నది.

అతిమాత్రము తఱచుగా సంభవించెడి వ్యాధి కాదు. మాంచెస్టరు పట్టణమునందలి ఒక పెద్ద ఆసుపత్రిలో ఇరువది సంవత్సరముల కాలములో రోగులుగా బ్రవేశించిన 27,721 మందిలో 272 గురు మాత్రమే అతిమాత్ర వ్యాధిచే బాధనొందిరి. ఇంగ్లాండు, ఫ్రాన్సు, డేన్ మార్కు, యునైటెడ్ స్టేట్సు దేశములలో అతిమాత్రవ్యాధి హెచ్చుచున్నది. ఇండియా దేశమునందు హిందువులలో చెక్కుచగన, సిలోస్, దక్షిణ ఇటలీ, మా ప్రదేశముల యందును, యీ వ్యాధి యితర దేశములనుండుకంటే మెక్కువ వ్యాపకముగ నున్నది.

లక్షణములు.

ఈ వ్యాధియొక్క మొదటిగల లక్షణము హానానధికమగుటయు. మూత్ర విస్తరణావస్థయు యెక్కువగుటయు, అయియున్నది, నీరసము ప్రారంభమయి, తోగితుప్పించుటకు ప్రారంభింపవచ్చును. తఱచుగా, దాహము అకస్మికముగా వుట్టును. వ్యాధియొక్క ఉద్రేకకాలమునందు ముఖము కుప్పించి, నుదురుపయిన ముడతలు కన్పట్టును. సాధుగ తల యందు ముఖమునందు మార్పులేనియు హానానధికముగ గానరావు. మిక్కుటవ్యాధియందు శరీరమునందు గూడ కుప్పించును.

మూత్రముయొక్క పరిమాణము యొక్కవగును. తీవ్రగతులయందు దినమునకు 150 మొదలు 250 ఔన్సులవరకు గూడనుండును. సాధుగతులయందు మామూలు కంటె కొద్దిగమాత్రమే హెచ్చును. మూత్రముయొక్క రంగు వెలవెలలాడెడి తెలుపువర్ణమును గలిగియుండును; ఒకానొకప్పుడు ఆకుపచ్చు, పసుపు గలిసిన వర్ణము ఉండును. మూత్రము నందు గ్రేప్ సుగరు ఉండుటకే ముఖ్యమయిన మార్పు అయియున్నది. ఈ గ్రేప్ సుగరు, మూత్రమునందు 100 కి 1/200 వంతు మొదలు, 5 లేక 10 వరకు నుండును. ఆతిమాత్ర రోగియొక్క మూత్రముపయి ఈగలు విశేషముగ మూగును. ఈ వ్యాధికి యిది యొక గుర్తుగా గమనింపవచ్చును. ఈమూత్రముయొక్క యొకచుక్క యెచ్చటవైనను పడినయెడల, అది అరిస పిమ్మట ఒక తెల్లని వదార్చ మచట నిలువయుండుటకు మనము కనుగొనవచ్చును.

వ్యాధి వృద్ధిచెందినపుడు, మూత్రముద్వారా అల్బుమిన్ ఆను శ్రేతభాతువు గూడ వెలువడుట తటస్థించును. దేహముయొక్క వేడిమి స్వాభావిక వేడిమితో సమానముగ నుండును, లేదా, కొంచెము తగ్గియుండును. ఇతరమగు శరీరాస్పృశ్యతలు సంభవించినచేత పు శరీరవేడిమి హెచ్చును. ఉద్యోతగతులయందు ఒడలు పొడిగానుండును. కురుపులు, రాచపుండ్లును, అంగవికృతి (Apoplexy) రోగమును దటస్థించుటయు గలవి నోరు సామాన్యముగా పొడిగానుండును; దీర్ఘవ్యాధిత వ్యాధియందు పంటిచిగుళ్లు తఱచుగా వాచియుండును; పళ్ళు పుప్పియగును. ఉద్రుత గతులయందు నాలుక యెరగాను పచ్చి గాను ఘండును. చొలకాలను ఆకలి మందగించకనే యుండును. ఒకానొకప్పుడు ఆకలి అధికముగా నుండును. రోగి చిక్కినకొలదిని, ఆశోగ్యత చెడి, ఆకలి తగ్గి, చెమటలు పూ రంభమయి, హృదయస్థిగియు నీరసించి, పాదములు వాచుటయు తటస్థించును. స్త్రీలలో దుగ్ధము యొక్కవగా నుండును. ఈవ్యాధి కుందు కంటికి పొగగప్పటయు నొకానొక ప్పుడు తటస్థించును. పుగుళులయందు సంభోగశక్తి తలచుగా క్షీణించును. ఉద్రుతగతుల యందు స్త్రీలలో సంభోగేచ్ఛ తగ్గుననియు, వయసుచెల్లిన ఆడవారలయందు, యీవ్యాధి సాధుగతియందు నుండిన యెడల, సంభోగేచ్ఛ హెచ్చుననియు తెలియుచున్నది. యిట్టి ప్రకారముగానే యుండునుగాని, సామాన్యముగ మాంద్యమును, మత్తును విచారమును వహించియుండును. ఈవ్యాధి స్త్రీలయందు కంటి పుగుళులయందు యొక్కవ వ్యాధితి మయి యున్నది. నలువది సంవత్సరముల వయసువయిన యీ వ్యాధి కుందు మరణము తెక్కువగనున్నది. ఉద్రుత గతులయందు మరణము కొన్ని సంవత్సరములలోనో, లేక కొన్ని మాసములలోనో, గలుగుటయు గూడగలదు. సాధుగతులయందు, వయసుచెల్లిన వారిలో, 10 సంవత్సరములు మొదలు 20 సంవత్సరముల వరకుగూడ నిలిచియుండుట గలదు. ఈ వ్యాధియందు తీయరోగము సంభవించిన యెడల మరణమునకు పూర్వమున ఆతిమాత్ర లక్షణములు హరించ వచ్చును.

ఆతిమాత్రవ్యాధి వీడితరుణియొక్క మూత్రమును యిట్లు పరీక్షించ వలయును. సరి సమానములగు మూత్రమును తిక్కరీసొటాన్ ను గలిపి కాచినయెడల బాగైన యొరుపు రంగు వేలును. ఈయొరుపురంగు మూత్రమునందు గ్రేప్ సుగరు వుండి యున్నట్లు సూచించును.

చికిత్స

అతిమాత్రవ్యాధిచే బాధనొందు నోని భోజన పదార్థములయందు ముఖ్యముగా జాగ్రత్తగా నుండవలయును. చక్కెర కలిగియుండు పదార్థముల భుజించుట మానవలయును.

ఈ దిగువ పదార్థములను భుజింపవచ్చును:—

మాంసమునందు కారణములేక తక్కిన అవయవములును, చేసెలు, గుడ్డలు, మీగడ, వెన్న, చమురులు; కాయగుండలలో క్యాపిట, గ్రానీకాయ, చిన్న ఉల్లిగడ్డ, బొంబాయిలు, ద్రవపదార్థములలో సామాన్యజలము, స్పోగోవాటను, వివరలో వాటన్ని, తేయాకునీళ్ళు, కాఫీ, డ్రైఫ్రూట్, క్లాగట్ బర్గండి వైసులు, బ్రాంలీయును, కొద్దిగా పుచ్చకొన వచ్చును.

ఈ దిగువ పదార్థములను త్యజింపవలయును:—

పార్శ్వవైన్, చాంపేరువైన్, ఫలములయొక్క రసములు, మరచతులు, కోకో, చాక్ లేట్లు, ఆమ్లము, పాలు విస్తారముగను, పుచ్చకొనగుండము.

పాలలో 100 కి 4 నంతులు చక్కెర పుండును ఇందులో విశేషభాగము కొద్ది వృష్ పదార్థమును అల్పమును పుండును. మీగడలో కొద్దివృష్ పదార్థము యొక్క పదార్థముండి చక్కెర తక్కువగానుండునుగాన, దీనిని పుచ్చకొన వచ్చును. గోధూమ పొటలతో జేసిన రొట్టెను దివ్యవచ్చును. అతిమాత్ర వ్యాధిపీడితులు చక్కెరకు బదులుగా సాకరీన్ ను వుపయోగింప నగును.

మండులు.

అత్యుదత స్థితియందు యేచందులును సామాన్యముగ నుపయోగింపబాలవు. సాధుగ ఫలముందు అనేక ద్రవ్యములు వుపయోగము లగును. సీసము (నల్లముండు) మార్షిన్, కొడిన్ చాలా ఉపయోగములు. సీసము అర గ్రెయిను మొదలు 2 లేక 3 గ్రెయినుల వరకును మోతాదును పెంచుచువచ్చును. కొడిన్ (కొడియా) కూడా అర గ్రెయిను మొదలు 2 లేక 3 గ్రెయినులవరకును మోతాదులు పెంచుచు వచ్చును. వీటిని భోజనాంతరమున బుచ్చకొనుట మంచిది. ఇవి మలబద్ధమును బుట్టించును గాన, దానికి జేరువిధముగా చికిత్స జేయవలయును.

బై కార్బోనేట్ ఆఫ్ సోడా, సోల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా, ఆసిటేట్ ఆఫ్ సోడా ఉపయోగముగ నుండును. ఈ క్రింది ద్రవ్యములును ఉపయోగములుగ నుండును. సాధుగతులలో ఆర్యెసిక్ (పాచాము); బాంబూల్ (నేరేడు) లిక్విడ్ పెద్ద మోతాదలలోను; సోడియం సాలైసైట్; బ్లిత్ సాలైసైట్; క్షిప్రోవ్యూతో గూడియుండిన యెడలలితియం పాల్బులును; మిగుల కుష్మించి యుండినయెడల కార్బోలివరు చమురును ఉపయోగించును.

ఈవ్యాధి మిగుల ఉద్రుతస్థితి యందున్నపుడుగాని, మూర్ఖ వచ్చునట్లుండిన గాని సోడియం బై కార్బోనేటును దినమునకు 150 గ్రెయినులు యియ్యవచ్చునని యొక గొప్ప డాక్టరుగారు చెప్పబడినది.

(2) డయబీటిస్ ఆన్ సిపిడస్.

ఈవ్యాధి బహు అరదుగా దట్టించును. మాంచెస్టరు పట్నమునందలి యొక పెద్ద ఆసుపత్రిలో 10 సంవత్సరముల కాలమునందు బ్రతేజించిన 14,575 రోగులలో 7 గురు మాత్రమే యీవ్యాధిచే బాధనొందిరి.

కారణములు.

తలకు పెద్ద తాగుటవలనను, మనము యొక్క విశేష ఆయాసము వలనను, అధిక మనో ద్రోహము వలనను, భయమువలనను, దుష్పలముగ ఆహారమువలనను, తాగుబోతు తనము వలనను, ఇన్ఫ్లుయెంజా కొలుకు మొదలగు వ్యాధులవలనను, చలిగాలి సోకుట వలనను, నీవ్యాధి తటస్థించును. కారణమేదైనను, మొదడుయందు గలిగెడి మార్పువలన యీవ్యాధి పుట్టుచున్నది. శిశువోసన మూలమున దెలియుచున్నది. మూత్ర గ్రంథులతో సంబంధించిన సరముగాను ఆస్వస్థత శిండుట వలన మూత్ర గ్రంథులయొక్క పనియందు లోపము కలుగు చున్నదని చాలమంది యొక్క అభిప్రాయమై యున్నది.

లక్షణములు.

ఈవ్యాధియొక్క ముఖ్యలక్షణములు, ఆతిదాహము, ఆతిమూత్ర విసర్జనము. ఏయితర వ్యాధియందుకంటెను యీవ్యాధియందు మూత్ర పరిమాణము అధికముగ నుండును. మూత్ర మున దినమునకు 180 చుట్టులు మొదలు 400 లేక 500 చుట్టుల వరకు నుండును. మూత్రమునందు శ్వేతధాతువు ఉండదు. సూపును, నాలుకయును పొడిగానుండును. ఒడలు పొడిగానుండి, కేవల తగ్గియుండును. సామాన్యముగ నాకిలి మారక నేయుండును; మల బద్దమును సామాన్యముగ తటస్థించును. కొన్నివిషయములలో ఆతిమూత్రము, ఆతిదాహము తప్ప వేరువిధమగు అనారోగ్యత యేమియు గానరాదు. మరికొన్ని విషయములలో శుష్కం చుట విశేషముగ నుండును. శరీరవేడిమి సామాన్యముగ మామూలుదీతియందే నుండును. ద్రవపదార్థములు లోనకు బుచ్చుకొనుట తగ్గించినయెడల గుణము నిచ్చిన కొన్ని ద్రవ్యంతో ములు కలపు. జ్వరమావచ్చినపుడు మూత్ర పరిమాణము తగ్గును.

చికిత్స.

ఇంకొకవ్యాధితోగూడి యీవ్యాధి యుండినపుడు, ఆవ్యాధికి నుండు చికిత్సగావించ వలయును. ద్రవపదార్థములను బుచ్చుకొనుట తగ్గింపుటవలన కొద్దివిషయములలో ఉపశాంతి గలిగియుండును. లోనకు జంకు పెల్లెరియనేట్, ఆంటిపైరిన్ యిచ్చుట వలన చాలావచ్చుది కలుగకలదు. యెర్గాట్లోనకు యిచ్చుటవలన మూత్ర పరిమాణమును తగ్గించునుగాని, దీనిని విశేషముగ నివృత్తుకూడదు. డైట్రోగ్లిసేరిన్ యిచ్చుటవలన యొకప్పుడు గుణము నివృత్తి వచ్చును. ఇందును బుట్టించుటకుగాను ఉష్ణతను గలుగజేయు దుస్తులను ధరించుటకుంచిది. దాహమును ఆశువుటచేయు దాహములను, అసిడీ సంబంధమగు దాహములను, బుచ్చుకొ నుట ఉపయోగకారిక నుండును. ఈవ్యాధియందు చక్కెర గలిగియుండు పదార్థములను నివే ధించుట యవసరములేదు. అవసరముతో లవణమును కొద్దిగా భుజించుట యొక ముఖ్య నుండును.

ఆతి సూల తి.

ఇండియా దేశమునందలి యూరపియనులు స్వదేశీయులును గూడ తిమ్మగ స్థూల కాయ లగుటగలదు. ఇట్టి స్థూలకాయము అననుకూలతతో దోహదపడుటగాక, ఒకానొక

వృద్ధుల వ్యాధిగను పరిణామించుచున్నది. దీనికి కారణము బహుళః క్రొవ్వు పదార్థములను విశేషముగ భుజించుటవలనను, శరీరమునందు క్రొవ్వుపదార్థము కూడుకొని యుండుట కను వగు వయస్సునందు తగిన శరీర సాధకము దీనికొనక పోవుట వలనను, అయినందుడనచ్చును. ఈ క్రొవ్వుపదార్థము శరీరమంతటను సమానముగ వ్యాపించి యుండిన యెడల, అవ్యవధాన మైన అనర్థకమేమియు లేక పోవచ్చును. కాని ప్రత్యేకస్థలముల యందు మాత్రము యీ క్రొవ్వు పదార్థము అవలించి యున్నపుడు దానియొక్క హానికరమగు గుణము స్పష్టముగాక మానదు. ఆరోగ్యమానందన్న స్వదేశీయుడు, ఇరువది సంవత్సరములకును ముప్పది సంవత్సరములకును మధ్యవయసునందు, సామాన్యముగ 5 అడుగుల 5 అంగుళముల పొడవును, 140 పౌనులు మొదలు 150 పౌనులవరకు బరువును ఉండును. ఇంతకు పైన యుండితే వృత్తి అంగుళము పొడవునకును దాదాపు 5 పౌనుల పొడవుబరువు ఉండును. అడువారలు కొంచెము తక్కువ బరువుగా నుండురు. తమ పొడవునకు పించియుండి బరువు ఉండినపుడును తమయొక్క నడుమకొలత ఛాతీకొలత కంటే నధికముగా నుండునపుడును, శరీరమునందు క్రొవ్వుపదార్థము అధిక మగుచున్నదనియు, స్నాయువుల యొక్కయు పటుత్వము తగ్గిపోవుటకు సూచక గెన్నట్లు చున్నదనియు, చలినికొన వలయును. శరీరమునందు స్థూలత గుంట్కువ అయినయెడల, ఆయా భాగముల కన్నిటికిని అధిక రక్తమును బంపుటకుయి హృదయమునకు పని యెక్కువ అగుచున్నది. ఇందువలన హృదోగము జనించి ఆయాసముతో గూడిన ఊపిరి తీసిరియును, కఠినముదప్పి గుండె కొట్టుకొనుటయు, చలనశీలమును ఇదిగాక గుండె ప్రక్కల గాని గుండెకుండేగాని క్రొవ్వు పదార్థము కూడుకొని ఆ అవయవము యీజనశక్తి వచ్చును. దీనికిని చైతన్యములే ఉద్వేగిత స్థితియందుండి, తలకిందుగుటయు నేర్పడును. కాయము మీరిన వారలయందు, కండ్లు ఒకవిధమగు సూత్ర ఆకారమునుదాల్చి కంటిగుచ్చు నందలి తుక్కును డలము లేక కాచిబింబము అనబడు దాని అంచున మందమైనట్టియు కొంచెము తెల్లనైనట్టియు పొర కనిపియుండును. క్రొవ్వుతో గూడిన గుండెలోగము మిగుల అపాయకరముగాన యుండులకు చిత్రేన జేయుటను గూర్చి అశ్రద్ధజేయరాదు. ఇట్టి రోగులు అన్ని విధములగు ఆమిత పరిశ్రమలను మానివేసి, తొందర గలుగునట్టిగాని ఉద్యోగములు గలంగ జేయునట్టిగాని పనులను గూడ వదిలివేసి, ఆహారమును తగ్గించి, గాలిపీచుచుండి బహిరంగస్థలములో నిదురము తప్పకుండునట్టియు సాధారణ మయినట్టియు శరీరసాధకమును దీనికొన వలయును. ఒకానొకప్పుడు మిదడు యందలి రక్తనాళములలో నీ క్రొవ్వుపదార్థము వృద్ధి యగుట వలన రక్తనాళము బిడ్డలగుట యేర్పడి, మూర్ఛయు చటస్థ మగును.

ఒక చనిపి వివరీతముగ లావు అగుట పొరంభము కాగానే ఆహారము తగ్గించుట వలనను స్థూలతను తగ్గింపవచ్చును. చక్కెర సంబంధమగు ఆహారములను తగ్గించి వలయును.

ఏ భోజనపదార్థములను విశేషముగ లోనబుచ్చుకొనుట వలన స్థూలత యేర్పడుట తలపించుచున్నచో అట్టి భోజనపదార్థములను తగ్గింప వలయును. మాంసమునందలి క్రొవ్వు తెల్లబొప్పె, జాన్ను, మీగడ, పెన్న, బిరు, రీపిసారాయీలు, బంగాళాదుంపలు, అన్నము, ఆరొయిల్, సగ్గులియ్యము, చక్కెర — వీటిని మితముగా తినవలయును; పొట్టుతోగూడిన పొట్టెముక్కలు, పచ్చికూరగాయలు, ఫలములు మొదలగునవి తినవలయును. ఒక తరహా

భోజనమునుండి వదిలెయ్యక తరచు భోజనమునకు కృషిముగా నుద్వలయును. ఒకే సారిగ మార్పులు మంచిదికాదు. మత్తుపదార్థములను సుమారుత్రిగా మానవలయును.

అంటిఫ్యాట్ అను పేరుగల కొన్ని మందులు అప్పుబడును. ఇవి ఉపయోగింప నీవని కావు.

కేవలము మాంసము మాత్రమే దినుచు ఒక భోజనమునకును యింకొక భోజనమున కును మధ్య కాలమందు నిద్రపట్టెంటు ఉష్ణబలమును దినమునకు మాడవనాలుగు పర్యాయములు సెమ్మదిగా పుచ్చుకొనవలయుననెడి యొక చికిత్సగలదు. తక్కిన విధములగు ఆహారపదార్థములను పూర్ణముగా వదిలివేయటం ఆరోగ్యమునకు భంగకరమగును గాన నీ పద్ధతియు ఆంత శ్రేయముగ గనుపడదు.

లూనకు పుచ్చుకొను ద్రవపదార్థములను దగ్గించుటవలన మనిషి సన్నము కావచ్చునని యొక ఉపాయము కొందరు చెప్పియున్నారు. శరీరమునం దెప్పుడుచున్న వ్యర్థపదార్థములను దీసికొని పోవుటయొక్క శరీరమునందంతటయు నలసినంత ద్రవపదార్థము ఉండవలయును. ఈ వాహనమునకు, మూత్రమునందలి యూరిక్ ఆసిడ్ అను మూలపదార్థము కఠిని ద్రవరూపమున మూడుగుల గడ్డవడిమిగున్న ఆలతకు 8000 గ్రాములతో గలగవలయును. దీనిచే నది గడ్డకట్టి మూత్రకృచ్ఛముగా నేర్పడి మిగుల బాధ గలిగించును. కావున నీ పద్ధతిగల ఆవలంబినియముగ గనిపించదు.

హి స్టీ రి యా,

హిస్టీరియా అనబడు నీమెదడు సంబంధముగల అస్వస్థత సామాన్యముగ సుఖజీవనము గలవారియందును; యెల్లప్పుడును కూర్చుండి యుండుట యలవాటు గలవారి యందును తటస్థమగుచున్నది. ఇది ఆడువారిలకు సంబంధించినది మూత్రమే అయియున్నది. ఈ వ్యాధి రెండువిధములుగా పరిణమించుచున్నది. (1) సరములతో సంబంధించిన కొన్ని దుర్లభములు మొదలు ప్రారంభమగును. (2) మూర్ఛగతులు తటస్థమగును.

సరములతో సంబంధించిన దుర్లభములు యీ దిగువ నుదహరింపబడినవి:—ముఖము యెర్రవాడట, కడుపు ఉబ్బరము, వెక్కిరి, గుండెలు కృమముదప్పి కొట్టుకొనుట, క్వాస యందు ఆయాసము గలుగుట, ఉక్కిరి కిక్కిరిచేయు ఖోభములు గలుగుట, గొంతులో ఉండ చిక్కుకొనియున్నట్లు చిత్తవృత్తి గలుగుట, కంఠద్వని పోవుట. శరీరమునందు చాల భాగములలో నొప్పలు గలుగును తలలో మేకును నట్టుచున్నట్టి బాధయు గలుగవచ్చును. ఎడమపార్శ్వము, కీళ్లు, ప్రసాగములు అస్వస్థత నొందవచ్చును ఈ వ్యాధియందు, రోగి, నిజముగాని అనేక వ్యాధులచే బాధనొందుచున్నట్లు వివరించును. నిజముగా రోగి విధమయిన వ్యాధియు లేనపుడు ఈరోగి పేగులసంబంధ మయినట్టిగాని గర్భాశయ సంబంధమయినట్టి గాని గొంతు సంబంధమయినట్టిగాని, వ్యాధులచే బాధనొందుచున్నట్లు మన మనుకొనుటకు వీలుగనుండును. దీనినిరోగి పోవుటయు, ఒక కేటయొక్క వ్యవహారమును, వెక్కిరి

ముకయొక్కపోట్లు, మాత్రము బంధించుట, యివి అన్నియు నీవ్యాధియొక్క సగుణము లయినవి. ఈవ్యాధిచే బాధనొందు స్త్రీలయొక్క బాధలనుగూర్చిన వివరములు ఘోర ములుగను, నిజమయిన నంగతులకు బహు అతిశయోక్తులుగను యుండును. ఒడలు మట్టు కొనగనే యీ రోగి పెట్టున నేడుచును; బాగుగ నొక్కినయెడల బాధ యెక్కువకాదు. ఆస్థలమందు నిజమయిన వ్యాధి యుండిన యెడల నొక్కిన మీదట బాధ యెక్కువ కావలసియుండును. ముఖము వాడియుండదు. ముఖమును జూచుట వలన బాధను తెలియజాలము. ముఖవైఖరి విచిత్రముగా నుండుటయు, కనులెప్పలు వాలియుండుటయు, నేసిన భ్రష్టతకు తటాకున జవాబు చెప్పటయు, యీ రోగులకు సహజమైయున్నది. దేహముయొక్క ఉష్ణత యుండేయిదు మార్పు కనబడదు. ఈ ఆస్థనంత నిజముగా వనరునది నుడిగియున్నది. రోగి యొక్క మనసుతో సంబంధించి సంతవరకు రోగి మొరపెట్టుకొని బాధలన్నియు నిజము లయి యున్నవి. ఇది మన స్వబంధమయిన వ్యాధి అయి యున్నది. ఈవ్యాధిచే బీడింప బడు వారు తరచుగా వ్యాధులను గల్పింప కుతూహలులై యుందురు. భోజన మక్కర లేదందురు; గాని రహస్యముగా తెప్పించుకొని తిందురు. రహస్యముగా నేనైన ద్రవపదార్థ ములకాగి వాటిని యెవో యొక వ్యాధియందువలె గ్రహింతుంగును. ఈవ్యాధియందు సామాన్యముగా బుతుసౌఖ్యము క్రియము దప్పియుండును. పేగులలో పురుగులుండినను యుండవచ్చును.

ఇతర సంబంధమగు మూర్ఛకును యీ మూర్ఛకును భేదమేరునగా, యీ మూర్ఛకు ముందుగా వెక్కి వెక్కి యేడ్చుటయు, ఆవలించుటయు, వెక్కిలియు, గొంతులో ఉండ బిక్కుకొని యుండికట్టుండుటయు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అయినట్లుండు టయు యివి అన్నియు పుట్టును. ముఖవిలాసము స్వాభావికముగనే యుండును. ఈరోగి క్రించవడు నెడల నజాగ్రత్తగా బడక సౌఖ్యమగు న్తమమును జూచుకొని అపాయము కలుగకుండ జాగ్రత్తగా పడును కాళ్ళు చేతులు కడలించుట యుండినను యివి పూర్వముగా స్వాధీనము తప్పియుం డవు. ఒకప్పుడు నవ్వుటయును; ఒకప్పుడు యేడ్చుటయును కూడ యుండును. మూర్ఛ పిమ్మట యెక్కువైన వర్ణము లేని అధికమాత్ర విసర్జనము తరచుగా గలుగుచుండును.

చి కి త్త

మూర్ఛవచ్చినపుడు చుట్టలను వదులుచేసి, వరికుప్పిమైన గాలివచ్చునట్లుచేసి విస రుచు, చల్లనీళ్లనుగాని, విరిగరునుగాని, యుడిగొలోనునుగాని, ముఖముపై బిల్లువలయును, స్పృశింపజూపునుగాని, పక్షి యీకెలను గాల్చి ఆ పొగనుగాని, వాసీ కారంధ్రమునకు జూపవలయును. పాదములను, చేతులను రుద్దవలయును. ముఖముపైనయును గుండెలమీద యును చన్నీళ్ళు పోయుటకంటె మంచిందు లేదు. ఇది మంత్రియవలె పనిజేయుచు. ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు ఒకానొకప్పుడు నేరు వ్యాధులచేతను బాధనొందు చుండురు గాన కనిపెట్టి జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయవలయును. ఈవ్యాధిగ్రస్తులు మూర్ఛలను దప్పించుకొనలేక పోయి నప్పుటికిని, వాటినుండి కాపాడుకొనుట తమ విధియైయున్నదని రోగులకు తెలియునట్లు చెప్పువలయును. మూర్ఛలకు మధ్యకాలములయందు, కుభ్రీయయిన భోజనము, మంచి గాలి యు, తరచుపాదకమున, మనస్సునకు కాలమా పనయను, విరేచనమును క్రమముగా నగుటకు తోలుచు పనులను, చచ్చిల్లసానకమును, అభివరములై నున్నవి.

ఈడుపువాయువు లేక ధనుర్వాాయువు.

ఈడుపువాయువు లేక ధనుర్వాాయువు అనబడెడి యీ వ్యాధి మేడయు దవుడలును బిగిసికొని పోవుటతో ప్రారంభ మగుచున్నది. దవుడలను దెరుదుటయు ననూముటయు మిగుల కష్టమగును. బలుబువలన గాని, కీళ్ళనొప్పల వలనగాని, యిట్లు దటస్థించినదని యనకొందును. ముక్కువెంటడియు, నోరు వెంటడియు ద్రవపదార్థములు వెలువడుట వలన మ్రొంగట బహుకష్టముగా నుండును. ఒకానొకప్పుడు యంతఃకీతో రోగి మరల స్వస్థతనంద వచ్చును. ఇతర విషయములలో, కొన్నిగంటలలో గాని లేక కొన్ని దినములలో గాని, దవుడ లుదట్టముగ కరచుకొనిపోవును. చేతులు కాళ్ళు లాగుకొనుటవలన, రోగి పాదములపైవాయును నడుచుచు; చురుగులుగొని, కొల్లువలె నొంగిపోవును. ముఖమంతయు ముడుచుకొనిపోయితికృత శాకారమును దాల్చియు నుండును. ఈ దుస్థితి నందు కాద్యుచేతులలోను, పొత్తికడుపు యందు నీవువగనను వ్యాధింపదు, అప్పుడు ఆధిగమగా నుండును. ఒకానొకప్పుడు కొన్ని నిమిషములను, మరి కొన్నిప్పుడు కొన్ని గంటలకును, ఈస్థితి గలుగుచుండును. మధ్యకాలముల యందు స్నాయువులు గట్టిగా నుండి, రోగి నిదించినట్లే దవు సవలించవు. ఈడ్పువచ్చి నపుడు, కష్టప నాశమునముగ్ధో నొందియుండి శరీరము ఉష్ణతను వహించి; చెవుటను బట్టి యుండును. శ్వాస నాశముయొక్క ప్రభాగము యొక్కగాని; ఎరుకొమ్మయందలి స్నాయువులయొక్కగాని యీడ్పువలన ఉక్కిరి బిక్కిరియయి శ్వాసనిల్చి పోవుటవలన మరణము సంభవింపవచ్చును. అలపువలనను నావు తటస్థింపవచ్చును.

ఈవ్యాధి యొక్క సన్నిహిత కారణము ఒకవిధమగు పురుగులవలన గలుగుచున్నది. 1589 సం॥ నందు క్రిస్టికాలో ఆను నాయనవలన యీపురుగు కనుగొనబడెను. ఈపురుగు శుభ్రతలేని గుట్టపుకొడ్లయందు వృద్ధియగును. ఏడ్వెను పుండు సకృత్తగా నుంచుట వలన నీ పురుగు పోషమును యేర్పరచు ననుచున్నది. ఈ పురుగువలన మేడడు యందలి భాగములు అస్వస్థతను జెడి స్నాయువులయందు ఈడ్పును గలుగజేయును. చలిగాలి సోపట వలన వెంటనే యీవ్యాధి తటస్థింపదు. ఆదువారలయందు ఋతుసౌఖ్యకాలమునందు చచ్చిళ్ళు స్నానము జేయుటవలన నీ వ్యాధి ప్రేరేపింపబడును. ఈపురుగు శరీరము నావరించియుండి యున్నప్పుడే యీ కారణములు యీవ్యాధికి సహాయము జేయును.

దంతములు యేర్పడుకొనుట ఒకానొకప్పుడు దవుడలు బిగిసికొనిపోవుట తటస్థించును. చిన్నవారలయందు యీ అంశమును గమనించి యుండుట ముఖ్యము.

కొక్కకాటువ్యాధి తటస్థింపనపుడును యిదీరితిగ నుండునుగాని ఒక ఈ డ్పునకును యింకొక ఈడ్పునకును మధ్యకాలములో స్నాయువులు గట్టిగా నుండవు. మరియు ఆ వ్యాధియందు కాండి)ంచుటయు ఉమ్మి జేయుటయు నుండును.

క్రికేసిస్ (విషముష్టి) యొక్క ఆధిక ప్రియోగమునందును యిదే విధముగ తటస్థించును.

ఈడ్పు వాయువునకు కారణము యెచ్చోటనో పుండు యుండియుండును గాన, ముందుగా దానిని గనుగొన యత్నింపవలయును. ఈపుండుయందు ఉండెడి రక్తమును

యితర చులినములను తుభ్రముగా గడిగివేయవలయును. ఏదైనను దిగుయిక మూర్తిమేయుండియెడల, దానిపైన స్వచ్ఛమయి, కార్బ్యూక్ ఆసిడ్ను మ్రాసి, నానోన, ఆయుడోఫారం, ఆరిఫ్టాల్ మొదలగువానితో బొర్రాపక్ లింట్ను ఉపయోగించి ద్రోవ చేయవలయును. గాయమును చుట్టియుండెడి ప్రదేశము ఉబ్బిగమండిన యెడలను, నొప్పిని గంటలవదలముండిన యెడలను, మిగుల వేడియగు కార్బ్యూక్ వద్దగా నోష్ట్రతో ద్రోవ చేసినయెడల, నొప్పి తగ్గి నావుతీయును. ఈవ్యాధిచే బాధపడెను వానికి గాయములం దండియున్న వీళ్లను చేదించుటవలనను, గాయము ఉండియున్న స్థలము నందలి చుర్రాంగమును దీసివేయుట వలనను, వ్యాధి నివర్తించినట్లు తెలియుచున్నది. ఈవ్యాధియందు రక్తములోని యింజక్త చేయుటకు “అంటిటాక్సిన్” తరగతుల యందు ఒకమందు కనిపెట్టబడినది. ఇది మిగుల సంతుష్టికరములగు ఫలితముల నిచ్చునట్లు తెలియుచున్నది. దీనిని మద్యమనందుగాని వెన్న పాము (సుషుక్తు) నందుగాని యింజక్త చేయుటవలన మిగుల జయప్రదముగ అనిచేయును. ఇండియా దేశమునందు యీవ్యాధి బహు తఱచుగ తటస్థించునుగాన, యీవ్యాధిని వివిధ నాచరణయందు బెట్టుటవలన జాల పాక్షిములను గాపాడవచ్చును. పెద్దమౌతాదులను నిర్భయముగ వాడవచ్చును. ఈవ్యాధియొక్క ఉద్యోతస్థితి మిగుల మారుచుండును. చాల కాలము ఉండియున్న కొలదిని కుదురుటకును యెక్కువ వీలుండును. సాధుగతులయందు శమనమును గలగజేసెడు మందలనిచ్చుట మూలమున మాత్రమే కుదర్చవచ్చును. ఉద్యోత గతులయందు యీవ్యాధి అపాయకకరమయి బాలవాటిలో మరణములే తటస్థించును. నొప్పిని తగ్గించుటకును, ఈడ్పు సర్దుకొనుటకును, క్లోరోడీన్ ను గాని క్లోరల్ హైడ్రేట్ ను గాని యిచ్చును. శరీరబలమును గాపాడుటకు దగిన ద్రవపదార్థముల నిచ్చును, చురుకు పుట్టించుటకు బ్రాంచీని యిచ్చు చుండవలయును. ఈపదార్థములు లోనకు బోవుటకు వీలుండుటకు ఒకప్పుడు ఒకపన్ను నూడబెరకవలసి వచ్చును. ఎంచుగడ్డ దొరికినయెడల, ముక్కలుగాకొట్టి ఒకసంచిలో గాని గుడ్డలోగాని మూటగట్టి, వెన్నముకపైన నుంచవలయును.

పైన చెప్పబడిన మందులు ఉపయోగించుటకు 5 చుక్కలు క్లోరోఫారంను, 20 మినిముల టింక్చర ఫేఫియంతో, ఒకబౌన్సు జాములతో గలిపి నాలుగు గంటల కొకసారి యియ్యవలయును. ఇదియు ఉపయోగించని యెడల, ఒక గ్రెయిను ట్రైప్లాకోక్లోరల్ అఫ్ మార్షియాను, 10 చుక్కలు రెక్టిఫయిడ్ స్పిరిట్యును, ఒకబౌన్సు జలములతో గలిపి నాలుగు గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

పురిటిలోని ఈడ్పువాయువు.

పుట్టిన కరువాక 8 వ దినమునకు 10 వ దినమునకును చుక్క యిచ్చునట్లు వసివిడల వను తటస్థించుట గలదు. బొడ్డుపైన తుభ్రముగా నుంచుటోపుట, వలన నీవ్యాధి తటస్థించును. నిద్రపోకపోవుట, మూలుగుట, ఆవలించుట, ఆదరుట మొదలగు లక్షణములు కనపించును. పాలు సరిగ దాగకపోవుట, చివరకు దవుడలు కరచుకొనిపోవుట, తటస్థించును. వ్యాధి వ్యాపించుచున్న యెడల పెద్దవారలయందు గనబడు లక్షణములే క్రమముగా గన

బడును. ఆచారమును లోని కిన్నుముందుటయందే చికిత్స యిమిడియున్నది. ఆహారమునందు తల్లిపాలుమే మిగుల శ్రేష్ఠము. దన్నుతలు కరకుకొని యున్నయెడల, చెమిచా కాడకు గుడ్డపట్టి పెల్లగా యెడము చేయవలయును. పాలులో మాడనవంతు భాగము తైలవాటరు గలిపి, జాగ్రతగా నిమ్యవలయును. ప్రొంగుటలో గవ్వముగ నున్నయెడల చిప్పచెమిచాలో నగముగాని, అవసరమయితే అంతకు తక్కువనుగాని, యియ్యవలయును. ప్రతిగంటకును ఆహారమును లోని కిన్నుముట్ల ప్రయత్నము చేయవలయును. దినమునకు రెండుపాదాలు వేడి నీళ్ళతో స్నానమును చేయించవలయును. ఈస్నానమును గాలి తగులని ప్రదేశములో చేయించవలయును. ముందుగ అగ్రగ్రయనుక్లోర్ హెడ్జిన్ నున్నూ, ఒక గ్రోయను పొటాసియం బ్రొమైడునున్నూ ఆరద్రాము జలములో గలిపి అయిదు లేక ఆరుగంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

ఉబ్బనము.

ఉబ్బిన వ్యాధులయందు ఊపిరి సంబంధమగు ఆయాసము తెరలు తెరలుగా గలుగు చుండును. ఈ వ్యాధియందు కఫము గూడియుండుటయు, కఫము లేక పోవుటయు గలదు. కఫము లేనిదానికి పొడి ఉబ్బన మందురు. తొమ్ముయొక్క ప్రభాగమునందు క్వాసనాళము (గొంతునీక) రెండు భాగములుగజేలి, రెండువైపుల నుండెడి క్వాకకోశముల లానికీ, తొమ్ము నున్నవి. రెండు భాగములుగా చీలిన యీరెండు నాళములును చిన్ననాళములుగ విభజిం బడి, మరల మరల విభజింపబడుటవలన ఉపకాఖలుగ శీర్షడి; క్వాకకోశముల యొక్క విలములలోనికిని, అందునుండి వెలుగటికిని వాయువును గొనిపోవుచున్నవి. ఈ నాళములన్ని యు గుండ్రీనయిన స్నాయు సంబంధములచే జాట్టబడియుండుటచే, నీస్నాయు బంధములు ముడుచుకొనుట వలన, నీనాళములయొక్క పరిమాణము తగ్గింపబడి, ఉబ్బనమునందలి క్వాససంబంధమగు ఆస్వస్థతావస్థ గలుగుచున్నది. ఈస్నాయు బంధములు ముడుచుకొనట రెండువిధములుగా గలుగవచ్చును. మొదటిది, దుమారము, కాకనంబంధమగు ఘాటుగతి పుష్పదులు, రసవాద సంబంధమగు ఆవిగలు, జంట సంబంధమగు ప్రసరణములు, శీతో వ్రసితీ సంబంధమగు ప్రబలతలు—నీటి కారణమున స్నాయుబంధములు సరాసరిగ ముడుచు కొనజేయుటందురు. రెండవది, కొవ్వు భయము మొదలగు మనోవికారములు, మలబంధము, బలమును, గాత్రభోజనములు; కడుపు ఉబ్బరము, యితర విధములగు ఆజీర్ణివ్యాధి, కీళ్ళకొప్పులతో గూడిన శరీర తత్వము, కొప్పువ్రుడిన గుండెకాయ, వంశపారంపర్యముగా నుండిడి ఉన్న కత్తి—నీటి కారణమున స్నాయు బంధములు జటుమాగ్గముగ ముడుచుకొన జేయబడును. కొందరు మనుష్యులు ఉబ్బనవ్యాధికి వేరీగా లానగుదురు. ఇట్టివాగు సన్నగానుండి గుండ్రని భుజములు గలవారే విదారముతో గూడిన ముఖకళిగ గలిగి సెం పలుకోతునకుపోయి ఎలుగురానిన గొంతుధ్వనిని గలిగి స్వభావసిద్ధముగా కొద్దిదగ్గును గలిగి యుండురు.

ఈ వ్యాధియొక్క తెర సామాన్యముగ రాత్రులయందు వచ్చును. సాధారణముగ రాత్రి 2 గంటలకును 4 గంటలకును మధ్యగా వచ్చును; రాత్రులయందు శరీరమునందలి

రక్తప్రచారము మాంద్యమును వహించి యుండుటవలన రక్తము సూడుకొని యూగుట తటస్థించి, ఊపిరియందలి యిట్టి అస్వస్థతకు దోడ్పాటును గలుగజేయును. అయితే, తెర వచ్చుటకు ముందు గా సామాన్యముగ నీరసము, కడుపు ఉబ్బింపు, తలదాచి, కన్నులు బరువుగా నుండుట, వాంతివచ్చినట్లుండుట, వివర్ణమయిన మూత్రము, నిద్రావృత్తి పోవుట, గుండె కాయయొద్ద యొకవిధముగ బరువు — యివియన్నియుగ నగుటయు. ఒకప్పుడు, వేడి వియు లేక ఆకస్మాత్తుగా నాయాసము వచ్చుటయు గలదు. ఈవాగ్ధి యుక్తి ఉచిత స్థితియందు ఊపిరిగి బీబుట మిగుల అయాసమయి మూలుగుట కూడ సంభవించును. ముఖము కయలినట్లుగాని నీలవర్ణముగాని యుండి, కంఠం పొడుచుకొని పెచ్చినట్లు గానుండి, శరీర ముచల్లని చెవటతోనిండి యుండును. ఈతెర కొన్నినిమిషములు గాని లేక కొన్ని గంటలు గాని నిల్చియుండును. తగ్గుచున్నపుడు మందమయిన కఫముగాని తెరుచుగాని పలువడును; అధికముగ వివరమయిన మూత్రవిసర్జనయు గలుగును. ఈవాగ్ధి ఉచితస్థితియందు నేన పుడు రోగి తగ్గుకొని నీటిగాను మండినయెడల ఆరోగ్యస్థితియందు నుగ్రవచ్చును.

నిద్రాస్థి.

ఈవాగ్ధియందు తెరవచ్చినపుడురోగి మాన్యుడవలయును. అయాసము పుడవనుగా నున్నపుడు చేతులగుల వర్తిల్లొక కుచ్చుండి ముందుగా నొక బల్లపై నుండుటచే ఆనిండు వైన మోచేతులను ఆనుకొని యుడవలయును. వెన్నెముక వెంటి సోప లినిమెంటు లోడను ఓపియం లినిమెంటు లోడను గుడవలయును. ఎన్నొమ్మిది చేతులకువచ్చెడి పెద్ద మర్దరక్తనాళములను బొటనకీళ్ళతో నొక్కిపట్టినయెడల; ఊపిరియందలి అయాసముతగ్గును రక్తప్రస్థిగల మనుష్యులకు ఒక ఔన్న జలములో 20 చుక్కల వైనం ఇవ్వకాను ఇయ్య వలయును. బలహీనులకు టింక్చర్ క్యాంఫర్ కొయును సిగ్నెట్టు అమ్మోనియా ఆలొమీ టిక్ కొయును యిచ్చుట మిగుల సుపయోగకారిగ నుండును. ఆవిశేషమయినగాని, అలస్యమైన గాని, భోజనమున జేసిన పిచ్చుట నీతెర వచ్చినయెడల, ముప్పగ వాంతికార సుపయోగింప వలయును. మలబద్ధమనకు పిచ్చుట తటస్థించినయెడల, సోడా సల్ఫేటు నీయవలయును. ఒక ఆరఔన్న బాగ్దీని నీళ్ళతోగలిపి యిచ్చినయెడల ఒకప్పుడు ఉపశాంతి నిచ్చును. మరి యొకప్పుడు ఘాటయిన కాఫీర చక్కెర పాలు లేకుండ నిచ్చినయెడల పెచ్చుదించును. ఓపియం, బెబెడోనా, పొటాసియం ఆయొడైడ్, టింక్చర్ లావేలియా ఈధరిన్ — ఇయు వాడనగును అయాసమును తగ్గించుటయందు నైట్రోగ్లిసెరిక్ బాగుగ పనిచేయును ఇది 'ట్రైబా యిడ్ (బిళ్ళ) రూపమున అమ్మును. దీనిని ఉపయోగింపవలెను. రసభిద్యమును విరేచనకారిగ నిచ్చి, యొకప్పుడు మేలు గలుగ వచ్చును. క్లోరోఫారంను బహుజాగ్రితతో వాసన జూచుటవలన తచ్చాంతిగ గలుగజేయును. 10 గ్రెయినును ఆలం (పటిక) పొడిని నాలుకపై నుంచినచో నొకప్పుడు ఉచితము నణవచ్చును. 20 గ్రెయినును క్లోరల్ హైడ్రేట్ నిచ్చినను ఒకప్పుడు గుణము వచ్చును. కాని దీనిని బహుజాగ్రితతో నీయవలయును. ఒకటి తరువాత నొకటిని వీటినిన్నిటిని వాడి చూచినయెడల యేదైన ఒకటి ఉపశాంతి గలుగజేయకమావదు. వైద్యుడు తన బుద్ధివిశేషన సుపయోగించి వీటిని వాడవలయును. తెర పూర్తిగా తానవుడు, నల్లఉమ్మెత అకుల పొడితో చుట్టనుజుట్టి గాల్చుట మిగుల ఉపయోగ

ముగ నుండును. ఈ సంబంధముగ చుట్టలు కెమిట్టు పాపులయందు చొరవను. దీనికే ప్రామాణికం అని పేరు.

ఉబ్బునవ్యాధి నీడితూ, యీవ్యాధి ఉద్యుత సితియందు లేనప్పుడు క్విస్, బరన్ (హామస్), నీకోనీస్ (కవముప్పి), ఆర్నెక్ (హామము), బలవర్త కాపిడములుగ బుచ్చుకొనవలయును. పొటాస్ ఆయైడెనున్నా, ఆర్నెక్ యున్న చాలకాలము నేవించినయెడల వ్యాధి అంతరించి పోవచ్చును.

—:—

ఉబ్బునము జ్వరము.

నాణ్యులనందు శేలి సంఘటిచుచుండెడి ఒక విధముగ అణువులు, ఒకవిధముగ శరీర తత్వముగల కొంత బలముగలవారు నాసికా బలములందు బ్రజేరించినప్పుడు, జలుబును, తుమ్ములును పొందెను. నుండు పుష్పడు స్వోమును అంకురించును.

ఈవ్యాధి తటస్థించిన స్థలమును మూర్ఖులవలన ముఖ్యముగ నీవ్యాధి కుదురును. స్థలమును విడిచివెళ్ళుటకు నీలు లేకపోయినయెడల గవహరుల నీయవలయును. ఒక బెన్ను జలములో కందెనుగొయ్యినుండు క్వినీను గలిపి, యందులో 2 ద్రాములను నాసికారంధ్రములలో దినమునకు రెండు సార్లు పిచికారీ చేయవలయును. ఆజీర్ణముగ పదార్థములను భుజింప కూడదు. చలి గాలి శరీరమునకు ప్రోచకుండ విచ్చన గలగజేయు దుస్తులను ధరింపవలయును. ఆలస్యము జేందకుండ బహిఃప్రజేకమునందు శరీర సాధకమును బుచ్చుకొనవలయును. కీళ్ల నొప్పులతో గూడిన శరీరతత్వము యుండినయెడల భోజనమును కూర్చి మిగుల ముఖ్యముగ జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనవలయును.

ఉమ్మి ఊరుట.

మనము భుజించెడి ఆహారపదార్థము చుండలి “స్టార్” సంబంధముగనని చక్కెరగా మార్చబడి శరీరమునది రక్తములో గలియుటకు వీలగునటుల జేయుటకు నోటియందలి మాంసగ్రంథులు, ఉమ్మియనబడు ఒకవిధముగ ద్రవమును స్రవించ జేయుచున్నవి. వ్యాధి యందు యీద్రవము తక్కువ కావచ్చును; లేక యెక్కువయు కావచ్చును. తక్కువ అయినపుడు నోరు ఆరుదల నందియుండును. ఎక్కువ అయినపుడు యీద్రవము నోరు అంత యుండి కాదు. నోటియొక్క వాపుదల యందును, స్వోమునందును, లెబిదోనా యొక్కయు, ప్రామాణికం (ఉమ్మిత్త) యొక్కయు, విషప్రయోగముల యందును, శరీరమునుండి విశేషముగా నీగు స్రవించునపుడు ఆనగా యొక్కవ చుట్టపట్టినపుడును, లేక, అతిమాత్రా వ్యాధి యందును, నీర్లకాలము విరేచనము లగుచుండుటయందును—యీ ఉమ్మి ఊరుట తగ్గియుండును.

నోటియొక్క వాపుదలయందు బారాక్షన్ (వెలిగరము)ను గ్లిజరీనుతో కలిపియు వలయును; లేక గోధుమిచ్చనీళ్లు, త్రాగకుండ, పుక్కిలించి విడువవలయును. అతిమాత్రా వ్యాధియందు మూత్రముగూడ వెలుగుడు చక్కగ గగ్గినపుడు యీ అస్వస్థతగ్గును; అన్ని

కోశ సంబంధమగు అస్వస్థత యుండినయెడల దానిని బాగుజేసిన పిమ్మట యీ ఉమ్మి ఊసు టయొక్క తగ్గదల పోవును.

జలబు చేయుట మూలమునను, నీరసత్వము, ఆక్తిర్తి, పండ్లవచ్చునది, సోదరసము అయిడిక పాగాకు మొదలగు వాటివలనను — యీ మౌన గ్రంథులు ఉమ్మిని నిశేష మగు నొగించును. ఒకానొకప్పుడు నునోద్రోకముల వలనను, బాధలవలనను, గర్భమును దాల్చియున్నపుడును, వెజ్జితనమునందును యిట్లు కలుగును. రసప్రయోగము, వల్లసెనయెడల నాలుకయును ద్రవ్యమును పండ్లవలన నొక్కులువడి పుండ్లు ఆగును. రోగభరితముగ నీ ఉమ్మి ఊసుట దటస్థించినయెడల పది మొదలు పదునైదు దినములవరకును నిలచియుండును; ఒకానొకప్పుడు యొక్కనకాలము వ్యాపించి పుండ్లు నెమ్మదిగా బాగుగుండుము కలదు. పటిక నీళ్ళను పుక్కిలించి వేయవలయును. లేదా, పోద్దవయినను జలమును ననుభాగములుగ గలిపి పుక్కిలించి వేయవలయును. రోగియొక్క బలమును, ద్రినవదాగ్ధములను తేలికగా జీర్ణమగునట్టి ఆహారములను లోన కిమ్మటవలన, గాపాడవలయును. నీరసత్వమువలన అధిక ముగ ఉమ్మిఊసుట దటస్థించినయెడల, క్విసిక్, బిరక్, గలిపిన బలవర్ధకావధములు, నానికీ చ్చుట మంచిది; నోటియందలి పుండ్లకు, మూడుచాగ్గములు పటికపాడిరి ఒక బొన్న జలములో గలిపి పుండ్ల నద్దవలయును. లేదా, యెడలైన ఈకతో ఖనిగర్ వయినను అద్దవలయును. పాదరసము, అయిడిన్ వలనగాక యితరకారణముల వలన అయినయెడల దినమునకు మూడు సార్లు టింక్చరు లెలడోనాను 10 మినిముల చొప్పున నియ్యవలయును. రస సంబంధములగు వాటిని దినుటవలన దటస్థించినయెడల వాటిని నిలుపు చేయవలయును.

ఋతు స్రావము.

స్త్రీలు ఋతుస్రావకాలమగుదు చలిగాలి సోకకుండునటులను, వాయువు నందలి ఆస్మికపు శీతోష్ణ మార్పులకు దగులకుండునటులను, ఆతిశయమగు పరిశోమలకు లోను గా కుండునటులను బహుజాగ్రత్తగా నుండవలయును. ఇందు సంబంధమగు వ్యాధులు యీ క్రింద వివరింపబడియున్నవి.

1. అమెనోరియా (ఋతుస్రావముయొక్క క్షీణత లేక నిలుపుదల).

స్త్రీలకు ఋతుస్రావమేర్పడుట ఇండియాదేశమునందు సామాన్యముగ పడమూ కవ సంవత్సరమునందు ప్రారంభమయి నలుబదియైదవ సంవత్సరమునందు నిలిచి పోవు వున్నది. ఈ క్రింది సందర్భములయందు ఋతుస్రావము నిలిచిపోవచ్చును. (1) గర్భవస్త్రాల మునందును స్తన్యమునెచ్చు కాలమునందును సాధారణముగ నిది నిలిచిపోవును. (2) యుక్త వయసునందు గెనపడక నిలిచిపోవచ్చును. (3) ఋతుస్రావము కొంతకాలముపటికునయి అంతట నిలిచి పోవచ్చును. (4) గర్భాశయముయొక్క వ్యాధియందును, గర్భాశయమునందలి యేడియో వదార్థ అటంకమువలనను, స్రావము కనుపడక పోవచ్చును. (5) వయసు పెల్ల పుడు నిలిచిపోవచ్చును. లేదా పాంథురోగముయొక్క ఫలితముగ సంభవించినను సంభా వింపవచ్చును.

మొదటిది:—గర్భవతియగుట వలన ఋతుస్రావము నిలిచిపోయి, యాడల యొడల కంటకు తక్కిన అక్షయములనుబట్టి దీనిని హల్దికానవచ్చును. అప్పుడు యెమియుచేయు నక్కరలేదు. స్తవ్యమునిచ్చు సమయమున నిల్చిపోవుటయు స్వాభావికమే అయియున్నది గాన, అప్పుడు సేమయు బోసునక్కఱలేదు. స్తవ్యముచ్చినయందును ఋతుస్రావమును దటసించినయెడల, శరీరము రోగునైవచ్చును అను భయము బాలగుగా, స్తవ్యము నిలిపివేయుట కిది సుదయ్యె యున్నది.

రెండవది:—శ్రమమునకు వలయునగు ఋతుస్రావ మగునడక, అలస్యముయినయెడల, అబాలిక పాలిపోయి, బహిష్కరమున నీరసమగును యెడి, స్తవ్యములు పెంపొందక కల్గు, చేతులు, ముఖము డబ్బువల బాపవచ్చును. వచ్చు పెంబడియు నడుచునందును. అప్పుడప్పుడు నొప్పిలు గలుగుటయు, తలనొప్పియు తలమగ తలస్థిమచు, తెలుపు స్రావ మగుటయు, కొద్ది పరిశ్రమ చేయగనే గాని, మనస్సునందు కొద్దికలతి గలుగగనే గాని, గుండె యొక్క అదనుట దట్టస్థియటయు, విశ్రాంతమునోగు డిన్ అకలిపుట్టి సుద్దముక్తులు మందలగు వాటిని నినుటయు దిభిగుడి గలుగుటయు, శోషము అధికమగుటయు —యివి అన్నియు సామాన్యముగ దట్టస్థిమము. ముఖమున ముట్టిములులేచి, యొకానొకప్పుడు అంగుండి ద్రవము వచ్చుటయు, గాకపోవుటయు గలగు. కాల్దేవన దురదతో కూడి గుండెల అకారమును వహించి బొప్పిలు లేచును. శరీరముయొక్క వ్యయము నల్లనై, ఒకప్పుడు పనులు ఆకు పచ్చ కలేసేవల్గుమును వహించియుండును. అకలి తక్కిపోవును. శరముపైన పొట్టు పొంగింభ మును. నూతిగము వలవలలాడును పరిమాణము అధిక మగును. మూత్రమును నిలువజేసినయెడల యుర్రటి గనీ దేరును. హిస్తీకయా లక్షణములను గమనించుచు. మలబద్ధము ముఖ్యముగా నుండును. ఋతుస్రావకాలమందు వచ్చు పైలలను నడుచుచోను విశేషమగు నొప్పి యొడి పొడములు వాచుటయుండు.

ఈ సుదర్శనములందు లోహము గలిగిన రులవర్ణ కౌశలముల నిచ్చుట శ్రేయస్కరము ఋతుస్రావమునకు ముండు నిసములు పూర్వమును ముండునిసములు పిచ్చుటను తప్పతక్కిన కాలమును 3 లేక 4 గ్రాములను సల్పితే అప్ర విశేషము ఒక బొమ్మనలమునో గలిసి దినమునకు ముండుసాను తీయవచ్చును. బహిష్కరణకాలలో సామాన్యము మున శరీర సాధకమును దీసికొనవలయును. తేలికగా జీర్ణచక్రస్థియు బుయు నిచ్చుస్థియు ఆహారమును బుచ్చుకొనవలయును. కాంతయొద్దను సుఖోదము నిచ్చుస్థియు సహవాసమును గలిగి యుండవలయును. రాత్రియొక విస్తారముగ మేల్కొనరాదు. గాఢము మోతురు లేని గదులలో నివసించరాదు. చెన్నీశ్శోక్ స్నానము చేయుటయు మిగుల మంచిది. ఆయాసము లేకుండ ప్రయాణము చేయుటయు సమస్తపు నీళ్లలో స్నానము చేయుటయు ఒకప్పుడు మంచిదిగా నుండును. విశేషము శ్రమముగా నకుటకు తిగు సాధకముల చేయుచుండవలయును. ఋతుస్రావములకు మధ్య కాలమునందు టింక్చర్ ఫ్యూరీయిపెర్ క్లార్ వాడవలయును.

మూడవది:—ఋతుస్రావము కొంతకాలము వరకు అయినట్లుట నిలుపు కావచ్చును. మయనమందు త్వరితముగ ప్రారంభమగునయెడల, ఋతుస్రావము శ్రమయగ శ్రతి వాలుగు వారములనుగ గన్పించుట లేకపోవచ్చును. శరీర మందుల కలవాటు పదియందొక

పోవుటవలనను, మతీయు కొంతకాలము వరకును యే చిన్న కారణమైనను దాని కాటంకము గలంగజేయుట వలనను, ఇట్లు కలుగుచున్నది. తడిలో దిరుగుటవలనను, తడిసేలమిదగుల్గులంబుటవలనను, గాలి ఉదుగ్రతనుగా పీచుచున్నపు డెదుగుగా నిలుచి యుండుటవలనను, అధిక వనఃపరిశ్రమవలనను — ఋతుస్రావము నిలుపు కావచ్చును. ఇది ఋతుస్రావము వైకారణములలో దేనివలననైనను నిలుపు కాబడునపుడు, తలనొప్పి, మిఠిమీసె, పేగులలో యడుగు భాగమునందు నొప్పి—యిది అన్నియు సామాన్యముగా నుండుననుచు.

క్షయ మొదలగు కొన్ని వ్యాధులయందు ఋతుస్రావము నిలుచిపోవుట తటస్థించును గాని, అట్టివి అదృశ్యము పయినవివరింపబడిన లక్షణములను గలిగియుండును. ఇతర వ్యాధులు ఉండుట తటస్థించి వాటి లక్షణములు కనుపట్టుచుండిన యువల, వాటిని చికిత్స జేయుటవలన నీవ్యాధియు కుదిరిక నందగలదు.

సాలవది:—గర్భాశయమునందు యేదైన నష్టమగుట వలన గాని, లేక గర్భాశయము యొక్క అన్యస్థితవలనగాని స్రావము గలుగకపోవుట గలదు. అప్పుడును, చాలావిధ స్త్రీలయందును, అన్యస్థిత పైదవారలయందును గలుగును. పైన వివరింపబడిన చికిత్సలు యుండు యు ఉపయోగింపబడెదల సిగ్గుపడుటచే నన్యస్థితను ద్రుఢపరచుటకు, అన్యస్థిత మిగిలే యిహనుకొనవలయును. ఇట్టివాటికి చికిత్సలు నివృన్యోజనములు గాక, చికిత్సలులేని మాత్రమే సేయించుచుండుటవలన, హానియు కలుగగలదు.

అయిదవది—పుష్కవయమునందు ఋతుస్రావము నిలుపుచుగట పిహుమములు యున్నది. ఇది సుమారు నలుబదియైదవ సంవత్సరమునందు దటస్థించును. ఇది అవసరమందు స్త్రీలకు జుబ్బుచేయుటయు, కలదు. గుండెకోగము ననునదిచి మూర్ఛలు వచ్చుటయు, కాళ్ళు వాచుటయు, రాత్రులు చెమటలు పట్టుటయు, పెరిటిపు దురదలు కలుగుటయు, ముక్కువెంటి రక్తము గారుటయు, మూలశంక పరీవేశించుచుటయు వీటిలో నేటివను గలుగవచ్చును. హిస్టీరియా వ్యాధిసూడ ప్రవేశించుచుటయు వీటిలో నేటివను యొక్కవగా నుండును. కొంచెము పరిశోధన పిమ్మటగాని, తుమ్మినపుడుగాని, దగ్గనపుడుగాని మూత్రమును నిలిపియుంచుట కశక్తవలన కొద్దిగా పెరువడుచుండుటయు కొందరకు సంభవించును. కోపము అధికము కావచ్చును. ఇతర కారణము లేమియు లేకుండెనపుడు, పుష్కవయసునందలి అపస్థయేయని దలుపవచ్చును. విశేషము కృమి మగ చాగులుల క్రద్ధ తీసికొనవలయును. మిక్కిలి కుష్మించియున్న వారలకు సిక్రేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియా యును టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ యును యియ్యవలయును.

2. డిస్ మెనోరియా. (ఋతుస్రావమునందు నొప్పిగలుగుట)

ఈవ్యాధి ఇండియా దేశమునందు మిక్కిలముయి యుండి, గర్భాశయ సమావయన రక్తముకూడుగొని యుండుటను సూచించుచున్నది. పేగులయొక్క అడుగు భాగమునందు నొప్పి అధికముగా నుండును. నొప్పి తీవ్రముగానుండి పొట్టు పొడుచుచుండుట వలన, కోకి కడుపునొప్పిచే బాధనొందుకొని, దొడ్లుయు దటస్థించును. రోగి, హిస్టీరియా వా

ధియందునలే బాధనొందుటయు కలదు. శలక్షణములు ఋతుప్రావణమునకు పూర్వము, ఒకానొకప్పుడు కొన్ని గంటలకును ఒకానొకప్పుడు కొన్ని దినములకును, తటస్థమగును; తరచుగా 2½ గంటలకు పూర్వము, యెక్కువ బాధగానుండును. సాగ్రము ప్రారంభము కాగానే యీ యాత్రము లన్నియు నిలిచిపోవచ్చును. లేదా, ఒకానొకప్పుడు పేనులోని రక్తపు గల్లెలపోడను, పిగవలమిధునుకు శునుకలపోడను ప్రవిచించునపుడు, యీ బాధయు వ్యాధిగోచరము, పానము నిలుచునంతవరకు బాధ యటులనే యుండును. సాగ్రము తక్కువగా నున్నపుడు బాధయు తక్కువగానుండును. ఋతుసాగ్రమునం నిట్టి బాధనొందువారు యితర కాలములందు సామాన్యముగ నజీర్ణవలన బీజింపబడు చుండును. దగ్గ, గుండ, కోగము, నగురుపోటు, తలలొ యెడతెగనిపోటు, ఎర్రనుపార్శ్వమునందు నొప్పి, వాన్పుడు లోయగుభాగమున నొప్పి, వీటిల్లా నేవైననుగూడ దట్టించివచ్చును. సాగ్రము నందు విశేషముగ గలుగుటయు, లేక తెలుపువర్ణము గలిగి యుండుటయు, గూడ దట్టించవచ్చును.

చి కి త్స.

ప్రావణమునకు ముగియు లేక నాలుగుదినములు ముందుగా విరేచనము కాలక్రిమమున యగునటుల బరిచయపలయును. చనిగాలిగాని చెమ్మగాని సోకకుండునటుల జూడవలయును. ఏవిధమయిన ఉద్రేకములను గలుగకుండ నుండవలయును. సోమరిగగాని, నిర్వాగి పారముగగాని యుండకూడదు. అట్లుండినచో యానన శ్రీతియందు మలబద్ధమునకు గారణమయి, యీవాగ్ధి కనుకూలము మనోగతులను నాడిగతులను చేర్చుదును. బాధ ప్రారంభ మయినప్పుడు, వెంటనే వేడినీళ్లు స్నానము చేసినయెడల బాధ నివారణ కావచ్చును. స్నానమయిన పిమ్మట తృణముగా దుడచుకొని, వరుండి, వేడినీళ్లలో సిండిన ప్లాస్త్ గుడ్డలను, పేగులయొక్క అడుగుభాగము వైనయును, రహస్యభాగముల వైనయును తొండి తొండి వేగుచుండవలయును. స్నానము చేయుటకు వింటలే, పోయినయెడల, కేగులయొక్క అడుగుభాగమున కావడమునుగాచి, క్లోరోడిన్ 30 మినిముల మోతాదు నియ్యవలయును. సోమలబాధ ముగిసెడిగాని, హిస్టీరియా సంబంధమగునట్టిగాని లక్షణములు గనుపడిన యెడల ప్విరిట్టు అమోనియా ఆరోమేటిక్ ను యియ్యవలయును. బ్రాండిని చాలవరకు యియ్యకుండుటయే మంచిది. ఇచ్చిసను ఒకసారికంటె నెక్కువ యియ్యరాదు. సోటాసియం బ్రోమైడును పశిగంటకును లేక పశి రెండుగంటలకును ఒకసారి యియ్యవలయును. బ్రాండినిచ్చుటలన గర్భాశయమనందలి రక్తము కూడుకొనుటకు యెక్కువ అనుచును చుప్పు. కొద్ది సరిసంబంధ మైనదిగ నేర్పడి తొండితొండి వచ్చును. దివమసమ ఒకసారిగాని లేక రెండుసార్లుగాని తటస్థపడుచుండిన యెడల క్లోరిన్ గలిపిన మడును యియ్యవలయును; సుస్యకాలముల యందు అలసట నియ్యని వనులు జేయవచ్చును. రాత్రి యెక్కువసేపు మేలు కొనుగూడదు. లేనికగ జీర్ణమున పదార్థములు మాత్రమే బుచ్చుకొను చుండవలయును. నిద్రించు గడియందు గాని ధారాళముగ ప్రసరించుచుండవలయును.

క్లోరిన్ అమ్మోనియా క్లోరోమేటిక్ వనిచేయును, నొప్పి తగ్గుటకయి రెండు గంటలకోక చర్యాయము, 7 లేక 8 సారులనరకును, క్లోరిన్ కేజేట్ ఇండికా 4 ముగి.

లను కొంచెము సీర్బింగ్ చేసి యియ్యవలయును. మధ్యకాలములయందు ఉపయోగించుటకు, బలవర్ధకావధము నీ నిర్భయవలయును. విశేషమునకు బోషధము అవసరము లేక పోయిన యెడల, యీ బోషధము సందలి పశ్చిమీ ఆఫ్ సోడాను తగ్గవలయును. ఇందలి ఐరన్ (లోహము) యేదైన దుర్బలములగు ననుపచిన్య యెడల యీముద్రను నెరిపిచేసి, నిరవశ్యమై ఆయెడడే 10 చుక్కలును, లెక్కర్ ఆల్బిని కాలేస్ నీ చుక్కలును ఒక జోన్స్ జలములో కలిపి నినునకు 3 సార్లులు భుజ్యుకొనవలయును. ఆల్బిని కాలేస్ (పానాము) ను కొంతకాలము పుచ్చుకొనునదికే చేగలయందు నొప్పులును కండ్లునుగదలును నీర్మకాగటయు కండ్లయందు రక్తపు గిరలు కనబడుటయు, కనుకావలసిన నిరవశ్యమందును యేర్పడును. ఈ లక్షణములనుబట్టి మందు పనిచేయుచున్నదని తెలిసికొనవచ్చును.

(2) మెనోరేజియా (ఋతుస్రావమునగు అధికస్రావముగటగాని తలచుగ నగుటగాని, లేక అధిక కాలము వలకు వగుటగాని)

ఋతుస్రావము సామాన్యముగ పౌలి 28 దినములకును తలగ్గవగును. ప్రాచము సాధారణముగ మూడు దినములవల కగుచుండును. మూడు నాలుగు దినముల ద్వైవము నట్లమగును. దీనికి ఒకానొకప్పుడు భిన్నముగ జరుగవచ్చునుగాని, సామాన్యముగ నీతలలకు భేదింబియున్నపుడు వ్యాధి ప్రారంభమయినదని మనము తలపవచ్చును. ఎక్కువ అగు నట్టియు, తలచుగ నగునట్టియు, దీర్ఘకాలము వ్యాపించునట్టియు, ఋతుస్రావము, కరీరము నందు రక్తమధిక ముండుటవలనను రావచ్చును. లేదా, నీరసస్థితి వలనను రావచ్చును. రక్తమధికముగ నుండుటవలన యెనవో చలి, తలయందును నడుముయందును నొప్పి, ముఖము యొర్రవారట, జ్వరము—యీ లక్షణములతో గూడియుండును. నీరసమువల్లనెనవో, పాలి పోవుట, నీరసమయిన నాడి, నిద్రాస్థితి, కడుపుబ్బరము, విశేషము కల్గియుగా గాక పోవుట, పిత్త, నడుము తొడలు వీటియందు పోట్లు పొడుచుట—యీ లక్షణములతో గూడియుండును. అధికముగా ప్రవృత్తినిచ్చుటవలనగాని తలచుగా గర్భవతియగుటవలనగాని, అధిక స్రావముగట కొందఱకు తటస్థించును. గర్భిణినిగురించి అనుమానముగానున్నపుడు, గర్భస్రావమయినదియు, ఋతుస్రావసంబంధమగు వ్యాధియయినదియు, తెలియుట కష్టము. మెత్తని పరుపులపై బరుకుండుటయు, యెక్కువగా నిల్చుండుటయు, నడుమునుండి బరువైన బట్టలు వేలెడుచుండుటయు, వెచ్చనయిన గదులయందు నిరసించుటయు—యీ వ్యాధిని అనుభవించును.

చికిత్స.

ఋతుస్రావమధికముగ నగు అస్థివ్యాధివలనయందును సంపూర్ణముగ విశ్రాంతిని దీసి కొనుచు, వడంబియింపవలయును. ఉద్రేకములయందు, తేదీగుడ్డలనుగాని, మంచుచేసి మున్నగుంచునిగాని, చేగులయొక్క అడుగుభాగముయొక్క వైపును టోచువులనున్నవలెగా ఉంచవలయును. రక్తమధికముగా నుండియెడల, ముఖము యొగ్గివారి, ప్రావణ్యది అధికముగా నుండును. అట్టిస్థితియందు ఆహారమునుతగ్గించి, తేలికతో జీర్ణముగ పదార్థములను, పాలను, బుచ్చుకొనుచు సామాన్యజలము, సోడావాటరు, నిమ్మరసము చక్కెర గలిపిననీళ్ళను త్రాగ

పలయును. నీరసస్థిగియందుండిన యెడల, భోజనపదార్థముల సక్కువ కరిచి నివృత్తమును మిగుల ఉద్రేక స్థితియందుండిన నేతస్ప, నిస్త్రాణము నిలుపుచేయుటకు బ్రాచీన్ మెదలగు పదార్థముల నివృత్తము. ఏలనగా, బ్రాచీన్ నిర్ముటవలన రక్తప్రచార మధికమయినావ మను అధికము జేయును. పరుండి విస్తృతి దీనికొనుటవలననే నిస్త్రాణతగ్గును. లావలికిడిసి కొను ప్రతిపన్నువును. చల్లగా నుండవలయును. స్త్రావమునున్నపుడు వేడిపదార్థ ములను బుచ్చుకొనెనయెడల రక్తప్రచారము సధికముచేసి, స్త్రావమును అధికమగునట్లు జేయును. విషవాయుసంబంధమును వ్యాధియందుననే తప్ప క్విస్కను ఉపయోగింప మాడదు. కాజము అస్వస్థతయందుండి, విరేచన బద్ధమును గలుగును. విరేచనబద్ధమునకు, దాహ్యశరీరులైనయెడల సల్ఫర్ ఆఫ్ సోడాను, బుహిమైనయెడల చిట్టాముదముచున్న యియ్యలయ్యును. కదలుటవలన ప్రావము తిరిగి కాకుండినయెడల, రోగి గాలిలో కొద్దిగా తిరుగుటకు నారంభింపవచ్చును. మధ్యకాలములోందు పరుండగదిలోనికి పరిశుభ్రమయిన గాలియు, వెలుతురును, వచ్చుచుండునట్లు బాగ్రతి పడవలయును. పరుండునల్లము మెత్తగానుండక గట్టిగా నుండవలయును. కట్టుబట్టులు తిరువుగాకుండ నుండవలయును. విరేచనబద్ధము లేకుండ కాల విరేచన మగుచుండునట్లు బాగ్రతిపడవలయును.

(4) లుకోరియా (బుగుస్త్రావము తెలుపు వర్ణముగ నుండుట).

ఈ వ్యాధియందు రహస్యస్థలమునుండి తెల్లవైనట్టియు కొంచెము పసుపురక్తము గలిగినట్టియు, ద్రవపదార్థము కలుపబడియుండును. ప్రతిదినమును కొన్ని బొప్పిల పరిమాణము పరిమాణము ద్రవస్వభావమునుండును. ఇది యొకానొకప్పుడు కోడిగొడ్డు చొనవలె నుండును. అట్టిత ప్రవేశించి విరేచనబద్ధము ఉండును. గుండెలోగలను, తలతిరుగుట, నిస్త్రాణ సరములు నొప్పులు, కడుపు ఉబ్బరము, వెన్నునొప్పి, శరీరము తెల్లబారట, హిస్టేరియా లక్షణములు — వీటి అన్నిటికో నొకానొకప్పుడు కలిసియుండును.

రక్తహీనత, కర్ణమును యునుస్త్రావముగట, గర్భాశయముయొక్క వాపుడల లేక లొలగియుండుట, తలచుగ పిల్లల గనుట, శరీరసాధకము లేకపోవుట, సుఖమరిజీవనము, శరీరముయొక్క బలహీనతకు కారణములగు నత్యవస్థలు, యీ వ్యాధికి కారణములగుచున్నవి.

చి క త్స

బుగుస్త్రావము నందలి అస్వస్థతకు దగుచికిత్స చేయవలయును. గర్భాశయముయొక్క వ్యాధి యేర్పడనయందుండినయెడల అందులకు సాధకమును చేయవలయును. ఇట్టి కారణము లేనియుగాన, శరీరమునందలి బహిరంత సమసరించి యీ వ్యాధి ఏర్పడినదని నమ్మకము కలిగినయెడల, అనోగ్యమునకు వలయుచున్న జేయును, ఆహారమునుగూర్చియు, మేగుల యొక్క స్వస్థతనుగూర్చియు క్రమమగు నడుపాయమలను చేసి, సరియగు శరీరసాధకము నకుమాడ దగు యోర్నాటులనుజేసి, స్థలమును మార్పులకు విలయింపదో నట్లు జేయవలయును. రోగి గర్భిణి దానియొక్క పుడు తప్ప చచ్చి పోవుచున్నదని చేయుటయు, అధమభయము వెన్నెముక కంటికి చచ్చి పోవుచుండుట యయినను, జేయవలయును. స్త్రావమును నిలుపు జేయుటయు పరిశుభ్ర లోపను బొష్యయోగమును విచిత్ర జేయవలయును. పరిశుభ్ర

ఉపయోగించకపోయిన యెడల యీ క్రింది పోషకయోగ పరిశ్రామం లోనుగా వేచిచికారీ చేయవలయును.

సల్ఫేట్ ఆఫ్ జింక్ - గ్రా|| 2(1)

ట్రీక్చర్ ఆఫ్ ఓపియం - 2(1) 3(1)

గోరువెచ్చనిశీర్ష - జొన్నులు 3

లోనకు ఐదను అవకాశములు; మిసర్లో ఆసీద్య; కాక పరిణామమును బూచర్ల కామ్యములు యియ్యవలయును.

ఎండబెట్టు

ఎండబెట్టవలసిన గలిగెడు వ్యాధి మూడువర్గాలుగా నున్నది. (1) నిష్క్రాంతి లేక మూర్ఛ (2) అంగవికృతియోగము (3) ఎండవలని జ్వరము (తాపవ్యగ్రము).

అధిక సూర్యతపమువలన మెదడుయందు గలిగెడి అస్వస్థతవలన నీ వ్యాధిగులువంద విండుచున్నవి. అధికమగు నెండలో దిరుగుటవలనను, యీవ్యాధి గావచ్చును. లేక నీడను ఉండినను, ఎండవేడిమి వలన వాయువునందు గలిగెడి తీక్షణతవలనను, యీవ్యాధి తలపింపవచ్చును. ఈ వ్యాధివచ్చుటకు యీ క్రింది కారణములు కారణములు చేయవచ్చును. — అలసట, మరొక్కోమము, మసూవిచారము, జననస్మృద్ధిమగు గృహములలో నివసించుట, పరిశుభ్రమైన గాలి వెలుతురు రాని యిండ్లనుండుట, కఠియైన నీటివలన తీగవలన, మలబద్ధము, మత్తుద్రవముల సహమితము గా దాగుట.

లక్షణములు.

ఎండబెట్టవలసిన నీ వ్యాధి సంభవించుటకు పూర్వము రోగికి కోపము అధికమగుట తాపము జనించుట, తలనొప్పిగలుగుట — యీ లక్షణములు గమనమును. ఆకలి మందగించి మలబద్ధమౌగూడి, వాంతివచ్చుటలుండుటయు గలదు. పిత్తగుల్మము సంభవించుట, చర్మము వేడిగను పొడిగను నుండుటయు, కొద్దిగా తలతిరుగుటయు, కొద్దిగా మూత్రమును విసర్జించుచుండుటయు తలచుగా మూత్రమును విసర్జించుటయు వచ్చులని యుంచుటయు — గలుగవచ్చును. భావముల యందు క్రమగలుగుటయు, దృష్టియందును భ్రమతగలుగుటయు, ఎక్కువగా మాట్లాడుటయు, తెరలు తెరలుగా నవ్వుటయు, యేడ్పుటయు తలపింపవచ్చును. ఈ లక్షణములు వ్యాధి పూర్వక పరిణామించక పూర్వము కొన్ని గంటలకుగాని కొన్నిదినములకుగాని, కనుపడినను కనుపడవచ్చును. లేదా; లేకపోవచ్చును, అధిక అతకమునకు లోనయిన జనులయందు తైలక్షణము లేమయిన గమనమైన యిప్పుడు, యీ క్రింది ఉపచారములను వెంటనే జేయవలయును. — గాలి బాగుగా తగులునట్లు చేయుట, నీడను బ్రత్యేకపెట్టి చల్లగా నుండునట్లు చేయుట, చల్లనిశీర్ష విక్కుటచుగ దాగునట్లు చేయుట, విశేషముగా తడిగుడ్డతో గుడుపుట, వీలయితే స్నానము చేయించుట.

విశేషమగుటకు సాధ్యము చేయుట సామాన్యముగ నవసరమయి యుండును. తాడుపెద్ద చెమిచాలతో పిల్చేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను ఒక అంటునకు బలముతో గలిపి పూరి నెండుగంటలకు నియ్యవలయును.

(1) నిస్త్రాణ లేక మూర్ఖ.

పైచెప్పబడిన లక్షణములు ఒకనొకప్పుడు కలసియు ఒకనొకప్పుడు లేకయు— నిస్త్రాణ; తలదడుగుట; వణకుట; కాళ్లు చేతులు చల్లబడుట; తలచుగ మూత్ర విస్తరణము చేయ నిచ్చుగలిగి యుండుట; ఒకనొకప్పుడు మర్మగ పడియుండుట; యీ గుణములతో మూర్ఖ స్వరూపుడును. ముఖము పాలిపోయి శరీరముయొక్క ఉపరి భాగమంత యు చల్ల గావండి తలచుగ చేయబడక పడినయుండును. డిక్షిరి ఆయాసముతోనూడి, గుండెయొక్కయు నాడియొక్కయు నడక బలహీనతను వహించి, కనుగుడ్లు విస్తరింప జేయబడి, కొంచెమెచ్చు తక్కువగ స్మారకము తప్పియుండును

(2) అంగవికృతి రోగము.

పైచెప్పబడిన నిస్త్రాణ లేక మూర్ఖస్థితియండి కొద్దినిమిషములకే గాని లేక కొద్ది గంటలకుగాని ఉక్కిరిబిక్కిరి జెరిగి అంగవికృతిలోగ మేర్పడవచ్చును. ఇందులకు యీది గుప్త క్రొత్తలక్షణము లేవుడును — ముఖము యెర్రవారుట; శరీరమంతయును తలయును వడియెక్కుట; కంఠము రక్త పూరితములగుట, నాడి బలమైనట్టియు తొందర గలిగినట్టియు నడకను గలిగి యుండుట, గుండెలో నూడినట్టిగాని, క్రియముడప్పి ధ్వనిచున్నట్టిగాని, అసం పూరియైనట్టిగాని, డిక్షిరి గలిగి కానరాకములు అస్పృశ్యత నందియున్నట్లు పలియుజేయుట. కొద్దికాలములోనే స్మారకము తప్పిపోయి అపయనములు కొరకలు బోవుటయు దటస్థించును. ఇట్టి సందర్భములలో నొక పడిపోవును. ఒకనొకప్పుడు కాళ్లు చేతులు యీడ్చుకొనుట యుండునుగాని, సామాన్యముగ నిక కదలుట తటస్థించును. ఈవ్యాధి ఒకనొకప్పుడు తలకు వ్యాపించుటచేతను, రెండు విఘ్నములుగ పరిణమించి, మరణమును దటస్థింప జేయును.

చి కి త్న.

వ్యాధి యేగతియం నుండి యున్నదియు ముందుగ గమనింపవలయును. రోగి నిస్త్రాణ జలించి, తలదడుగును, వణకును, చల్లగనుండినయెడల, బీల్చున బయడబెట్టి, కాళ్లను చేతులను రుద్ది దుస్తులను వదులుజేసి, కొంచెము బాగొందియును కొంచెము జలమును గలిపి యియ్య వలయును. ఈ సీతినుండి ఉక్కిరిబిక్కిరి మారుచుండుట బహుశాగ్రతగా గనిపెట్టి చని చేయవలయును. ముఖము యెర్రవారుట, శరీరవడిమి హెచ్చుట, కంఠ రక్తపూరితములై యుండుట, నాడియొక్క చురుకుదనము హెచ్చుట — యీ లక్షణములు గమనించినయెడల బాగొందిచ్చుట నిలిపివేసి, తలచున చల్లనిదిట్లు పోయును. చుట్టుపట్ల గాలియంతయు చల్లన నుడులు విస్తరవలయును. రోగి మింగి గలిగినయెడల, ఒకబొమ్మ సోడానల్నేటును ముడు బొమ్మల జలములలో గలిపి వెంటనే విరేచన మగుటకు, ముందుగా నీయవలయును. కి లేక 10 గ్రెయినుల స్క్విచ్చును పీచోతో గలిపిగాని లేక విడిగాగాని యియ్యవలయును. కాళ్లను చేతులను రుద్దవలయును. ముస్తద్దు (ఆన) పిండిని మెడమీద పట్టిగా చేయవలయును. రోగిని వ్యవస్థిత్రలో స్నానమును చేయించ వచ్చును.

కృమము దప్పినట్టియు వ్యనితోగూడినట్టియు ఆయాసమునకును శాసంపూర్తి యయినట్టియు, ఊపిరితోగూడియుండుట వలన శ్వాసతోకములు అస్వస్థుల నయియున్నట్లు తెలియబడినచో ఎరురామ్మత్తవ పుష్పవస్త్రము పట్టి పేరువలయును. తలయును ఎరురామ్మత్తునుగూడ నస్వస్థత నందుట సామాన్యముగ తటస్థించుచుండును, ఇట్లు రోగిని నస్వస్థత జేందియున్నట్లు దోషినయెడల మెడమీదను ఎరురామ్మత్తు మోదను గూడ వస్త్రము పట్టెలను వేయవలయును.

అన్నితంగతుల ఎండ్ దెబ్బలయందును రోగి చల్లదిరిల్లియు యున్న వగ శ్రాగమండ వలయును ఇట్లు చేయుటవలన చేతులు అధికమగుటయుగా శరీరమునకు చల్లదనమను గూడ నిచ్చును.

రోగి అదివరకు సుఖసంబంధముగ వ్యాధులచే బీజించుట జరుగజేసినచో పొటాని యం అయొడెడ్ను సాధ్యమయినంత త్వరలో నియ్యవలయును. ఈసమయమునకు సోగమువలన మెదడునందలి రక్తనాళములు నూర్చాకపమునకు జరిగిన భాననకు ప్రతిబంధముండుట దుర్విద్య యును. పొటానియం అయొడెడ్ను యిచ్చుట వలన నీలూపము పుష్కలమగును.

ఈ వ్యాధియొడి స్వస్థతనందుట బహు శీఘ్రముగ గలిగినప్పుడు, సామాన్యముగ జ్వరమును, ఆయాసముతోగూడిన ఊపిరి బీజింపునయును, శాన్సి దినములవరకు శ్వాసగోచము తలనొప్పి; విరేచనముగ; యొకానొకప్పుడు పక్షవాతమును గూడ గలుగును. ఇది పుష్కల మెడడు చేడి వెజ్జితనము బుట్టవచ్చును. పూర్తియైన వ్యస్థతను జేందియున్నప్పుడిది యీ రోగి యిమిదెన్నడును ఎండచెప్పుకు నిలవ జాలదు.

ఎండచెప్ప సంబధముగ అన్ని వ్యాధులయందును త్వరముగ బనిచేయు విరేచన కారి నిచ్చుట మిగుల ముఖ్యముగాన యీ విషయమున గమనించవలయును.

(3) ఎండచెప్పవలన జ్వరము (తాపజ్వరము.)

ఎండచెప్పవలన జ్వరము యొకానొకప్పుడు కొద్దిగ రావచ్చును; మరియు పుష్కల మిగుల ఉద్రోతముగ రావచ్చును. దినమునందు బనిచేయుటలో ముగ్యాతమునకు తాబ డిన చాల జరులు రాత్రియందు శ్వాసతబొంది, ఆయనుగురించి లక్ష్యము చేయకుండురు. కొన్నిగంటలలో వది అంతరించివాపును. తేక రాత్రిఅంతయు నిద్రాపట్టక; అట్టి నిద్రాపన ములు తటస్థించినను దటస్థింపవచ్చును. ఇదియే నిస్త్రాని బలహీనత ఆలంబింపావుట మొదలగువాటిలో బెట్టి జ్వరమును బుట్టింప వచ్చును. ఇది యిగువదినాలుగు గంటలలో తగ్గవచ్చును. తేక తాపజ్వరముకింది బెట్టవచ్చును. ఈవ్యాధియుక్క ప్రారంభమునకుముందు కొంచెము చలి పుట్టినను బుట్టవచ్చును. శరీరముయొక్క చేడిమి అధికముగ హెచ్చి, దాహ మతిశయము, నాలుక పిడచగట్టి యొర్రానై అరుదలనంది; నాడి బలముగాను, బహు మరు కుగాను ఉండును. ఈవ్యాధి ఆరువది గంటలవరకు వ్యాపించును. ఈలోగా మిదురక పో యిన యెడల, స్కార్లకముదప్పి మరణము సంభవించును. శరీరముయొక్క చేడిమి 108 డిగ్రీలవరకు వ్యాపించును. ఒకానొకప్పుడు 108 డిగ్రీలుకూడ చాటి 112 డిగ్రీలవ లో పుగ నుండవచ్చును. తక్షణమే ఆచిదలని నీళ్ళలో స్నానము చేయించినచో దప్పు యొక అరగంటలో ధన ప్రాణముపొవుట తటస్థించును.

చికిత్స.

కొద్దికొద్ది నందుచున్న యెడల గోరువెచ్చనిగాని కొంచెము చల్లనిగాని సల్ఫూర్ సాక్షి నహుచేసి, విశ్రాంతిదీసికొని, వినుకొనుటయును నవ్వనంత వచ్చును; విశేషనల్లముగ నుండిన విశేషసాధకమును జేయవలయును. అదుర్తముగ తాపజ్వరమయినయెడల, తలకు మంచునగట్టి, షీట్టిగదిలో నున్నగలిగి, విశ్రాంతి నిచ్చుచుండ వలయును. విశేషవకాయల దలచుల నిచ్చుచుండవలయును. వ్యాధి సుపాండి అధిమరు నివ్రాణ గలిగినయెడల బ్రాందీ యను నీరును గలిపి యిచ్చువలయును. బలమునిచ్చు ద్రవపదార్థములను గూడలోనికిచ్చు చుండవలయును.

ఎమెరోము నొప్పి.

హృదయస్థానములయందు విశేషముగ పోటువల్లము యొక్క పగుల తిడి వలనను గొప్పదు నీ ఎమెరోమునొప్పి మఖ్యముగ ఉద్గీకమువలనగాని పరిశ్రమ కలనగాని రక్తనాళ ములయందలి రక్తప్రవాహమునకు తొందరి కలుగ జేయబడుటచే జేపడుచున్నది. సంతోషము; ప్రేమ; జాలి—ఆత్యధికయి బాధతో నుండిన నేపప్పు రక్తనాళములయందు మార్పు నందింపజాలవు. ఆత్మత; వివారము; భయము; కోపము యివి యీవ్యాధికి దోడ్పడును. హృదయోత్పాదము; మేడపిల్లల పెన్నట్లు; నీర్లను బరువు పెట్టుట; ప్రాసనందు కొనుటకు త్వరగా బరుగెత్తిపోవుట—యిట్టి పరిశ్రమలు యీవ్యాధికి కారణభూతములు కావచ్చును.

దేహముయొక్క ఆరోగ్యస్థితియందు గుండకాయయందలి యెత్తిడివలన రక్తనాళ ములయొక్క పరిమాణము నిర్ణయింపబడుటయు, రక్తనాళములయందలి యెత్తిడి వలన గుండెయొక్క కొట్టుకొనుటయందలి గతులు నిర్ణయింపబడుటయు, యెట్లుడుదన్నవి. ఎదు రొమ్ము నొప్పియందు రక్తనాళములకును హృదయమునకును యుండెడి యీ సంబంధము నకు కలత గలుగుచున్నది. భోజనము చేసిన మెటనే రక్తనాళముల యందలి యెత్తిడి అధికముగ నుండునుగాన నాశయమున పరిశ్రమను దీసికొనిన యెడల నీవ్యాధికి మిగుల సహాయభూతముగ నుండును. చుట్టును గాల్చుటయు విశేషముగ కాఫీయును తేయాకు నీళ్లును త్రాగుటయును ఒకానొకప్పుడు యీవ్యాధి తటస్థించవచ్చును. ఈవ్యాధి యొక సారి వచ్చినట్లుట మరలి యింకొకప్పుడు వచ్చుటకు శరీరమున దుర్బుక్తత బ్రచీరించి యుండును. కొన్ని నెలలకు వచ్చినను రావచ్చును. లేక కొన్ని సంవత్సరములకు వచ్చినను రావచ్చును. ఈ వ్యాధియొక్క మొదటి పాటునందు సామాన్యముగ మరేమియు నపాయము గలుగదు. కాని హృదయోపయవమునందు నిరవగుమార్పు గలిగినచోడట తెర వచ్చుట ప్రారంభమయిన యెడల ప్రాణాపాయము గలుగవచ్చును.

చికిత్స.

ఈ వ్యాధి కలకాటుకదీనవారు భోజనమయిన పప్పు, ఒక అంగుల విశ్రాంతి దీసి కొనవలయును. శరీరమునకుగాని మనసునకుగాని అత్యుద్గీకము గలుగవలకునట్లుల సాగ్రిత బచ్చుకొనవలయును. ఈ వ్యాధియందలి గహస్థము రక్తనాళములయందలి ఒత్తిడిని తగ్గించుటకు మందుల నొప్పును నులు యొన్నది. నైట్రిక్ ఆసిడ్ 'ట్రెట్మెంటు' (విప్ప) పరిచేయునుగాన

ని వాడవలయును. పొటాస్ ప్లొక్సిడేస్ అంత పనిచేయును. అయితే ప్లొక్సిడేస్ ను వాడన జాచుటవలన బాధకు పెంటనే ఉపకాంతిగలుగును. కడుపు ఉబ్బరము ఉండియుండిన యెడల కార్బినేటివ్ మిక్స్చర్ నీయవలయును. ఉష్ణజలము పోషణయున్న సీసాలకు బిరడాలు వేసి హృదయభాగముల యందు మెదలిన పాదముల మీద చేతుల మీద భామలు మంచిది. తెర రా వేగమే బాగోడిని నీళ్లతో గలిపియిచ్చి అజీర్ణమయిన నుండినయెడల అందులకుగు బౌషధసేవ జేయవలయును.

ఏనుగుకాలు.

కొందరకు కాలు మిక్కుటముగ వాచి ఏనుగుయొక్క కాలువలె ఉండుటవలన నీ వ్యాధికి ఏనుగుకాలు అనివాడుమరు చేతికిమాడ నిదేవిధమగు వ్యాధికొందరకు గలుగును. అస్వస్థతనందిన అశయవమునందలి మేదము పారడి నాళములు విస్తరించుట వలన అందలిద్రవము పారకుండ నడ్డుపడుట వలనను యీ వ్యాధి పొధించుచున్నది. ఈ నాళముల విధమగు హాని యొకవిధమగు పురుగుచే గలుగుచున్నది. ఈ పురుగుయందలి అడుకొలిపురుగు మంచినీళ్ల ద్వారా శరీరమందుకొచ్చి మేదము పారడి గ్రంథియందుగాని నాళమునందుగాని ప్రవేశించి అచ్చట గ్రంథము జీవముతో నుండిన బురుగులను పట్టుచున్నది. నీటివలన జ్వరమువలన చి ఒక అవయవమునందు కొద్దియో గొప్పయో బాధతో గూడి అందలి మేదము పారడి కొన్నిసార్లు ములు విస్తరింపజేయుబడును. ఉద్యుతగతి పెంటనే తగిపోయి అదేలక్షణములతో నుగిలి వచ్చును. అస్వస్థతనందిన అవయవము లాపునందుచుండును. చెన్నపురి రాజధాని యందు నీ వ్యాధి చెన్న పట్టమునందును విశాఖపట్టమునందును మిక్కుటముగ నున్నది. సోగియొక్క రక్తమునుండి చిన్నపురుగులు దోమలచే నెత్తుకొనిపోవడి నీటయందు గలుపబడును. కాని మిక్కిలి లాడగుటవలనను బరువెక్కుటవలనను నడచుటయందు రోగికి కష్టముగా నుండును. కట్టుకట్టినయెడల నడచుటకు వీలు గానుండును. అయాభాగములయందు దోశానొచ్చును కంతులు లేరును. చుట్టూపట్ల దోమరాండుకుండు నట్లు జేసికొనవలయును. అపరిమిత్తమునసరిటిని త్రాగమాడదు. ఈ వ్యాధికి మందు యేమియు ఉపయోగములేదు. చర్మము రుమ్మిదడి కంది నట్లుండి వాచినయెడల ఒక బౌస్నజలములో 5 గ్రేయిసుల పిల్లర్ పై పోటునుగలిపిపయిన రాయవలయును. 5 గ్రేయిసుల సల్ఫేటు ఆఫ్ బరనును ఒక బౌస్న ఉష్ణజలములో గలిపి అందులో దడిపిన గుడ్డను పయనగట్టినను ఉపకాంతి గలుగవచ్చును. చర్మము మంత్ర పవిత్ర పడిన చోట్ల కుళ్లముగా నుంచవలయును. లేనిచో కురుపులు యేర్పడవచ్చును. పాపులీండిన పేర్ల సంపద కురుపులు యేర్పడవచ్చును. గాన జింకా ఆక సైడ్ పొడిని జల్లుటవలన యీ కురుపులు యేర్పడకుండును.

ఏనుగుగజ్జి(Eczema)

ఏనుగుగజ్జి అనేకతరగతులుగా తటస్థమగును. ఈ వ్యాధియందు చర్మము యుర్రైన, ఆచచ్చలపట్ల వెడల్పుయిన భాగములయందు ఉన్నతములయిన చిన్న పొక్కులు లేచును. ఈ వ్యాధి పామాన్యముగ చంకయందును గజ్జయందును బుట్టును. ఈ పొక్కులలోని ద్రవము త్వరతోనే తెల్లగాను మట్టిగాను మార్పబడి, నాలుగయిదిపములలో పొక్కులు తగిలి

ద్రవము వెలువడి పల్లవైవర్ణ్యము కొద్దిగా పసుపును గలిగి అకుపచ్చనివర్ణమును వహించి నట్టియు పక్కులు కట్టినను ఈ అస్వస్థత భాగమునకు జాట్టి కొత్తపాక్కులు లేచి, పెనుక భాగము పచ్చిగోళముడగును. ఈవ్యాధి ఒకవారములలో నయమైనను గావచ్చును. ఒకప్పుడు కొన్ని నెలలయినను పట్టవచ్చును. సగ్గ కాలము వ్యాపించునపుడు పక్కులు ఊడిపోయి, అగ్ధలము పచ్చిగా నుండినను ఉండును. సో పక్కులు పగులుటవలన సీస్యనంటి ద్వారము వచ్చును. పిల్లలకు పండువచ్చునపుడు చెవులపెనుక నీవ్యాధి తటస్థింపవచ్చును. స్త్రీలయందు ఋతుస్రావ సూబంధముగ వ్యాధిలతోగూడ నీవ్యాధికలుగవచ్చును. ఒకప్పుడు పుష్కము నిచ్చు స్త్రీలయొక్క పుష్కగ్రంథులయందును నీవ్యాధి కలుగునుగూరు. చాలవారిలో నజీర్ జలన వచ్చును. ఈవ్యాధి అంధరించుటకు శరీరమునం దుద్యోగిత గలిగినపుడు బట్టయొక్క గాఢివలన నీవ్యాధికి స్థానమేర్పడును. చక్కెర, పిండి మొదలగు పాడి పదార్థముల దలచుక ముట్టుకొనుచుండినయెడల నొకప్పుడు యీవ్యాధి యేర్పడును. అట్టివారియందు ఆ కనలను మునినయెడల వ్యాధి అంతరించిపోవును. ఋతుస్రావ, వ్యాధిలతో గూడియుండిన యెడల నావ్యాధికి కగు జీకేన్ జేసి యెడల ఏనుగుగట్టి పోవును. ఈవ్యాధియందు చక్కము పరి పాడి గానన్నయెడల 5 గ్రాయిగుల బోరిక్ ఆసిడ్ను, 5 గ్రాయిగుల జింకు ఆక్సైడును 6 గ్రాయిగుల ఆరిస్టోల్ను, ఒకబొమ్మ వాగజీస్లో గలిపి రాయవలయును. రసి గారుచున్నయెడల, ఆరిస్టోల్ను గాని జింక్ ఆక్సైడ్నుగాని పైనదట్టముగ జల్లవలయును. దీనికైన లింబునువేసి గట్టజేయును. రసివలన లింబు తడిసినయెడల ఆభాగమంజయు కుభ్రముగాగడిగి తిరిగి డ్రైవచేయవలయును. ఆన్ని విషయములందును విశేషము క్రమముగా నగుటకు జాగ్రత్త పుచ్చుకొనవలయును. కీర్తికాష్ణలతోగూడిన ఏనుగుగట్టి ఆయన యెడల భోజనపదార్థములయందు బహుజాగ్రత్తగ నుండవలయును. పాలు కాకపదార్థములు—భుజింపవచ్చును. చక్కెర గలిగి యుండిన పదార్థములను త్యజింపవలయును.

ఒడలోగలుగు కడుపుదివ్వు.

ఒడలో ప్రియాణము జేయునపుడు కొందఱకు గడుపులోదిగ్విప్లవము విషయము సామాన్యముగ కలిసివడి ఆయియన్నది, ఇందలకు నిశ్చయమైన మందు కానరాదు. బ్రాంచీయును చల్లనినీళ్ళను కొందఱకు ఉపయోగించును. ఆన్న కోశము కైన ఒత్తిడి యుండునటుల ఒక పటకాను బెట్టుకొనుట వలన కొంతపఱకు ఉపయోగముగ నుండును పాటానియం బ్రామైడు ఉపయోగముగ నుండునుగాని, దీనిని జాగ్రత్తతో నీయవలసియుండును. కొంచెము చక్కెరపైన 2 చుక్కల క్రియోజేట్ను వేసి పుచ్చుకొనుటవలన నొకప్పుడు గుణమియ్యవచ్చును.

కడుపునొప్పి.

సామాన్యముగ పేగులలో గలిగిడి నొప్పికే మనము కడుపునొప్పియని వాడుచుండుము. ఇది ఆనేకవిధములకు పరిణమించుచున్నది. (1) మరుక్షణజ్ఞియు పోటుతోగూడి యుండునట్టియు (2) నొప్పితోగూడి వాంతి వచ్చునట్టియు (3) వాయుపూరితమయి ఉబ్బి రముగానుండి వానపెట్టునట్టియు (4) ఆహారము జీర్ణముగాక పోవుటవలన నొప్పి గలిగించు

నట్టియు (5) పేగులు వ్యవస్థపై న గలియందుండుటవలన మృత్యును పుట్టించునట్టియు (6) పేగులలో నాంకము గలుగుట వలన మరయు నోటిచుట్టది పోవునట్లును బాధను గలిగించు నట్టియు (7) సీసపు సంబంధమును పదార్థములు జీర్ణకోశమునందు పునఃసంఘటన వలనను గలవనల చేయుటవలనను బాధను గలిగించునట్టియు — యిన్ని విధములుగ కడుపు నొప్పి కనుపడుచున్నది.

ఈవ్యాధి సామాన్యముగ రాత్రియందు అకస్మాత్తుగా పేగులయందు ఉండి ఉండి నలికేయునట్టి నొప్పితో ప్రారంభమయి నిస్సాక్షి కడుపులోద్రోవ్వటం; బహుశః వాంతి — పిటితో గూడియుండును. బొడ్డుదగ్గర పొన్నయువులు ఉండిఉండి మునుపటినున్నవలన బొడ్డులోనకు లాగుచున్నట్లు కనబడుచుండును. పేగులయందు ముందుగా నుల్లభింపజేర్చుడి వాయుప్రవేశములమున యీ అవయవము విస్తరింప జేయబడియుండును. కొంత సేపటికి రోగికి విరేచనము కావలెనని మిగులకోరిక యుండును విరేచనముకలుగజేయక విరేచనతో వాయువుకూడ వెలువడి రోగికి మిగుల శయ్యగనుండును. పేగులయందు ఉబ్బునలయుండి నపుడు దప్ప తక్కిన సందర్భములయందు రోగినొర్లుటవలనగాని కడుపును బయండుటవలన గాని పేగులపై కొంతవరకు ఆదునుటవలన కొంతఉపశాంతి కలుగగలదు. ఇందులకయితోడలు వచ్చి పేగులపై నదమిట్టునటిస్థితిలోయుండునట్లు కాళ్ళపక్కలయొక్క యెదుటి భాగములను జేతులతో బట్టుకొని రోగి తలచుగా బయండియుండును. ఇందువలన పొత్తిదుపు యందలి సాన్నియువులు సహరింపు నందును. పేగులు వాపు నందియుండిన యెడల, రోగి వీపుపైబయండి కాళ్ళను మడుచుకొని వయండి యుండును పేగులయొక్క వాపునలయుండి యుండినయెడల జ్వరము విశేషించి యుండును. విరేచనము కలుగునొప్పి అయినయెడల శ్వాసము ఉండదు. ఇతరవిధముగ కడుపునొప్పికి దగుచిత్త జేయనియెడల, పేగులయొక్క వాపుగాని, పేగులయందలి అటంకపదార్థము యొక్క యేర్పడుటగాని తటస్థించును.

కడుపునొప్పి మా త్రీకృచ్ఛము నుండియు — విరేచనము లగుటకు ఆరంభదశనుండి యు కొంతలని మూలశంక వ్యాధినుండియు పైతృవాహిక (Gall duet) నుండ “స్ట్రాన్” (కొలపదార్థము) పోవునపుడు గలిగెడి బాధనుండియు కాలరాయందు తటస్థించెడి కొవ్వు లనుండి ఒరుబీజము గలిగెడి బాధనుండియు — భేదముగ గుర్తించబడ వలయును. మాత్రీకృచ్ఛవ్యాధియందు వృషణము లోనకు లాగుకొని, అపకృత్తనుండికి కాల ముద్దుబారి, తొడలోకూడ పొట్టుపొడుచుచు నడుచునందు నొప్పితోగూడి, తరచుగ మూత్రమును విడువవలెననెడి యిచ్చగలిగి యుండును. విరేచనవ్యాధి ప్రారంభమునందు గలిగెడి బాధ విశేషముగనుండక మలబద్ధమునకు లబడుటగా అజీరి విరేచనములతో గూడియుండును. మునడల నిమూలశంకయందు క్రిందిపేగుయందు మాత్రమే నొప్పియుండి, రక్తము స్రవించినను స్రవించవచ్చును. పైతృవాహికలో “స్ట్రాన్” యుండినయెడల, జీర్ణకోశమునెపున బాధ గనుపట్టుచు వీపులోనికి పోల్లు పొడుచుచుండును; కాలరాయందు అజీరి విరేచనములకు ముందుగా వాంతులును, తెల్లనిద్రవము విరేచనముగనుండ బారుచుండుటయు, మాత్రము బంధించుటయు, తటస్థించును.

చికిత్స.

కడుపునొప్పి వ్యాధియందు కారణమును గమనించి మరియు చికిత్స జేయవలయును అట్టి పద్ధతులను భజించుటవలన కడుపునొప్పి బట్టివలన వచ్చిన యెడల స్వస్థులవారి కారి నియ్యవలయును. వాంతికారికి సహాయముగ నుండుటల ఉడుకునీళ్లును విశేషముగ త్రాగవలయును; పిమ్మట పాగుచేసిన విశేషకారి నియ్యవలయును.

కడుపునొప్పి వైద్యసంబంధ వైద్యయెడల, తలనొప్పి, ఆలసట, కడుపునొప్పి, వైద్యద్రవము వాంతియగుట, నుండుగా నుండుంధముతో గూడియుండుట, పీటితో గలిసి యుండును. మిమ్మలనుకు డోరు యొడిసి యెడల వాంతికారి నెప్పుడో యెక్కువ ఉపయోగముగ నుండును. విశేషముగా గాతురయెడల విశేషకారి నియ్యవలయును.

కడుపునొప్పియందు ఉబ్బునను కనపించిన యెడల వచ్చిగాయలను విశేషముగ కాక పద్ధతులను మేదలగువాటిని నివారించుటవలన బలపరచుచు వాగులకు జీర్ణోశను వాయు పూరితము నొప్పిగలుగుట తగ్గినట్లుచును. ఇట్టిస్థితియందు ఒకప్పుడు జనులూ 40 మినిముల స్పిరిట్ ఆమ్మోనియా ఆఫ్ పీటిక్ ను యియ్యవలయును. 20 మినిముల టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ నును నుంచుకొను నిచ్చును; ప్రతిరెండు గంటలకు రెండు చెమిచుల పిప్పిట్ ఆఫ్ మెన్మిని ఈను స్పిర్టుతో గలిపి యియ్యవచ్చును.

వివిధముగ కడుపునొప్పియైనను, పేగులను చేతులతో నొత్తివట్టుట వలన గాని, పెడల్పయిన బ్యాండ్జిని కట్టుటవలన గాని, లినిమెంట్ పీచియందుగాని, లినిమెంట్ తెలవోవాను గాని చేసిన పీచియందుగాని గాని చేసినవలన గాని, బాధ తగ్గింపవచ్చును. సోప్ లినిమెంట్ రుద్దుటవలనను గూడను గూడవచ్చును. బాధ ఉద్రుక్తముగా నుండియెడల ఒక మోతాదు మాత్రమే 15 లేక 20 గ్రాయినుల స్లోజ్డ్ ట్రాన్స్డ్రెస్ ను యిచ్చుట వలన గుణము నియ్యగలదు.

వైద్య సంబంధముగ కడుపునొప్పి ప్రారంభము కాగానే విశేషబద్ధ మనముగ నుండియెడల 5 గ్రాయినుల రసభస్మమును 1 గ్రాయిను యెక్కువ ఆఫ్ పీచియతో గలిపి యియ్యవలయును. తరువాత మూడుగంటలకు ఒకప్పుడు సోడా సల్ఫేటునున్న నుప్పది మినిముల టింక్చర్ ఆఫ్ జింజరునన్నా రెండు పిమ్మల జలముతో గలిపి యియ్యవలయును.

పేగుయొక్క వాపుదల,

పైన వివరించబడిన తరగతులలో జేరక పిమ్మటగిని నుండులవలన శేమియు ఉడయో గింపక పోయినపుడు, అయినను ఇట్టిపిమ్మట మూలమున వచ్చిన గుణములన్నియును పొత్తికడుపు నొడుక్కమును వహించి పిమ్మట ఇంకనుగూడా అంతుంచి యుండును. ఇట్టి సంబంధములయందు విశేషకారుల నియ్యవలయును. పేగులయొక్క యాద్యులమే యెక్కువయి పేగులయొక్క వాపు యెక్కువగును. ఈ స్థితియందు పేగులలో నుండుపుటి

నొక్కినయెడల బాధ యొక్కవగును. ఆహార్యస్థితియందు డిపెండినీ బిల్లులలో సాత్వికపుష్పైకిలేచి క్రిందపడుచుండును. ఈ వ్యాధియందు బిల్లులను దాదాపు నిద్రలకుండ నుండును మరబంధము, కడుపు తిప్పట వాంతియగుట, మిగులబలవీర్యత, ముఖమున కడివోపుట ఈ గుణములు సాధారణముగ గలవగుచుండును. నాడి మారుటగనుంచి మూత్రమును తీవ్రవర్ణము వహించియుండును. మరణము సంభవించు విషయములందు శేగులు మిగుల హస్తనంది, వాయువుతో నిండియుండినందున పైనగొట్టినచో మృత్యువు వచ్చును. పాదములను మాన్యము లాను చలువగమ్మి, ఒడలంతయు చల్లని యెదుటపట్టి ముఖమున నెగుల మారిపోవు బాధ అఃస్మాత్తుగ తగ్గి, రోగి మరణము సాధును, శేగులయొక్క వాపు కలగనగును జ్వరచిహ్నములు అగునడుగు.

శరీరమునకు చలిగొలిపి సోకటవలెనను, శేగులైన శేషానాల్కు శాగిగటవలెనను శేగుల యందు చిక్కుకొనిన యేదైన పదార్థమువలెనను, యీ వాపు యేగ్గువచ్చును. శ్లోఘాయితో మొదలగు కొన్ని జ్వరములందు యీటులనే సుధవింపవచ్చును.

చికిత్స.

విడవకుండ శేడిసిర్లతో కాపడమును గాచుచుంపవలయును. శేగులు తల్పపై నుంచ కొనుటవలెన నూసిరిబిల్లుట తేలికగా నుండును. అస్వస్థతకు పూర్వము ముంబున ముండినదప్పు విరేచనకారక నియ్యకూడదు. అట్టిస్థితియందు ముందుగా చిట్టాముదము నిచ్చుటయే చిది. బాధనివారణ యగుటకును, నిద్రపట్టుటకును, క్లోరల్ ట్రైచలోను గానియిందియ్యవచ్చును. పేగులకుం దస్వస్థతో జ్వరముడినైఫాయితో జ్వరముతోనికీ చిగవచ్చునుగాన మిగుల బాగోతతో నుడలయును కాలరా సమీక్షమునందుండి యున్నపుడు అజ్ఞేవిరేచనములను ఆశ్రయింపకూడదు.

సీసపు సంబంధముగు కడుపునొప్పి.

సీసపుసంబంధముగు పదార్థములు శరీరమునందు బ్రవేశించుట నలన నదిగము కడుపునొప్పి, సీసము లేక సత్తు శరీరమునందు గలిసియుండుటవలన, శేగులనొప్పి, ముంబున లాగుట, కడుపులాదిరిప్పుట, వాంతియగుట, విరేచనబద్ధము—పిటితో గూడిక కడుపునొప్పి యుండును ఈ లోహము శరీరమునందు ప్రవేశించుటవలన, పశ్యచిగుళ్ళమీద బూడిచినవగుముగల గీరలు యేర్పడును. వైత్యమువలన గలిగడికడ పునొప్పికి వలెనే దీనిని చికిత్స చేయవలయును.

చికిత్స.

శేగులయందలి మలము వర్షముగా బోవునరకును పృతి మూడు లేక నాలుగు గంటలకును యీ దిగువ ప్రకార మియ్యవలయును.

- | | |
|--------------------------|---------------|
| మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ : | [దాములు 2 |
| డైల్యూట్ సల్ఫూరిక్ ఆసిడ్ | } మినిములు 10 |
| (జలము గలిపిన) | |

టిక్టర్ ఆఫ్ ఓషియం
జలము

మినిములు 10
బౌన్సులు 1

బాధతో గూడిన లక్షణములు పోయినప్పుడు ఆల్బరెటివులలో 3 వ బౌన్సుయొగ
మును వాడవలయును. ఇందలి బౌన్సు 2 యం అయెడదే 1 క్రమమునది సీగము లేక సత్తుతో
గలిపి అయెడదే ఆఫ్ తేజి గా యేర్పడి మాత్రము ద్వారాయును యితర వ్యర్థద్రవపదార్థములతోడను, శరీరమునుండి వలవడే పోవును.

కణ్డోగములు

(1) చెవిలోనుండి స్రవించుట.

చెవిలోని ముఖ్యవైద్య మార్గము గాని, మధ్యభాగము గాని, వాపునందు వలన
పోటుపోటుగాను, చెవివలన గాని, చెవియందు వలన గాని, ఆహారమును భుజించుట వలన గాని,
నొప్పి యధికముగునుండును. దిగటి రెండు దినముల పిమ్మట చెవిలోనుండి పసుపువర్ణముగల
చీము వచ్చును. చీము వచ్చుట ఆంభమును పిమ్మట నొప్పి తగ్గును. పండ్లువచ్చుట
వలన నీవాపు యేర్పడియుండెడి పండిచిగుళ్ళను కత్తితో గీరవలయును. చెవియందు యితర
మగు పదార్థము లేదు మున నుండును ముల పిదికాచే చెముటవలన వాటిని బయలు వెడలించ
జేయవలయును. పెద్దచిగుళ్ళను బయలు వెడలవలయును. పిదికాచే చెసినుమ్మట
చెవిలో బోలెడ అనిపించు వీరీ దూసి పోవలయును. పిదికాచేముటకు సబ్బుగలిపిన గో
రువెచ్చరి నీళ్ళను ఉపయోగించ వలయును. చిన్నళ్ళను ఉపయోగించరాదు. నొప్పివలన
నిద్రరాని యెడల, పెద్దవారలకు 10 గ్రములు క్లార్ ల్ హైడ్రోవసుమ్ము, పిల్లలయిన
యెడల 2 ముండులు 4 గ్రములువరకు పొటాషియం బ్రొమైడునున్న యియ్యవల
యును. అవసరమువలెయెడల పిగ్గించివారి దేహమును యియ్యవలయును. చెవిని దినము
నకు రెండు లేక మూడుసారులు కడుగవలయును.

(2) చెవి పోటు.

చెవిపోటు నరముల సంబంధమున దయ్యగు అయియుండువచ్చును. లేక కరువుల
వల్లనై యుండువచ్చును. చెవివాపువల్లనైనను అయియుండువచ్చును. నరముల సంబంధమైన
దెయ్యవల చెవి గాని వల్లనైనను, లేక చిన్నళ్ళనును సానునము చేయుటకుండు అజాగ్రత్తగ
జేయుటవల్లనైనను, దట్టపడవచ్చును. పుష్పవర్షు వల్లనైనను లేక పండ్లు వచ్చువల్లనైనను,
యీహాటు తటస్థించవచ్చును. నరముల సంబంధమగు చెవిపోటు మిగుల అతిశయముగనుండి
ముఖము ప్రవయును తలయుండును పోటు ప్రారంభించి, నోరు తెరచునప్పుడును నమరిన
ప్పుడును యీహాటు అధికముగ నుండును. ఇట్టి చెవిపోటు ఆకస్మాత్తుగ వచ్చును; యిందు
వ్యర్థము కూడ నుండదు.

చికిత్స.

పెద్దవారలకు విరిచనకారి నిచ్చుటయు, పిమ్మట క్లార్ ల్ హైడ్రోవసుమ్ము గుణము
నిచ్చును. పండ్లు వచ్చునుండియెడల కత్తితో గీరవలయును. బాధ అధికముగా నుండిన

యెడల క్షోరతో హైడ్రోస్ ఒక మోతాదునకు పంటనే కలుపున నలుపును. క్షోరతోగాని, ఉడుకుపీల్చితోగాని, చెవిమట్టను గొడవలయును. చెవిపోటు నుతికాలవ్యవస్థలలో వచ్చుచుండియెడల, రోగియొక్క వయసునుబట్టి తనమోతాదు క్షిప్రముగా యిచ్చునుండి వలయును.

(3) చెవుడు.

చెవియందు గుబిలి యేర్పడుటవలనగాని, నవియొక్క వాఘముల నెఱవగొని, అందలి ఫలితములవలనగాని, చెవియందు కొయ్యగండ పెరుగుటవలనగాని, దేవుడు తీర్చిదిద్దవచ్చును. ఇదిగాక, యితర విషయములయందు యేకాక్షణమున్నట్లైనను చెవియొక్కభాగము అస్వస్థక నుడుటవలన చెవుడు సంభవింపవచ్చును. ఈ కారణములు — తొలిమడు, మడుట, పెద్ద ధ్వజ, యేదైననవరు — చెవుడును రప్పింపవచ్చును. వీళ్లలో మారుగుబ్బనను, గుబ్బిలంబరగా లానికొచ్చుకవుడు గూబ బ్రస్థలకటవలనను, చెవుడు తీర్చిదిద్దవచ్చును. స్కాన్డెల్స్ జ్వరము, పొగు, టైఫస్, విషజ్వరము — యీ వ్యాధులవలన కరోమువలన క్షయ విషయముగుటవలన చెవుడు యేర్పడువచ్చును. ఒకప్పుడు మనోక్రీకము నలగయును తీర్చిదిద్దవచ్చును. క్షిప్రము కిడువకుండ పెద్దమోతాదులను తీసికొనుటవలనను, చెవుడు కలుగ వచ్చును.

చికిత్స.

చెవుడును కారణమేమియో విచారించి చికిత్స తీసువలసి యుండును. చెవివిమక టింక్చర్ ఆయొకిక్కును రాసువలయును. నగనులయొక్క బలహీనతవల్లనేన యెడల, బలవర్తకావగములను, బలహీన ఆహారమును, బుచ్చుకొనుచును వలయును. ఉడుకున సబ్బునీళ్లతో పిచికారీచేయుటవలన స్వస్థత గలుగక పోయినపుడు, వైద్యునితో నాలాదించుట మిగుల మంచిది.

(4) చెవిలో గుబిలి.

చెవిలో గుబిలియైనయెడల రాత్రియందు చెవిలో రెండు చుక్కలు స్థిరమున నేసి మరునాడు ఉదయమున సబ్బుకలిపిన ఉడుకునీళ్లతో పిచికారీ చేయవలయును. గుబిలి బయటికివచ్చినయెడల రెండుచుక్కల స్థిరమున తిరిగి చెవిలో నేసి చూడని పద్ధతివలయును. ఇందుకొరకై చెవులలో చమురును వేయుట మంచిది కాదు.

కాలరా.

కాలరావ్యాధి : విరేచనములు ; హంతులు ; కాష్ట్యులాగుట ; మూత్రబద్ధము ; శరీరముయొక్క చల్లదనము ; యీ ముఖ్యలక్షణములతో గూడి యుండును. ఇలాంటి మాదక మనం దీవ్యాధి అనేక పురుషాంతరములనుండి వ్యాపించియున్నట్టిదని, బోలెడుమారుల వైద్య శాస్త్రజ్ఞులు యీ వ్యాధియొక్క లక్షణములను వరుసగావ శతాబ్దములను గమనించి యుండలేదు. 1313 వ సంవత్సరమునందు కాలరావ్యాధి గూవాపు అని నూఖుడ మంతయు వ్యాపించినపుడు, యిందునుగుంచి యొక్కవ శతాబ్దముననుబడినా. అయితము, 1830 వ సంవత్సరమునందు యీవ్యాధి బోహోపాఖండమును ప్రశంస మన దర్శించినపుడు యీ వ్యాధిని

గుర్చి మరియుత శాస్త్రమున విశేషమును వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు బరిష్ఠించి యుండిరి. 1332 వ సం॥ నందు ఇంగ్లాండు దేశమునందును యీ వ్యాధి స్థానమును గనుగొనెను. అటుతరువాత నింగ్లాండు దేశమునందు యీ వ్యాధి ముమ్మాట బ్రజ్వలించెను. 1866 వ సం॥ సిమ్లట శిష్యుడును యీ వ్యాధి ఇంగ్లాండు దేశమునందు గనబడి యుండలేదు. ఈ వ్యాధికి ప్రధాన స్థానము దక్షిణ ఇంగ్లాండ్ ప్రదేశముయందున్నది. ఇచ్చట అన్ని కాలములయందును యీ దేవత యధిష్ఠిగా రాజ్యము చేయుచుండును. మహాచి పొగు వ్యాధులయందువలె యీ వ్యాధి గాలి ద్వారా వ్యాపించదు. ఒకవిధమున పురుగు శరీరమునందు బ్రవేశించి ఆపురుగు అభివృద్ధి నందుటవలన యీ వ్యాధి గలుగుచున్నదని అభిప్రాయమై యున్నది.

ఈ వ్యాధి-మనుష్యసంస్థము; జలదారి-ఆహారపదార్థములు; తాగినీళ్ళు; నీళ్ళుగలి సిన పాలు—విటివలన యొకచోటనుండి మరొకచోటికి గొంపోవడుచున్నది. ఈ వ్యాధి తలసించుటకు ముందుగా కాలరా పురుగు ఉండవలయును. ఈ పురుగు శరీరమునందు బ్రవేశించిన పిమ్మట ఆర్థి మనుష్యునియొక్క శరీరస్థితి యీ వ్యాధి కనుకలముగ నుండవలయును ఈ కారణగతులన్నియు సంవృద్ధుడైనకాని, యొకపురుగునకి కలరా వ్యాధి తలసించదు. ఏది యెట్లున్నను శరీరమునందలి జీవశక్తియు తిగ్గుల నుండుండుననేగాని, యీ పురుగు శరీరమునందు బ్రవేశించినది మాత్రమున హాని కలగజూడు చుండుట కాలరా వ్యాధి యుండివును, శరీరమున కలనట జెందునట్టి పరిశ్రమల దీనికొనిగూడదు. పెంటవపులు ఈ పురుగుయొక్క అభివృద్ధికి సహాయము జేయుచు గాన, అట్టిగాటి నన్నిటిని తొలగింపవలయును. లోనకు పుచ్చకొను నీళ్ళు, పాలను, బాగుగా గాచి మరియు బుచ్చకొనవలయును. ఈ వ్యాధివలన భయమును, గొంతవీకు ఉమ్మక్తిలను బుట్టించును.

లక్షణములు.

ఈ వ్యాధి రెండు విధములుగా బ్రజ్వలించుచున్నది. (1) అకస్మాత్తుగా వచ్చుట. (2) అజీర్తి విరేచనములుగా బాగింభము, ఒకటి మొదలు పదిదినములవరకును అటులుండి అప్పుడు కాలరా ప్రారంభముగల ఈ వ్యాధి సామాన్యముగా వాయువేడిని తగ్గియుండి నపుడు, అనగా, రాత్రియందుగాని, ఉదయముననేగాని ప్రారంభమగును. ఆరంభమునంచు యే మిగుల నిస్సౌఖ్యము, నీరసమును, గనబడును. మొదటలో పేగులయందు నొప్పిగలగవచ్చు గాని, విరేచనములును పొంతులు అధికమయిన కొలదియు, నొప్పి తగ్గిపోవును. ఆరంభమునందలి విరేచనములు మలమును బోలియుండునుగాని, తరువాతి తరువాత పలచనై గంజినీళ్ళను బోలియుండును. పొంతులును గంజినీళ్ళవలెనే యుండును. దీనికి కారణము కారిజమునుండి వైద్యద్రవము ప్రవహించుట యుండుటవలన నయియున్నది. కొద్దిగంటలలో నిట్టి విరేచనములు పనునైదు లేక యిరువదివరకు యుగ్గును; పొంతులును అదే ఉద్వేగముగా నుండవచ్చును. కాలరా వ్యాధియందలి పొంతి యేదియు ప) మత్నము లేకనే యగుచుండును. చేతివ్రేళ్ళు, కాలివ్రేళ్ళు, తొడలు, పేగులయందలి స్నాయువులు—యివి అన్నియు క్రమముగాలాగుట ప్రారంభమగును. ఈ బాధ మిగుల అతిశయముగా నుండుటవలన మూలుగుట ప్రారంభమగును. చేతివ్రేళ్ళు కాలివ్రేళ్ళు నీలవర్ణమును గలిగి మువతలు పడియుండును. మొదటగా మూత్రము కొద్దికొద్దిగా వెలువడుచు తీవ్రవర్ణమును గలిగియుండును. పిమ్మట సంపూర్ణముగ

బంధించిపోవును. మాత్రాకోశములనుండి మాత్రము వెడలుటయు లేదు. కడుపులో నుట ఘట్టము. నాలుక తెల్లనై వణకుచుండును. నోరంతయు చేదుగానుండును. ఉమ్మి డోకుట లేదు. నోరంతయు ఆరిపోయి దాహము అధికమయి చల్లని ద్రవములను త్రాగదలెనని యుండును నాడి నీరసముగానుండి మామూలుకంటే విశేషముగ కొట్టుకొనుచుండును. నిమిషమునకు 96 సాయలుకూడ కొట్టుకొనవచ్చును. ఒడలంతయు చల్ల గానుండును. జ్వరము డోడను ఆరంభదశయందు పేడితగ్గిపోవునుగాని, రోగి అధికతాపము నుడుచు, బట్టక ప్పకొననడ పరుండుటకు యిష్టపడును.

చెలిలో ధ్వజులు పుట్టవచ్చును. రోగి మిగుల ఆయాస పడుచు నిట్లుంటు కొట్టుకొను చుండును. చివరకు ఆయాసము అధికమగుచు షీతారతి పొంగింపునుచును. ఈ గతయే నడచుచున్న యెడల, నాడి తొందర నుని చేరికి మాత్రము అందకుండి వాతులును విరేచనములును గూడ గట్టి, నొప్పలును తగ్గును. ఒడలంతయు చల్లనిచేతుటపట్టి దుర్వాసన గలిగి నీలవయివర్ణము ప్రవేశించును. గోళ్ళును పెనవులును ముక్కుముగా నీ వర్ణమును పోషించి యుండును. ఒడలంతయును, ఆనయనములును, మునుమగ్గిన పోవును. ధ్వని బొగుపోయి నీరసమును పోషించును. నాలుక కొనవేలి, నాలుకయును డోపరియును జల్లగయిండును. స్మృతి సామన్యముగ బాగుగనే యుండునుగాని, యిందువలన సుఖముగ నెంచరాదు. ముక్కును నాడి యుండును. కండ్లు గుంటలుపట్టి కనుపొవలు మాత్రము మామూలువలెనే యుండును. ముక్కుమాత్రము ముక్కుటముగ గనబడుచు ప్పకొట్టు లోకు నకుపోయి, దళిత కరచుగొని పోవును శరీరపేడిమి తగ్గినటుల గనబడును, నాడియు బలహీనమయి, వెక్కిరిపుట్టి విరేచనములు రోగికి చెలియకుండ నగుచు, శరీరమంతయు కొంచెము నీలవర్ణమును పోషించి యుండును. మరణమునకు రెండుమూడు గంటలపను పూర్వము, తలకును నుడుగునకును, ఎడమొమ్మనకును, కొంచెము వేడిపుట్టవచ్చును. మరణము సమీపించు టవలన చిన్నరక్తనాళములు సడలివునది యీవేడి గలగునుగాన యిదిచేయు చిహ్నముగా దీసికొనవలయును.

కాలరాష్ట్రాధి సంభవించినవారిలో దాదాపున గమముంది మరణము నందుచును. ఈ వ్యాధిపుట్టిన ఆరంభమునందు మరణము లెక్కువగా నుండును. పడుచు వారలయందును, ముసలి వారలయందును, బలహీనులయందును, మధ్య వయసు వారలయందుకంటెను, శరీరలయందు కంటెను, మరణము లెక్కువగా దట్టించును. వ్యాధి త్వరలో వృద్ధి నుండుట, వ్యాధి ఆకస్మాత్తుగా ప్రవేశించుట, మిగుల ఆయాస మునందుట, నాడి త్వరలో చెరిగిపోవుట, శరీరము మిక్కుటముగ చలవలు గ)మ్ముట, మాత్రము విడువకుండ బంధించుట, వచ్చకామాల వ్యాధి, క్వానసోక సంబాధమగు కలతలు, విరేచనములు వాతులు తిరిగితిరిగి గలుగుట, టైఫాయిడ్ లక్షణములు, సంభిగుణము — ముని యర్పియు యీవ్యాధి యందు చెడు గుర్తులైయున్నవి.

వాతులును విరేచనములును క్రమముగా తగ్గుటయు ఒడలు వేడియగుటయు, నాడి నిండుచుటయు, కంఠస్థనియొక్క శక్తి హెచ్చుటయు, మాత్రము వెడలుటయు, విరేచనములను వర్ణముకలుగుటయు, కడుపులోని మంట తగ్గుటయు, రోగి నిద్రించుటయు —

యివియన్నియు మంచినర్తులై యుండి స్వస్థత కనువగును. మాత్రము వెడల నంతవరకు నపాయము దాటెనుండదు; వ్యాధి ప్రారంభమయిన 72 గంటల లోపుగా మాత్రము వెడలిన యెడల వ్యాధినుండి స్వస్థత నందవచ్చును. మూలగ్రంథులు క్రమముగా బనిచేయు యనియెడల, మాత్రను గుండ వెలువడవలసిన విషపదార్థములు రక్తస్థానందు గత్తిసి, రక్తము నంతయు పాడుకొనును. ఇందు మూలమున మరణము సంభవించగలదు.

ఒకప్పుడు స్వప్నమయిన లక్షణములు లేకుండనే ప్రైత్వీక్షణమునో గుర్రుని విశేషన ములు ఒకటి రెండు మాత్రమే ఆయినప్పుడు, తేలికైన ప్రారంభముగా, మగమున సంభవించును.

చి క్తి త్న.

కాలరా వ్యాధి యందు పరిశుభ్రముగా నుండుటయే పరిశుభ్రమగు పదార్థముల భజించుటయు, కాచి చల్లార్చిన నీళ్లను దాగుటయు మిగుల ముఖ్యములు. ఈవ్యాధియందు జాగ్రత్త నాహారము నివృత్తవలెనను, స్వాభావికముగ కఠినమునందు గలుగుచుండెడి వ్యాధిప్రతికారమునకు మిగుల కుశలతతో మందులనివ్వటములమన సహాయము జేయుచుండుటవలెనను, అనేక ప్రాణములను గాపాడవచ్చును. అజీర్తి విశేషములు ప్రారంభమయినప్పుడు వెంటనే బరిచేతులవలన మిగుల ఉపయోగ ముండగలదు. కాలరా వ్యాధివచ్చి యున్నపుడు అజీర్తి విశేషములు ప్రారంభమయిన యెడల, నిరసలకు వెంటనే దగ్గుదిక్షిత్తు జేయవలయును. లేనిచో నీ వ్యాధి కాలరాలోని కీడునగలదు; ఈ సమయమందు విశేషన కారుల బుచ్చుకొన కూడదు.

అజీర్తివ్యాధియొక్క లక్షణములు కనువడగనే 30 ముక్కల క్లోరోడీక్షను ఒకబొన్ను బ్రాండిలో కలిపియిచ్చును, అవగరములతో చొత్తి రెండుగంటలకు దీని మరల నియ్యవలయును. కడుపులో నివృత్తుట టెంక్చర్ జింకర్ బొవధయోగమును బుచ్చుకొనవలయును మొదటిబొవధము రెండు మోతాదులను, రెండవబొవధము నాలుగు మోతాదులును, యిచ్చినపిమ్మట వ్యాధి క్షుద్రీకణదక పోయినయెడల, 10 గ్రెయినుల పల్వీస్ క్రేటా ఆరొమేట్కో కం పిసియందు యియ్యవలయును; దీనియొక్క ఒక మోతాదుతో నయములేక పోయినయెడల, మూడు గంటల తరువాత మరెయ్యక మోతాదు నియ్యవలయును.

మాత్రము క్రమముగా వెడలుటకు గాను రెండు బొన్నుల జలములో నొక దానిము స్పిరిట్ ఈథర్ వైట్రీస్ ను గలిపి పొత్తిగంటకును యిచ్చుచుండ వలయును. కడుపులో ద్విష్టాట యెక్కువగా నుండిన యెడల పొత్తికడుపువైన మృగము పట్టిని వేయవలయును. రోగి పయండ బ్రెట్టబడియే యుండ వలయును. విశేషములు కట్టు నంతవరకును తేయాకు నీర్లు; ఆరొమాట్ పిండితో గాని స్వల్పనియ్యముతో గాని చేసిన జావ, కొంచెము పోర్టువైను—వీటిని లోనకియ్యవచ్చును. గట్టి పదార్థములు సేవియింపరాదు. వాంతి వెల్లిపోయిన యెడల, ప్రతి ఆరగంటకును కొంచెము కొంచెము మాత్రమే యిచ్చుచుండవలయును. దాహమునకు, మంచినీళ్లు, సోడావాటరు, మంచుగడ్డ గలిపిననీళ్లు, యియ్యవచ్చును. వినియోగతో గాని సున్నాక ఆసిడ్తో గాని రెండు తేజ మూడుముక్కలు గలిపిననీళ్లను లోనికిచ్చుట మిగుల శ్రేష్ఠము; నీలనన, పులుపుతో గలిపిన

దశివమునందు కాలగావురుగు నివసించజాలదు. మాత్రము విదలుచుడు సంకరరతు పూజా పాయము లేదు. మాత్రము బంధించినయెడల, నడుము స్థిల పెన్నుపెత్తున మన్ననపట్టి వేయుటవలన మూత్రము వెలువడగలదు. కాళ్ళులాగునవుడు, చేతులతో బుట్టుటవలన శవ సముగ నుండగలదు. కాళ్ళుచేతులు చల్లగానుండినయెడల, గోడును పోవుటగాని, ఉప్పుతో గాని, కాచవలయును. అస్థింజెంట్లలో 4 వ బొవధయొగమును వానిగు మోతాదులవలన రెండు గంటల కొకసారియును యియ్యవచ్చును.

వైచికిత్సను కేసినపిమ్మట విరేచనములును వాంతులును గట్టిపోయిన యెడల రోగి షోణిత సందుట పొంభుగును. ఈస్థితియందు నుండులను నోటివ్యాగా నివృత్తివలనమిగుల ఉపయోగము ఉండజాలదు. ఈ సమయమునందు శరీరవేడియిని గాపాడవలయును. పరిశుభ్ర మయిన గాలి వచ్చుచుండునట్లును జాగ్రత్తపడవలయును. రోగి పరుండిపోయి యుండవలయున లేవనియ్య కూడదు. షోషినిబీల్చుట ఆయాశముగా నుండినయెడల, ఎదుగొమ్ముపైర మన్నన పట్టిని వేయవలయును. పాదములను చేతులను కర్పూరజ్వాలలతో రుద్దవలయును. దాహ మునకై ఒక అరబొన్న బ్రాందిని నీటితో గలిపి యియ్యవలయును. కాలరావ్యాధి యందు గట్టిపదార్థముల పెన్నుడును అహారముగ నియ్యకూడదు.

ఈ వ్యాధియందు బాధ తగ్గించుటకుగాను, మార్చీనును గళములోనికి యింజుట్ట చేయుట మిగుల ఉపయోగముగ కనుగొనబడెను. నాడి మిగుల నీరసస్థితిలో నున్నపుడు, 60 గ్రేయిసుల సామాన్య లవణమును 30 గ్రేయిసుల పోడాచార్మికేటును గండుపెట్టు కాది చల్లార్చిన నీళ్ళలో గలిపి, యీ నీళ్ళ 98.4 డిగ్రీల వేడియైనచో రక్తవేడిమి యందు డగా నవరిశుద్ధ రక్తవాళములలో నింజుట్ట చేయుట వలన నొకప్పుడు నాడి సరియై, పోజి మాలు కాపాడబడిన సందర్భములును గలవు. ఈనీళ్లను యింజుట్ట చేయుటయందు అందలి గూఢమును జాగ్రత్త కనిపెట్టుచుండ వలయును. అయితే, విరేచనములు వాంతులు అగమం దిన యెడల యీనీళ్ళు అన్నియు మల వాటిగుండు శరీరమునుండి వెలుగడి, దీనియొక్క గుణము హరించిపోవును. రోగియొక్క శరీరవేడిమిని గాపాడుటకు గుప్పటిని కప్పవలయును ఒడతంతయు దుడువవలయును.

ఈవ్యాధియందు పాదములును చేతులును చలవగన్ని శరీరము షోణితయందుండి యెడల, కడిని బుట్టించుటకును గుండెకాయయొక్క నడకను సరిచేయుటకును, 5 మినిములు లిక్కర్ స్పీక్ సీసను 15 మినిముల టింక్చర్ డిజటాలిన్ ను 10 చుక్కల స్పిరిట్టు అమ్మోని యా అలోమేటిక్ ను ఒక బొన్నలములోగలిపి రెండుగంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

కాలరా కేర్వడిన బొవధయొగములును కూడ జూడవలయును.

కాలరావ్యాధి రాకుండుటకు గాను, హాఫ్ కెన్ ఆనునాయన ఒక విధమయిన ద్రవ మును రక్తమునందు యింజుట్ట చేయుట మూలమున టీ కాలు చేయుటను కనుగొ నెను. కొంత పరీక్ష ఉపయోగముగ నుండునట్లుల దెలియచున్నది.

కాలరాయందలి పిమ్మట గుణములు.

షోణితనుండి వ్యాధి స్వర్ణకామటకు ఆరంభమయినపుడు ఆహార పదార్థముల యందు జాగ్రత్తగా నుండుటకంటె మేు బొవధముల చిమ్మట సామాన్యమగునవసరములేదు.

(1) బ్యాక్టిమెడలగ మత్తుకదాగముల నగ్గోమగ నిచ్చియుండుటవలన నొకానొకప్పుడు జ్వరము సంభవింపవచ్చును. ఈజ్వరము ఒక నొకప్పుడు సాధగతియందుండి దానంతట ఆది పోవచ్చును. ఇత్యాదులు జ్వరము అధికవయి నాలుక మొదలు తెల్లగానుండి తరవాత గోధుమవర్ణమును పొంది అరుదలైనది కాకై భృయోర్యివారి నాడి మరణజ్వారి బడలంతయు ఉద్దముగ నుండను. ఈ స్థితియందు సుధి జిగిచి క్రిమముగా ప్సార్కముతప్పియిట్లు నాలుగొసములు మొదలు ఎగిమిది సములవరకును. గతజీన పిమ్మట వ్యాధి స్వయంకానినను సుద్ధకానినను. లేక, తొగి వరదాను సూనినను వందవచ్చును.

(2) మరియొకప్పుడు ఆంగ్లకృతిరోగము రెన్నడి, జ్వరముఒకానొకప్పుడువచ్చియు ఒకానొకప్పుడు రావలెను, మూత్రము మరల బాంబించియుండును.

(3) అజీర్తి వ్యాధిచే బీడింపబడుచుండువానికి, కాలరా వ్యాధి పిమ్మట ఒకానొకప్పుడు పెక్కిలిబుట్టి అహారమేమియును, లోపలికి దీనికొనుటకు వీలుగాక ఆయాసము గాను, దివిగుల నిస్రావ పోరంభ మగును.

చి కి త్న.

కాలరావ్యాధి తగ్గుదల నందుచున్నపుడు శరీరముయొక్క కేడిమిని తడిగుడ్డతో దుడుచుటవలన తగ్గింపవచ్చును. మూత్ర విచ్ఛేదము కావలసినంత తేనివో నడుముపైన వెన్నుకైపున మట్టపట్టిని కేయకలగును. మూత్రసాధకముగ సివిట్ ఈధర్మ కైట్రిన్ ను యియ్యవలయును. బ్యాక్టిమెడలగముల నాలుకను సామాన్యముగ వాంతి యగుచుండునుగాన, సిక్రేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను కొద్ది మోతాదలలో నియ్యవలయును. ద్రవపదార్థములను మూత్రమే కొద్ది నవలయు అహారముగ నిచ్చుచుండుట మిగుల మంచిది. నాలుక గోధుమవర్ణము గలదిగను అరుదలైనదిగను నుండి నాడిమందగుగ నుండకపోయినను బల పీనముగనుండి, సుధి పోకేకంబినయెడ, పృతిగంటకును ఒక అరబొన్ను పోర్టుకను నీయవలయును. బలమును గాపాడుటకు ద్రవ అహారముల నిచ్చును కొద్దికొద్దిగ పాలను లోన కియ్యవలయును. అహారమును ఒకే సారిగ పెక్కువ మూత్రము నియ్యకూడదు. నాలుక గోధుమవర్ణమును వహించి అరుదల సంధియున్నయెడ, అమ్మోనియా కార్బనన్ 2 ద్రామలును, సల్ఫూరిక్ ఈజర్ 4 ద్రామలును, సిసిట్ యాథర్ కైట్రిన్ 6 ద్రామలును, 12 బొన్నుల జలములోగలిపి, మూడుగంటల కొకసారి ఒకబొన్ను చొప్పున నీయవలయును.

ప్సార్కము తప్పటగాని, ఆంగ్లకృతి రోగమును బోయియుండినగాని. పాదములను చేతులను కడిగానుండి, తలపైన తడిగుడ్డలుకేసి, మూత్రగ్రింధుల పైసయ్యును కారిజము పైసయ్యును. మెడకు కెనుకకైపునయ్యును, ముష్టపట్టిలను కేయకలయును.

పెక్కిలి పుట్టినయెడల పాలలో మూడవవంతు త్రొవ్వులరును గలిపి లాసకెయిల వలయును.

పైన జెప్పినవి ఉపయోగింపక పోయినయెడల, నాటికిగాని పెక్కిలికిగాని రెండు మాడుపుక్కల క్లోరోఫారంను నాలుగుబొన్నుల జలములోకేసి యియ్యవలయును.

పసిపిల్లలయందలి కాలరా.

చిన్న పిల్లలయందును వైలక్షణముల తోడనే కాలరా పుట్టవచ్చును. వయసు ననుసరించి క్లొరోడిస్ ను యియ్యవచ్చును. గంటకొక మోతాదు చొప్పున నీయవచ్చును. పాలను వైంచాటరును సరిసమానముగ గలిసి లానకెయ్య వలయును. గుణము కనుపడక పోయిన యెడల టెంపర్ జెంజర్ ను వయసునుబట్టి యియ్యవలయును. కొద్దిగ పోషకమును యియ్యవచ్చును. ఒక చిన్న చెమిచా కొలతగల నేయాను నీళ్ళలో స్నిగ్ధము లివ్వాలియో ఆరో మేటికోను అరు లేక యెనిమిది ముక్కలనుజేసి యిచ్చిన యెడల బిగుల గుణము కనుపడును. ఇందువల్ల మగత తగ్గిపోయి చురుకు పుట్టును. వేగల్పమైన మందుగా వల్లనగునట్లుగాజేసి అందుపై నవ్యర్థద్రవ్యీని జేయుటవలన ఆరంభదశయందు మిగుల ఉపయోగముగ నుండును. పాదములను, చేతులను, బ్రాంచితోడను లేక కర్కుగళకేముతోడను చేచ్చగా నుండునట్లు రద్దవలయును. పోప్ లిని చెంట్ ఉండినయెడల దానితోడను రద్దవచ్చును.

కారిజ వ్యాధులు.

కరీమనందలి చగ్గ నావయవములలో నొకటగు కారిజము ఉదగమునందు కడి భాగమున నిర్మింకజడి యెడవభాగము వరకును వ్యాపించుచున్నది. ఈఅవయవముయొక్క స్వస్థావస్థపై మానవజీవితమునందలి సౌఖ్యవదలి నిర్మాణమునంది యున్నది. ఈఅవయవము యొక్క స్వస్థత జెడియెడల మనజదు సౌఖ్యముగ జీవించుటకే నిలుకేడు. ఆరోగ్యస్థితి యందును దీనిపరిమాణము మారుచుండును. నడచునకు దట్టముగా పటకావేసు విరించు అడు వారలకు నీ అవయవము ఒక అంగశము లేక చెండు ఆంగుళములు క్రిందికి నుండును.

ఈ అవయవముయొక్క ముఖ్యవ్యాపారము మనము భుజించు కొిప్పువద్దాగ్ధములను రక్తమునందు గలియునట్లు జేయుటకుకయోగించు వైత్యవిదానమును ప్రకటించేయుట ఆయి యున్నది. ఈ వైత్యవిదానము స్వాభావికదగు విలేచనకానిగను, అనుభవమును సుశీల్యకుడ జేయునట్టిదిగను. సరిజమించుచున్నది. క్రిమముగ నంగార భూతజనుటవలన తగ్గి పడిమిని కొంతవరకు నిలికియుంచుట కుపయోగింపబడు గ్లెస్ జెన్ నాబడు చిక్కర పదార్థమును నీళ్ళ పరచుటయందును, నీలవ చేయుటయందును, యీ కారిజము పుచ్చేయుచున్నది. కారిజము యొక్క యీ విధికరము అస్వస్థత జెంసయెడల అతిమాత్రవ్యాధి ప్రకటించుచున్నది. రక్తమునందలి అమ్మోనియాలవణములను మాత్రగింధులద్వారా బయలు వెడలింప జేయుటకుగాను యురి కూ అనబడెడి మాత్రమునందలి మూలపదార్థముక్రింద ముక్కిరక్తమును పరిశుద్ధిచేయుటయు కారిజముయొక్క పనియైయున్నది. ఇదిగాక రాగి మొదలగు వివిధదా ర్థములనుండి కరీరమును కారిజము కాపాడుచున్నదని కొందర నవీన రసవాద శాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయమైయున్నది. ఆహారమువలనగాని, త్రాగుడు పదార్థములవలనగాని, కరీరమును దస్వస్థతనందెడి అవయవములతో నన్నుకోశమునకు దరుచాత నీ కారిజమే ప్రధానమైనదై యున్నది. మత్తుపదార్థముల నెక్కువగ ద్రాగుటవలన నీ కారిజము అస్వస్థత నందుచున్నది.

(1) కారితమునందు రక్తము కూడుకొని యుండుట

కారితమునందు రక్త వర్ణముగా జేరుటవలన నీ అవయవములయు గాని, లేక కొంత గాని, విస్తరింపజేయుటయు. ఒకానొకప్పుడు చేరుకట్టుము, ప్రత్యవాహికయు మాత్రము యీస్థితి నందియుండును. ఇందుకు యీదిగువ నుదాహరింపబడినవి కారణములయి యుండుననునవి:—జననపుర్వముగా నుండుచోట్ల నివసించుట, ఎక్కువగా కూర్చుని పనిచేయుట, ముఖ్యముగా పగటియందు యెక్కువగా నిద్రించుట, విశేషముగా తాగింపుట, తేలికగా జీర్ణముకానట్టియు కాఁగముతో గూడినట్టియు ఆహారములనుభవించుట, మత్తు గలుగజేయునట్టియు, యెక్కువగా చక్కెరయు గలిగియుండునట్టియు ద్రవపదార్థములను దాగింపుట, మూలకంక వ్యాధివలన గలుగుచుండెడి రక్తస్థానము నకస్మాత్తుగా గట్టిజేయుట, జ్వరవ్యాధివలనందు శరీరము చల్లదనమును వహించి యుండెడి మధ్యకాలముల యందు రక్తము అంతరావయవ ములలోనికి యెక్కువ ఉద్రుక్తముతో బంపబడుటచే నీ ఆవయవములు విస్తరింపు నందుట.

కారితమునందు యెక్కువరక్తము కూడియుండుటగాని, కారితము వాపునందుండుటగాని, కారితము ముక్త పుండుననుగాని, ఉద్యుక్తతను గలుగజేయు ముఖ్యకారణము, ఉపసృజకములయందులి దేశములలోని శీతోష్ణస్థితియొక్క గుణగుణములను బట్టియుండెడియు న్నది. సమశీతోష్ణ దేశములయందు కంటె ఉష్ణదేశములయందు కారితమునకు పితృమును స్రవించు వ్యాపార మధిగతులవలన నీ ఆవయవము ఉద్రేకత నందుచున్నది. సమశీతోష్ణ దేశములందు క్వాసకోశముల వ్యాధి వలనవరింపబడు కొన్ని ద్విపదార్థములు, ఉష్ణదేశములందు కారితమునుండి యెక్కువ ప్రత్యేద్యము స్రవించబడుటవలన శరీరమునుండి వెలువరింప జేయబడుచున్నవి. కాలిక నీ దేశమునందు యీ అవయవమునకు యెక్కువపక్షిగలుగుచున్నది. ఎండ తిగులుటవలనను, ఎండచీడిమికిని, శరీరమునకు చేరుట అధికమయి చక్రము నిరసనీతిని జింది, చిరచిరలాడు నుజములు ఆవహించి, వాయువునవలె బురుగులుననున రిదియు గలుగుచుండెడి శీతోష్ణములలోని అధికమాక్కులవలన చక్రము మిగుల నుర్జితముగ నుండును. కాలిక శరీరముయొక్క ఉపరిభాగము నులభముగా చల్లదనముకలుగుట వలన, రక్తమాత్రము లోగి అవయవములకు బంపబడుటవలన కారితమునకు యీక్తుగలిగి అస్పృశత గలుగుటకు కారణమగుచున్నది. ఈ సూక్ష్మమున, శరీరముయొక్క ఉపరిభాగమునకు ఉష్ణత గలుగునపుడు రక్తము పయిభాగము లుదయ్యుచుగ ప్రసరించు చూడుననియు, శీతలత దగు లునపుడు రక్తము అంతరావయవములకు విశేషించి పంపబడుననియు, యీసాధారణాంశములను గమనించవలసి యుండును.

పితృశయ సంబంధమున రక్తము కూడుకొనుట కిదిగువ లక్షణము లుండును:—నాలుక బెడడుకట్టుట; నోటియందు ఆరిచి; ఉత్సాహము తగ్గియుండుట; ఆకలి మందగించుట; తలనొప్పి; విరేచనక్రియము తప్పుట; విరేచనము నల్లగానుండుట లేక రంగును తగ్గియుండుట; తడుగు విరేచనబద్ధము గలిగియుండుట; పూర్తి వచ్చునట్లుండుట; కుడిభాగము బరువుగాను నిండుగాను యుండెడలుండుట.

ఈలక్షణము లుండినయెడల కారితము మాంద్యత వహించియున్నదని చెప్పవచ్చును. ఈలక్షణములే సాధువుగ నుండినయెడల ప్రత్యేద్యము ఇవించిందని చెప్పవచ్చును.

చి కి త్తి.

భోజన విషయమును జాగ్రత్తను వహించి శివ విరేచనమును సుపయోగించి వలయును సాధారణమును శరీరసాధకమును బుష్కళముచేయు వలయును రుచికిత్తు ఉపయోగంపక హియినయెడల 5 గ్రాములను రసభస్మమును యిచ్చువలయును. రసభస్మము నెచ్చిన తరువాత రెండు లేక మూడు దినములకు యిదిగురుమూడును యిచ్చువచ్చును.

యూనిమిన్	...	గ్రా 12
యక్తాస్త్వ హయోగమన్	...	గ్రా 18
,, జెక్ డన్	...	గ్రా 18
,, బెల్డోనా	...	గ్రా 3

పీటి నన్నిటినిగలిపి 12 మార్లు గాక్షిపింపటి, రెండు లేక మూడు మాత్రలను ఆప్సరస్సుడు చేసికొనవలయును.

(2) కారిజముయొక్క వాపుదల.

కారిజముయొక్క వాపుదలమీను, కారిజమునందు రక్తము కూడుకొనుటకు పనిచేయు కారణములే, వర్తించును. చలిగాలి ముఖ్యముగా దీనికి గారణమగును. రక్తము కూడుకొనుటకు చికిత్స జేయుయెడల వాపుదల చావచ్చును. ఒకానొకప్పుడు గ్రహాశీయును, యిందుతో సంబంధించిన మలవచ్చును, పేరులను కారిజమునకును ముగ్ధముండెడి ఆపరిశుద్ధ రక్తకాశములవలన గ్రహించుకొనబడుటచే కారిజముయొక్క వాపుదల సంభవమగును.

కారిజము యొక్క వాపుదల యొక్కది లక్షణములతో గూడి యుండును కుడిభాగమునందు నొప్పి; పక్కయెడల నొక్కిరప్పుడును దీర్ఘకాలము దీర్చకొనుట వలనను దగ్గుటలను యెవమప్రక్కను పుండుటవలనను యొకొప్ప అధిమరుట , అన్నకోశము వైపున యొడిచెడు నొప్పి పుట్టవచ్చును. కిన్నులు పసుపునర్ణమును చాల్చి యుండవచ్చును. మాత్రము తీవ్రవర్ణమును చాల్చియుండును. కడుపులో దిప్పుటగాని వాంటియుగుటగాని యుండును. మలబద్ధము నుండినను యుండవచ్చును. లేక, అట్టి రివికే చనములు తీయినను కావచ్చును. ఈవ్యాధియందు సామాన్యముగ జ్వరము ఉండియుండును కాని కొన్ని విషయములయందు కొద్దిజ్వరము మాత్రమే ఉండవచ్చును. ఒకప్పుడు కారిజము విస్తరింపజేయబడినట్లు స్పష్టముగా గానవచ్చును. ఆయితే, అది యెల్లప్పుడును దట్టస్థింపబడి కాదు.

బాధ అధికముగానుండి జ్వరము అతిక్రియించి యుండినయెడల కారిజము యొక్క కప్పుభాగము ముఖ్యముగ వాపుదల నంది యుండును. నీరునుతిత్తి రేగుదలనంది నడుమున వల బాధ యొక్కరగా నుండినయెడల కారిజముయొక్క ఆడుగుభాగము అస్వస్థత నంది యుండును. వాంటిమరుట ప్రామాఖ్యముగనుండి, పక్కలి తోడను అన్నకోశము వైపుల నొప్పితోడను గూడుకొనియుండినయెడల, అన్నకోశమునకు దగ్గునందెడి కారిజముయొక్క భాగము అస్వస్థత నందియున్నదని మనము తెలిసికొనవలయును. ఉదాహరణకు,

దీర్ఘశ్వాసము కలిగినవారు ఆశక్తత, దగ్ధ-యాలతలములు పోషణముగా నుండినయెడల, కుడిశ్వాసకోశము క్రిందనుండియున్న కారజముయొక్క భాగమును, ఒకప్పుడు శ్వాసకోశము సహితమును, అన్యస్తతనంది యుండనని మనము గ్రహించ వలయును.

చి కి త్న.

పొచ్చెల్లల రజిజ్	...	గృ॥ 6
పొచ్చెల్లల రజిజ్	...	గృ॥ 15
అన్యస్తతనంది	...	గృ॥ 6

ఇవి అన్నియు కలిపి ఆరుమాత్రులుగా జేయవలయును. ఇందులో ఒకమాత్రయిచ్చి మిక్కిలి నాలుగు గంటలకు 4 వ విరేచనకార నియవలయును. విరేచన బద్ధముగానంతి గృహణి వ్యాధి లేకుండిరయెడల, యీ మందుల నియ్యరాదు.

గృహణి లేకుండినయెడల, దృఢమైన యిట్టియు సామాన్యముగ నారోగ్యత్రయం నుండినట్టియు రోగికి, యీవిధమిది చికిత్స జేయవచ్చును. వయన సుఖవాతంబున విరేచన కారల పాకపర్యాయము యుద్ధివ మిక్కిలి, 2 గ్రాములు టార్టార్ యెమిటిక్ ను 2 దాముల పై పోసి అగ్ని పోటాష్తో బాగుగా కలియనట్లు చేసి, దీనిని 8 భాగముల తేక పోటుములు గాఢపి పర్తిగంటకును ఒక్కొక్క పోటుమును యియ్యవలయును. టార్టార్ యెమిటిక్ వలన మిగుల తీవ్రవలయు, వాంతియలయిన యెడలగాని, తేక విరేచములు యెక్కువగా యగునట్లు చేసినగాని, 8 పోటుములకును 1 గ్రాము మాత్రమే టార్టార్ యెమిటిక్ ను ఉపయోగించి పేరు పోటుములుకట్టి వాటిని వాడవలయును. తక్కువ దార్ఢ్యత గలవారికి 20 గ్రాములు అమ్మోనియం క్లోరైడును జలములో గలిపి దినమునకు మూడుసార్లు నియ్యవలయును.

(8) కారజముయొక్క దీర్ఘ వ్యాపితమగు వాపుదల

కారజముయొక్క వాపుదల ఉద్యోగతీతముండి తత్సలితముగ దీర్ఘ వ్యాపితమగు నది కావచ్చును. తేక రక్తము మాచుకొనుట తలచుగ దటస్థించుటచే నిట్లుకావచ్చును. ఒకానొకప్పుడు యిది క్రమక్రమముగా వచ్చుచుండుటవలన చాలకాలము ఆశ్చర్య చేయబడుటచే సంప్రదియగును. కుడిభాగమునందు బరువుగా నుండునట్లుండి అప్పుడప్పుడు పొటు పాడునాచుండుట, ఆకలి పోయింతుట, కడుపు ఉబ్బరము, అజీర్ణవ్యాధియొక్క యితరలక్షణములు—వీటితో గూడుకొనియుండును. కారజముయొక్క యావంబుధమగు నొకవిధమగు వ్యాధియందు కారజము విస్తరింపజేయబడి పుక్కియెముకల క్రింద చేతులతో దడిమి చూచుట వలన గనగొనుటకు వీలగును. మత్తపదార్థములను త్రాగు వారికి యీవ్యాధి సంభవించినయెడల, కాన్నిదినములకు కారజము నన్నగిలి స్వాభావికముగ నుండిన దాని కంటెయు పోయి పోయి. ఈ రెండువిధముల వ్యాధియందును ముఖము పాలిపోయి, ఒడలుంతయు పొడిగానుండి, రోగిమిగుల అర్ధిర్యమానంద నిద్రస్థితియందుండును. విరేచనము వల్లగా నున్నను గట్టిగానున్నను దేగడమున్నయొక్క రంగునగలిగియుండును. పెత్తద్రవమువలన

మూత్రము తీవ్రవర్ణము వహించి యుండును. ఒకప్పుడు యీవ్యాధియందు పచ్చకామాల వ్యాధి కలుపించును. పేగులనుండియు ముక్కునుండియు ఒకానొకప్పుడు రక్తము కారుట సంభవించును.

కొఱకు సంబంధముగ విషములు కారణము ననుసరించి యుండును గాన స్వయముగ గాని పితృధనముగ గాని యీవ్యాధిని సంపాదించినవారు కారణమునందు రక్తము కూడు కొనియుండు వ్యాధిచే బాధనొందునపుడు ప్రత్యేకముగ చికిత్స నందవలయును.

చికిత్స.

ఉదయమున 4 వ విరేచనకారి నుపయోగించుట వలనను భోజనపదార్థములయందు బాగ్రీరగానుండుట వలనను, మత్తుపదార్థములను త్యజించుటవలనను, ఉపకాంతి గలుగజేయును. వ్యాధి కాలంతిసందక పోయినయెడల సమశీతోష్ణస్థితిగల ప్రదేశమున కెగుటవలన నుపయోగముగ నుండును.

ఈ క్రింది ఔషధయోగములను ఉపయోగింపవచ్చును.

డైల్యూట్ నైట్రిక్ ఆసిడ్ ద్రాము 1

డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆసిడ్ ద్రాము 1

టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ ద్రాము 1

జలము

బౌనుస్సులు 8

దినమునకు మూడుపర్యాయములు ఒక్కొక్క బౌనుస్సువొప్పున పుచ్చుకొనవలయును. ఈమందు పుచ్చుకొనిన పిమ్మట నోరు కడుగుకొనవలయును.

8 వ విరేచనకారిని గాని 3 న అల్పరెటివును గాని గూడ వాడవచ్చును. వీటితో నేదైన యొకటి గుణము నియ్యవచ్చును.

(4) కారిజము యొక్క పుండు లేక వ్రణము.

1. కారిజమునందు రక్తముకూడుకొని యుండునప్పుడుగాని, కారిజముయొక్క వాపు వల ఉద్వేగస్థితియందుండు నప్పుడు గాని, యీవిగవ లక్షణములు కూడియుండినయెడల కారిజమునందుపుండు పుట్టుచున్నదని యెంచవచ్చును. చలిపుట్టుట, చల్లనిచెమటలు గలుగుట; నాలుకపై విడువకుండ పొరకప్పుట; మూత్రము తగ్గుదలనంది తీవ్రవర్ణమును వహించి యుండుట; మూత్రమునందు గసి తేలుట; రాత్రులయందు జర్న మధికమగుట, అజీర్తి విరేచనములు

2. దీర్ఘవ్యాపితమగు కారిజముయొక్క వాపుదలయందు యీపుండు కర్మణ్య కలుగునుండును. ఈ వాపుదలయొక్క ఉద్వేగ తగ్గగనే, పుండు ప్రారంభమయి, రోగి ఆరోగ్యతనందక, నీరసించి, అవ్వదశపుడు చలికలుగును. సామంకాలమునందు బిచ్చదిహ్నుము కలుగుచు, నాలుకపై, పొరకప్పి, నాలుకయొక్క కొనయందును అంచులయందును యెర్రగ నుండి, కడివైపుల బరవుగాను ఆయాగము నిచ్చనట్లుగాను ఉండి, అరచేతులు పొడిగా నుండి—యీ లక్షణములతో గలిసియుండును.

3. కారిజమున దగవరకేమియు వాపు లేకుండగనే ఒకానొకప్పుడు పుండు తటస్థింపవచ్చును. రోగి చిక్కిపోయి, మనోవ్యాకులత బ్రవేశించి, బండబారిన పోటు పొడచుచు కుడిపక్కను బరువుగానుండి, కొంచెముగా దగ్గు ప్రవేశించి యుండవచ్చును. ఈ తేలికయగునామామలలన పుండు యేర్పడుచున్నదని అనుమానము కలుగకపోవచ్చును. వణకుట, ప్రారంభమయి, చల్లని చెనుటలు పుట్టి కారిజము వాపునది నట్లు కనుపడునంత వరకును వ్యాధియొక్క ఉద్భుతస్థితిని గుర్తింపబడి యుండుటలేదు.

4. గ్రహణివ్యాధియొక్క వృద్ధియందలి అలసట, చిక్కిపోవుట, పాయంకాలము నందు జ్వరము వచ్చుట, అవ్యాధియందలి దానికంటె నెక్కువ ఉద్రుతనా వహించియుండిన యెడలనున్నా, నాలుకమధ్యయందు బెరుడకట్టి కొనయందును అంచు యందును యెర్రగా నుండిన యెడలనున్నా, పక్కవైపుల నొప్పిగానున్నా, బరువుగానున్నా, యుండినయెడల నున్నా, పుండు ప్రారంభించినదని అనుమానించ దగియుండును. వణకుట యుండినయెడల, పుండును గురించిన అనుమానము నివర్తయగును.

కారిజముపైన పుండు ప్రారంభమయినపుడు, ఒకప్పుడు అన్నకోశము వైపులకు వైభాగమున వాపుతో గనబడవచ్చును. ఒకప్పుడు అన్నకోశము లోనికే కురువుగా దేలివాంటి మూలముగా బయలు పెడలిపోవును. ఇంకొకప్పుడు కేగులబానిగి ప్రవేశించి మలినకుంతయు మలముద్వారా పోవచ్చును. మరియొకప్పుడు క్యానకోశములో ప్రవేశించి దిగ్గుములముగా బయలు పెడలును. ఈమార్గములేమియు పిలువక పోయినప్పుడు, ఎదురొమ్మనందలికేగుల యందలియు అంతర్భాగములలోనికి జొచ్చుటవలన, బయటికి పోవుటకు మార్గములేదు. కురుపుపైకే దేలుచున్నపుడు, చరగ్గును యెర్రబారిన స్థలమందు, కురువును దెరచి పిండికట్టు కట్టవచ్చును. కురుపు గొప్పది కాకపోయినయెడల, యిందుమూలమున మలినములన్నియు బయటకువచ్చి, కురుపు క్రిమముగా మారి, రోగికి నెమ్మది కలుగవచ్చును. తిక్కినవిషయములలో, సాధ్యమయినంత త్వరలో తెలిసిన శస్త్రవైద్యునికి జూపించి శస్త్రము చేయించుటయే మంచిది. అంతవరకును, రోగికి బలమయిన ఆహారము నిచ్చుచు, బాధను తగ్గించుటకు గాను ఖోరర్ ప్రొడ్రోనను యిచ్చుటకంటె చేయునది యేమియులేదు. శస్త్రముచేయుట అలస్యము చేసినకొలదిని అపాయము యొక్క వగుచుండును. కురుపు విశేషించి పెద్దది అయి యున్నప్పుడు, ఒకటికంటె ఎక్కువ కురువులు ఉండియున్నప్పుడును, సామాన్యముగ మరణము సంభవించును.

5. కారిజముయొక్క నరముల సబుధమగు వ్యాధి:— కుడివైపున కొంచెము బరువుగా నుండి, కొద్దిగా ఆసౌఖ్యతతో గూడిన లక్షణము లుండి యుండునును. కుడిభుజము అలసటబడిన ట్లుండుచు, నీరసము: మనోస్థిరత లేకపోవుట, విచారము ఉండియుండును. ఆకలియు జీర్ణతయు క్రిమముగానుండి రోగికి నిద్రపట్టు చుండును. మనిషియొక్క ఆశోగ్యతయేమియు చెడకుండ యీ విధముగ కొన్ని మాసము లుండిన యెడల నీ వ్యాధిని గమనింపవచ్చును. ఒకప్పుడు ఈవిధముగ కొన్ని సంవత్సరముల వరకు గూడ నీ వ్యాధి వ్యాపింపవచ్చును.

చి క త్త.

బాధ అధికముగా నున్న యెడల సర్వకొనుటకుగాను మున్నట్లు పట్టిని సేయవలయును.
(1) వ బౌసధయోగమును (బలవర్ధకాషధము) యీయవలయును.

కింక వాయుస్య.

గొంతుపీకలోనున్నా శ్వాసకోశములనుబోవు శ్వాస వా భేదములనునున్నా పొంగున బంధమగు యొక శ్లేష్మనిపదార్థము చేరుకొని, యీపదార్థము యీశ్వాస వాతములనుబోనే అడ్డుపడుటవలనగాని, లేక గొంతునుండి గొంతుపీకలోనికి బోవు చిన్నరంధ్రమునం దడ్డు పడుటవలనగాని, ఊపిరిపీల్చుట ఆయాసమయి యీ కింక వాయువు అనేడివ్యాధి కలుగుచు న్నది. ఒకప్పుడు సాధుగతులయందు యీపదార్థము సరిగ నేర్పడకుండగనే, శిశుడే అడలి పోయి వ్యాధి దానంతట అదియే సర్వకొనును.

ఒక సంవత్సరమునకును అయిదు సంవత్సరములకును మధ్యవయసునందు మాత్రమే యీ వ్యాధి యెక్కువగ దటస్థించుచుండును. అయిదు సంవత్సరముల పిమ్మట నీ వ్యాధి వచ్చుటయే తక్కువయి యున్నది; వచ్చినను శేషికగా సర్వకొనును.

ఈవ్యాధికి కారణములు, చలిగాలి తగులుట, చచ్చు తగులుట, అయియున్నట్లు సా మాన్యముగా చెప్పబడుచున్నది. కొందరి పిల్లలయందు యీవ్యాధికి ఉద్యుక్తత అతిశయ మగునుండి, వారు తక్కువ నీవ్యాధికి లోనగుచుండురు. ఈవ్యాధి యొకసారి తటస్థించిన యెడల మరలి మరలి వచ్చుట సామాన్యముగ గలుగుచున్నది.

ల క్షణములు.

కింకవాయువు ఒకానొకప్పుడు ఆకస్మాత్తుగ దటస్థించి ఛాల్చియందు ఊపిరి పీల్చుట యందలి ఆయాసముతో బ్రాగ్భ మగును. చాలవిషయములలో కొన్ని నిసములవరకును జ్వరతేవుండి, తుమ్ములుతుమ్ముట, కండ్లవెంటిడి నీళ్ళుకారట, పొడిదగ్గు, జలుబుగూ సంబంధ మగు నీ లక్షణములతో గూడియుండును. గొంతు బొంగుబోయి యుండును. ఇట్టి సూచనల క్షణములు ఒకప్పుడు ఉండియు, ఒకప్పుడు లేకుండగను, బిడ్డ ఊపిరిని పీల్చుటయందలి విశేష మగు ఆయాసముతోడను, మెలికేయునట్టి దగ్గుతోడను నిద్రలేచును. ఈదగ్గుయొక్క ధ్వని వికారముగా నుండును. కొడికూడునట్టిగాని కుక్కమొరగు నట్టిగాని ధ్వనివలెనుండి, లోహ సంబంధమగు ధ్వనిని వహించి యుండును. ఊపిరిని పీల్చుట ఆయాసమయి, గుడ్డద్వారా గాని లోహపుగొట్టముద్వారాగాని ఊపిరిని పీల్చినట్లుండును. ఈ ఆయాసమును దగ్గును తెరలు తెరలుగా వచ్చుటకు మధ్యకాలములందు బిడ్డకు కొంచెము నిద్రపట్టవచ్చును. దగ్గు మొదటలో పొడిగానుండును. పిమ్మట తెనుట వెల్లిపోయి కాంతిని గలగజేసి, వ్యాధి అంత రింపవచ్చును.

వ్యాధి యీవిధముగా కుదిరిక నందకపోయిన యెడల తెల్లని పోసంబంధమగు పదార్థము తెలువడుట ప్రారంభమగును. ఈ పదార్థము బయటికి పోవునట్లు చేయుటకు వ్యయ

త్వము విశేషముగను. ముఖము యెర్రవారి శరీరమంతయు చెమటపట్టును. హస్తములుగట్టిగా మూయబడి యిటునట్లు కొట్టుకొనుచు, ప్రక్కట్లులు త్రోసివేయబడును. బిడ్డ ఒకప్పుడు కూర్చుని ఒకప్పుడు పరుండి తలవెనుక వయిపులకు బిగదీసికొని పోవును. కన్నులు పొడుచుకొనివచ్చి కండ్లలోని తెలుపులు రక్తవయిములయి యుండును. నాడి తొందరగాను కలిసెనుగాను ఉండును. ఒడలంతయు మంటగానుండి దాహ మధికముగా నుండును. ఏదియో అడ్డుమును దీసివేయుటకయి యున్నట్లు బిడ్డ చేతిని తరచుగ నోబియొద్దకు దీసికొనుచుండును. ఉదయమునందు యీ లక్షణములు తగ్గి నెమ్మదించుచున్నట్లు కనుపడవచ్చును. ఇంగువవల్ల ఘోర్తిగా నెమ్మదించినదని అనుకొనుటకు వీలులేదు, పాయంకాలమునకు వ్యాధి తిరిగి రావచ్చును. పలుకులు పలుకులుగా నుండెడి పదార్థము దగ్గరమాలమున తెవడగా వెల్లిపోయిన పిమ్మట వ్యాధి మదిరిక నడినను అందవచ్చును. లేక దగ్గరయొక్క తెలును ఊపిరిని పిమ్మటయందలి ఆయాశనులై శక్తిహీనత న దగ్గరయొక్క ధన్వి ఊచించి నరుకతో గూడినదై గొంతుపై వెలివేసినట్లుండి, అలసటవలనను ఊపిరి తిరుగకపోవుట తటస్థించును. తరచుగా నంతిమస్థితియందు వోకటికండు యిట్టి తెలువచ్చి మరణము సంభవించుటయు కలదు. ఈ వ్యాధియొక్క పరిమితి యిరువది నాలుగ గంటలు మొదలు ఆయిదు దినములవరకు నుండును.

చి రి త్న.

కింకవాయు ప్రభుధమగు దగ్గరగాని గొంతు బొంగుపోవుటగాని, తటస్థించిన పిమ్మటనే నీక్రింది బొంపధయోగము నిచ్చి, రోగికి ముఖ్యముగా రాత్రియందు చలిగాలి తగులకుండు నట్లు బాగ్యుత్త పడవలయును.

టింక్చర్ క్యాంఫర్ ఓ	...	ద్రాము	1
వైనం ఇసికాక్	...	మినుములు	20
స్పిరిట్ ఈథర్ స్ట్రెబ్రిస్	...	ద్రాము	1
జలము	...	బొన్నలు	2½

ఈ బొంపము, ఒక సంవత్సరము వయసునందొక ద్రామును యిచ్చి అంతకుయెక్కుడు వయసుండిన యెడల పృతి సంవత్సరమునకు నొక ఆరద్రాము చొప్పున మోతాదను హెచ్చుచేయవలయును.

కింకవాయు ప్రవేశించినదని స్థిరముగ జాలినయెడల, వాంతికారిని పెట నేయియ్యవలయును. ఇందున్నర లేక మూడు సంవత్సరముల వయసుగల దాగ్ధ్యులగు బిడ్డకు రెండు ద్రాముల వైనం ఇసికాక్ ను ఇండు లేక మూడు బొన్నల జలములో గలిపి యియ్యవలయును. బిడ్డకు శరీరదాగ్ధ్యత లేకపోయిన యెడల, మోతాదను తగ్గించిఒకద్రాము వైనంఇసికాక్ ను మాత్రము రెండు లేక మూడు బొన్నల జలములోగలిపి యియ్యవలయును. కుభ్రముగా వాంతివెప్పువరకును యీబొంపధమును పృతి అయిదు నిమిషములకును యియ్యవలయును. వాంతికారి డోడుగ 9కి మొదలు 100 డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ వేడిమిగల నీర్యయందు రోగిని స్నానము చేయించవలయును. ఎనిమిది నిమిషములలో నీస్నానమును నిలిపివేసి

అప్పుడు రోగిని తుభ్రముగా దుశ్శిచి, దుష్పటి కప్పియుంచవలయును. బాంతికాయల నిచ్చుట వలన గుణము నిచ్చిన పిష్టిట విరేచనము క్రమముగా గాఢపొయిన యుడల ఒక్కదాము చిట్లాముడము నియ్యవలయును. నివ్రాచుటకు గాను నల్లమందు సంబంధముగ వాటివేమియు నియ్యరాదు. అందువలన కఫమున కాటంకము కలుగగలదు. వేడినీళ్ళలా గుడ్డను పిడిచి తలచుగా గొంతుపైన దుడుచుచుండటవలన గుణముగ నుండును. వ్యాధియందంతటను రోగి యొక్క శరీరబలమును గాపాడుట ముఖ్యము గనుక, బలమును గలుగజేయు ఆహారములను లోనికిచ్చుచుండవలయును. రోగ నివసించియుండు గదిలో ఉష్ణమధిక మగుటకుగాను వీలయినన్ని యెక్కువదీపములను వెలిగించవలయును. గదిలోని వాయువునందలి నీటిభాగము అధికముగా నుండనట్లు గదికి బయట పెచ్చటపైన నీళ్లను మసలగాని, అందలి అవిగ ఒకగొట్టము ద్వారా గదిలోనికి వచ్చునట్లు చేయవలయును. ఈ నీళ్లను గాపాడుట గదిలోని నీళ్లును మంటపెట్టుకొడదు. గదిలోనే నిళ్లును వెళ్లనటువంటి పని వచ్చును. యీవనిగ రోగికిమంచి కాదు. ఇదిగాక ఆవిరి పైకిపోయి రోగికి యేమియు ప్రయోజనము లేదని నుండును.

అన్ని చికిత్సలును నిరుపయోగములైనపుడు గొంతుదగ్గర శస్త్రము చేయుట వలన నొకప్పుడు జయప్రదమగును. ఈపని సర్జను వలన మాత్రమే చేయవలయును.

కింకాయాయువునకు లోపైన బిడ్డలయందు జలుబు చేయకుండగను దగ్గరానుండగను కాపాడుచు, తేలికగ తీర్చుమగు ఆహారపదార్థముల నిచ్చుచుండ వలయును.

కురుపులు.

కురుపులకును వ్రణములకును గల భేదము.

కురుపులకును వ్రణములకును భేదమును గమనించవలసి యున్నది. కురుపుల యొక్క మధ్యభాగము గట్టిగా నుండియుండును. వ్రణములయందు దట్టముండును. వ్రణములయందు నిర్జీవమగు కడువ తేక మాంసము ఉండదు.

[వ్రణములు.

శరీరమునం దేభాగమునందయినను, బాధతోగూడి వాత్రుదలనంది కలిమముగానొకప్పుడు ఘోమముగానున్నా, ఒకప్పుడుఅలస్యముగానున్నా కొంచెము పనువునగుగల సీమ బయలు వెడలు దానికీవణమందురు. వ్రణములు శరీరమునం దేభాగమునందైనను తేవవచ్చును. వంటి చిగుళ్ళపైపుండ్లకును, గోరుచుట్టునకును, స్తనమునీచ్చు కాలమున స్తనములపై గనబడు బాధతో మాడినవాపుదలకును, మెడమయందలియు కాలిజును నందలియు పుండ్లకును, వ్రణములనియేవాడు దురుషిదైవా చెప్పితగుంటవలనగాని చలిగాలి తగులుటవలనగాని, ఆహారముతేమివలనగాని కొలుకు సంబంధమగు వ్యాధుల ఫలితముగగాని, శరీరముయొక్క నీరసనీకులు ననుసరించిగాని, వ్రణములు కలుగవచ్చును.

వ్రణములు రెండు తరగతులు గా నుండును. ఒకవిధమగు వ్రణములలో వాపుదలయు బాధయు అతిశయముగానుండి వాటిసడకయ్యుచుండుగా నుండును, రెండవవిధమగు వ్రణములు

సమృద్ధిగా నెదురును బాధ సామాన్యముగ నుండి చర్మము యొరగానుండినను ఉండును. లేక పొయిన లేక పోవచ్చును. మొదటి తరగతిలో రెండు లేక మూడు దినములలోగానే లేక కొద్దిగంటల లోనే గాని వాపుదల అతిశయమయి యొరగానుండి బాధ యొక్కపై చర్మము విస్తరింపునంది ను దృఢభాగమునందు యురువువర్ణము తీవ్రముగనుండును. వాపుయొక్కవయిన కొలదిని బాధగము అధికమయి పోయి పొడుచుచుండును. వ్రణాసమాపము నందలి చర్మమును, దానిని చుట్టుకొల్పయిన ఉబ్బుదలజూపి ప్రేలుతో నొక్కినయెడల సాట్టవడి అగుర్తు కొంతసేపటివరకు అటులనే యుండును. వ్రణమునందలి మధ్యభాగము కఠినముగా మెత్తబడి పక్షముననువచ్చి యిచ్చటికి నెర్తము పల్పనై యొక్కన నుట్టమగును తీవ్రమైన యెర్రని వర్ణముపోయి పసుపు నీలవర్ణములు గలిసిన చుక్కయేర్పడును. ఈ సమయమునందు వాపుఅంతయు మెత్తనై రెండు చేతులయొక్క వేర్వేర్వతోను మెల్లగా నొత్తుటవలనలోపలిచీముచెడర క్షము కదలుచున్నట్లు కనుగొనవచ్చును. చిట్టచివరకు వ్రణముపూర్తి అందలి మాల్నివ్యమంతయు, ఒకటి లేక అంతకన్నకు ద్వారములగుండా బయటికి వెడలిపోయి మొదటగా వెడలునట్టి మలినము అధికముగానుండి చిక్కనై పసుపువర్ణమును గలిగియుండును. వ్రణముయొక్క రంధ్రము ముడుచుకొని మూసికొనిపోవు సరికి యీమలినము రక్తముతో గూడినదియై స్వచ్ఛముగాను పల్లగాను యుండును. వ్రణము మానుటయందు చర్మముయొక్క ప్రేరణల ఊడిపోవును. వ్రణముయొక్క ఉద్యోతనుబట్టి, జ్వరత వణకుట తలనొప్పి వీపుయందును కీళ్ళయందును నొప్పలును తలచును. చర్మము నుండముగానున్న స్థలములయందును లోపలి భాగములయందు, అనగా ఒకవిధముగ గోరుచుట్టు పెండలగు వ్యాధులయందు, వ్రణములు తేలుటకును మిగుల అలస్యమయి బాధ యొక్కవగును. రెండవవిధముగ వ్రణములు దీర్ఘ వ్యాపితమునై అంతయొక్కన క్షయములైనవి కావు. జ్వరతయును తలనొప్పియును తగ్గుదలనందిచని లేక పోవచ్చును. వాపుదల మెల్లగా నభివృద్ధిజెందుచు, బాధయు కొంచెముగా నుండవచ్చును. చాలకాలమువఱకు చర్మముపై నుబ్బుదల గనపడక పోవచ్చును; తుదకు యొర్రనై ఒక చిన్న ద్వారముగుండ రసి కారిపోవును. ఇట్టి వ్రణములయం దారంభమున విశేషజ్వర ముండకపోయినను, చిట్టచివరకు ఉద్యోత జ్వరము రావచ్చును. దీర్ఘ వ్యాపితముగ వ్రణములు సామాన్యముగ పిచ్చువిగనుండి రసిగారుట అధికముగనుండి చాలకాలము వ్యాపించిన యెడల, దుర్బలముచేత వచ్చుజ్వరము రావచ్చును.

చి క్తి త్న.

ముండు మొదలగురవి గుచ్చుకొనుట మూలమున గలిగిడి వ్రణములయిన యెడల, అట్టివాటిని దొలగించి, లింతును నాలుగు లేక అయిదు మడతలుగా వేసిబొన్ను 1 : 10 చుక్కల స్వచ్ఛమైన కార్బాలిక్ అసిడ్ను గలిపిన నీళ్ళలో దడిపి, పైన డ్రైస్ చేయవలయును. మిగుల బాధతోగూడిన వాపుదలయొక్క ప్రారంభమున, చీము, రక్తము కూడ కొనకుండునట్లు చల్లనినీళ్ళతోగాని, ఒక అరబొన్ను నైట్రైట్ అఫ్ పొటాష్, ఒక అరబొన్ను హైడ్రోక్లోరేట్ అఫ్ ఆమ్మోనియా, ఒక అరబొన్ను సామాన్యలవణము—వీటి అన్నిటితో గలిపిన 12 బొన్నుల జలములో లింతును దడిపి పెగట్టవలయును. వ్రణములేచిన అడయకు ముసకు సంపూర్ణమైన విక్రొంతి నిచ్చుటవలనను, సాధ్యమయినంతవరకు వ్రణావయవమును ఉన్నతసామాన్యం దుంచుటవలనను, విశేషకారి నిచ్చుటవలనను, సారాయి మొదలగు

మత్తు పదార్థముల ద్రాగుట యలవాటుండిన యెడల అట్టివాటిని నిలుపు సేయుటవలనను, అరంభమునందు చీము రక్తము కూడుకొనుట కొంతవరకు నిలుపు సేయవచ్చును. కాకి చలికలిగినను, పొట్లు పొడుచుచుండినను, వ్రోణము పక్ష్యమునకు వస్తుటకును మొనడలుట కను అవసరముగ పనులను జేయవలయును. వెచ్చని పిండికట్టు కట్టుటవలన వ్రోణములు పక్ష్యమునకువచ్చి మొనడలును. ప్రతి నాలుగు గంటలకును క్రొత్తపిండికట్టును కట్టుచుండవలయును. చిన్నవ్రోణములైనయెడల వేడినీళ్లతో శుభ్రముగా గడిని గానవ్రోణముమార్చి పిండి కట్టు కట్టుటచాలును, క్రొత్తకట్టుకట్టుటకు ముందుగా ప్రతి తడవయును వేడినీళ్లతో గడగవలయును. పిండికట్టు కట్టుటకు ముందుగా కొంచెము చమురు రుద్దువలయును; యిట్లు రాయటవలన పిండియేమియు చగ్గమున కంటుకొనకుండ నుండును. పిండికట్టు బాగుగా చల్లారిన పిమ్మట నిలువయుంచిన యెడల, ఒకప్పుడు హానికరములగును గాన వాటిని పెంటనే తీసివేయవలసియుండును. బలము నిచ్చునట్టియు తేలికగా జీర్ణమగునట్టి యాహారములను లోనకీయవలయును. వ్రోణమును బుట్టించుటకు రుగ్మతను గలుగ జేయు బహిరికానణ మేమియు గానరాకున్నప్పుడు శరీరముయొక్క రక్తమునందలి లోపములవలన యని గ్రహింపవచ్చును. పండ్లచిగుళ్ళు జగురుగానుండి రక్తము గారుటకు లోపయియున్న యెడల పన్నీ వ్యాధి ఫలితమని తెలిసికొనవలయును. ఇందులకు క్రొత్తగా గ్రహింప కాక పదార్థములను నివృత్తమును భుజింపవలయును. నిస్సత్తువతోగూడి రక్తహీనత యుండినయెడల పల్పేట్ ఆఫ్ బరన్ నీయవలయును. దీనియొక్క మోతాదు 2 మొదలు 5 గ్రాములవరకు ఆయుయ్యు. ది; దీనిని రెండులేక మూడుబోనుల జలములో గలిపి యిచ్చువలయును. మిగుల పొటునుగలిగించువ్రోణములకు శస్త్రముచాల అవశ్యకము. శస్త్రము చేయుటలో డనేజి పశాంతినిచ్చును.

రోగియొక్క శరీరతత్వము మిగుల నీరసగతియందుండినయెడల క్విన్సను (1) (2) బలవర్ధకౌషధముల నియ్యవలయును. గాలియు వెలుతురునులేని గదిలో గాకుండగ భరిశుభ్రముగు గాలివచ్చుగదిలో రోగిని యుంచవలయును. ఇందువలన వ్రోణమునుండి మలినములు త్వరగా నేర్పడి త్వరగా వెడలిపోవుటకును, వ్రోణము త్వరగా ముడుచుకొన జేయబడి కుడికనందుటకును వీలుగనుండును. వ్రోణము బాగుగా జేరిన పిమ్మట కొనజేరియుండును; అప్పుడు చర్మము పల్లగా నున్న భాగమున కుభ్రమయినట్టియు వదునైనట్టియు లాస్సెట్ (ఒక విధమగు కత్తి)తో శస్త్రముచేయవలయును; అంతట వెనుద్రవకుంతయు ఒకప్పుడు విసురువాటుతో బయలు వెడలును. ఈ మలిన మంతయు తొందరగా బయటికి రావలె ననెడి యుద్దేశముతో నా భాగమును అదివి పట్టరాదు. తేలికగా పోయినంత దృఢము పోయిన పిమ్మట నారంభము మూసికొని పోకుండునట్లుగా చమురులో ముంచిన పన్నీనివత్తి యొక్కించి పిండికట్టును గట్టువలయును. రెండుమూడు గంటలతరువాత పిండికట్టును న్ను వత్తిన్నీ దీసివేసి వేడినీళ్లతో గడుగుటవలన బాధలేకుండ నొత్తివత్తి దీసివేయ గలిగినంత మలినపదార్థమును దీసివేయవలయును. తిరిగి పిండికట్టును గట్టుచు అనుదినమును మార్చి న్యవంతయు బయటికి వచ్చువరకును నెప్పుదిగా నొత్తి పట్టుచుండవలయును. వ్రోణము యొక్క ముఖభాగము మూసికొనిపోకుండ జాగ్రత్తగా జూచుచుండ వలయును. మలినము కడుగునలిచిపోయి గాయము తెరచియుండి ఆధారము వలసియుండిన యెడల పలుకొన్నివేయవలయును.

కురుపులు.

ఇండియా దేశమునందు కురుపులు సామాన్యముగ తలపెట్టెను. ఈ కురుపులు యొక ప్రాదు ఒకటిగా లేదు. కలదు. అనేకములుగా లేదు. ఇవి అనేక పరిమాణములలోని బహుభాగములు మొదలు కోడిగడ్డను వరకును అంతకు అధికముగనుగూడ ఉండి ఉండును. పక్షుకురుపులు సామాన్యముగ కాళ్ళు, చేతులు, పెదకు పెనుకవయ్యలు, నుక, తొడలు సమీపమున—యీ భాగములయందు లేవును. కొన్ని విషయములలో బాధయు వాపుదలయు గలిగినవియు చీముయు పెదకు క్షమును గూడకొనుట లేకుండగనే వాడుతల ఆవియు అంతరించిపోవును. కలమీద నొక ప్రాదు వందలకొలది కురుపులు లేవును. ఇండియా దేశమునందలి యీకురుపులు నేడిమివలన గాని దుర్మాయువువలనగాని చెడు ఆహారమువలన గాని అధిక పరిశ్రమవలన గాని జ్వరపీడనవలనగాని రక్తహీనతవలన గాని రక్తమునందు గలిగిడి లోపమువలన కలుగుచున్నవి. ఇట్టి ఉద్యుక్తతలకు లోనయిన జనులయంద క సాత్తుగ నేర్చిన జెయ్యుతగులుగాని, లేకుండ నందుటగాని, దురింపినయెడల కురుపులు యేర్పడును. రక్తము విషయము నుగుటవలనను కురుపులు కలుగవచ్చును. పండ్లువచ్చునపుడు పిల్లలకు కురుపులు లేవవచ్చును. ఉష్ణప్రసవములనుండి నమృద్రాశ్రియమునందలి పట్టుముతకు బోవుటవలన నొకప్పుడు కురుపులు కలుగవచ్చును మామిడి పండ్లు తినుటవలన కురుపులు లేవనని కొందరు తప్పు భావించును నందుచున్నాము. మామిడిఫలములు ఋతువు వెనువెంటనే చెమ్మతో కేడివి. అధికముగ నుండుటవలన రక్తము కడిపోయి అధికముగ నుండుటవలన రక్తముచెడిపోయి కురుపులు లేవును. పక్షుకురుపులు రాచపుండ్లని వాడుదురు.

చికిత్స.

అన్ని విషయములలోను రోగియొక్క సామాన్యమగు శరీరారోగ్యతను గురించి శ్రద్ధతో విచారించి తగు చికిత్సను చేయవలయును. నాలుక ముద్దుబారి జీర్ణావయవములు అస్వస్థకయందుండినయెడల దీ ప విలేచనకారి నువయోగింపవలయును. బలహీనులయెడల సిక్కిట్ అఫ్ మెగ్నీసియాను ఒకటి లేక రెండు పద్ద చెమిచాలను ఒక అరటంబుడు జలములో వేసి యిచ్చువలయును; స్మర్తీసంబంధమగు అనుమానముండిన యెడల, అహారపదార్థములయందు కాకపదార్థములు తక్కువగా యయినపుడు శ్రాత్తగా గోసిన కాయగూరల నువయోగింపవలయును. కొన్ని దినములవరకు పశిడినకాను రెండు లేక మూడు బొన్నల నిమ్మరసమును లోనకు ప్రయోగింపవలయును. బాటుకు సంబంధమగు వ్యాధి ఉండినయెడల, దీని అల్పరేటి పును బుచ్చుకొన వలయును. విటామిన్, రక్తహీనత, ఉండి యుండియుండి 1 కు బలవర్ధకొదధమును బుచ్చుకొనవలయును. వివిధమయిన నిరవ్యాధియు విలేచన బిడముగ నుండి యెడల సక్కిట్ అఫ్ సోడాతోడను, లేనియెడల నదిలేకుండగను, దీ ప విలేచనకారిని బుచ్చుకొనవలయును.

కురుపులయొక్క స్థలములయందు ఆవిసిపండిన ఉడికించి పిండికట్టు కట్టవలయును అతికాయల గట్టుటయు వాడుక గలను. బారానీక్ లెంటును నాలుగయిదు మోడుకలుగ వేసి, ఉడుకునీళ్ళకు బీల్చుకుండ దానిని తేని నెనవేసి. కట్టినను కట్టవచ్చును. మలినము కూడ గలియున్న ప్రాదు పిడికేటిని భాగమును పరిశుభ్రమయిన లాస్సిట్ (చిన్నక త్రి)తో గీరవ

యును. వృణములకు జేయుచికిత్సనే దీనికి జేయవలయును. దీర్ఘకాలము పీడించు కురుపులకు ప్రతిమూడు గంటలకు ఒకసారి స్పిరిటుస్ ఆఫ్ క్యాలఫరును వైసరాయటువలన, కురుపులు హరించిపోవును. రసికారుట నిలచిపోయిన పిమ్మట నుండుపుండ్లను కుభ్రముగా కార్చా లిక్ లో లోపనతో గడిగి, సింపిల్ ఆయింటు మెంటు వేయటవలన మానగలవు.

కురుపులను బోగొట్టుటకు, కురుపుచుట్టును ఒకటి రెండు అంగులముల మేరకు ఒక తక్కువో లినిమెంటు ఆయెండిన్ ను, మొదటిదినము మాడుపర్యాయములును, తరువాత తరు వాత తక్కువ పర్యాయములును అష్టలము పొక్తకుండునట్లు మోతము రాయవలయును. లినిమెంటు బెలడో నాయెక్క్యు గ్లిసేను యొక్కయు సమానభాగములను గలిపి కురుపు నుండి మాలిన్యము రాకమునపు వాపుదల యుండినప్పుడు, రాసినయెడల వాపుదల తగ్గిపో వును. క్యాలిస్సయం సోల్ ఫ్యూడ్ 1/10 గ్రేయిను గల చుత్తేలను ప్రతి రెండులేక మూడు గంటలకు నిచ్చినయెడల, క్రొత్తకురుపులు యేర్పడి కుండగను, ఉండియున్న కురుపుల యొక్క ఉబ్బుదల తగ్గిపోవునటులను, విస్తీర్ణ తగ్గునటులను, జేయుచు త్వరలో వాటిని పక్షమునకు దెప్పించి, మాల్విన పత్తిస్థుతతో పెడలిపోవునట్లు పనిచేయును. ఇతరములగు నుండు లేమి పుచ్చుకొనుచున్నను దీగని పుచ్చుకొనవచ్చును.

కుష్మరోగము.

కుష్మరోగము, ఐరోపాఖండమునకు తూర్పుదేశములనుండి ఐగుప్తు దేశము ద్వారా క్రిస్తుశకమునకు మూడు లేక నాలుగువందల సంవత్సరముల పూర్వము, గొంపోబడియు న్నట్లు తెలియుచున్నది. పదనయదవ శతాబ్దములకు మధ్యకాలములో, నతిశీఘ్రముగ వ్యా పించియుండెను. ఈ వ్యాధిపీడితులను విడిగా నుంచుటవలనను, ఆరోగ్యకాస్త్ర విధులను జక్కగ గమనించుటవలనను, ఆయాదేశములయం దీవ్యాధి చాలవరకు దరిమి వేయబడెను. బ్రిటన్ నందును, ఇతర ఐరోపియను దేశములయందును, యీ వ్యాధి స్వస్థానజనితమైయుండిన వారెవరును, యిప్పుడు కానరాదు. వార్యే దేశమునందును మధ్యధరాసముద్రము నంటి యున్న కొన్ని దేశములయందును మాత్రము, యింకను కొద్దిగ వ్యాప్తనంది యున్నట్లు దలి యుచున్నది. ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండములయందును, అమెరికా ఖండమునం దుష్ణప్రదేశ ములయందును యీవ్యాధి యింకను బలవత్తరముగనే ఆవహించియున్నది. యండియాదేశ మునం దీవ్యాధి అచ్చటచ్చట నావరించియున్నను, యిప్పుడీదేశమునందు ఒకలక్షకు మించిన కుష్మరోగపీడితులు కలరని లెక్కలవలన దలియుచున్నది. నీనాదేశమునందలి సంఖ్య మిగుల అధికమయియున్నది.

ఈవ్యాధి అంటువ్యాధి అయియున్నది. ఒకవిధముగు పురుగు శరీరమునందు బ్రకేం చుటవలన నీవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఈపురుగు 1874 సం॥ 1875 వాస్తవ్ అనునాంశవలన గనుగొనబడినది. ఈవ్యాధి అన్నివయస్సులయందు దట్టస్థింపవచ్చునుగాని, పదితనమునందును బాల్యమునందును మిగుల దట్టవయ్యెనున్నది. వ్యాధి అంకురించినది మొదలు పంపూర్తి యగుసరికి సామాన్యముగ రెండు లేక మూడు సంవత్సరములు పట్టును. ఈనరిమితి కొన్ని విషయములలో మిగుల హీనమయినచో మూడు మాసములు కావచ్చును. పరిమితి మిగుల అతిశయమయినచో ముప్పది సంవత్సరములును యొకానొకప్పుడు పట్టును.

కుష్ఠరోగము మూడువిధములయి యున్నది. మొదటిది గుండ్రమైనటిగాని వంకరలైన టిగాని తామ్రవర్ణము గలిగినవచ్చులు శరీరమునం దేభాగమున నయినను లేచి, తరువాత తెల్లనై, అస్వస్థతనందిన చర్మము బండబారి పోవును. ఈ అస్వస్థత కాలివేర్చుటగాని, చేతి వేర్చుటగాన, ముఖమునకు గాని, శరీరమునం దేభాగమునకైనగాని తటస్థింపవచ్చును. ఇంక వది చర్మముపైని నెత్తుగ కాయవలె వృద్ధినుంది యీ ఉన్నతప్రదేశములయందు పుండ్లుయేర్పడి క్రిమికృమముగ నీ పుండ్లు నూలునున మాంసమును, యెముకలునుగూడ దినివేయబడి, కాలి వేర్చుట డిగిరిపోవును. ముండవని పుండ్లు విధములను కలిసినవై యున్నది.

చి కె త్న.

కుష్ఠరోగమునకు సరియైన వం దింకను కనిపెట్టబడి యుండలేదు. ఓలియండ్ గొక్కార్డి యనుదానిని 2 చుక్కలు మొదలు 40 చుక్కలవరకునుదిన మునకు మూడు పర్యాయములు చొప్పున యిచ్చుటవలన గుణముగా నుండగలదు. ఆల్బెనిక్ (పాపాజము) లోనకిచ్చుట వలన బలవర్ధకౌవధముగ బనిచేయగలదు. అన్నా అనునాయన, ఇక్ తియాలను పర్వత మానసుగు మోతాదులలో లోనకిచ్చుచు, లానోలిన్ ఆయంట్ మెంటులో, పదవవంతు పైకోగ్యాల్లో అన్నియు వాన, పదవవంతు క్రియిసాఫానిక్ అనిడినుగాని, గలిపి వైనరాసి నయెడల, ఉపకాంతి గలగలదని చెప్పుచున్నాడు. ఆరంభదశయందు, సాల్మిసెలేట్ సం బాధనుగు లనణములను 15 గ్రియియల మోతాదుతో పార్గరంభించి దినమునకు నాలుగు పర్యాయము లిచ్చుచు, క్రియముగా మోతాదును పొచ్చించి ఆరుమాసములవరకు యిచ్చిన గుండల, తప్పక గుణము నసబడగలదని డానియల్సన్ అనునాయన చెప్పియున్నాడు.

కుష్ఠరోగము అంటువ్యాధి గావున నీ వ్యాధితో బాధనందువానిని విడిగానుంచి నన సంఘముతో సంబంధము నేకుండ జేయవలయును.

కొంకరలు వోవుట.

కొంకరలువోవుట అకస్మాత్తుగ దటస్థించదు. ఈవ్యాధి తటస్థించుటకు ముందు కొన్ని లక్షణములను గుర్తింపవచ్చును. బొటనవేర్చుట ఆరచేతుల వైపునకు నడుచుకొని పోవుట, వేర్చుట పట్టుపట్టుట, కానిలేవేడ్లు ముడుచుకొనుట, నిద్రయందు ఉలికిబడుట, వంకర జూపులను తాచుట, ముఖము కదలించుట, యీ లక్షణములతో గుడి యుండును. ఇట్టి గుణములు కనువడికపుడు బీర్థవయవముల యొక్కయు పండ్లయొక్కయు, ఆహారము యొక్కయు స్థితులు విచారించ బడవలయును.

బిడ్డలు ఒకానొకప్పుడు రాత్రిపులను భయపడి నిద్రలేచి ఉద్యుతిముగా నేడ్చు యారంభింతురు. ఇందులకు కారణము నాసికాబలములు దిగిసి యుండుటవలన నైయుండ వచ్చును. ఈ భయోద్రోకము కొంకరలు వోవుటలోనికి యీ ద్వబడవచ్చును. అజీర్ణతయు ఒకానొకప్పుడు యీ భయమును బుట్టింపవచ్చును. ఇంకొకప్పుడు నిద్రయిండి లేచినతోడనే ఊపిరిని బిచ్చుట ఆయాసమయి ముఖమంతయు యెర్రబారి బిడ్డ ఉక్కిరి బిక్కిరి యగుట తటస్థించును. ఊపిరి బిచ్చలేక వోవుట వలనను అలసటవలనను యొకప్పుడు మరణము గలగ వచ్చును.

చికిత్స.

మెడవైపుల నుండి గుడ్డలన్నియు శీఘ్రముగా నడచింపు జేయబడి పరిశుభ్రముగా
గారి లోనకువచ్చునట్లు జేయబడి బిడ్డకు గారి తగులనట్లు చేయవలయును. ముఖముపైన
చల్లని నీళ్ళుకొట్టి వివరము పీపుపైన గట్టిగా చుట్టవలయును. ఉడుగునీళ్ళలో నొక గుడ్డను
పిండి, దీనితో గొంతుపైని తటాలాన దుడిచి, ఒక అరనిమిషమైన పిమ్మట దీనినేని యిదే
పద్ధతిని ప్రతి అయిదునిమిషములకును ఒకపర్యాయము చేయవలెనని ముగలు చేయవల
యును. భోజనానంతరము యీవ్యాధి తటస్థింపబడెదలె, వాంఛితమగుటకు ఒక యింకను
గొంతులానికి బోనిచ్చి వాంతిని గలిగించవలయును. పశ్చిమిగుమ్మి న్నుదువుగనుండి ఉద్విగ
యెడల వెంటనే కత్తితో గీరవలయును. దీనితో వాంతి కాకపోయినయెడల, ఒకదానిము
పైనం ఇమికాకు ఒక అరబొన్ను జలములో గలిపి యియ్యవలయును. వీటివలన సామాన్య
ఉపశాంతి కలుగగలదు. ఒకప్పుడు ఉపయోగములేక పోయినయెడల, దీనిను వేడినీళ్ళలో
స్నానము జేయించవలయును. కొంతరలు పోవుట తిరిగి తటస్థమయిన యెడల, తల్లిపెగులను
పెడచేసెయ్యను బిడ్డ రును(పొక్కునుండు) చేయూని అవసరమగును.

కొకరలు పోవుటయొక్క ఉద్దేశ్యము తగ్గినచో, బ్రామైజి అధి పోయినయెడల (2 వ
అల్పరేటివు)ను యియ్యవలయును. మలబద్ధ ముండిర యెడలనున్నా సేగులలో పురుగు లుం
డిన యెడలనున్నా అందులకు దగు చికిత్స జేయవలయును.



కొరియా.

కొరియా యనబడు కొంతరలు పుట్టించు ఒకవిధమగువ్యాధి సామాన్యముగ బిడ్డల
యందును ముఖముగా అడవిల్లయందును దట్టస్థించును. ఎనిమిది మొదలు పదునాలుగు
సంవత్సరముల వరకు నుండు వయస్సునందు యెక్కువ తరచుగ వచ్చును. దుష్టమైన ఆహార
ముల నియ్యబడునట్టియు అనారోగ్యస్థితులయందు నివసించునట్టియు పిల్లలయందీ వ్యాధి
వచ్చుట మధ్యకత అతిశయముగ నుండును. ఏదైన నింకొకవ్యాధి అనగా, స్కాల్డల్
జ్వరము, పొంగు, కోరింతదగ్గు, కీళ్ళనొప్పులు మొదలగువాటి వలన ఏవైనా ప్రీతీహానం
వచ్చును. మలబద్ధము, సేగులలో పురుగులుండుట, పుట్టిపన్ను, కుష్టువచ్చుట, సాన్యత్వ
—పీడితలనను యొకప్పుడు యీవ్యాధి కలుగవచ్చును. చిన్నవయసుల యందు మునుపటి
వయసుందలి క్రమమదస్పటవలన నీవ్యాధి తటస్థించునని సామాన్యముగ జెప్పుకొందురు. బల
హీనులగు బిడ్డలకు గలిగిన భయమువలనను యొకానొకప్పుడు యీవ్యాధి సంభవించు
వచ్చును. అధికమగు మనఃపరిశ్రమయు కారణముగ బరిణమించవచ్చును దుష్టమగు ఆలవాటు
లను యీ వ్యాధిని బ్రోత్సహింపరువవచ్చును. ప్రత్యేకముగా కారణమేవియు లేక నొకప్పు
డు వంశపారంపర్యముగ రావచ్చును. వయస్సువారలయందు; సెగరొగమునంది రావచ్చును.
లక్షణములు.

కీళ్ళనొప్పుల గలిగియుండుట, మనోవిచారము, ఆయాసము, కొంత మధికమగుట,
నిద్ర పట్టకపోవుట, ముఖము చిట్టించుట; కాళ్ళు కదలించుట—యీ లక్షణములలో గూడి

యును. ఈ వ్యాధి సంపూర్ణవస్థ నందినప్పుడు కొన్ని ఆవయవములే గాని లేక ఆవయవములుగాని పరాకాష్ఠ కదలక నందవచ్చును. నడచుటయుండు కాలు ఒకవైపునకు యాడుకొనిపోవును. చేతిని నోటియొద్దకు దీసికొనిపోవుటకు యత్నించుటలో నది సుదరుసవైపునకు గాని భుజమువైపునకు గాని తలమీదికి గాని గొంపోబడును. ఒకప్పుడు మాట్లాడుటకష్టముగా నుండును. ఏదైన నొక ఆవయవమునకు పక్షవాతము సంభవించవచ్చును. ఆలసటతో గూడిన మూర్ఖులు రావచ్చును. గుండె అధికముగా గొట్టుకొనుట తటస్థించవచ్చును. ఆత్మద్రుతిమగు విషయములలో, హింసణమువలన, రోగినురణము నందవచ్చును. ఈవ్యాధికి సామాన్యమగుచరిమితకాలము రెండు మాసము లయియున్నది. ఒకప్పుడు ఆరుమాసము లయినను పట్టవచ్చును. ఆశ్చర్య జేసినయెడల దీర్ఘవ్యాపిత వ్యాధిగ నేర్పడవచ్చును.

చికిత్స.

వ్యాధి బహుశః యేకాకరణమువలన గలిగినదని విచారించ వలయును. పేగులలో పురుగుబండుట వలన యైనచో, వాటిని దొలగింప వలయును. వలబద్ధముండిన యెడల దానికి జీకిల్ని జేయవలయును. పంపు నచ్చుట మూలమున వైనచో వాపుదల నందిన పంటి చిగుళ్ళను లాస్సెట్ (ఒక విధమగుకత్తి)తో గీరవలయును. రక్తప్రాసత వలనయైనచో నందులకు వలయు జీకిల్ని జేయవలయును. బురుగుప్రాసమునందలి లోపమైన యున్నయెడల అందులకుగు బొంబడముల నీయవలయును. పొందురోగ మున్నయెడల అందులకుగు జీకిల్ని నొసర్చి వలయును. సిస్టెస్టవ నల్లనయినచో బలవర్ధకౌషధముల నియ్యవలయును. సామాజి సంబంధమగు బలవర్ధకౌషధ మిచ్చుట శ్రేష్ఠము. దుష్టమైన ఆలవాటు లేమైన యుండిన యెడల, అట్టి ఆలవాటులను మానిజేయ వలయును. మిగుల ఉక్కుతమగు విషయములలో సంపూర్ణమైన విశ్రాంతియు నెవ్వడియు గాపాడ బడవలయును. రోగి ఒక చీకటిగదిలో పక్కపై బరుండ బెట్టుబడి ఉత్తేజమునుబుట్టించు కారణములన్నియు దొలగింప బడవలయును కాళ్ళను పడులును దివసంతటను ఆనేకసారులు ఒత్తవలయును. పెద్దవారలకు పగలు నిద్ర వచ్చుటకుగాను పొటాసియం గ్రామైడం (1 వ ఆల్టరెటివు)ను దివసమునకు మూడుసారు నియ్యవలయును. రాత్రులయందు నిద్రబట్టటకుగాను క్లారల్ బేషధయోగమును యియ్యవలయును. నిద్రలకును యివే బేషధముల పయనుపరీకారము మోతాదుల నేర్పరచి యివ్వవలయును. ఉక్కుర విషయములలో సాధ్యమయినంత త్వరలోనున్నూ, సాధ్యరతులలో శిశువుమగునున్నూ, బాంబువునందలి మూర్ఖు కొంత, నివాసపరీక్షమును మార్పుట ముఖ్యమయి యున్నది. శిశువొప్పలచే గలిగిన కొరియావ్యాధికి వలన సంభవించిన గుండెరోగము పిచ్చుట కొంత కాలమువరకు సామాన్యముగ నిలచియుండి, క్రమముగా దానంతట అదియే సద్దామోనును.

కొఱుకు రోగము.

కొఱుకురోగము అంటువ్యాధులలో జేరినవై క్రమముగా నిభిర్భృత్తిండుచు నాలకాలము వ్యాపించునదియై యున్నది. ఈ వ్యాధికి మూల కారణము ఒక విధమగు పురుగు

రక్తమునందు బ్రోవేడెంచుట వలననై యున్నది. ఈవ్యాధి స్వయముగ సంపాదించుటయు, మరొక హేతుమార్గమున సంపాదించుటయు, విత్పుననముగ బుట్టుకతోడనే గలిగియుండుటయు, — యీ మూడువిధములుగ వ్యాధిసంధు మున్నది. స్వయముగా సంపాదించుటయన, విశేషమగు విషయములలో నీవ్యాధిచే బీడింపబడుట పురుషులలోగాని స్త్రీలలోగాని సంభోగప్రాప్తి సమదలన నీవ్యాధి సంభవించుచున్నది. మఱియొక, స్వస్వపానముచేయుట, కరచుట, పచ్చబొడుచుటయందు యీవ్యాధి పీడితుడు తనఉమ్మిని ఉపయోగించుట, టీకాలు వేయుట—పిటిద్యారా ఒకానొకప్పుడు యీవ్యాధి వ్యాప్తత నందుచున్నది; ఇంకొక హేతుమార్గమున నీవ్యాధి వ్యాపించుట యెట్లున అదివచ్చే కొలుకు పురుగుచే మాలిన్యమునందైన తాగింపు కుపయోగించు గిన్నెలు వంటిపనిముట్లు మొదలగువానిని తిరిగి ఉపయోగించుట మూలమున గూడ నీవ్యాధి వ్యాపించుచున్నది. ఆరుదల స్థితియందుకూడ నీ కొలుకు పురుగు అనేకవారముల వరకును సజీవిగ నుండుచున్నదని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ వ్యాధియొక్క అభివృద్ధి మూడుగతులుగ నియమింపబడి యున్నది. ఈ మూడుగతులను యీక్రింద వేరువేరుగ వివరింపబడి యున్నవి:—

ప్రథమగతి.

స్వసంపాదన వలననైవో వ్యాధి శరీరమునం దావహించిన (శరీరజన్మమును బట్టి) పడినములు మొదలు ముప్పది దినములలోగా, ముఖ్యముగా జన నేందిరియమలయం దెచ్చుటనో యొకచోట ఒకయెర్రైనైన చిన్న పొక్కు పుట్టి నాలుగవ దినమున యది నీరహితమైకొని దాని అడుగుభాగము వాపుదల నందును. ఈపొక్కు ఒకప్పుడు నాలుక, పెదవి, గవదకాయ, కనురెప్ప, చేతివ్రేలు — లేక శరీరమునం దేభాగమున నైననుగూడ లేవవచ్చును. ఈ పొక్కుయందు మాలిన్యమేర్పడి; అది నెలవడి, బాధ తేనట్టి పుండుగా నేర్పడి, చుట్టుపక్కల గట్టియయి అంచులు ఉన్నతములయి వధ్భాగము గొయ్యిగానుండును; ఈపుండుయే యీవ్యాధికి ప్రథమగతి యనబడును. ఈవ్యాధి శరీరమునం దావహించిన నాలుగు లేక ఐదు దినముల లోపుగనే యొకప్పుడు యింకొకవిధమగు పొక్కులేచి, యీ పొక్కునందు మొదటనే రసి యేర్పడియుండును. ఇది గట్టిగానుండక యెక్కువ బాధతో గూడి దీనిని అనుసరించి అంత తరచుగ కొలుకువ్యాధి లక్షణములు పిచ్చుట వ్యాపింపక పోవచ్చును.

పుండు పొరంభమయిన పిచ్చుట గాని లేక పుండు మానిపోయిన పిచ్చుట గాని పడునైదు మొదలు ముప్పది దినములలోగా గజ్జలలో వాపుదల పొరంభమయి, మెల్లదనమేర్పడి చిక్కలుగా చేలవచ్చును. ఇవి ప్రణాములుగా జేలినయెడల ప్రణాములకు చికిత్సనే జేయించవలయును.

ద్వితీయగతి.

కొన్ని వారములు, నెలలు లేక సంవత్సరములు గడచిన పిచ్చుట ఈ వ్యాధియొక్క రెండవగతి పొరంభమగును. ఈగతి సామాన్యముగ నారువారముల వరకు వ్యాపించియుండును. ఒకప్పుడు మూడు మాసములవరకు గూడ నుండవచ్చును. ఈ గతియందు రోగికి ఉత్సాహముచేడి, కిళ్ళనోపులు ప్రారంభమయి విక్రమముకల యందును మదమయెముకల యందును బాధ అతిశయమయి అతిశక్తితో నిద్రొచ్చుటకుండు నుండును. అంతట చర్మవ్యా

ధులు పొరంభమయి గొంతు పచ్చిచేయును యేర్పడి నాలుకవైసయును పుండ్లు అగుటయు కలుగును; ఇవి అన్నియుగాని లేక కొన్నియేగాని తండ్రిని పవచును. రోగికి గొంతు బొంగు పోయి చెవిలో పోట్లు పుట్టవచ్చును; ఈ రెండవగతియందు ఒకప్పుడు జ్వరము వచ్చి నను రావచ్చును. కొలుకు కుండలి చర్మవ్యాధిలో తొలుతుగ నరచేతుల యందు పొక్కులు లేవును. ముఖము పునగును ముక్కుయొక్క పక్కలను నోరుయొక్క కోణముల యందును తల ప్రసరయును ఉదర భాగమునందు బొడ్డుచుట్టును కడుపు

కిరుతెపులను ఆసనము జననేంద్రియముల సామీప్యమునకు పాదముల కడుగుభాగము నను యీ పొక్కులు లేవవచ్చును. ఈ అవస్థయందలి జ్వరము సామాన్యముగ 101 డిగ్రీలను మించియుండదు. కొద్ది నీటియనులలో మాత్రము జ్వరము ఉద్భుతము నహించి తగ్గుచు పోవచ్చుచుండెడి నిధమున గాని. దినము విడచి దినము వచ్చుచుండెడి విధమున గాని, వచ్చుచుండును. ఇట్టి సందర్భములలో జ్వరము 104 లేక 105 డిగ్రీలుకూడ రావచ్చును. ఒకానొకప్పుడు పొండురోగము ప్రవేశింపవచ్చును తలనొప్పియు సాధుగతియందగుగాని ఉద్భుతగతియందుగాని తండ్రిని పవచును. పొక్కులు ఉద్భుతగతియందుండినపుడు కళ్ళు దురదలు పొరంభమయి పునుగుగట్టిగూడును. ఈ వ్యాధి బలమయినపుడు కండ్లకు మసకలు యేర్పడవచ్చును. ఈ వ్యాధియందు లోపలి చెవి అస్వస్థత నందినయెడల ఒకపుడు రోగికి ద్వారలోనే పూర్ణమైన చెవుడు కలుగవచ్చును. ఒకానొకప్పుడు కాలియొక్కయు చేతియొక్కయు గోళ్ళు దళములయి పెరుగుతెక్కి ప్రభాగము మిట్టపల్లములుగాను నడుపాటి గోతులుగాను యుండును. ఇంకొకపుడు గోళ్ళయొద్ద పుండ్లుయేర్పడి మిగుల భాభగలిగించును.

ప్రతి రోగియందును ప్రసరించిన లక్షణములన్నియు, కనుపడవు. ఒకప్పుడు శరీరముపయిన పొక్కులుమాత్రమే గనబడి గొంతునొప్పితో పోవును. ఈ ద్వితీయగతియందు ఒకప్పుడు ఆరుమాసములు మొదలు ఒక సంవత్సరమువఱకు నుడుటకలదు.

తృతీయగతి.

ద్వితీయగతియందు దిగు చికిత్స చేసినయెడల సామాన్యముగ నీవ్యాధి పెంపందదు. ద్వితీయ గతియందు శరీరమునా దుపరిభాగములు మాత్రమే అస్వస్థత నందియుండును. తృతీయగతియందు అస్వస్థత అంతవాసయధములకు వ్యాపించి స్నాయుపులు ఎముకలు మొదలయినవి అస్వస్థత నందును. వ్యాధి పొరంభమయిన మొదటి సంవత్సరముననే యొకప్పుడు తృతీయగతి పొరంభమగును. ఒకప్పుడు మూడవ లేక నాల్గవ సంవత్సరమువరకు నాగియుండును. ఈ వ్యాధియందు తృతీయ గతికి వ్యాపించుట బహు ఆరంభగా గలుగవచ్చును. ఈ వ్యాధి తృతీయగతివఱకు వ్యాపించియున్నప్పుడు, రోగియొక్క అంతరాసయవముల సేకవిధములకు నస్వస్థత కెందియుండును. రెండుసంవత్సరముల పరిమితివరకును యీ వ్యాధి సంబంధమగు లక్షణములేమియు గనబడకుండునయెడల, అట్టివారు వివాహము చేసికొనవచ్చును. ఇట్టివారియందు తమ భార్యలకును బిడ్డలకును నీవ్యాధి వ్యాపింపజేయుట కవకాశము తగ్గి పోవుచున్నది. కొలుకువ్యాధితో బాధనొందువారు యేంపందర్భమనందును వివాహము చేసికొన నర్హులు కారు.

అడువారలు కొలుకువ్యాధితో బాధనొందుచుండినయెడల, తమ శరీరమునందలిదెడి కొలుకు విడవలితముగ, గర్భసౌరమముల నందుచుండురు. కొలుకు రోగముతో బుట్టినబిడ్డలకు

బాహిసముగ నుండి బొంగుపోయిన భ్వనితో నేడుచు నుక్కుల వెంబడినవము పడలును
ఒడలు పయినయ్యను, ముఖముగా జన నేందిగ్రియ భాగములయందును. తామ్రవర్ణము గలిగిన మచ్చలు కనబడును. ఇట్టివిడ్డలు ఉత్పత్తి అయ్యెను మునుకు తేలికగా లోనగుదురు.

చికిత్స.

పశ్చిమగతియందు పొక్కు యేర్పడి, పుండుయేర్పడినమునుపే అయినందుండి యెటు
జాగ్రత్తగా నంతటను నిల్వనైతేరేటును ఉపయోగించుటవలన గాని, శీతస్వచ్ఛమయిన కార్బు
లిక్ ఆసిడ్ తోడ నద్దటవలనగాని, దానిని రూపు మానవలయును. అంతట అనుదినమును
దానిని, నూనపుటకుగాను లింతును నాలుగయిదు మడతలుగావేసి కార్బులిక్ లోషనుతో
దడిసి పుండుచుట్టును గట్టుచుండవలయును. యిట్లు చేయకుండగనే, పుండుయేర్పడినయెడల
క్యాలోమెల్-లెంబాటరు ఔషధయోగమును లింట్ తో నుపయోగించవలయును. పుండు
భాగమును కుద్రముగా నుంచుట మిగులముఖ్యముగాను అందులకుపయోగించుటకు పైతో
పను హాజరులేనియెడల ఒకదానిము బోరిక్ ఆసిడ్ ను ఒకపయింటి ౧౦ములలో గలిపి దాని
తోడనుగాని, పెర్ ప్లూరిక్ ఆఫ్ మెర్క్యురీ ఒక భాగమునకు రెండు వలభాగముల నీళ్ళు
గలిపి, దానితోడనుగాని (లేక) సల్ఫేటు ఆఫ్ బొక్ రెండు గియినులను ఒక బొమ్మజల
ములలో గలిపి దానితోడనుగాని పీటిలో దేనితో నయినను భాగమును గడుగవలయును.
పుండు యెర్రగా నున్నయెడల అయ్యునోసారమును పయిన గట్టవలయును. రోగియుక్కు
ఆరోగ్యత అదివరకే వ్యాధిచేతను బీడకుండినయెడల ప్లూగెన్ (మెర్క్యులా హైడ్రాజెన్)
3 గియినుల మోతాదుతో దినమునను మూడుసార్లు నివ్వవలయును. నోటియందు లోహ
సంబంధమును రుచి గలుగు వరకుగాని - లేక - పండ్లదిగుళ్ళు పచ్చిగా నుండ వరకుగాని
యీ ఔషధమును యియ్యవచ్చును. ఈ మాత్రా సేగులపైన బనిదేయించునట్లు గనబడిన
యెడల, ప్రతి మోతాదుతోను ఒక పావుగియిను యొక్క స్పాక్రు ఆఫ్ ఓషియంను గలిపి
యియ్యవలయును. క్రమమయిన ఆహారమును భజించుచు, శరీరమునకు వెచ్చగలుగునట్లు
దుస్తులను ధరించుచు, కొద్దియైన శరీర పరిశ్రమను దీసికొనుచుండ వలయును. చుట్టును
గాల్పుటను మత్తుపదార్థముల దాగుటను నిలిపజేయవలయును. సంభోగమునున్న నిలుపు
దల జేయుట ఉత్తమము. సామాన్యముగా వేడి నీళ్ళయందు స్నానము జేయుటవలన శరీర
కుభ్రతను గాపాడవలయును.

ద్వితీయ తృతీయ గతులయందలి చికిత్స.

ద్వితీయ గతియందు మెర్క్యురీ (పాదరసము) సంబంధమును ఔషధముల నుపయోగిం
చుట యందలి అవశ్యకత చాలమందిచే నొప్పుకొనబడి యుండినదేగాని, దానిని ఉపయోగిం
చు విధమునందును దానిని ఉపయోగించు కాలపరిమితి యందును వివిధాభిప్రాయము లంద
బడుచున్నవి. మెర్క్యురీని నాలుగు విధములుగా వాడవచ్చును:— (1) లోని కిచ్చుటవలన
(2) వైన రుద్దటవలన (3) అరి పట్టుటవలన (4) నూదితో లోనకు యింజు చీయుట
వలన.

వ్యాధియొక్క ఉద్యోగ గతియందు మాత్రమే మందులను పుచ్చుకొనుచు తక్కిన
కాలములందు మందు బుచ్చుకొనకుండుట మంచిదికాదు.

ఫోర్స్టాయరు అను నాయన యీ కింది చికిత్సను జెప్పుచున్నాడు. గీస్ ఆయిడైడ్ ను ముప్పాతిక గ్రాయిను మొదలు ఒకటిన్నర గ్రాయిను వరకు గల మోతాదును ప్రతిదినము ఈ క్రింది విధముగ నీరువలయునని చెప్పుచున్నాడు. మొదటి రెండు సంవత్సరములయందును, ప్రతి ఆయిడు మాసములకును మొదటి రెండు మాసములయందును యీ బొవధమును యిచ్చుచు, తక్కిన మూడుమాసములయందును బొవధమును నిలిపివేయుటను, జేయవలెను. మూడు నాలుగు సంవత్సరములయందు, యిదే బొవధమును ప్రతి ఆరుమాసములకును ఆరు వారములు దీనిని నాలుగున్నరమాసములు నిలిపివేసి, యీ రెండు సంవత్సరముల యందును యీ ప్రకారము జరుపవలయును.

రికార్డు అను నాయన, ఆరు మాసములవరకును మెర్క్యరీ సంబంధముగ బొవధము నియ్యవలయుననియు, ఏమ్యట మూడుమాసములు పొటాసియం ఆయిడైడ్ ను యియ్యవలయుననియు, అంతట నొవధము నాపివేయవచ్చుననియు చెప్పుచున్నాడు.

హచ్చిసన్ అను నాయన హెడ్రాజరీ కం కేటా (గోవపుడు) ఒక గ్రాయిను మోతాదుగో పావుగ్రాయిను లేక అయిదవంతు గ్రాయినును నల్లమందును గలిపి, రోగియొక్క శరీరాంత్యంతకు భంగము లేకుండ వేసికొనగలిగినన్ని సార్లు యియ్యవలయును. ఉమ్మి ఊరుటగాని, అజీర్తి విరేచనములుగాని, కాకుండ సాధ్యమయినంత యెక్కువ మెర్క్యరీని శరీరమునందు బ్రోవేశపెట్టుట యీ పద్ధతియొక్క ఉద్దేశ్యమయి యున్నది. వండయొక్క స్థిని గాపాడుటవలన, వటిక గంధూవము నుపయోగించుటవలనను, ఉమ్మిఊరుటను నిలుపుజేయుచు సరియైన ఆహారము నిచ్చుటవలనను, నల్లమందును చిన్న మోతాదులలో నిచ్చుటవలనను, అజీర్తిని అటంకపెట్టుచును ఉండవలయును. ఈ మార్గలను దినమునకు నాలుగు లేక ఆయిడు లేక ఆరు లేక ఏడు సహితమును భోజన సందర్భము లేకుండ నియ్యవచ్చును. ఇట్లు ఆనుదినమును విశేష కాలము చేయవలసి యుండును.

బైం ఆయిడైడ్ అవ్ మెర్క్యరీ గ్రాయినును 8 మొదలు 16 మోతాదులుగాజేసి లాసకిచ్చుటవలనను ఉపయోగముండగలదు. మిగుల ఆలస్యగతులయందు ఒకదాములైకర్ హెడ్రాజరీపెర్క్లోరైడ్తో 8 గ్రాయినుల పొటాసియం ఆయిడైడ్ ను గలిపి తరచుగా నిచ్చుచుండుట ఉపయోగించగలదు.

తృతీయగతి యందలి పొక్కులకును కాళ్ళపై నలేచిడి బొబ్బలకును పాదరస సంబంధముగ బొవధములతో గూడిగాని లేకుండగాని 8 గ్రాయినులు మొదలు 20 గ్రాయినులు మోతాదువరకు పొటాసియం ఆయిడైడ్ ను దినమునకు మూడుసార్లు యియ్యవలయును.

మెర్క్యరీ సంబంధముగ ఆయిడుపెట్టున శరీరమునకు మర్దనచేయుట వలన పెక్కువ ఉపయోగ ముండగలదని భాంగరి అభిప్రాయమయియున్నది. ప్రతిదినమును 40 మొదలు 60 గ్రాయినుల వరకు ఘ్నా ఆయింట్ మెంటును ప్రతిదినమును శరీరమునం దేదోయొక భాగమున ఒక అరగంటసేపు మర్దనచేయవలయును. మర్దనచేయుటకు ముందుగా నొసము చేయుట మంచిది. తాగి పగులతయు వేరు వ్యాపకముండినయెడల సాయంకాలము మర్దన చేయుట మంచిది. తేనివో ఉదయమునూట ఉత్తమము ఈ పనిః ఓలియెట్ అవ్ మెర్క్యరీ

దీని గూడ ఉపయోగింతురు. కాని, అది అంత ఉపయోగముగా నుండియుండలేదు, ఇటీవల మెర్క్యూరీ గణినిమున్న సబ్బుబిళ్ళలగుడ నుపయోగించబడుచున్నది. ఈ సబ్బులను నురుగు వచ్చిన పిచ్చుట అవరుగును ఒడలుపైగాని ఆరుట్లు చేయవలయును.

మెర్క్యూరీ శీఘ్రముగా బలిచేయుటకయ్యును, దీర్ఘకాలిక నైనటియు ఉద్యుతగల యందండ్రినట్టియు, విషయములలో బాగుగా పనిచేయుటకును, అతిరిపింపు పనతి ఉపయోగించ బడుచున్నది. ఇందులకై 20 మొదలు 40 గ్రాముల వరకు క్యాలామేట్ (రస భస్మము)ను ఒక చిన్న గిన్నెలోవేసి ఒక చిన్న దీపము పైనపెట్టి, ఒక పదులన్నుమూతదల గిన్నెలో ఉడుకునీళ్ళనుబోసి, —యీ రెంటిని పేము కుర్చీకింద పెట్టిపట్టిలో రోగి మున్ను తిని గత్తుకొని ఒక అరగంటసేపు కూర్చుండవలయును. నీళ్ళ ఆవిరయంగు, రసభస్మము కాలిన పొగ కలిసి, శరీరమునకంతయు పట్టును ఈపనిని దినమువిడిచి దినము ర్కాంతి పనిండుముందర జేయవలయును.

సూదితో రక్తములోనికి ఇంజెక్టు చేయుటకై, క్యాలామేట్, యెల్క్సోఅక్ సైడ్ అఫ్ మెర్క్యూరీ, హైడ్రాజరి పెర్ క్లోరైడ్, సోల్యూషన్సు నుపయోగింతురు సామాన్య గతులయం దివి ఉపయోగింప దగవు. కొలుకువ్యాధి, కండ్లకు, చెవులకు, మొదలగునవి, వ్యాపించిన గతులయం దీవదల ఆవలంబింప దగియున్నది. వీటి అన్నిటిలాను ఎర్క్సైడ్ అఫ్ మెర్క్యూరీ లోషనుతో నింజెక్టుచేయుట మిగుల ఉపయోగముగ గనుగొనబడెను. ఇంజెక్టుచేయుటయందు మిగుల శుభ్రతను వహించి, యెక్కువ బాగ్యతతో బలిచేయవలసి యుండును.

వివిధమైన చికిత్స నిచ్చును రోగియొక్క సామాన్య అరోగ్యతను కాపాడుటకు దగులపొయత్తుములను జేయవలయును. శేలికగా జీర్ణముగునట్టియు బలమునెక్కు నట్టియు, ఆహారపదార్థములను భుజించుచుండుటయు, పెండలకడ పరుండుటయు, పరిశుభ్రమయిన గాలి దగులునట్లు జేసికొనుటయు, గాయపునందును నివాసపు జీతము నందును మార్పుజేయుటయు—యివి అన్నియు చికిత్సయందలి ప్రధానాంశములు అయియున్నవి.

ఒక గర్భవతియగు స్త్రీ, తనకు కొలుకువ్యాధి లేకపోయినప్పటికిని, తనభర్తకు కొలుకు వ్యాధి యుండియుండినయెడల, గర్భవత్కాలమునందు వ్యాధికి చికిత్సనంద వలయును. ఈ వ్యాధియొక్క లక్షణములు కనుపడకపోయి నప్పటికిని చికిత్స నొందవలయును.

గర్భి

గర్భి అనునది సామాన్యముగా చేతివ్రేళ్ళనుండున, ముఖమునందును గుండెయొక్క తల కంటే చిన్నదైన పొక్కులుగా ప్రారంభమయి, పిమ్మట యితరభాగములకు వ్యాపించును దీనికి చిదుము అనియు వాడుకపేరు కలదు. చర్మము క్రింద స్థానము నేర్పరుకొనడియొక విధముగు పురుగువలన నీవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఈ పురుగు అకారమునందు గుండ్రముగా నుండి బహు సన్నముగానుండును. ఈజాతి పురుగులయందు మొగపురుగుకంటే అడుపురుగు పెద్దదిగానుండునుగాన, బూడిడవ్వము తెలుపువర్ణము గలిగిన రంగుగలిగి, కడులుచున్న అంబ

పురాపమున, నొకప్పుడు దీనిని కంటితో జూడవచ్చును. సూక్ష్మదర్శన యంత్రము క్రింద బరిశీలించిన యెడల తాపేణ ఆకామున నహించి వెండు కలతోడను ముడ్డవోడను మోయించు తలయొక్క కొననును బుగ్గెన దపుడని గలిగియున్నది. మరల గనబడును. ఈనపుడు నోవోనే ఈ ఆకుపుగున చర్మము పల్లగానున్నది వృద్ధులు నున్న యుండెడి చేతి యొక్కయు మనోక్ష్మయొక్కయు లోపలిభాగమున చర్మముయొక్క పైపొరలోని పల్లని భాగమునందు వెరియ లజేయును. చర్మమునందు గొకసారి ద్వివేళించినపిమ్మట యీపురుగు తిగి బయటికి రావలె చర్మమునందు పిగ్మలజేయును. అప్పుడు తననందానమును జగతరములుగా వర్ణింపును. సూక్ష్మదర్శన సూక్ష్మోగిరలగినట్లుగా ముక్కల చుక్కలాగా గాని యీ వెరియలు మనము చూడవచ్చును. దీనివలన దుగద (రాత్రులయందు ముఖ్యముగా) అపరిమితముగా నుండును. ఈగట్టి కొంత కాలము వ్యాపించి చికిత్సకొందని యెడల, గోతు లవలన రేగువలయుచి, మూనిన్య మేగ్నబడి, యీ వెరియలు పుండుగా మారవచ్చును. గట్టి కలిగి ననాగిని దూరముగా నుంచవలెను.

చి రి త్న.

ఆస్వస్థతనందు భాగములను నబ్బుకోవలెను నీళ్ళతోడను కుప్పియుగా గడవలయును; ఇందువలన నేరియలు బయలుపడవును. అప్పుడు బొవధయోగముల యందుల గంధకపు ఆయింట్ మంట ను దినమునకు రెండుసారులు బాగుగా రుద్దవలయును. చేతులకు పాతగుడ్డలను గట్టియుంచి, పని ఆయినపిమ్మట వాటిని దగులజెల్ల వలయును. మూడు దినములపిమ్మట రోగి వేదినీళ్ళలో స్నానముజేసి, కార్బాలిక్ సబ్బుతో కుప్పియుగా రుద్దకొన వలయును. గంధకపు ఆయింట్ మెంటును తిరిగి ఉపయోగించవలయును. విశేషబద్ధ ముండినయెడల, కాలవిరేచన మగుటకు సాధకము జేయుటతప్ప, లోనకు జేరుచుండుల నిత్య నవనరములేను.

గ నో రి యా

(సె క రో క ము)

గనోరియా ఆంగ్లేయభాషా పదము ఆయియున్నది. దీనికి తెనుగునందు సెకరోగ మందును. ఇది అంటు వ్యాధి ఆయియున్నది. గనోకాకన్ అనబడు ఒకవిధమకు పురుగువలన నీవ్యాధి కలుగుచున్నది. ఈవ్యాధి పురుగులకును స్త్రీలకును గూడ గలుగవచ్చును. వ్యాధి ఆపడించిన మూడు దినములకును అరుదినములకును మధ్యగా, మూత్రీవ్యారముయొద్ద యెర్ర నై, ఒకప్పుడు దురద పూరంధమయి యింకొకప్పుడు నూదిపోటు పొడిచినట్లుండును. అటుపిమ్మట మూత్రీవ్యారముయొద్ద, మొదటలో కొద్దిగానున్ను, పిమ్మట అధికముగాను నున్న, దిగ్గివయ వెలుకడుట యేర్పడును ఈదగ్గివయయొక్క గంగు గొందరియందు తెల్లగా నున్ను, కొందరియందు కనుపు పర్ణము గలిగియున్ను. మరికొందరియందు అకువన్న వర్ణము గాని యెర్రనివర్ణముగాని గలిగియున్ను, యందును. ఈవ్యాధియందు మూత్రీచూర్ణము వాపుదల ను గొందును. మూత్ర విసర్జనయందు మంట గానుండును. అత్యుక్తతావస్థయందు మూత్రవిసర్జన కాలమున విశేషబాధ యుండును. మూత్రీవ్యారము విశేషముగా వాచి

యండినపుడు, యీస్థితికి “కాస్టి” యందురు. ఈ యవస్థయందు బాధ ఉన్నట్లయినను, నుండును అడువారలయందు, ఈవ్యాధియొక్క లక్షణములను బుకోరియా (నూనెవ్యాధి) యొక్క లక్షణమునకును భేదములేదు మూత్ర విసర్జనయ దు మరియు ఉడి యెడల గర్భియా వ్యాధిగక, శనియెడల బుకోరియా వ్యాధిగను, భాషించవలయును.

గనోరియావ్యాధియందలి వాపుదల ఒకప్పుడు క్షయజలములను వ్యాపింపవచ్చును. ఈ వ్యాధిసంబంధి ఒకప్పుడు నీరుడుటి తియి వాపుదల నందవచ్చును గజలలో నిశ్శలుక బవచ్చును శక్తిముయొక్క నివరభాగములందలి చర్మము ఒకప్పుడు వాపుదల నందవచ్చును శీతనాపులును గలగవచ్చును. గనోరియాయందు వెలువడు చ్చివము పొగబాటున కంట్లను పెగులుట దట్టస్థించినవో, చిన్నపిల్లలయిన యెడల అంధత్వమే యేర్పడును గావున నిందువిషయమయి బట్టలకుగాని చేతిప్రేళ్ళకుగాని తగలకుండ బాగోతగ నుండవలయును. ఈవ్యాధి పీడితులు రహస్యస్థలమందు ప్రత్యేకమగు గుడ్డలను గట్టుకొని అప్పుడప్పుడు వాటిని తగులబెట్టుచుండవలయును.

ఈవ్యాధి ఒకప్పుడు యెంతమంది చికిత్సనందినను మరుగునాని నందొక దీర్ఘవ్యాధివలయు గీట్ అనబడు స్థితిలోనికి వచ్చును. ఈ స్థితియందు చ్చివము వెలువడు లక్షణము మూత్రోక్తయై యిది అప్పుడప్పుడు కలుగుచుండును. ఉదయమున గాని దినమునం దప్పుడప్పుడు గాని ఒక చుక్కమూత్రమే వెలువడును. ప్రితిదినమును అగువడక పోవచ్చును.

చికిత్స.

పురుషులయందు యీవ్యాధి, కొంచెము దురదలోడును ద్రవసంబంధమగు పదార్థము వెలువడుటతోడను అరంభము కాగానే 3 బౌన్సు జలములూ 2 గ్రాయినుల నిల్వకు పై ట్రేటును గలిపి నాలుగు గంటల కొకపర్యాయము పిచికారీ చేయుటవలన గుణమియ్యగలదు. ఈప్రకారము ఆరు లేక యెనిమిది పర్యాయములు చేయవలయును. వెలువడు చ్చివము యెరిగినయెడలనున్న బాధ కలిగిన యెడలనున్న యీ పద్ధతిని ఆపివేయ వలయును. పిచికారీచేయుటకు ముందుగా మూత్రమును విసర్జించవలయును. విరేచన కారులలో 1వ బౌన్సు యొగమును బుచ్చుకొన వలయును. విరేచనకారిని బుచ్చుకొనిన పిమ్మట ప్రితి గంటకును ఒక చుక్క టింక్చర్ సల్ఫువామికా (విరుముప్పి)ను ఒక ద్రాచము జలములూకేసి లోనకు బుచ్చుకొనవలయును. రోగి సాధ్యమయి సంతకరకు పరుండియే యుండవలయును. ఈవ్యాధియందు విక్రాంతి దీసికొనుట మిగుల ముఖ్యము. రహస్యభాగమునకు పైస చల్లగా నుడులుకు తడిగుడ్డను జాటుట మంచిది. ఒక పైంటు సాధారణ ఉష్ణజలములూ 2 గ్రాయినుల పొటాష్ కర్మాంగనేటును గలిపిన లోషనుతో దినమునకు పది లేక పందొండు సార్లు మూత్రోద్వారమున పిచికారీ చేయవలయును.

జ్వరచిహ్నములు తగ్గకనే కొవేబాను లోన కియ్యవలయును. కొవేబావలన నొకప్పుడు దద్దురు పుట్టవచ్చును. అంతట నీ మందును నిలిపివెయ్యవలయును. ఈ స్థితియందు బింక్ సల్ఫ్యూర్ లోషనును దినమునకు రెండుసార్లు పిచికారీ చేయుట మరయోగించ వలయును. మూత్రమునందలి అమ్లమువలన మంటబుట్టును గాన, దీనికై పొటాష్ సింగ్లెస్ గాని

అంగీయ వైద్య చింతానుజీ,

మెగ్నీ నియా నిట్రిన్ గాని గలిసిప జొడవలను లోనకు బుచ్చుకొనవలయును. సాన్య జలమును సోడావాటరును లిథియావాటరును విశేషముగా బుచ్చుకొను చుండవలయును. తుదకు మూత్రోమార్గముయొక్క కొన్ని భాగములు గట్టియగుటవలనగాని, మూత్రోమార్గము సంపూర్ణముగాని కొంతవఱకుగాని బంధించబడును. దీనికి 'స్ట్రీక్చర్' అని వాడుదురు. ఈ అవస్థయందు సోకానొకప్పుడు గొట్టమును మూత్రోద్వారము గుండ నీరుడు తిత్తివత్తును. పోనిచ్చుటవలన మూత్రోమే మూత్రమును వెలువరింప వీలగును. సామాన్యముగా మూత్రము మూలములకంటె అధికప్రయత్నము చేయుటవలన మూత్రోద్వారముయొద్ద బాధకలుగుచు, మూత్రము వెలువడుట సంభవించును. కొన్ని ఉద్యుతగతులయందు యీవ్యాధి మూత్రోశయమునుండి మూత్రోగ్రంథాలకు గూడ వ్యాపించును. అడువారలయందైనచో, గర్భాశయమునకు వ్యాపించుట మూలమున, అనగా, గనోకాకన్ క్రిములు గర్భాశయమునందు బ్రకృతింపట వలన, అట్టివారు సంతానప్రాప్తికి దూరలగుదురు.

ఈవ్యాధి అడువారలకు గలిగినచో, మగవారలకుండు వ్యాధిలక్షణములకు దోడుగా, రహస్యభాగములంతయు పేడినతోడను బాధతోడను గూడి, మూత్ర విసర్జనయందును, నడచుటయందును, కష్టముగా నుండును. అడువారలకు మూత్రగ్రంథమును మార్పుటకు పొటాష్ సిట్రిస్ మెగ్నీనియా సిట్రిస్ లను మూత్రము లోనకిచ్చుటకు దప్పి, లోనకిచ్చుటకు పేరు జొచ్చుము బుపయోగింపబాలవు. పొటాష్ పర్మాంగనేట్ సోల్యూమను భగరంధ్రము లోనికి పిబ్బికారీ చేయవలయును.

ఈ వ్యాధియందు వృషణములకు అస్వస్థత గలిగినచోడల పిచికారీ చేయుటను ఆపి వేసి ఉడుకునీర్యతో ఆభాగమును కాపడము గాచవలయును. మూత్రోశయము వాపువలనందినయెడలనున్న పిచికారీ చేయుటను ఆపివేసి రోగిని కడినీర్యలో స్నానముచేయించి పేగులయొక్క అడుగుభాగముపైన ఉడుకునీటితో కాపడము గాచవలయును. ఇందులకు వేరుచికిత్సనున్నా జేయవలసియుండును.

గనోరియ వ్యాధి 'గ్లీట్' స్థితికి వచ్చినపుడు బహుజాగ్రతగా చికిత్స చేయవలసి యుండును. జింక్ సల్ఫేట్ లోవనును పిచికారీచేయుచు బ్లస్ (లోహము)ను లోన కిచ్చుట వలన గూమి యగులదు. ఈ అవస్థయందలి చికిత్సన విశేష కాలము పట్టును. ఆహార పదార్థముయందు బహుమితముగా నుండవలయును. లైకర్ కాంటాక్ స్టేవి బక్కు యెట్ క్యూరేషన్ ఒక ద్రావియోష్టక దివమునల రెండు సారులు జలములో గలిపి యియ్యవచ్చును.

క్రిగ్నర్ లై చికిత్సచేయుటకు నర్జనుయొక్క సలహా నీసికొనుట మంచిది.

గర్భవత్సంబంధముగు వాంతులు

ఈ గర్భవత్సంబంధముగు వాంతులు సామాన్యమగ గర్భముగలిగిన అంశవారసునందు బాగ్రంభముగా మూడవమాసము చివరకు అంత్యమగును. ఒకప్పుడు యింకను కఘ్రిముగ బాగ్రంభముయొక్క సవనముయము వలన నిలిచి యుండును. విశేష శ్రమలూ కడుపులూ

దిగ్విప్లవము వాంతులు వెళ్ళుటయు, ముఖ్యముగా నుదంతమున గలుగుచుండును. కొందరు
యందు దినమంతయు నటులుండి ఉద్యోగ గతియు నవలంబించి వచ్చును.

చికిత్స

కడుపులో దిగ్విప్లవము వాంతులు కలుగుటయు చాధుఁ తిలోనే నుండి యెడల,
యందులకు జకిత్స అవసరములేదు ఉద్యోగముగా నుండినయెడల యెంతవఱకువచ్చును నల్ల
నిట్లుగలిగినదియు విచారించి, అట్టిదానిని త్యజింపవలయును. ఇతర కాలములందును శీర్షము
చేసికొనగలిగిన అహారపదార్థములను గర్భవత్కాలము నందు శీర్షము చేసికొని త్యజింప
వచ్చును. విశేషమునగిగా కాకపోయిన యెడల చిట్టాముదమునుగాని కాపాగూసాగూగ్రాదా
మూతలనుగాని పుచ్చుకొనవలయును. కడుపు ఉబ్బుగనుగా నుండినయెడల ఆందు కగుజకిత్స
జేయవలయును. కొందరు స్త్రీలు ఒక టంబురు ఉడుకునీళ్ళు త్రాగుటవలన గొన్నినిమిషములు
వాంతియగుట వెక్కువగావించి పిమ్మట వాదినమునకు నాతిపు గలిగియుండును. వాంతి
యగుట మిగుల యెక్కువగానుండి దినమంతయు ఆనందప్రసార నుండినయెడల గొన్ని పరిమాణ
ములుగ బలముగ అహారపదార్థములను, అనగా పాలు మొదలగు నాహార లోన కిచ్చుచుండ
వలయును. సోడావాటరు త్రాగుటవలన నొకప్పుడు గుణమియ్యగలదు. ఒక దానినున్నిట్లు
అమ్మోని నూ అరొమేటిక్ ను లోనకొచ్చుట వలనను, గుణము కనుపించవచ్చును. ఔషధం ఇవి
కాకను ప్రతిగంటకు ఒకచుక్క చొప్పున ఒక దానిము జలములో గలిపి యిచ్చుటవలన నొక
ప్పుడు మంచి గుణము నియ్యగలదు. గుడ్డను అనేక మడతలువేసి, తడిపి, అన్నకోశముపైన
గట్టుటవలన నొకప్పుడు ఉపయోగముగ నుండును ఈకట్టును ఉడుకుముననే రెండు లేక
మూడుగంటలవరకు నుంచవలయును. ఒకటి రెండు పెద్దచెమిచాల సిటీగ్రేట్ అఫ్ మెగ్నీ
సియా వచ్చుదను ఒక అరటంబురు జలములో గలిపి యిచ్చుటవలనను యొక ప్రభు ఉపయో
గించ గలదు 2 ప్రొట్ట ఉడుకు జలములో 1 టౌన్సు టింక్చర్ ఓపియనుజేరి, యీఅవిరిని
చీల్చుట వలనను యొకప్పుడు గుణమియ్యగలదు.

గర్భస్రావము.

గర్భస్రావము సామాన్యముగ నారవ మాసమునకు పూర్వమున గలుగుచుండును. అద
మాసముల పిమ్మట శిశువు జరించిన యెడల ఆకాలపక్షగణన మనబడును. గర్భస్రావము
యెక్కువ తక్కువ నయ్యెడి కాలము చూడదయ్యదునుచు దయియున్నది. ఈమాసమున
కొంచెమెచ్చు తక్కువగ ఋతుస్రావ కాలముననే గర్భస్రావము కలుగుచుండును. గర్భస్రావ
మొక్కసారి గలిగినచో నిది మరల మరల సంభవించుట కద్యుక్తత యేర్పడుచున్నది. కొం
దరి స్త్రీలలో నిది అలవాటుగ దటసింపవచ్చును. ఇందులకు కారణములు అనేకములున్నవి.
నిశ్చయమైన, మనోదోషము, కోపోదోషము, భయము, అనదు. ఇచ్చి, పుట్టుపయిన కాల
కారణం, బండితుడువు, పీడిలో చేసినవలనను గలగ వచ్చును. గర్భకాయము యొక్క బల
హీనత వలన గాని, లేక, వ్యాధివలనగాని, ఒకప్పుడు గర్భస్రావము గలుగవచ్చును. గ్రహాణి

అంగీకృత వైద్య చింతామణి

128

సకా

మూలముగను విరేచనకాయల దుర్వాసుక జేయుట వలనను, గర్భస్రావము కొందరు ప్రేలు స్వాహాపానముగ శరీర దౌర్బల్యత గల వారలగుటచే గర్భము మునుప రాకముచుపే సాగ్రవము కలుగుచుండును. వివజ్వర పీడన గలిగిన యెడల నీ దౌర్బల్య తకు దోహదము గర్భస్రావము తప్పక గలుగును. కొఱుకు రోగమును గర్భస్రావమునకు గారణ మగుచున్నది. కొఱుకు రోగమున్న యెడల, గర్భభారణ ప్రారంభమునుండి; వెనుకటి గర్భవత్కాలముదు యేకకాలమున గర్భస్రావ మేర్పడినచో అంత పరిమితి వరకును, ఆయొ డెడ అఫ్ పాటానీయం ర గ్రయినుల మోతాదును దినమునకు మూడుసార్లులు పుచ్చుకొను చుండ వలయును.

లక్షణములు.

గర్భస్రావము గలుగునెడల, ఒకవిధమగు ఆయాసము, నిస్సౌఖ్యము, అలసట ప్రారంభ ము, వెన్ను నడుము, తుట్టు - బీజీవపుల పొట్టు పాడుచుచు కొద్దిగా రక్తస్రావ మేర్పడును. ఈ లక్షణములు కొంత కాలము ఉండిన పిమ్మట కాన్పుయందు నొప్పులవలెనే నొప్పులుగలిగి ఒకప్పుడు వాంతియగుటయు, అధిక రక్తస్రావమగుటయు, గలుగును. ఈ రక్తము పూర్ణముయిన యుర్రులగు లిగియుండును. నొప్పియును, రక్తస్రావమును అప్పు డప్పుడు కలుగుచు యీ అవస్థ చాలదినములవరకు నుండవచ్చును. ఒకప్పుడు గర్భస్రావము అకస్మాత్తుగా బ్రూరంభముయి, అంతయు కొన్ని గంటలలోనే పూర్తి కావచ్చును. మూడు మాసముల పిమ్మట యైనచో, పుడమి, యెరుపు తీలుపు లిగిన యొకబంతి ఆకారమును, వహించి, పావురము గుడ్డయొక్క పరిమాణము గలిగి యుండును. ఇంకను అధికకాల మయిన పిమ్మట యయినచో, కాలపరిమితి ప్రకారము పరిమాణము నందు పెద్దదిగానుం డును. బాధయొక్కగను రక్తస్రావము యొక్కయు ఉడుతను బట్టి పిమ్మట అపాయనీతి యేర్పడియుండును.

చికిత్స.

గర్భస్రావము గలుగు చిన్నములు కనబడిన వెంటనే పరుండియుండుట మూలముగ విశ్రాంతిని దీసికొనుటవలెను, ఒకటి మొదలు అయిదు చుక్కలవరకు యుక్తస్రావ్య అఫ్ కోనియందు రెండుగంటల రోకపర్యాయము యిచ్చుట మూలమునను గర్భస్రావమగుటను నిలుపు చేయవచ్చును. లేక యుక్తస్రావ అఫ్ వైబర్నం పూర్తినిభాలియా లిక్విడ్ నయినను రెండు గంటల రోక పర్యాయము ఒకద్రామ మోతాదు చొప్పున నీయవచ్చును.

బాధ యొక్కవయి, రక్త స్రావమును అధికమయినయెడల, గర్భస్రావము, తప్పుక దటసించును. ఈ సందర్భమునందు రక్తము విశేషనవ్దము కాకుండునట్లుల జాగ్రత్తపడవల యును. ఈ స్థితియందు 1 వ అస్త్రింజెంటు నిచ్చుచు, రోగి పరుండియే యుండి రక్తస్రావ భాగమునందు దడిచుడ్రు నుంచవలయును. గర్భస్రావము కాగానే రక్తస్రావము సామాన్య ముగా దానంతట అదియే కట్టును. ఒకప్పుడు మలిన్యమును దొలగించుట అవసరమగును. పైన చెప్పబడిన 1 వ అస్త్రింజెంటుకంటే 3 వ అస్త్రింజెంటు మిగుల ఉపయోగముగ నుం డునుగాన, పీక్షణయెడల దీనిని ఉపయోగించవలయును. ఈస్థితియందు, రోగి, ఏడు లేక యెనిమిది దినములవరకును పరుండియేయుండి విశ్రాంతిని దీసికొనవలయును. ఆహారపదార్థము లందు తేలికవి పుచ్చుకొనుచు, విరేచనము క్రియముగా నగునట్లుల జాగ్రత్త యిచ్చుకొనవల

యును. గర్భస్థావమునందు, వెంటనే తిరుగుచు అరంభించినయెడల గర్భాశయముయొక్క ఆస్వస్థత యేర్పడునుగాన, యందునివయముయి శ్రీలు బహువాగ్రతిగా నుండవలయును.

గవదలు.

చెవియొక్కయెదురు వైపునను, దవడకుక్రిందు గానన్నూ, ఉమ్మిసీని స్రవించుగ్రంధియొక్క వాపుదల మూలమున నేర్పడెడి వ్యాధికిగవదలు అనిపేరు. ఈవ్యాధి సామాన్యముగఁజేల యందుదటస్థించును. ఒకప్పుడు పెద్దవారల యందును దటస్థించును. ఈవ్యాధి ఒకసారివచ్చిన వారికి మరలవచ్చుట బహుఅరుదుఅయియున్నది. ఇదిఅంటువ్యాధిఅయి నున్నది. ఈవ్యాధియందు వ్యాపించు పురుగునోరి మాయందలిగనో కాక నేపురుగురూపముననుండును. ఈవ్యాధియొక్క వ్యాప్తతకుచలిగాలి మిగుల అనుకూలముగ నుండును. ఈవ్యాధి సంబంధముగుపురుగు శరీరము నందుబహుళము పెదలుమూడువారముల వఱకుబంధింపబెట్టుట, గవదలులేలును. నిస్రావి, చలి, జీర్ణాస్వస్థత, వాంతియగుట, రాత్రియందు తాపము గలుగుట—యీలక్షణములతో బాగుండును. అంతట, శరీరవేడియి చాలనివయములలో 100-101 డిగ్రీలకు పోవుచు కొద్దివివయములలో మాత్రము 103, 104 డిగ్రీలకు గూడ పోవును. ముఖముయొక్క ఒకప్రక్క-ఉద్వేగము పోటు పొంగునందు వాపు యేర్పడును. ఈవాధ ఒకప్పుడు పంటి నొప్పి బాధను బోలియుండును. చెవిక్రింద చెంపపైనుండి గడ్డము వైపులకు వ్యాపించుచు, యీవాపుదలభాగము తలచుగ రాయివలె గట్టిగానుండును. జ్వరము అంకురించిన కొద్దిగంటలలోనేగాని, లేక ఒకప్పుడు ఒకదినమునకు గాని రెండుదినములకుగాని యీవాపుయేర్పడును. ఈవాపుదల భాగమునందు పోటు అధికముగానుంకి, వాపుదల నాలుగులేక అయిదు దినములు అదేప్రకారముండును. ఈవైధియందు చర్మము యెరిగి నుండును. క్రమేణ యెరుపుదనమును వాపుదలయు తగ్గిపోవును. ఈవాపుదల ఒకప్పుడు ఒకవైపుననే యేర్పడవచ్చును. ఇంకొకపుడు రెండువైపులను యేర్పడవచ్చును. ఈవ్యాధియొక్క ఉద్వేగగుల యందు గొంతువాచుట వలన అహారము మింగుట బహుకష్టముగానుండును. నాలుకపై పొరకమ్మి వాపుదలనంది ఊపిరి దుర్బంధసహితముగ నుండును. ఈవ్యాధియొక్క నడక యందు, సామాన్యముగ అంత్యగతియందు, స్త్రీలకు సనముతయొక్క వాపుదలతోడను పురుషులకు పుష్కణములయొక్క వాపుదలతోడను, పరిణమించును.

చికిత్స.

గవదలు ఉద్వేగగతియందుండినయెడల, గుటక వేయటగాని, ఊపిరిని నీల్చుటకు గాని బహుకష్టముగా నుండును. ఇట్టిస్థితియందు గుడ్డనుఉడుకనీళ్ళలో నిండి, దానితో తలచుగ వాపుదల భాగముపైన నెద్దుమండివలయును. ఇది మంచి గుణము నియ్యగలదు. ఇతర కాలములందు వాపుదలభాగముందు ఫ్లాస్ట్ గుడ్డను గట్టియుంచ వలయును. జ్వరగతియందు రోగి పరుండియే యుండవలయును. అహారపదార్థముల మింగుట కష్టమయినయెడల, పాన మొదలగు ద్రవపదార్థములను మాత్రమే లాభింపజేయునంద వలయును. విశేషము సాఫీగా

యగుటవలన మిగుల ఉపయోగకారిగ నుండునుగాన, విశేషబద్ధ ముండినయెడల విశేషసకాదల నుపయోగింపవలయును. రాతులు నిద్రపట్టుకపోయిన క్షోరల్ హైడ్రేస్ నుగాని పొటాసియం బ్రామైడునుగాని లోనకిచ్చుటవలన నిద్రపట్టుగలదు. ఈ వాపుదల భాగము చీముపట్టినయెడల, పిండికట్టు కట్టుటవలన నుపయోగముండ గలదు. శరీరమంతయు ఉడుకునీళ్లలో స్నానము చేయటవలన నుపశమనముగా నుండగలదు; సిటీజీట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను వయననుబట్టి తగుమోతాదులలో నిచ్చుటవలన శరీరమునకు చల్లదన మేర్పడగలదు.

గాయములు.

శరీరమందలి కొన్ని భాగములు నలుగుట మూలమున గాయములు యేర్పడును. ఈ గాయములయందు చర్మము చీలుకొనిపోవుట తటస్థించదు. ఈ గాయములకు సాధుగతియు ఉద్ధృతిగతియు, గూడ గలవు. సాధుగతియందు చర్మముయొక్క ఉపరిభాగము మాత్రమే అస్వస్థత నందియుండును. ఉద్ధృతిగతియందు చర్మమునందలి చిన్ని రక్తనాళములు బద్ధమై, అందలి రక్తము చర్మములోనికి జొచ్చుటవలన విపర్యయమేర్పడును. ఈవర్ణము ముండుటగానలు పునీలము కలిసియుండి ననిగానుండి, పిమ్మట క్రమముగా ఊదా, ఆకుపచ్చ, పసుపుపచ్చ, వర్ణములను వహించి, దానంతట అదియే పోవును; గాయము ఉద్ధృతమై వహించిన దైనయెడల, చర్మము క్రింది అంతర్భాగములయందు రక్తనాళముల యొక్క విచ్ఛేదముగలిగి రక్తము ప్రవహింపవచ్చును. ఈస్థితియందును, ఒకప్పుడు చర్మమున కేమియుహాని కలుగక అంతర్భాగములు మాత్రమే అస్వస్థత నందివచ్చును. చిన్ని గాయములకు, అనగా బిడ్డలు క్రింద పడుటవలన గలిగిడి గాయములకు, గుడ్డను బ్రాంచిలో మంచి పైనగట్టుటవలన గూఢమియ్యగలదు. లేదా, స్పృశింపని ఆఫ్ క్యాంఫరునుగాని, టింక్చర్ ఆఫ్ ఆర్నికానుగాని పైనరాయుటవలన నుపయోగ ముండగలదు. ఎక్కువ ఉద్ధృతమై వహించిన గాయము తగిలిన అవయవమును నిండుపైన అన్వేషించుటవలనగాని, పేయవిధముగాగాని, సాధ్యమయి నంతవరకు యెత్తయిన పుడక మునందుంచి ఫ్లెనల్ గుడ్డను ఉడుకునీళ్లలో మంచి తలచుచుగా వేడికామోములను గానగుటవలన గూఢముగా నుండును; లేక, విస్కీయును జలమును సమాన భాగములుగా గలిపిన లోషనును పైనరాయవలయును. గాయము అపాయకరమైన దైనయెడల, ఈస్థితియందు చర్మముపైన బొబ్బగా యేర్పడును. ఈబొబ్బలను మెల్లగా గత్తిరించి, అందలి నీరును బిడిబిడియవలయును. ఈబొబ్బయొక్క సారను మాత్రము తీసివేయకూడదు. అంతట వేడి కాషణములను క్రిమముగా తగ్గించి, ఒకబొమ్మ వినిగరును నాలుగు బొమ్మల జలమును గలిపిన లోషనును రాయవలయును. కొంతకాలము పిమ్మట, సోప్ లినిమెంటును రాయుటవలన గూఢ మియ్యగలదు.

గాయము తగిలిన భాగములయందు, ఒకానొకప్పుడు పెద్దరక్తనాళ మేజైన విచ్ఛేదమునంది, విశేషరక్తము అయా భాగములయందలి స్నానము బంధముల యొక్కయు నాడి బంధములయొక్కయు అల్లికలలోనికి జొరవచ్చును. ఈస్థితియందు పుండుయేర్పడి చర్మము పగిలి బళేవబాధ కలిగింపవచ్చును. దీనికి పిండికట్టునుగట్టి, పుండుఅంతయు తుల్యపగువలనను, కార్బాల్ లావనుతో గడుగుచు అందులకుగ జిత్కేయి వలయును.

గాయిటర్

గాయిటర్ వ్యాధియొక్క ముఖ్యలక్షణము, గొంతుయందును ఉడిగై గాయాడీ అనబడెడి ఒక గొంధియొక్క వాపుదల అయియున్నది. కనుకగొంతు పొడుచుకొని వచ్చునట్లుండుటయు, గుండెయొక్క కొట్టుకొనుట అధిక నుగుటయు, ఈవ్యాధియొక్క యితర లక్షణములైయున్నవి. ఈవ్యాధియొక్క ఉద్యుక్తత పురుషులయందు కొంత స్త్రీలయందు ఆరు లేక యెనిమిదంతలు అధికముగా నున్నది. పీస్టీరియా, మూర్పు, అతిమూత్రము, మనోవ్యాధులు— వీటిచే బాధనొందువారియందు దీవ్యాధికి ఉద్యుక్తత అతిశయముగ నుండును. ఇండియా దేశమునందు బంగాళా రాజధానియందును దక్షిణాంధ్రీయా యందును యీవ్యాధి సామాన్యముగ గనుపించుటయేలేదు. పశ్చిమోత్తర పరగణాలయందును న్యూదానది ప్రాంతములయందును యీవ్యాధి అతిశయముగ వ్యాపించియున్నది. తాగిగడి జలములతోనున్నముకలిపియున్నయెడల నీవ్యాధి అవహించునని కొందరి అభిప్రాయ మయియున్నది. ఇట్టి నున్నముకలిపిన నీళ్లను ద్రాగివలసిన స్థలమునందుండుట దలంపించినయెడల వ్యాధి అంకురించిన యితరస్థలములకు వెళ్లిపోవుట మంచిదై యున్నది.

తైరాయిడ్ గొంధియొక్క వాపుదల ఒకప్పుడు మిగుల యెక్కువై, క్వాసనాశము వైసయును ఆయాభాగముల యందలి రక్తనాళముల వైసయును అదిమిపట్టుటవలన, ఉచ్ఛ్వాసవిశ్వాసము లతికల్పములై, గుటకపేయుటయు బాధతో గూడినదియై గొంతుయొక్క ధ్వనియందురూడ మార్పు గలిగియుండును. ఈగతియందు శస్త్రము చేయుట మిగుల అవసరముగాన నశ్శిష్ట జేయరాదు.

నాడి యొక్కవ చురుకుగా కొట్టుకొనుచుండును; నిమిషమునకు 90 ముదలు 180 వరకును ఒకప్పుడు అంతకొక్కవగను గూడ నుండును. చేతులును కాళ్ళును ఒకప్పుడు శరీరమంతయుగూడ వణకట పొర్రంభమగును. శరీరవేడిమి అధికము కావోయినను ఒడలేపుడును యేకరీతిగ ఉష్ణతను వహించియుండుట వలన శరీరమందలి పదార్థసప్తము అధికమయి రోగి చిక్కిపోవుట తటస్థించును. నాలుక యొక్క స్థితి తరచుగ మారుచుండును. తీర్ణకోశమయొక్క యస్వస్థత లేనంతవరకును నాలుక సామాన్యముగ క్షుభముగనే యుండును. జీర్ణతయు బాగుండవచ్చును గాని, ఒకప్పుడు అజీర్ణవిరోధములు పొర్రంభమయి వాంతులును గలిగియుండ వచ్చును. మూత్రద్వారము నుండి క్షేపిత ధాతుసప్తము కలుగవచ్చును. అతిమూత్రవ్యాధియు ఒకానొకప్పుడు పుట్టవచ్చును.

చికిత్స.

రోగికి మొదటగా శయనపలసిన చికిత్స, శరీరమునకును మనఃస్థానమునకును సుఖపూర్ణముయిన విశ్రాంతి నిచ్చుటయై యున్నది. ఉద్యుక్త గతులయందు రెండుభూము మాసములవరకు గూడ, ప్రక్కనుండి కదలనీయక, ఉద్యుక్తతను గలుగజేయు యెట్టి సమాచారములను రోగికి చెలియవద్దరాదు. ఉద్యుక్త గతులయందు తేయాకు కాళ్ళను యియ్యరాదు. మత్స్యదాగ్ధముల సుఖపూర్ణముగ త్యజించి వలయును. కాల్షియం క్లోరైడ్ ను 'స' గ్రేయినుల మోతాదులతో దీనమనకు మూడుసారు లిచ్చుటవలన నుపయోగముగ నుండగలదు. గుండెకాటయొక్క ఉద్యుక్తమగు వడకను నిలపు చేయుటకు టింక్చర్ డిజిటాలిను గాని, టింక్చర్ స్ట్రాఫాం

తననుగాని, యిచ్చుటలన కొకప్పుడు గుణమియ్యగలడు. మెదడుకు శాంతతను గలుగజేయమనగా, టెంక్సర్ రేలాడోనాను 5 మెదలు 10 మినిములవరకును, పొటాసియం బ్రొమైడును 10, 20, తేక, 30 గ్రాములు మోతాదులలోను దినమునకు మూడుసార్లు యియ్యవచ్చును. బ్రొమైడ్ నీరసతను గలుగజేసినయెడల స్పిరిట్ను ఆహ్వానియూ ఆరోమేటిక్ను దానితో కలిపి యిచ్చుచుండువలయును. శరీరవేడిమి హెచ్చు అగునటుల గనబడినయెడల 15 తేక 20 గ్రాములు డి. డా. నేల్సెలను గూడువలయును. రక్తహీనత యందున్నయెడల టెంక్సర్ ఫర్మాయి పెర్రోల్ను యిచ్చవలయును. నవమలయొక్క బలిమిక్రమైపో ఫాస్ఫోరైట్ను యిచ్చవలయును.

పొటాసియం ఆయోడైడ్ను కొన్ని మాసములవరకును లోపకీచ్ఛుచుండుట వలన గలుగజేయుదబ్బున. ఆయోడైడ్ను యెక్కువగా సుపయోగించుట వలన కొందరకు కండ్లకుండుదల కనురెప్పల నాళువల పారించుగునట్లుండుట విరేచనములు, ముఖముమీద, మెదడుమీద, ఉదరము యొక్క పెద్దాగమున, పొక్కులు తేచుట, యీలక్షణములు కనుపడవచ్చును. ఇట్టి స్థితియందు యీయందును నిలిపివేయవలయును. మెర్క్యరీ ఆయోడైడ్ కలిపిన ఆయోటుమెంటును మెదప్పయిన బాగుగారుగ్గి ఆభాగమునకు బాగుగా వేడితగులునట్లు చేయవలయును. దీనివలన పుండు యేర్పడినప్పటికిని గాయటర్ మానుదలనందునని తెలియుచున్నది. ఇట్లు చేయుటకు వీలులేనివాడు టెంక్సర్ ఆయోడిన్ ను బాగుగ పైన రాయవలయును. ఇది తలుచుగా రాయటవలన పుండు యేర్పడిన యెడల పుండుమానిన పిమ్మట మరల రాయట ప్రారంభించవలయును.

గుండె రోగములు.

ఈ అవయవముయొక్క వ్యాధులయ గుర్తించుటకుగాను యెక్కువ వైద్యశాస్త్రజ్ఞానమును, యీ అవయవమును గురించి కారీశాస్త్రజ్ఞానమును, మిగుల అవసరములైయున్నవి. గుండెయొక్క డెబ్బలనుగూర్చి విచారణచేయుటకు, యీడెబ్బయొక్క గుణమును చెప్పి గుర్తింపగలక తీయు, మిగుల అలవాటును గూడ, ముఖ్యములైయున్నవి. గుండెకాయ అస్వస్థతనాది యున్నప్పుడు దానియొక్క ధ్వనియందలి మార్పులు వైద్యశాస్త్రజ్ఞునికే గాని, యితరులకు తెలియజాలవు. ఈ ధ్వనియందలి మార్పులేకా యీవ్యాధిని సూచించు యితరమాన్యులును గలవు. ఉండి ఉండి కొట్టుకొనెడి నాడి, గుండెయొక్క ఆదర, సామ్రస్థిల్లుచున్నట్టి భావములు, ఒకరిభవను బయలును ఒత్తిడిని కలిగియుండుట, ప్రాస్యమగుడోపిరి, నీలవర్ణముగలముఖము, పొడములు హస్తములు చల్లగానుండుట, యెడమ భుజమునందు నొప్పి, కాళ్లువాచుట, యీలక్షణములయందును, అన్ని కాని కొన్ని కాని యీవ్యాధిని సూచించుచుండును. తలక్షణములయందు కొన్నిటికి వ్యాధినిగూడ అనుసరించుచుండునుగానగుండెయొక్క ధ్వనులయందలి ఆరోగ్యతను అనారోగ్యతను గుర్తించిన సేవను గుండెరోగము యొక్క ఉనికిని నిర్ణయింపజాలదు. ఎడమరోముందు కాదగాని ఒకవిధమున ఆస్థానం పొంగింభవము యెడమభుజమునందు నొప్పిగూడ నయి ర ఆస్థానంలేనియైన యుండినగాని కాళ్ళవాపు యేర్పడినగాని గుండెవ్యాధి యేర్పడినదనియే తెలపవచ్చును. ముకు

ప్రావమునం దస్వస్థత యుండిన యౌవనస్థ్రీయందు మాత్రము యీ లక్షణములు గుండె వ్యాధిని చూచింపజేయు. గుండె అదరనగు యీక్రింది అంశములనుచూర్చియుగ గమనించ వలయును.

1. ఎక్కువకాలము పరుండియుండుట చూలమున గుండెకాయ యొక్క పనినితగ్గించవలయును.

2. మనోదోషత కలుగకుండ జేసికొనుట మూలమునను, త్వరితముగ నడచుటవలనను, అధిక బరువుల యెత్తుటవలనను, అకస్మికమగు స్నాయు పరిశ్రమలను దీసికొనకుండుట మూలమునను, చలని ద్రవపదార్థములను విశేషముగ గ్రాహకండుట మూలమునను, అజీర్ణ సుండెయొ ముఖ్యమునుండియు గాపాడుట మూలమునను, గుండె కాయ యొక్క వ్యాపారము శ్రమముగా జరుగుచుండునటుల చేయవలయును.

గుండె అదరు.

(పాల్పిటేషన్)

గుండెయందలి బెబ్బయొక్క తరచుగ సంభవించుటవలన గాని, దీక్షయొక్క తీవ్రత వలనగాని, గలిగిడి చిత్తవృత్తికి పాల్పిటేషన్ అను వాడుకపేరు గలదు. ఈ చిత్తవృత్తి శేషము మనసంబంధ మయినదే అయియుండునట్లును. గాని, సామాన్యముగ వాహ్యమునను గూడ గోచరమగుచున్నది.

పాల్పిటేషన్ అనునది రెండువిధములుగ గలుగుచున్నది. ఒకటి నరముల సంబంధ మగు పాల్పిటేషన్ అనియు, రెండవది అతయన సంబంధమగు పాల్పిటేషన్ అనియు, చెప్పబడుచున్నవి. శేషము నరముల సంబంధమగు పాల్పిటేషన్ వలన ప్రాణాపాయము లేదు. గుండెయొక్క పాల్పిటేషన్ లేక అదరు అనునది ఒకప్పుడు, అజీర్ణవలనను, శదువు ఉబ్బరమువలనను, చుట్టసు గాల్చుటవలనను, రక్తహీనత వలనను, హిస్టీరియావలనను, ఋతు ప్రావముయొక్క క్షీణత లేక నిలుపుదల వలనను, గలుగవచ్చును. అత్యుష్ణముగ దినమునను పాల్పిటేషన్ కనుపడవచ్చును. గుండెకాయ యెంతమాత్రము రేగుదలనీయిం దుండినను యెడమవైపున బరుండుటకు గష్టముగా నుండును. గుండెయందు అవయవాస్వస్థత యేర్పడిన యెడల అస్వస్థతయొక్క ఉద్రుతను బట్టి యీవ్యాధివలన అపాయము స్థిరపడుచున్నది.

చికిత్స.

పాల్పిటేషన్ వలన శాధనోందువారు తమ సహజజ్ఞానమువలన నీ అదరును అణచి పెట్టుటకుగాను దమ చేతితో హృదయభాగమును ఒత్తిపెట్టుట మూలమున గొంతడివకాంతిని బొందుదురు. ఇదేవిధముగా హృదయభాగములయందు అణచి పెట్టుటకుగాను, బెల్లడోనా పలాస్త్రిని ననుపైన తోలుపైనజేసి దాని ఆస్థలమున వేయవలయును, ఇట్లు చేయుటవలన పలాస్త్రి ఆభాగమును కిగిదిసి కొంతవరకు ఉపకాంతి గలుగజేయును. కొంచెము బ్రాండ్లీని లోనకిప్పుట వలనను గుణము నియ్యవచ్చును. దీనిని తరచుగా నిచ్చుటవలన నదియే అలవాటును. గాన బ్రాండ్లీనిచ్చుటకుండు బాగ్రతగా నుండవలయును. ఇంతియగాక బ్రాండ్లీ

నిచ్చుచుండుట వలన నది పసచేయుటకుగాను మోతాదును హెచ్చుచేయుచుండుట అవసరమగునుగాన నది మిగుల ఉపయోగకారిగ నెంచబడదు. బ్రాందీని తరచుగనిచ్చుట వలన గుండెయొక్క వ్యాపారమును దానుతట అది జేసికొనెడి కష్ట తగ్గిపోవు చుండును. ఇందులకే బ్రాందీయొక్క మోతాదును క్రమక్రమముగ హెచ్చుచేయవలసిన అవసరము కలుగుచున్నది. ఈ కారణమువలన దీనికి బదులుగా స్పిరిట్స్ అమోగియా ఆరోమేటిక్స్ ను క్రమమగు మోతాదులలో ఉపయోగించ వలయును. దీనివలన వైకపాయమేమియు గలుగజాలదు. ఒకానొకప్పుడు చల్లని నీళ్ళను నెమ్మదిగా దాగిగుటవలన గాని పొంగువచ్చు జలమును దాగిగుటవలన గాని అదే ఉపయోగముండగలను. రోగి రక్తహీనత గలిగి నిశ్శక్తువగా నుండునపుడు చల్లని నీళ్ళను నిరపేనుగాని ప్లెస్ట్ హైపోఫాస్ ప్లేట్సును గాని లోనకియ్యవలయును. నరములయొక్క రేగుదలను స్వస్థపరచుటకు గాను పొటాసియం బ్రొమైడును యియ్యవచ్చును. కాకజమునందలి అస్వస్థితిను బోగొట్టుటకు క్యాలొమెల్ ను ఉపయోగించవలయును. పేగులయందలియు కారజమునందలియు రేగుదల పదార్థములను వెలిబుచ్చుటకు గాను పిల్కూలా హైడ్రాజిని 4 గ్రెయినులు లోనకిచ్చి పిచ్చుట 1 వ విశేషనక రినియ్యవలయును. డిగ్టాశయము యొక్క రేగుదలను అపుజేయుటకు గాను లిస్సెట్ సబ్ సైట్రస్ - పెసిన్ లను యియ్యవలయును.

టింక్చర్ బెల్ డో నాను పెద్దమోతాదులలో నిచ్చుటవలన, గుండెకాయయొక్క రేగుదల కట్టువడినట్లు కొందరు వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు చెప్పమన్నారు. ఈ సహాయమునందు శరీరపరిశ్రమ యంతమాత్రమును ఉండకూడదు. ఎట్టిమనోవికారము లున్నను సాల్విలేషనును వ్యవహరించుచు గాన, రోగికి మనోవికారము లేమియు గలుగకుండ శాంతత యుండునట్లు పెట్టవలయును; ఏ దైన మనస్సునబంధమగు అస్వస్థి యుండిన యెడల సోడా సేలిస్సెట్ ను చిన్న మోతాదులలో అనగా 10 గ్రెయినులతో 10 లేక 20 గ్రెయినుల పొటాసియం బ్రొమైడును గలిపి, దినమునకు రెండు లేక మూడు పర్యాయములు యియ్యవలయును. దినమునకు ఒక పిస్సాగ నిద్రబోవుముందర రట్టింపు మోతాదు నిచ్చినందువలనను ఉపయోగము గనుపడగలదు.

అన్నింటికంటె తుదకు శిష్టబుధీనస్పటికిని ఉపయోగమునందు చక్కవకానట్టి టింక్చర్ డిజిటాలిస్ ను 5 మిగులులు మోతాదులలో దినమునకు మూడు పర్యాయము లిచ్చుట వలన, మిగుల ఉపయోగముగ నుండగలదు. ఆచరు వచ్చినపు డైనను యీ మందును యియ్యవచ్చును.

గురకతో గూడిన దగ్గు.

(మాంద దగ్గు లేక కక్కువాయి దగ్గు)

గురకతో గూడిన దగ్గునకు మాందదగ్గు లేక కక్కువాయి దగ్గు అను పేరుకూడకలవు. ఈ దగ్గు అంటున్నది అయియుండి సామన్యముగ బిడ్డలకు సంభవించుచు ఒకానొకప్పుడు పెద్దవారలకుగూడ దట్టించుచు, జీవితమునందు సాధారణముగ ఒక్కసారిమాత్రమే గలుగుచుండును; ఇది సామన్యతదగ్గుగా బ్రూరంభమయి, కొన్నిదినముల పిమ్మట తెరలుగావచ్చి,

ఊపిరి బిల్బుటయందు ఆయాసమేర్పడి ఒక విధమున గురక లేక మాత్రసోగూడియుండును. ఉద్యోతగతులయందు దినమునకు యిరువది పర్యాయములుగూడ యిట్టివేరలు వచ్చును. కొన్ని పర్యాయములు ఈకూత లేకుండగూడ వచ్చుచుండును. బిల్బుట యీయిట్టివేర వచ్చుచుండర మిగల భయముగలిగి, తల్లియొద్దకు బయటవును. వయస్సు అధికముగా నుండినయెడల సరిగా నిలిచియుండుటకు గాను దేనినైన బట్టుకొనుటకు పని గలుగును. ఈ దగ్ధతయందు శరీరముగా వాంతి వెల్లిపోయి, ఊపిరి తిగుగక యీ దగ్ధతకు మూలకృణ్యమైన నీటి కనబడి, ఆతె అంతటితో నిలిచిపోయి, బిడ్డతరిగి తన ఆట పాటలకు బోవును. ఈ దగ్ధతయందు గలుగు వాంతి వలన, బిడ్డలు శరీరమునకు గావలసిన ఆహారపదార్థముల కీర్ణాశయమునం దిమిడ్చుకొనలేక పస్తుబడియుండును. కేవలము యీ దగ్ధవలన వ్యాధిభయములేదు. ఈ దగ్ధతయొక్క ఉద్భవ గరియం దీ కానొకప్పుడు కండ్లలోనికి రక్తము విశేషముగ పోగి కండ్లమునకుగల యం డును. ముక్కులోనుంచియు చెవులలోనుంచియు రక్తము రావచ్చును. వెళ్ళునట్టి బిడ్డలు కావచ్చును. ఒలుబీజముకలిగినను కలుగవచ్చును. ఒకప్పుడు యీవ్యాధితో కొన్ని పక్షిశము కూడ యేర్పడి తొందరగా ఊపిరి బిల్బుట, జ్వరత, సంభవించును. కొన్ని విషయములలో క్వాసకోశములయొక్క వాపుదల యేర్పడవచ్చును, మరికొన్ని విషయములలో నొగయుక్కు ఉద్రుతతలన క్వాసకోశములయందలి వాయుబిలములకు ఆవ్యర్థక గలుగునట్టిబిడ్డలనువల అస్పదము కలుగచున్నది. బిడ్డలయం దీవ్యాధియందు ఒకప్పుడు మూర్ఛలు కలుగవచ్చును. మూర్ఛలకు గుర్తులుగా కాలివేళ్ళు చేత్రివేళ్ళు ముడుచుకొనుటకుగాని, లేక, చేతియొక్క బొటనవేళ్ళు అరచేతిపైపులకు లాగకొనుటను గాని, చూచి తెలిసికొనవచ్చును. అట్టి విశేష చనములను అంత్యదశయందు పొర్రంభింపవచ్చును. ఈ దగ్ధతకుటువ నుదును ఆరువారములవరకు వ్యాపించి యుండును. ఒకప్పుడు త్వరలోనే పెద్దదింపవచ్చును. లేక కొన్ని నెలలు పట్టినను పట్టును. వ్యాధికుదిరినపిమ్మట ఆరువారములవరకును ఆరోగ్యము నిలిచి యుండును.

చి కి త్న.

బిడ్డకు దగ్ధతెర వచ్చినపుడు ఒకచేతితో పిత్తను బట్టుకొని రెండవచేతితో తలయొక్క నుచు భాగమును బట్టుకొనవలయును. దగ్ధతలన వెలుపడు తెనుడనుగాని, యిరవగు దాని గాని, కృతముగా దుడిచి, వెన్నువయిపుల మెల్లగా చేతితో రాయవలయును. తెరలకు మధ్యకాలమందు యేదురోముట్టెనయును పెన్నుపైపునయును, వ్రాండియును ఆవ నూనెయును సమానములుగ గలిపిన దానితో పెన్నుదిగా రుద్దవల యును. బిడ్డనుదము చుట్టవలన విశేషము వధృముగా నగునట్లుల బేయవలయును. దీనం ఇదికాకను కొద్ది మోతాదులలో బిడ్డలయొక్క వయస్సునబట్టి లోని కీర్ణ్యాలయును. దగ్ధయొక్క తెరలు అధికముగానుండి యేదురోముట్టె అస్వస్థత జేంది యుండునట్లుల, 93 డిగ్రీల ఫారెన్ హీటు కేడిమి గలజలమునందు పత్తిరాత్రియిన పదిమిషములపాటు స్నానము చేయించుటవలన నుపయోగముగ నుండగలదు. దగ్ధపాడిగానన్న విషయములలో పొటాషియం బోరేక్షైడ్ డిస్క 2వ అల్లరెట్టివును యియ్యవలయును. దీనితోపాటు వైసం ఇదికాకను గూడ నియ్య వచ్చును. దగ్ధతెరవలన గలిగెడి నీరసతను దగ్ధించుటకు ఒకసంవత్సరము వయస్సు బిడ్డకు 4 చుక్కలును, మూడు సంవత్సరముల వయస్సుబిడ్డకు 8 చుక్కలును, స్పీరిట్టు అమోనియా అమోమేటిక్సు కొంచెము పాలలోను కొంచెము నీళ్ళలోను గలిపి

యియ్యవలయును. జీర్ణమునకు ఆర్థము గాని పదార్థములను యియ్యకూడదు. వ్యాధియొక్క ఆరంభగతులయందు జ్వరము పెచ్చునట్లుండిన యెడల నున్నా రొమ్ము పడిశేముపట్టు నట్లుండిన నెరున్నా నొగికి వెచ్చిగా నుండునట్లుల చేయ వలయును. రాత్రుల యందు బరుండు నపుడు దిండ్లపై నతిని ఆస్సుకొని యుండ వలయును. కిటికీలు తెరచి గాలిని లోనను గొరనీయ వలయునుగాని నొగిపైగాలి వీచకుండ జేయవలయును.

పైసచెప్పిన బ్రాండ్ల ఆవనూనెలకు బరులు గా, వెన్నుపై నరాయుటకు, సోప్ లిని మెంట్ ను ఓపీయం లిని మెంట్ ను ఉపయోగించుట మంచిది. ఇవి విచిత్ర పదార్థములు. వీటినిపై న రాయనల యరుగాని లోనకేయ్యరాదు. మిగుల ఉద్రుత గతులయందు 20 చుక్కల క్లోరోఫారంను చేతిరుమాలుపై నవేసి తరువచ్చినప్పుడు బిడ్డయొక్క ముఖమునకు ఒక ఆరడుగు దూరము న నుంచవలయును. కళ్లవారులలో కేవల బొవధయోగమును గూడ వాడి చూడవచ్చును. ఈ వ్యాధివలన మిగుల నీరసము గలుగును గాన బలవర్ధకౌషధములలా కివ బొవధయోగము నియ్యవలసి యుండదు.

గొంతు రోగములు.

1. గొంతు బొంగుపోవుట.

స్వరపేటికి కు ప్రభాగమునను గొంతునకు వెనుక భాగమునను కేగుదల చేర్చుటచే రక్తము కూడుకొని ఆధిక్యము ఆముము ప్రవృద్ధి యగుటవలన గొంతు బొంగుపోవుట కలు గుచున్నది. ఇది ఉదయమున పాత్రంభయము మధ్యాహ్న వేళలయందు తగ్గిపోయి రాత్రుల లో హెచ్చుదలయందుండును. ఇతర ఉద్రుతి లక్షణములులేని పొడితనముతో గూడిన బొంగుపోవుటకు స్పెల్మోగ్రడ్డను యిట్టి యాకృతి బొవధయోగమును మూడు లేక నాలుగు గంటల కొక బొన్నుచొప్పున పుచ్చుకొనవలయును.

టింక్చర్ కాస్టోఫిల్ కో	ద్రామములు	3
పైసం ఇసికాట్	ద్రామము	1
స్పిరిట్ ఈథర్ స్ట్రెట్రగిన్	ద్రామములు	3
జలము	బొన్నులు	7

పెద్దవారలకు పల్వీస్ ఇసికాట్ కో ను 5 గ్రెయినుల మోతాదులలో గుణము నిచ్చు వరకును మూడుగంటల కొకపర్యాయ మిచ్చుటవలన ఉపయోగ ముండగలదు. త్లురేట్ ఆఫ్ పొటాష్ టేబ్లాయిడ్ (బిళ్లలు)లను ఉపయోగించుట వలనను ప్రయోజన ముండగలదు. కొకేన్, పొటాష్, సొరాసు (వెలిగారము)లతో జేయబడిన బ్రోజ్ వెల్కుం ఆందు కం పెసియొక్క సాయిస్ టేబ్లాయిడ్లను బుచ్చుకొనుటయు మిగుల మంచిది. ఈ బొంగు పోవు టకు దోడుగా గొంతులోని గవద కాయలు (Tonsils) యున్న పై ఉబ్బుదల నందియున్నట్లుండినయెడల స్పెల్మోగ్రడ్డను టింక్చర్ ఫ్లెట్రయి పెర్క్లొర్ను సమానభాగములుగ గలిపి, బ్రష్ తో గొంతులోని గవద కాయలకు దినమునకు రెండు సార్లు రాయవలయును.

2. గొంతు నొంక యొక్క పొడగరించుట.

గొంతుయొక్క ద్వారము మొదలున ప్రభాగమునుండి నీలిలాడుచుండితి. యీకొండ నాలుకను నోరు వెరచిన మీదట పులి వాయను గుర్తింప దగి యున్నది. ద్రవ పదార్థములను

మింగుకపుడు, పీచిని తిరిగి నాసి కాద్వాగముల గుండ రానుండ జేయుట, దీనియొక్క యి
అయియున్నది. జలుబువలన గాని, బహిరంగోపన్యాసముల నిచ్చుట వలన గాని, ఒకప్పుడు
జీర్ణకోశమనందలి అస్వస్థత వలనగాని, యీ కొండనాలుక పొడవించి, నాలుక యొక్క
వెనుకభాగముపై నంటియుండును. ఇందుమీదట రేగుదలపుట్టి, బొంగురు ధ్వని ప్రారంభమ
యి, పరుండి యున్నపుడుగాని, చదువునప్పుడు గాని మాట్లాడునప్పుడుగాని వాయువున
నోటిద్వారా బీల్చునపుడు గాని, ఒకవిధమయినదగ్గ కలుగుచున్నది. కడుపులో నిప్పుటయ
వాంతికలుగుటయు మాడ నొకపుడు తటస్థింపవచ్చును.

చి కి తన.

5. గ్రయినుల సిల్వర్ వైరేట్టును ఒక బొంబు జలములో గలిసి పుల్లకు దూదిని
చుట్టి యీ సాల్వ్యాదనులో మంచి కొండనాలుకపై ఉదయమునను సాయంత్రమునను
అద్దవలయును.

ఒక ద్రాము ట్యూసిక్ ఆసిడ్ ను నాలుగు ద్రాముల గ్లిసెరినులో కలిపి స్పిరిటు దీప
ముపైన నెచ్చజేసిన పిమ్మట, యిది ద్రావరూపముగా మారును. ఉదయమునను సాయంకాల
మునను దీనిని రాసినందువలనను ఉపయోగ ముండగలదు.

పగటిపాడుమును ఉదయముననున్న సాయంత్రమున యున్నా బ్రెన్తో నడ్డుము
డుట వలన నొకపుడు ఉపయోగించగలదు.

ఏమందు ఉపయోగించినను విరేచనబద్ధ ముండిన యెసల అందులకు గు జికిత్సను జేయ
వలయును.

పిటి అన్నిటి కంటెను పొడగరించిన కొండనాలుక యొక్క కొండము చివరభాగము
ను గత్తిరించుటవలన నెక్కువ ఉపయోగ ముండగలదు.

3. గొంతుయొక్క వాత్రువల.

స్కార్లెటు జ్వరమునందు గొంతుయొక్క వాత్రువల ఉద్యోతస్థితి పండియుండును. కి
లుకు రోగమునందును ఒకప్పుడు గొంతు వాత్రువల నందవచ్చును. ఆయావ్యాధుల యంద
గొంతువాత్రువల పనునరించి యితర లక్షణములును ఉండును. జలుబు వలన నేర్పడడి గొంతు
వాత్రును గురించి మాత్రమే యీ సందర్భమున అలోచింపబడును. జలుబువలన గలిగిడియ
గొంతువాత్రునకు, ఆలసట వ్యాకులత అధర్యయ జలదారులయందలి దుర్వాయువు, ఉద్యు
క్తతనబుట్టించును. జలుబు వలన గలిగిడి గొంతువాత్రు సాధుగతియందును లేక ఉద్యోతగతి
యందును ఉండవచ్చును. ఈ వాత్రువల సామాన్యస్థితియందుండినపుడు ఒకప్పుడు గొంతు
బొంగు పోయినను పోవచ్చును, ఈ వాత్రువల ఉద్యోతస్థితియందుండినపుడు గవడకాయల
యొక్క వాత్రువల (Tonsillitis) కలుగును. ఈ స్థితియందు సామాన్యముగ ఒక గవడ
కాయయును, ఒకప్పుడు రెండు గవడకాయలును, వాడుట రోవుడును. అస్వస్థ భాగము
మిగుల యెర్రవై వాత్రువలనంది పుండ్లు యేర్పడి ఒకప్పుడు ప్రజమునకు స్థానమేర్పడినను
యేర్పడును. ఈ గతియందు ఆ భాగమంతయు పచ్చిగా నుండి మ్రింగుటయు కష్టముగా

నందును. చీను యొక్కడుచున్న పుడు గొంతులో పోటు పొడుచును. చెవులలోను బాధ కలుగుచు తలనొప్పి పొంగింభవయి ఊపిరిని బీల్చుటకును మిగుల కష్టమయి తరుచుగ మ్రింగవలెనను యిచ్చ గలుగుచు నోటిలో బెట్టు ద్రవపదార్థములు ముక్కువెంబడి వెలువడుచుండును. చీను అంతయు గూడి వ్రణము పక్ష్యాదునకు వచ్చునది మూడు నాలుగు దినములు పట్టును. ఆంతట చూలివ్యవంతయు బయలు వెడలి క్రిమి నివారణ వగును. మెదయందలి గ్రింధులును వాపుదల నంది బాధగా నుండును.

చికిత్స.

గొంతువాపుయొక్క సాధుగతులయందు మస్త్యుపట్టిని పైభాగమువండు చేయుటవలనను, విరేచనరాలిగ 1 వ బొమ్మయోగమును అప్పుడప్పుడు నిచ్చుట వలనను పటికగంధూనమును వాడుటవలనను ఉపయోగ ముండగలదు. గొంతుయందు పుండ్లుపడినయెడల మూడు ద్రామల పటికను ఒక బొమ్మ జలములో గలిపి, దానిని అడుటవలన నుపయోగించగలదు. గవదకాయల (Tonsils) యొక్కనాపుదల ఆతిశయముగ నుండి పుడు బయటివైపునకు నీళ్ళ గోమంచిన శుద్ధితో కాపమును గాచవలయును. గొంతులోనికి ఆవిరిని బట్టవలయును. బాధను తగ్గించుటకును విశ్రాంతిని గలుగ జేయుటకును థ్లోంట్ హెడ్జిన్సు తగుమోతాదులో నిచ్చుటవలన నుపయోగించగలదు. అనధరమైన యెడలనున్న నీలు గానున్న యెడలనున్న వ్రణమును కశ్రుము చేయించవలయును. గ్వయింజం (Iozenges) బిళ్ళలను తరుచుగా చప్పరించుట వలనయున్న, సోడాసోలిపైస్ 10 గ్రెయిసుల మోతాదును మూడుగంటల కొకపర్యాయము పుచ్చుకొనట వలనయున్న, స్పష్టమగు ఉపకౌంతి కలుగగలదు. సూటికి 10 వ వంతు కొకేస్ సోల్యూషనును గొంతుపైని రాయుటవలన ఉద్రుతబాధ తగ్గుదల నుండును.

4. గవదకాయల యొక్క వృద్ధియగుట (Tonsillitis)

గవదకాయలు తరుచుగ వాపుదలనందుట మూలమున నవి పరిమోళమునం దభివృద్ధియందుట యొగ్గుచును. కొందరకు యీ గవదకాయలు సహజముగ బుట్టుక తోడనే పెద్దవిగ నుండును. కొందరకు యితర కారణమువలనను పెద్దవికావచ్చును. తేమగల ప్రదేశములయందు నివసించుటవలన నొకప్పుడు యీవ్యాధి యొర్పడవచ్చును. ఈ గవదకాయలు పెద్దవియై, గట్టిపడియుండినపుడు, మ్రింగుటయందును, ఊపిరిని బీల్చుటయందును గష్టమై, మూటయందును స్వచ్ఛత దప్పి, ఒకవిధమగు ముక్కిడిమాట వచ్చుచుండును. కొంతవరకు చెవుడు యొర్పడి, యీ రోగి నిద్రించునపుడు నోరు తెరుచుకొనియుండి, గుర్రు పట్టుట అధికమగును. వాయువేడిమియందంత మోత్యము మూర్ఛగ నుగిసెను, యిట్టివారలకు గొంతునొప్పి యొర్పడును. ఈ వ్యాధి కీతల ప్రదేశములయందధికముగ నుండును.

చికిత్స.

చలిగాలి తగులకుండు నట్లు సాధ్యమయినంత వరకు జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనుచు విలపరకానధముగ 3 వ బొమ్మయోగమును బుచ్చుకొనవలయును. బలమునిచ్చు అపారద్రావ్యములను భుజించు చుండవలయును. క్రిమముగ శరీరసాదకమును దీసికొనుచు, ఉదయముననే చప్పిళ్ళలో స్నానము చేయుటవలన నుంచుకొనియుగలదు. వడిగ గంధూనమును ఉప

యోగింపనగును. సిల్వర్ ప్రైటేట్ సొల్యూషనును రాయుటవలన ఉపయోగమందునని చెప్పుదురుగాని, దీనివలన గవదకాయలకు లేగుదల అతిశయమై వాటియొక్క అభివృద్ధి కనువు గలుగజేయుటయు గలదు. ఈ సందర్భములందు గవదకాయలను స్వల్పముయొక్క సహాయమున గత్తిరించుటయే ముఖ్యముగ గమనించుచున్నది.

5. స్వరపేటిక యొక్క వాపుదల (Laryngitis)

క్వాసనాళము యొక్క ప్రభాగము స్వరపేటిక యనబడును. ఈ భాగము యొక్క వాపుదల పడినెము తోగాని, గొంతుయొక్క పచ్చి చేయుటతో గాని ప్రారంభ మగును. జలుబువలన గాని కంఠధ్వనియొక్క అధిక పరిశ్రమ వలనగాని, యీ వ్యాధి సంభవించవచ్చును. తీయరోగమువలనగాని కొఱుకు రోగముయొక్క ఫలితమగగాని, ఒకప్పుడు యీవ్యాధి సంభవించవచ్చును. ఈవాపుదల ఒకప్పుడు గొంతు బొంగుపోవునంత కొద్దితోడనే సమాప్తి నందవచ్చును. మరియొకప్పుడు ఉద్యోతగతిని పహించి కంఠధ్వని బొత్తుగా నశించి ఊబియాడకుండ జేయును; ఉద్యోతగతియందు సామాన్యముగ బిడలకు కొన్ని గంటలలోనే మరణము సంపాద్యమగును; దీర్ఘవ్యాపక స్థితి యందు కొన్ని వారములుగాని కొన్ని నెలలుగాని పట్టును. క్వాసనాళము యొక్క వాపుదల ఉద్యోతగతియందుండి అతిశయస్థితిలో నున్న యెడల నిది మిగుల అపాయకరమైన వ్యాధి అయియున్నది. జ్వరము, బాధ, గొంతుయొద్ద బిగువు, ఎఱుగురానినట్టియు గొఱుగునట్టియు కంఠధ్వని, కింకిరాయు సరిబంధమగునట్టి దగ్గు—యీ లక్షణములతో గూడియుండును. మొదటగా గొంతుయొక్క ప్రభాగమున్నూ పచ్చిగానుండి ఆరుదల నందినట్లుండి, దళమైనట్టియు తేగలు పొగునట్టియు కఫము వెలువడుచు, యీ కఫము చీముతో సంబాధించినవై యుండి తెలువడుట అధికమైనకొలదిని బాధ తగ్గుదల నందుచుండును. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసముల యంతాయాసము గలుగుట, సులభముగా మింగుట కళ కత, నిద్రపట్టకపోవుట, ఉండి ఉండి క్వాసాచరోధము కలుగుచుండుట, తుదకు ఎగఊపిరి బిల్లుట, మూర్ఛన వచ్చుట—యీ లక్షణములు క్రమముగా గనబడుచుండును. గొంతుయొక్క వాచినట్లు కనబడును. క్వాసనాళములోనికి ఉండు చిన్నరంధ్రము ఆ యా భాగములు వాపుదల నందుటవలన కొంచెమెచ్చు తక్కువగా మూయబడి వాయుప్రవేశమున కాటంకము గలుగజేయ బడుచున్నది

చికిత్స.

గొంతు బొంగుపోవుట తోడనుగాని కంఠధ్వనియొక్క సకంఠతోడను గాని యీ వ్యాధి ప్రారంభముకాగానే చిలికాలి తగులకుండునట్లు గొంతుచుట్టు ప్లానర్ గుడ్డను జాటుటనగాని, మృదుపట్టిని జేయుటనుగాని, చేయవలయును. కఫమును హరింపు చేయుటకుగాను యీ క్రింది ఔషధయోగమును మూడు లేక నాలుగు గంటల కొకసారి ఒకపాస్సు మోతాదు చొప్పున నీయవలయును.

టింబర్ క్యాంఫర్	ద్రాములు	8
నైనం ఇసి కాక్	ద్రాములు	1
స్పిరిట్ ఈతర్ పైట్రీస్	ద్రాములు	8
గజము	ద్రాములు	7

వ్యాధి ఉద్మత్తగతియం దుండినయెడల అధిక చికిత్సలను జేయవలసి యుండును. ఉడుకునీళ్లనుంచి వచ్చేడి ఆకిరిని లానకు బీల్లుచు ఉడుకు నీళ్లలోముంచిన స్పృంజితో గొంతు యొక్క ప్రేభాగమున నద్దవలయును. బిడ్డల కయినయెడల గంటకొకసారి 30 మినియుల స్పిరిట్ ఈథర్ పైట్రీనును లోనకియ్యవలయును. పెద్దవారల కయినయెడల పర్లిస్ ఇపి కాక్ కో ను 5 గ్రేయిసుల మోతాదలలో నాలుగుగంటల కొకసారి యియ్యవలయును. అవసరమయినయెడల విశేషణ కారిగ 1వ ఔషధయోగము నియ్యవలయును, కోగిని మాట్లాడనియ్య కూడదు. కోగి పరండియుండు గదిలోనికి గాలి ఉద్మత్తముగ విస్తరులు లేకుండ నుంచవలయును. అహోమునకు ద్రవపదార్థమును ముత్యమే యిచ్చుచు మత్తుపదార్థముల త్యజింపవలయును.

గోరు చుట్టు.

గోరుచుట్టు అనేకవిధము లయియున్నది. అన్నిటిలోను శ్రేష్ఠ విధమయినది తటస్థించినపుడు గోరుయొక్క మొదలువైపున ఒకపక్కగా వాపుదల ప్రారంభమయి పోట్లు పొడుచుచుండును. కఠిమకఠిమముగా కొంచె మెచ్చు తక్కువగ గోరు చుట్టును, కొంచెము తెల్లనై నట్టియు, కొంతపగట స్వచ్ఛమయినట్టియు, గుల్లయేర్పడును. ఈగుల్లను తెరువకుండినయెడల, దానంతట అదియే బ్రద్దలయి, ద్రవరూపమగు మాలిన్యము బయలుపెడలి మానుదల నందను. ఈ మాలిన్యము కొన్ని దినమలపాటు ఆచ్ఛట కూడుకొని యుండియెడల చర్మముయొక్క అంతఃకాగమున పుండు యేర్పడి యోగిని చుక్కవలె పైకిదేలి యిది బహుమృదువైయుండును. ఇది పృథ్విఅయినయెడల గోరు నశింపునందును. ఈగుల్లను కఠిరించి పిండి కట్టు కట్టుటవలన నీపుండును మాన్పవలయును. ప్రతిదినమును కారాల్బిక్ లోషనుతోగడిగి శుభ్రపరచుట మంచిది.

రెండవవిధమగు గోరుచుట్టు శ్రేణియొక్క చివరభాగమునందు లేచును; మొదటి విధమయిన దానికంటె నిది మిక్కిలి కఠినమైనదై యందలి మాలిన్యము చక్కమునకు పూర్తిగా నడుగుభాగమున యేర్పడియుండును. గుల్ల లేలక ప్రేలు ఉట్టి, యెగ్గినై మాలిన్యము పైకిదేలిన కొలదియు తెలుపునర్థమును వహించుచుండును. ఈభాధ అరచేరి వైపులకును బాహువు వైపులకును గూడ వ్యాపించును. ఈ సందర్భమునందు గోరు సామాన్యముగ నశింపునందును. ఈస్థితియందు ప్రేలును నిలుపు వైపులను లాతుగాజేల్చి, మాలిన్యమును దీసివేయుచు, పిండికట్లను కట్టవలయును. మాలిన్యము కారట నిలుపు కాగానే పలాక్రిని జేయవలయును.

మూడవ విధమగు గోరుచుట్టు మిగుల ఉద్మత్తమైనదై యున్నది. ఇందు స్నాయు బంధముల వావరించియున్న కోశము ఉబ్బుదల నంది వేడియై యెర్రబారి విశేషమగు భాధను గలిగించును. ఇది రెండవ దానికంటె నెక్కువలోతుగ నేర్పడుచున్నది. ప్రేలు ఉబ్బుదల జూపి, త్వగలో జికిత్స, నందనినో వాపుదల చేతికి వ్యాపించి స్నాయు బంధములుగాని, ప్రతీయొక్క ఒకటి లేక అంతకొక్కడు యెముకలుగాని హానికెంది బయటికి వెడలి

రావచ్చును. అస్వస్థత భాగమును ఉడుకు నీళ్లలో దడిసి వేడివేడి అవిసిపెండి కట్టును గట్టవలయును. వ్యాధి ఆగంభవమున యిరువది లేక ముప్పది గంటల లోపుగా వాభవల నందిన భాగము యెముకవరకును జీర్ని లింటును బెటుటవలన గాయము తెరచియుండునట్లుగా జేయవలయును వేటువకు పరిపూర్ణమైన విశ్రాంతి గొలుగునట్లు చేయుటకు వ్రేలువెంటి మనేకటువలను నొక మృదువగు కొయ్య బద్దను గట్లయందు ఈయ్యబద్ద వ్రేలుయొక్క వెడల్పుననే యుండి అరచేతి వైపులను మాత్రము యెక్కువవెడల్పున నుండిన యెడల సౌఖ్యకరముగ నుండగలదు. ఈ కొయ్యబద్దపై గుడ్డను జుట్టి, అనుదినమును తగ్గుదల మా గొచ్చుచే, కొయ్యబద్దనుగూడ శుభ్రముగా గడుగుచుండ వలయును. చీగ్గిర పిమ్మట మూనిస్యము పిగిలుట అగిపోవు వరకును, పిండికట్టును గట్టుచుండవలయును. చేతికి గదిగది గలుగకుండునట్లు చేయుటకు, చేతిని వెడదనును ఒక వెడల్పుయిన గుడ్డను గట్టి, చెయ్యి యొక్క కొన యెడరభుజము వైపుల కుండునట్లు ముడుచుకొనియుండి, చేతిని అగుడ్డపయిన అనుకొనియుండునట్లు చేయవలయును.

గౌట్.

రక్తమునందు యూరిక్ ఆమ్లము ఉద్భవించి, స్నాయుబంధములయొక్క అల్లికలయందు నిలవకాబడుట వలన గలిగెడు విగుల నుద్రుతమగు బాధకు గౌట్ అను వాడుకపేరు కలదు. చీగునుగాని పీచి సారాయిలనుగాని యెక్కువగా దాగిగుటవలన కాని మూత్రాగ్రింధులయొక్క గాని వ్యాపారమునందు లోపము కలుగుటవలన, యూరిక్ ఆమ్లము అధికముగా నేర్పడుట తటస్థించును. ఒకప్పుడు వంశపారంపర్యముగ గలిగి ఊర్ధ్వతలవలనను గలుగవచ్చును; అచరపద రముల నుండు స్పష్టమైన అవ్యక్తత లేక పోయినను, ఒకప్పుడు కారణమును మూత్రాగ్రింధులును తమ కార్యముల నిర్వహించక పోయినప్పుడు; యీవ్యాధి తటస్థించును. ఒకవిధమగు గౌట్ వ్యాధి దీర్ఘవ్యాధితమగు సీసపురదార్ధపు విషప్రయోగము వలన గలుగుచుండును. కొన్ని విషయములలో గౌట్ వ్యాధి, వాతరోగము (కిళ్లనొప్పులతో గూడిన)ను బోలియుండును. గౌట్ యందు మొదటగా, కాలివ్రేళ్ళు చేతివ్రేళ్ళు మొదలుగాగల చిన్నకీళ్ళు అస్వస్థత నందును. వాతరోగమునందు, పెద్దకీళ్ళు పట్ట పట్టును. గౌట్ వ్యాధి, సామాన్యముగ సోమరిపా తులకును, మలినరాయలులుగ భుజించువారికును, దట్టమగును. వాతరోగము, శుభ్రమగుదునుల తేనివారికిని, శుభ్రమగు భోజనము లేనివారికిని, సామాన్యముగ దట్టించుచుండును. గౌట్ పెద్దవయసునందు గలుగుచుండును; వాతరోగము తరుచుగ పిన్నవయస్కులకు గలుగుచుండును. ఒకప్పుడు, గౌట్ వ్యాధియును వాతరోగమును గలిసివచ్చినను రావచ్చును.

లక్షణములు.

ఈగుడల నందిన స్వభావము, జ్వరత, తలనొప్పి, అజీర్తిని సూచించు లక్షణములు — యీవ్యాధియొక్క తెరవచ్చుటకు ముందుగ నీగుణములు కనబడును. ఈవ్యాధి తరచుగా రాత్రులయందు వచ్చును. ఎక్కువతరచుగా కాలియొక్క బొటనకేటయందు ఉద్రుతమగు మెలికేయు నొప్పి పారంభమయి, ఉదయమునకు తగ్గుదలనంది, వ్రేలుయొక్క యెర్రదనము

ను వాపులయు అటులనే యుండి వ్రేలు మృదుత్వమును వహించి మెరయుచుండును. చెమట ఆస్పహితముగ నుండును; రోగియొక్క ప్రకృతి మిగుల అహంకారమును వహించి యుండును. మాత్రము ప్రధమమున షీజతనంది తీవ్రవర్ణమును వహించి స్వచ్ఛవైయుండి తరువాత అధికమయి యిటుక పొడుమును బోల్చి గణి అడుగున చేలును. చాలదినములవరకు రాత్రులయందు బాధ అధికమగుచు. వాపుదల అధికమయిన కొలదియు బాధ తగ్గుచుండును బాధయు వాపుదలయు తగ్గుదలనందగనే, అభాగమునందలి చర్మము పొరలుగా నూడి పోవును. అంత నీవ్యాధి అంతరించి, మఱి కొన్ని మాసములవరకును కనుపడక పోవచ్చును. ఈవ్యాధి పీడితునియొక్క గోళ్ళు గట్టిబారి, పెళుసులెక్కి, గీలు జెందియుండును. ఆరు నెలల విషయములలో మాత్రము, యీవ్యాధి బాటనవ్రేలునుండి బీర్తాశయము నకు వ్యాపించి, ఆకస్మాత్తుగ పొత్తికడుపుయొద్ద ఉద్రుతమగు బాధ ప్రారంభమయి కడుపు ఉబ్బరము, నిస్క్రియా, వాంతివచ్చునట్లుండుట, కఠినము తప్పినట్టియు నీసతను వహించినట్టియు నాడి ... యీలక్షణములు కూడియుండును. ఒకానొకప్పుడు అంతరావయవములకు వ్యాపించి, యితరరోగములను బుట్టించవచ్చును. యూరిక్ ఆసిడ్ (అమ్మ) ఆయా అవయవములందు జేరియుండుట వలన వివిధములగు అవస్థలు కలుగుచుండును.

చికిత్స.

ఈ వ్యాధియందలి తెరవచ్చుచుందర, విశేషసబద్ధముండిన యెడల 1 వ విశేషచరారిని పంపిస్తే ఉపయోగించవలయును. వ్యాధియొక్క ముచనలు కనుపడిన వెంటనే, 30 మినిముల కాలానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ జలములో లిపి తున్నకొనునలయును. పిమ్మట బాధ తగ్గువరకు ప్రతి నాలుగు గంటలకు డయూటిక్సులో 2 వ టేబుల్ యోగమును బుచ్చుకొను చుండవలయును. మంద్యత గలిగిన యెడలగాని, వాంతివచ్చినట్లు ఉండినయెడలగాని, మందును నిలిపివేయవలయును. గుండెయొక్క అస్వస్థత గలిగినయెడల కాలిక్వెనెను యొక్క వగ నియ్యరాదు. ఒక టేబుల్ జలములో నాలుగు డ్రాముల సోడాకార్బోనేట్ కలిపిన లోషనులో ముండిన కాటన్ వూల్ ను అస్వస్థత భాగమువకు జైవ గట్టచలయును. అస్వస్థత భాగమును ఉన్నతప్రదేశమున నుంచి, సాధ్యమయినంతవరకు గడలకుండ నుంచవలయును. అన్ని విషయములయందును వెచ్చన గలుగజేయుట యొక్క వ ముఖ్యము. చల్లదామ వలన నీ వ్యాధి అంతరావయవములకు వ్యాపించుట కనుపగను. విశ్రాంతి పరిపూర్ణముగ నుండి ఆహారపదార్థములు పాలు, ఆరోయాట్, సంబంధమగునవి అయియుండవలయును. లితియా వాటరును విరివిగా నుపయోగింపదగును. ఉద్యోగత గలంగ చేయు టేషుధముల నెక్కువగ నిచ్చురాదు.

తెరవచ్చిన పిమ్మట భోజనపదార్థములు ముఖ్యముగ కాక సంబాధవైనవై యుండవలయును. తీవ్రపదార్థముల పరిపూర్ణముగ ద్యజింపవలయును. కఠినమైన శరీరసాధకమును బుచ్చుకొనుచు, విశేష కఠినమును గాపాడవలయును.

గ్రహణి.

(డయేరి కూ)

గ్రహణి వ్యాధికి అతిపారము అతిచిరేచనము అనియు వాడుకపేర్లు కలవు. అంగ్లేయ భాషయందు డయేరియా అందురు. ఈ వ్యాధి అనేక కారణములవలన గలుగుచుండును. అన్ని తరగతులయందును ఇండియా దేశమునందు యీ వ్యాధి వ్యాపించి యున్నది.

(1) కాలరా వ్యాధికి ముందుగా నేర్పడే అతి విరేచనము, (2) చీము, నెత్తురు, మలముతోపడు విరేచనములకు ముందుగాగలుగు అతిచిరేచనములు. (3) ఇతర వ్యాధుల యొక్క లక్షణముగాగాని, అట్టి వ్యాధులతో గూడికనంది గాని, ఏదైనా అతిచిరేచనములు ఈ మాడు విధములగు అతిచిరేచనములకును ఆయా వ్యాధులను వివరించుటయందు, జికిత్స వాయబడియున్నది. ఇతరములగు అతిచిరేచనములను యీ క్రిందిరీతిగ విభజింపవచ్చును. (1) రేగుదల వలని అతిచిరేచనములు, (2) వాగ్మివేడిమియందలి మార్పువలన గలిగిడి అతిచిరేచనములు, (3) హిల్ (పర్వతప్రాంతములయందలి) డయేరియా, (4) నిత్యసంబంధమగు అతిచిరేచనములు.

ఈ వ్యాధియందు జికిత్స చేయుటకు ముందుగా విరేచనములు కాలరావ్యాధియొక్క ప్రారంభ లక్షణములా అని పోల్చింపవలయును. చుట్టుపట్ల కాలగా లేకుండియెడల నీసం గతిని గూర్చి విచారించవలసిన పనిలేదు. చుట్ట పట్ల కాలరా ఉండియుండిన యెడల, అందుల కగు జికిత్స జేయవలయును ఇటు తరువాత విచారించవలసిన కమాయము, నీము నెత్తురు మల ముతోపడు వ్యాధికి ముందుగా నీ విరేచనము లగుచున్న వాయని విచారించుట, అయి యెప్పుది. ఈ వ్యాధి కడుపునొప్పితో, బారంభమయిన యెడల నీ సందియము అచ్యుతము లేదు. రేగుదలవలన గలిగినదని మాచించెడి యాక్రిండి కాగణము లేమయున యుండిన యెడల నున్నా, యీ వ్యాధి యీ తరగతికింద జేగదని గ్రహింపవచ్చును వాయువేడిమి యందలి మార్పువలన గలిగెడి అతిచిరేచనముల వెంటి, సామాన్యముగ చీము, నెత్తురు, మలముతోపడు విరేచనములు సంభవించును.

1. రేగుదలవలని అతిచిరేచనములు.

రేగుదలవలని అతిచిరేచనములు, చాల విషయములతో భోజన పదార్థములయందలి అవివేకతవలన గలుగుచుండును. ఇట్టిదానివలన ప్రేగులయందలి హానికరమగు పదార్థములను వెలిబుచ్చుటయే శరీరమయొక్క స్వాభావిక ప్రయత్నమని యెంచవలయును. ఈ హానికర మగు పదార్థములు, జీర్ణత కాదగని ఆహారము, పక్ష్యమునకురాని కాయలు, పూర్తిగా నుడ కని కూరగాయలు మొదలగునవి అయియున్నవి. వండుకొనుపాత్రలకు తుభ్రముగా కళాయి చేయించుకొన నందువలననున్న యీ విధమగు విరేచనములు కలుగవచ్చును. ఉప్పునీళ్ళు త్రాగుటవలనను ఇట్టి విరేచనములు కావచ్చును. మంచినీళ్ళు ఉండు ప్రదేశములకుండి ఉప్పు నీళ్ళుగల ప్రదేశములకు బోయినపుడు, అనీళ్ళుగాని వడియగట్టి త్రాగకపోవుట వలన, నీ విరేచనములు తరుచుగ సంభవించుచుండును.

ఈ ప్రకారమువలన గలిగెడి రేగుదల వలని విరేచనములు కలుగకుండ నుటకు మనము జాగ్రత్త పడియుండ గలము. మన స్వాధీనమునందు లేని కొన్ని

కారణములును గలవు. పురుగులు, మలపదార్థము యొక్క నెలవ యుండుట, అజీర్ణ, పిత్తముయొక్క అతిప్రవాహము, కారణమునందు రక్తము కూడుకొనుటవలన గలిగెడి పిత్తము—యీ కారణమువలనను రేగుదల గలిగి అతివిరేచనములు గలుగవచ్చును.

చికిత్స.

మొదటగా జెప్పబడిన కారణములలో దేనివలనైనను విరేచనములు కలిగిన యెడల, పేగులయందలి రేగుదలను గలుగజేయు పదార్థములను వెలిబుచ్చుటకయి విరేచనముల గలిగించుట శరీరముయొక్క స్వాభావికముగ చికిత్స గావున నిట్టివారికి సామాన్యముగ వేరుమందులు అవసరములేవు. అయితే విరేచనములు నీరసమును గలుగజేసి, కడుపునొప్పిని కూడ తరచుగా బుట్టించునుగాన, యెంత శీఘ్రముగ జికిత్సనొందిన యంతమంచిది. ఈ తరగతియందలి విరేచనములందు కొద్దియో గొప్పయో మెలివేయు నొప్పి ఉండును. ఈ సందర్భమునందు పెద్దవారలకు ఒక అంబోన్న చిట్టాముదము నిచ్చి, 20 చుక్కల క్లోరోడీకా నిచ్చుటవలన గుణముగ నుండగలదు. విరేచనములు కట్టక పెద్దవిరేచనము లగుటవలన నీరసత గలుగుచుండినయెడల తి ద్రావిముటింక్చుర రీయు కొను ఒక బోన్నజలములో గలిపి యిచ్చుటవలన గుణమియ్యగలదు. బిడ్డలకు చిట్టాముదము నిచ్చుటయే మిగుల మంచిది. పయిమందువలన గుణమియ్యక నొప్పి యొక్కవగా నుండినగాని, వాంతినచ్చునట్లుండినగాని లింటుముక్కనుగాని స్థానలు గుడ్డనుగాని, కర్పూరశైలములో నడిపి పేగులపై నుంచి, అందువయిన ఒకపొడిగుడ్డనేసి ఒక గంటకు మించనికాలము అట్లుంచవలయును. మంట యొక్కవగా నున్నతోడనే తీసివేయవలయును. వాంతిగుణ మున్నయెడల సోడావాటరు వలన ఉపయోగముండగలదు.

2. వాయువేడిమి యందలి మార్పువలన గలిగెడి అతివిరేచనములు.

ఈ విధమగు విరేచనములు వాయువునందలి వేడిమిలోని ఆకస్మాత్తుగ గలిగెడి మార్పువలన సంభవించుచున్నవి. వర్ష కాలప్రారంభమందలి ఆకస్మిక శీతలత వలనను, రాత్రియందలి చెమ్మతోగూడిన గాలి సోకుటవలనను, తడిగుడ్డలను గట్టుకొనుట తడి వరువులను వేసికొనుట వలనను, గాలి కెదురుగా గూర్చుండుట లేక పరుండుట వలనను — ఒకప్పుడు యీవ్యాధి సంభవించుచున్నది. ఎండలో దిరుగుటవలనను యీవ్యాధి కలుగవచ్చును. ఎండలో దిరిగి ఆకస్మికముగా చల్లని నీడకు బోవుట వలనను ఒకప్పుడు యీవ్యాధి సంభవించవచ్చును. చెమట పోసినప్పుడు ఉద్రోతమగు గాలిలో గూర్చుండుట వలనను యీవ్యాధి కలుగవచ్చును. బలదాయకముండియు, మురికిగుంటల నుండియు వెలువడు దుర్వాసమువును వీల్చుటవలనను, యీవ్యాధి జనింపవచ్చును. రక్తహీనత గలిగియున్న జనులు వాయువునందలి మార్పువలన పెక్కువగ అతివిరేచన వ్యాధిచే పీడింపబడు చుండుదు. మనోవ్యాధి, విషాదుడల వీటివలనను అతివిరేచనములు పుట్టవచ్చును.

చికిత్స.

ఈ కారణమువలన గలిగెడి అతివిరేచనములు తోగి పేలువిధమగు ఆనారోగ్యస్థితి ఉండుండినను నవ్వు, నానాంశల అంగియో నవ్వునును. నేరు అస్వస్థత ఉండినయెడల, కఠిన

ముగా చీము, నెత్తురు, పడుటలోనికి దించును. ఈ తరగతిలోని విరేచనములందు విరేచన కారల లోనికియ్యరాదు. టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ ఔషధయోగమును లోనికియ్యును, ద్విప పదార్థముగు ఆహారమును మాత్రమే యిచ్చుచుండుటవలన గుణ మియ్యగలదు. అసలు వ్యాధియే రాకుండుటకు తగు వాగ్రీత బుచ్చుకొనుటకు గాను వాయువునందు మార్పుగలుగు ఋతువులలో ముఖ్యముగా గాలి ఉద్రుితముగ వీచుచోట్ల గూర్చుండకయును. ఫ్లానల్ గుడ్డలను ధరించుటవలనను, ఉపయోగ ముండగలదు. ఉదయముననే బయటకు పోవుముందు వేడి కాఫీ గాని తేయాకు నీళ్ళను గాని త్రాగుట మంచిది.

3. హిల్ డయేరియా.

పర్వత ప్రాంతములయందొక విధమగు అతివిరేచనములు సామాన్యముగ గలుగుచుండును. హిమాలయ పర్వత ప్రాంతములయందీవ్యాధి మిక్కుటముగ వ్యాపించి యున్నది. ఈ వ్యాధి యొకప్పుడు యితరప్రదేశములయందు గూడ గనబడుచుండును, వివిధములగు అతివిరేచనవ్యాధులయందు దిది దుష్టమయినదిగా నెంచవచ్చును. విరేచనము లగునప్పు డెమియు బాధలేక, విరేచనములు ముఖ్యముగా ఉదయమున నగుచుండును. విరేచనములు కొద్ది పరిమాణముగ నగుచు వర్ణమునందు వెలుపు గానుండి నున్నము, నీళ్ళు, గలిపినట్లుగానుండి నురుగుకట్టియుండును. వ్యాధి ఉద్రుతగతి నందునపుటికి సాయంకాలముకూడ విరేచనము లగును, ఒకప్పుడు భోజనము వెంటనేగూడ యగుచుండును. విరేచనమగునపుడుగాని, విరేచన మగుముందరగాని, తాదలేకుండినను విరేచనవిధర్తన మనకు బహుతొందర గలిగియుండును. విరేచనము పిమ్మట సౌఖ్యముగ కూడ నుండును. పేగులు వాయుపూరితములగుటచే విజృంభణతనంది, అజీర్ణక్షణములు కనుపడుచుండును. నాడి నీరసతనంది, నాలుక మధ్యభాగ మందు పొరగిమ్మి, ఆకలి యందు విస్తారము అన్యస్తత యేర్పడక పోవచ్చును. రోగికి కారణము వైపుల అసౌఖ్యత కనుపడవచ్చును. ఈస్థితియందశ్రద్ధజేసిన యెడల విరేచనము లధికమగుచు, రోగి కుష్ఠించి రోగియొక్క మనోభ్రమములు కూడ నీరసించి, జ్వరము రావచ్చును. అంతట విరేచనములయందు చీము నెత్తురు పడుచు, రోగి నిస్ప్రాణుడై మరణము నందుట సంభవించును.

చికిత్స.

పర్వతస్థలములకు బోయినవెంటనే ఫ్లానల్ గుడ్డలను ధరించవలయును. వాయువునందులి అక్విక్చుమగూర్చు కారణమువై బనిచేయుటచే పిత్తము ఉత్పత్తియగుట నిలిచియు, యీవ్యాధి సంధించును. ఈ కారణమువలననే ఫ్లానల్ గుడ్డలను ధరించుట మిగుల ముఖ్యము. మిక్కిలి వేడియగు ద్రవపదార్థములను దాగిరాదు. పాలను అవలంబదార్థము గా నుపయోగించుట తగుచుగ సరిపోవును. ఒకప్పుడు కాచిన పాలను ద్రాగుట శరీరమునకు బాగుగా సరిపడును. టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ ఔషధయోగము మిగుల నుపయోగముగ నుండును. పేగులపై నెచ్చగా నుండునట్లు చేయుట చాలముఖ్యము. విరేచనములందు చీము, నెత్తురు పడుట అరంభించగానే స్థలమును వదలి వేరొకచోటి కేగుటవలన నెమ్మది గలుగగలదు.

శేవలము పాలనే ఆహారపదార్థముగ జేసికొని, లైకర్ హైడ్రాజిన్ పెర్క్లోరైను 3 మినిముల మోతాదులలో దినమునకు మూడుసారులు పుచ్చుకొనుట బహుశ్రేష్ఠము, పేగులు ఊబ్బరముగానుండి దుర్వాసనగల తేవులు వచ్చుచుండిన యెడల, ఒకచుక్క కార్బాలిక్ అసిడ్నుగాని క్వియసోట్నుగాని, కొంచెము చక్కెరపై వేసికొని బుచ్చుకొన వలయును. పీటివలన నుపయోగము లేకపోయిన యెడల టింక్చర్ కేసేటిస్ ఇండికా 10 మినిములును, దిస్కోల్ సబ్ నైట్రిస్ 10 గ్రాయినులును, స్పిరిట్సు క్లోరోఫారం 20 మినిములును, ఒక బోన్స్ జలములలో గలిపి యీవ్యక్తము దినమునకు మూడుపర్యాయములు పుచ్చుకొన వలయును. పాలు శరీరమునకు పడకపోయిన యెడల, కార్నిక్సు లిక్విడ్ పెప్టనాయిడ్సు, షేర్వెల్ డిస్ పెన్సోపెప్టిస్, అను పేటెంట్ బొంబములను వాడవచ్చును.

4. శకుంభబంధముగు ఆతివిరేచనములు.

శకువులను అనుదినమును మూడు లేక నాలుగుపర్యాయములు విరేచన మగుచుండ వలయును శకువులయొక్క ఆరోగ్యమగు విరేచనము ఆవపిండి వర్ణముగలిగి, పులుపువాసన లేకుండ నుండును. శకువులయందు దేవ్యాధియు ఆహారపదార్థముల యందలి లోపములవలన గాని, తేమవలనగాని, చలిగాలివలనగాని, తటస్థించును. దుస్తులను గ్రహముగా దొడుగక పోవుటవలనను, జీర్ణతనందని ఆహారమువలనను, పేగులయందు గట్టిరడిన మలపదార్థము పేరుకొనుటవలనను—ఒకప్పుడు యీ విరేచనములు యేర్పడవచ్చును. గురకతోకూడిన దగ్గయుందును యీవిరేచనములు పుట్టవచ్చును. బిడ్డలయందుగలగు యీవిరేచనములకు శోడుగా వాంతులును ఉండవచ్చును. కడుపు ఊబ్బరము యేర్పడి పేగులు మెలిపేయుటవలన బిడ్డ ఏడుచు కార్శతో పేగులవైపుకు దన్నుకొనును. విరేచనము స్యాభావికమగు పనుపువర్ణము గలిగియుండి, జ్వరతేజుండైనయెడల, ఆహారపదార్థమునందలిలోపముండటవలనగాని, వాయువునందలి మార్పులవలనగాని యీవ్యాధి యేర్పడియుండెనని భావింపవలయును. విరేచనము ఆకుపచ్చ వర్ణముగాగాని ఆకుపచ్చ పనుపు గలిగిన వర్ణముగాగాని యుండి, పనుపు వాసన గలిగియుండి, ముక్కలుముక్కలుగా దొడుకొనిన తెల్లని పదార్థము రీతిగా నుండినయెడల పేగులయందు రేగుడల యేర్పడియున్నదనియు, ఆహారము బిడ్డకు సరిపడుట లేదనియు, గృహింపవలయును. ఈస్థితిలో, పేరుకొనిన పదార్థమువంటి వెల్చిపోవచ్చును; విరేచనములు తెలుపుగానున్న యెడల, కారణముయొక్క ఆస్వస్థతను దెలియజేయును. నీళ్లవిరేచనములును మలబంధమును, ఒకటి తరువాత నొకటి కలుగుచుండిన యెడల, యీవ్యాధికి మలబంధమును, ఒకటి తరువాత నొకటి కలుగుచుండిన యెడల, యీవ్యాధికి మలబంధమే కారణముగా గెలిసికొనవలయును. ఆతివిరేచనములు ఆకస్మాత్తుగా బ్రారంభమయి, విరేచనములు పూర్తిగా ఆకుపచ్చవర్ణమును వహించి యుండినయెడలనున్నా, నిస్త్రాణితో గూడి యుండినయెడలనున్నా, యీస్థితి కాలరాను బోలియున్నదని యెంచవలయును. విరేచనములయందు, పినును రక్తపుగిరియును గలిసియున్నయెడల, వ్యాధియొక్క గుణము మీరిపోవుచున్నదని తెలియవలయును.

అతివిరేచనములయొక్క ఒకానొకగతియందు పేగులు రేగుదలనంది, 104 డిగ్రీలవరకు జ్వరముపుట్టి, నాడి చురుకుబారి, నాలుకయిన తెల్లనిపొరగమ్మి యెర్రనిచుక్కలు యేర్పడి ఒడలు పొడిగానుండి, మూత్రము తగ్గుదల నందియుండును. విరేచనములు అర్థద్రవసూచ మన నుండి, తరుచుగా గట్టి ముద్దలు ఉండి స్వాభావికమగు దానికంటె తెలుపువర్ణమును వహించి, తెలుపయిన అమను తోగూడి, పేగులు పచ్చిగా నుండును. నుటకుడా యొక్కు పగా నుండును. జ్వరమువల్లను, తెల్లని ఆముమువల్ల యీవ్యాధిని సామాన్య అతివిరేచనము లనుండి వేరుగ గుర్తించవచ్చును. విరేచనమునందు రక్తపుగిరలు లేక పోవుటయు పీనియొక్క గుణపైయున్నది. మంటకు దోడుగా విరేచనమగునపుడు మెలిపేయునట్టిబాధ కలిసియుం డును. పాదములు చల్లనై పేగులపై వేడిగానుండి, ముఖము కమలి, శరీరము మడుచుకొని పోయి. తరుచుగా నీరసమయినట్టియు హృస్వమయినట్టియు ధ్వనితో నేడ్చుచు, ముఖ్యము గాపండ్లు వచ్చుచుండినయెడల, మూగ్గులు వచ్చినను రావచ్చును. తుదకు వ్యాధి ఉద్మత గతి నందినయెడల, నాలుక ఆరుదలనంది, నాడి తొందరను వహించి నిస్త్రాణిచే బిడ్డకు మరణము సంప్రాప్తమగును. విరేచనములందు చివరకు రక్తము అగుపడినయెడల, మరణము సమీ పించుచున్నదని తెలిసికొన వలయును.

చి కి త్న.

బిడ్డలకు ముఖ్యముగా పండ్లు వచ్చినపుడు అతివిరేచనము లయిన యెడల, యిట్టిది శరీ రమనందు గలిగిన రేగుదల నణచివేయుటకు జరుగు శరీరము నందలి స్వాభావిక పృయత్న మే గనుక, యీవిరేచనములను అతిశయముగా నిలుపు చేయుటకు యత్నించరాదు. విరేచనములు సామాన్యగతియందుండి, విరేచనము యొక్కవర్ణము స్వాభావికముగనుండి విరేచనము అర్థ ద్రవ పదార్థముగ నుండిన యెడల, మందు ఆవస్థరము లేకుండగనే నెమ్మదింపును. ఎటులయి నను, ఈఆస్పష్టతను యిరువదినాలుగు గంటలకంటె నెక్కువకాలము చికిత్స చేయుకుండ నూరకుండరాదు.

అహోపదర్శములయందు యేమయిన లాభము దిన యెడల, దానిని సరిచేయవల యును. పసిపిల్లలకు రెండుగంటల కొకసారి కంటె నెక్కువగ సాహారమును లాభకరము రాదు. వయసునం దెదిగిన కొలదియు, యీ కాలపరిమితిని హెచ్చింప వలయును.

వ్యాధి ప్రారంభము కాగానే సంవత్సరములోపు వయసుగల బిడ్డ ఆయినయెడల ఒక ద్రామున్నూ, చిట్టాముదమును యిచ్చుట మిగుల శ్రేష్ఠమయిన చికిత్స ఆయినయెన్నది. దీని వలన పేగులయందుండెడి రేగుదలపదార్థము వెలువడును. విరేచనములు కట్టుకపోయిన యెడల, వయసుననుసరించి తగిన మోతాదులో క్లొరోడీన్ ను యియ్యవలయును. ఒడలు ఒకసారి వేడిగను ఒకసారి చల్లగను ఉండినయెడల, యీ క్రింది ఔషధయోగమును వాడ వలయును.

పల్వీస్ ఇపీకాక్ ఔ గ్రియసులు 2
క్లిఫీక్ — — — — గ్రియసు 1

ఈ రెంటిని బాగుగా గలిపి పవుదరుగా చేయవలయును. రెండు సంవత్సరముల వయసుగల బిడ్డకు ఉదయమునను రాత్రియును ఒక పవుడరు గొప్పన యియ్యవలయును.

ఒక సుపత్నియు నయనుగల బిడ్డకు పై మోతాదునందు సగము చొప్పునను, ఆరు మాసముల వయసునందున్న బిడ్డకు నాలుగవ వంతుచొప్పున యియ్యవలయును.

ఊపిరిగాని విరేచనములు గాని, పులుపువాసన గొట్టుచుండినయెడల తైంవాటరును ఉపయోగించవలయును. విరేచనములు తెల్లగానుండినయెడల, ఒక గ్రెయిను పొడాఫయిలిన్ ను ఒక ద్రాము (గాందీలాగలిసి, యీ సాల్యూషనులో ఒకటి లేక రెండు చుక్కలను కొంచెం చక్కెరపైవేసి, దినమునను రెండుసారులు యియ్యవలయును. దీని వలన కారజము యొక్క అస్వస్థతకు కుదిరిక నందగలదు. విరేచనమలందు ఆమము, రక్తము, కూడి యుండినయెడల, ఆమ విరేచనములకు దగ్గు చికిత్స జేయవలయును. ఆలివిరేచనముల యొక్క అన్ని తరగతులయందును, బిడ్డలను కొద్ది పరిమాణములయందు అనేక సార్లు లిచ్చుచుండవలయును. ఎక్కు పరిమాణముతో వినియోగించునపుడు పావుగంట కొకసారి ఒకదాగ్గము చొప్పున ఆమమును లోనజేయవలయును. కీఘ్ర కాలములో చురుకును బుట్టించు పదార్థములు ఆవ సుమగును. గాన, మొదటి ఒకటి రెండు దినముల పిమ్మట, ఒకదాగ్గము పొర్లువైనను కొంచెము నీళ్ళలోవేసి దినమునకు రెండు మూడు సార్లులిచ్చుటవలన గుణమియ్యగలదు.

ఆలి విరేచనములలో నన్ని తరగతులయందును, బిడ్డలను పేగులపైన ప్లానర్ గుడ్డును జాట్టుట మంచిది. మందులు యిచ్చుచుండినను, పండ్లయొక్క స్థితిని పిచారించి, పండ్లబిళ్ళయొద్దనే ఉబ్బుటల నందియుండినయెడల బిగుళ్ళను లాస్సెట్తో గీరవలసియుండును. పేగులయందు పురుగు లుండిన యెడల, సాంటోసిన్ యిచ్చుటవలన అందులకుగుజికిత్సజేయవలయును.

ఊపిరియందు పులుపువాసన యుండినయెడల 7 వ అస్టిగ్రింజెంటు బౌషధయోగమును వాడవలయును. దీనితోగూడ 4 వ ఆల్టరేటివు బౌషధయోగమును వాడవచ్చును. నొప్పి అధికముగానుండిన యెడల 4 వ అస్టిగ్రింజెంటు బౌషధయోగమును ఉపయోగింపవలయును.

చెంపపై పొక్కులు.

మొక్కుయొక్క ప్రక్కలను చెంపలపై ఉన్నతయైన పొక్కులు ఒకానొకప్పుడు లేచును. కొన్ని విషయములయందు యీ పొక్కులు పుండ్లుగా దేలును. ఈ పుండ్లుయెదుగుట కాస్తవము కలుగుచున్నది. తయవ్యాధి పీడితులయందు యీ పొక్కులు కలుగుట మిగుల తరుచుగ సంభవించుచుండును. తయసంబంధముగు పుగగు యీ పుండ్లయందు సామాన్యముగ గనబడుచుండును. ఈ పుండ్లకు పొక్కుమందులను వేయుటవలన నుపయోగముండగలదు. ఈ పొక్కులు గుబురులుగా నుండినయెడల, ఒక్కొక్కభాగమున కొక్కొకపర్యాయము స్వచ్ఛమయిన కార్బాలిక్ ఆసిడ్ ను రాయుటవలన గుణమియ్యగలదు. ఎరెక్ట్రోక్ వెలుతురు వోనను. సూర్యగన్ధి వలనను, యెక్స్ కిరణముల వలనను, సంతృప్తికరములగు భరితములు కలిగియున్నట్లు తెలియుచున్నది.

చర్మరోగములు.

చర్మరోగములు రెండువిధములుగ నున్నవి. ఒక విధమయినవి క్రిమిజాలములతో గూడి యుండును. రెండవవిధమైన వాటియందు క్రిమిజాలములుండుకాక కేవలము చర్మసంబంధము లైపట్టికగ గాని, శరీరమునందలి కొన్ని యితర అస్వస్థతలవలన గలిగెడి చర్మమునందలి వినుగగజ్జి, గజ్జి, తామర మొటిమెలు, సోరియేసిస్ - మొదలగు వాటిగ గాని పరిణమించుచుండును. ఈ వ్యాధులు ఆయా కిరీకల క్రింద వివరింపబడియున్నవి. ఇచ్చట తక్కిన చర్మ వ్యాధులు మాత్రమే గవనింప బడి యున్నవి.

1. మచ్చలు.

సూర్యాతపమువలన, ఎరుపువర్ణము గలవారియందు, ముఖ్యముగా ముఖముపైన, నచ్చటచ్చట గురురులుగా, ఒక విధమయిన రంగుగల మచ్చలు యేర్పడును. వీటివలన బాధ యేమియు లేదు. హానికరములును గవు. సూర్యాతపమునకును, గాలికిని, దుమారమునకును, లోనుగాకుండుటవలన నీ మచ్చలు వాటంతట అవియేర్పవును. పలిగారియందు యీ మచ్చలు నశించును.

చికిత్స.

ఇరువది నుంచి బాదంకాయలలోని పప్పులను కల్వములో ముద్దయగునట్లు మెత్తగా గొట్టి, ఒక పెంటు ఉడుకునీళ్ళలో దీనిని గలిపి, వడియగట్టి, యీ నీళ్ళ యందు స్పంజిలో మంచి మచ్చలపైనెత్తి, ఆ నీళ్ళను చర్మముపై సారనీయవలయును. లేదా, సమానములగు లైంవాటరును పాలనుగలిపి, దానినిగూడ యిదేప్రకారము అద్దవచ్చును. ఒకఆరగంటపిమ్మట ఆయాభాగములను గ్లిసేరిను సబ్బుతోడను నీళ్ళతోడను గడిగి కేయవలయును. అటుతరువాత, తెల్లనైన ఫుల్లరు ఆర్డు (చవుడు) నుపైనఅద్దవచ్చును. మరియొక, చికిత్స రెండు ఆవున్నుల నిమ్మరసము, ఒక చామి కెలిగారము, ఒక చామి తెల్లని చక్కెర - వీటి నన్నిటినిగలిపి అప్పుడప్పుడు రాయుచుండుట ఆయున్నది.

2. ఎరిగి పొక్కులు.

పొంగనందువలె నీ వ్యాధియందు ముందుగ జలుబు, తుమ్ములు వచ్చుట కండ్ల వెంట బడి నీళ్ళువచ్చుట - యీ గుణములు కలిగియుండవు. పొంగనందువలె పొక్కులుఒక్కటే ఆకారము వహించియుండలేక, అనేక పరిమాణములుగను, అనేక ఆకారములుగను, శరీరము తటను వ్యాపించియుండును. స్కార్లేట్ జ్వరమునందు వలె యీవ్యాధియందు గొంతునొప్పి యుండదు. ఈ వ్యాధి అనేక తరగతులుగ నుండి యున్నది. ఇందు, గులాబివర్ణమును వహించి గుండ్రని ఆకారముగా శరీరమున వ్యాపించి యుండెడిది మాత్రమే ముఖ్యమైయున్నది. ఇట్టిపొక్కులు ఒకానొకప్పుడు మహాచికమనకు ముందుగా రావచ్చునుగాన, మహాచికము చుట్టుపట్టు వ్యాపించి యుండినయెడల, యిందువిషయమై యొక్కవజాగ్రతను వహించియుండుటమంచిది. బిడ్డలయందు, యీవ్యాధి తటసించి పండ్ల చిగుళ్లు వాదియొండినయెడల, వాటిని, లా సెన్టీతో గో యత్నింపవలయును. విరేచనము క్రమముగా గాకుండినయెడల చిట్లామదము నిశ్శయము. కడుపునందు అప్లము వృద్ధిగా నుండిన యెడల, కొద్ది గ్రెయి నుల సిల్వేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను నీళ్ళలోవేసి యియ్యవలయును. ఈ వ్యాధి పెద్దవారలకు

వచ్చినయెడల, సామాన్యముగా నేదియో యొకవిధమగు అజీర్ణవ్యాధి వ్యాపించియుండును గాన, అందులకుఁ జకిత్స జేయవలయును.

3. టక్కు ముండ్లు (Nettle Rash).

దూలగొండి (Nettle) అను రాయుటవలన యేర్పడెడి కండులవలెనే కంది, బాధ యందును దానివలెనే యుండెడి, యీ వ్యాధికి టక్కు ముండ్లు అను వాడుక పేరుకలదు. ఒకప్పుడు యీదద్దురు పేము బెత్తముతో గొట్టిన చెప్పవలె పొడుగుగా బ్రారంభమయి, అంచులయందు మాత్రము యెర్రగానుండును ఈదద్దురు తరుచుగా నకస్మాత్తుగ గనబడును. కొన్ని నిమిషములు మాత్రమే ఉండిన పిమ్మటగాని, లేక ఒకటి రెండు దినముల పిమ్మటగాని, దానంతట అదియే అకస్మాత్తుగ నంతరించిపోవును. పగులు కనుపడక రాత్రి తిరిగి వచ్చుటయు కలదు. దరద బహు అతిశయమయి ఒడలు జలపరిచుటయు గలుగును. దీనికి, ఒక భాగము స్పిరిట్సు ఆమ్ల్యానియా ఆరోమేటిక్ను రెండు భాగముల జలములోగలిపిపయిన రాయవలయును. ఒకప్పుడు వాంతితోడను జ్వరముతోడను గూడ అకస్మికముగ నిది సంభవించుట మిగుల భయమును బుట్టింపవచ్చును. కాని, యీ వ్యాధి అపాయకరమయినది గాక, తరుచుగా నాహారపదార్థముల యందలి లోపమువలన మాత్రమే యీవ్యాధి కలుగుచుండునని గ్రహింపవలయును. కొందరి మనుష్యులలో షెల్ఫిష్ (ఒకవిధమగు చేప) దోసకాయలు, కుక్కగొడుగులు మొదలగు వాటిని దినుటవలన నీ వ్యాధి గలుగును. కొపేతా, ఆంటివైరిక్ క్విన్స్ - వీనిని దినుటవలనను, యిచే విధమగు దద్దురు కొందరియందు కలిగియున్నది. శరీరము వేడిగానున్నచిట చల్లని నీళ్ళను ద్రాగుట వలనను, ఈ వ్యాధికలుగవచ్చును. సంపూర్ణయైన భోజనమయిన వెంటనే ఈదద్దురు యేర్పడిన యెడల మనస్థైర్య వాంతికారి నియ్యవలయును. ఇతర సందర్భములయందు 1 వ విశేషనకారి నియ్యవలయును.

4. చెమరకాయలు.

శీతల ప్రదేశములనుండి ఉష్ణ ప్రదేశములకు వచ్చువారలకు సామాన్యముగ గలిగెడి దీని వ్యాధియే ఆయియున్నది. దీనికి ఒడలు ప్రేలుట యనియు కొందరు వాడుదురు. దీని వలన అపాయమేమియు లేకన్నను బహు చీదర గానుండును. ఒడలు చిటచిటలాడుట, దురద పెట్టుట, చెమటపోయుట, యీ లక్షణములతో కూడి చర్మమువయిన యొగ్గిని పొక్కులయందు అటుపిమ్మట కొంచెము తెల్లని పదార్థమును, ఉండును. శరీరసాధకము వలనను, ఉడుకు ద్రవములను ద్రాగుట వలనను, యీ పొక్కులయొక్క వర్ణము తీవ్రతను వహించును. ఈపొక్కులకు పయిన స్పిరిట్సు ఆమ్ల్యానియా ఆరోమేటిక్నున్న జలము నున్న సమానభాగములలో గలిపి రాయుటవలన దురద తగ్గగలదు. కరుకయిన తువాలు తో ఒడలను దుడుచుటవలన చిన్నిపొక్కుల యొక్క తలలు బ్రష్లలము యిచి దురద పెట్టుట తగ్గిపోవును. తేలికయిన దుస్తులను ధరించుట, విశభోషనము చేయుట, అప్పుడప్పుడు విశేషనకారుల బుచ్చుకొనుట, ఆవశ్యకములై యున్నవి. ప్లానర్ దుస్తులను ధరింపరాదు. దాహముగానుండి జ్వరత వహించి యుండినయెడల సిట్రేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను తగు మోతాదులలో నీళ్ళతో వేసి పుచ్చుకొనవలయును. ఉద్యోగావసరమున నిది పెట్టకపోవుటయు, కొపము పెంపందుటయు, గలుగును. వీలుకలిగినవారు శీతలప్రదేశమునకు పోవుటయు,

మిగుల మంచిది. ఇరువది గ్రేయిసుల కాపర్ సల్ఫేటును ఒక బౌన్సు జలముతో గలిపి, ఆ స్వస్థ భాగముల నద్దవలయును. రెండు ద్వాయిత పాటాన్ బైకార్బోనేట్ కు ఒక ఆరవ యంటు జలముతో గలిపి అద్దినను అద్దవచ్చును.

5. ఒకవిధముల పొక్కులు (బైట్స్)

బిడ్డలయందు మాల్గిముగా శరీరముయొక్క నానాభాగాల నుంచును. ఒక విధముగ పొక్కులు లేచును. పాగిరంధమునందు, పీపు, కడపు, పిరుదులు, కాళ్ళు, చేతులు— పీటిపయిన వెర్రినయిన గుండ్రని మచ్చలు యేర్పడి, యివి మంటలోగూడి దుగద పెట్టును. కొద్దిగంటలలోనే యీమచ్చల మధ్య పొక్కులు యేర్పడి, అతిత్వరలోనే పెద్దవయి, కొంచెము అంచుచూర్చి ము వదలి, యెరిసిమచ్చ అంతటను యీపొక్కు వ్యాపించును ఈవిధ మగు పొక్కులు అనేకములుగా లేచును. ఈపొక్కులలోని ద్వివము, మొదట స్వచ్ఛము గానుండి క్రమముగా మడ్డియయి, రెండు లేక మూడు దినములలో పగులును; పగలిన పిచ్చుట పక్కలుకట్టి, యివి మానుగలి నందును. కొన్ని పక్కలు మానుచుండగానే మరి కొన్ని క్రొత్త పక్కలు యేర్పడి, యీవ్యాధి యీప్రకారము కొన్ని దినములు గాని, ఒకప్పుడు కొన్ని వారములుగాని, వ్యాపించియుండును. బిడ్డలయందు, పుట్టుక వెంటనే యిట్టి వ్యాధి తటస్థించినయెడల, కొఱుకు వ్యాధియొక్క ఫలితముగగాని, నొప్పులు పడుటయందు గాని పిచ్చుటనుగాని తల్లినుండి గ్రహించిన చూలివ్యయి యొక్క అంటువలగగాని, యెంచ వలయును; పిచ్చుట కొంతకాలమునకు దటస్థించినయెడల జీర్ణాశయముయొక్క శస్త్రస్త్రా ఫలితముగ నెంచవలయును. పెద్దవారలయందు, అజీర్ణవ్యాధి వలనగాని, యితర కారణముల వలన గలిగిన నీరసశక్త్యు వలనగాని, ఈవ్యాధి తటస్థించినవి యెంచవలసి యుండును. ఈ వ్యాధియందు గలుగు దుగదవలన నిద్రపట్టకపోయిన దప్ప యితర విధములుగ రోగి సౌఖ్య ముగ నుచ్చటులనే గనబడును. రోగియొక్క సామాన్య ఆరోగ్యతను గనిపెట్టుచు జీర్ణాస్వ స్థత లేమయిన యున్నయెడల దగుచుండుల నిచ్చుటయందే యీవ్యాధియొక్క చికిత్స యి మీడియున్నది. ఈపొక్కులను సన్న సూదితో గుచ్చుటవలన, లోనిమాల్గివ్యయిను దొలగించి గుడ్డలు తగులుటవలన సస్వస్థ భాగములకు హానిగలుగకుండ జేయుచు, పీలువెంబడి వాటిని గడుగుచు బోరిక్ ఆసిడ్ ను పయిన పిచ్చుట మూలమున, స్థానికా చికిత్సను జేయవలయును ఈపుండ్లు మామదలనందిన పిచ్చుట కొంత కాలము నలనిమచ్చుటయందుగాని సామాన్యగతుల యందివి స్థిరముగ నుండుననికావు. లోనికిచ్చుటకు పాశురసంబుధములు మిగుల ఉపయో గములుగ నెంచడుచున్నవి.

6. సన్నని పొక్కులు (మిలియేరియా)

సామాన్యముగ గుండునూదితలకంటె పరిమాణమునను దధికముగనుండుని సన్ననిద్రవ పదార్థ సహితములైన పొక్కులకు మిలియేరియా అను వాడుక పేరు కలదు. ఈవ్యాధియందు తిరుచుగా చర్మముకూడ యెర్రోవారి యుండును. ఎక్కువ చెంటును బుట్టించు కొన్ని జ్వరము లు మొదలగువాటియందు, స్వేదగ్రంథులకు గలుగు యస్వస్థల వలన వీర్యాధి యేర్పడును. స్వేదమును న్నవించినట్టి చిన్ని నారములు చర్మముయొక్క చితిమువలన గాని సాగ్రముల వలనగాని కప్పబడుటవలన నీవ్యాధి కలుగుచున్నది. అధికవేడిమికి లోబడినవారలకు గాని

ఒడలు పరిశుభ్రముగా నుంచని వారలకుగాని యీవ్యాధి సంభవించు చుండునట్లుల మనము తరుచుగ గమనింపు చుండుము. ఈవ్యాధులు ముఖముగా మెడ, ఎదురొమ్మ, చంకలు — యీభాగాలయందు గనబడును. దీనివలన అపాయమేమియోలేదు గాని రోగియొక్క రమణకు చిల్లినయను, చర్మమునకు వరకు భీతియును, గావలయునని సూచించును. శరీరింట్లో ఆక్సైజన్ పోషణను నైన బంతులవలన నుపయోగ ముండాలదు.

7. తల మూ ద.

తలమద అనునది చీముసంబంధమగు పురుగువలన గలిగెడు అంటువ్యాధి అయియున్నది. మెడలు గొంఠెము దురదప్రారంభముయి యొరని వర్ణముగల బొబ్బవలె చేతికి దగులును. ఈబొబ్బ వ్యాపించినకొలదిని తామరయందువలె గుండ్రముగ నుండక, వంకరుగ నుండును. సుమారు పండుగండు గంటలలో పరిహిబ్బయొక్క మధ్యప్రదేశమునందును, కొంచెము పసుపువర్ణముగల ద్రవపదార్థము గోళాకారమున వహించి యుండును. ఇదియును దీనిపిమ్మట మొవడు దశమైన స్రావమును అరదలనంది తేనెకుట్టె ఆకారమున వహించి, పక్క యొక్క కొంతభాగము మిట్టగానున్నా, కొంతభాగము పల్లముగానున్నా యుండును. ఈపక్కలలో తలవెండ్రుకలు మారియుండును. వ్యాధి ఉద్యోగము నందినకొలదిని, తలయంతటను కొంచెము పసుపువర్ణముగల పక్కగట్టునంత వరకును స్రావము దశమగుచు పరిమాణమునం దధికమగుచుండును. ఈవ్యాధి ఆశ్చర్యదాయకమైన యెడల పక్క ఆడుగున పుండ్లుయేర్పడును. ఈవ్యాధి ఆరంభదశలో గుర్తింపబడినయెడల తామర కగు జీతిన్నే దీనికి జేయవలయును. పక్కలు కట్టునంతవరకును యేమియు జేసియుండని యెడల పక్కలు ఊడిపోయి ప్రైభాగమంతయు శుభ్రముగ నుండునంతవరకును పిండికట్టును గట్టవలయును. వెండ్రుకలను సాఫుగా శుభ్రపరిచవలయును. అలివ్ ఆయిల్ నుగాని గ్లిసేరిన్ నుగాని పైసరాసి తలకు అంటిపెట్టుకొని యుండునట్టి టోపీని ధరించవలయును. ఆహార పదార్థముల యందును, మందుయందును వ్యాప్తతలగుండ నవలంబించవగు పద్ధతులయందును తామర కగు అంశములనే గమనింప వలయును. ఈవ్యాధి ఒకబిడ్డనుంచి మరయొక బిడ్డకు వ్యాపించుచుండునట్లులయును. గోకుకొంటువలన శరీరమునం దొకభాగమును డి మరయొక భాగమునకు వ్యాప్తతలగుండ నట్లులయును జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనవలయును. బలహీనులగు రోగులకు తరువులుగా చేలవచ్చును. గంధకపు ఆయింటు మెంటు బొవధయోగమును గూడ వాడనగును.

8. చీడ (Erythema)

ఈ వ్యాధియందు కొంచెము యొర్రినై వివిధ పరిమాణములును వివిధ ఆకారములును కలిగిన గుబురులుగా శరీరమందలి నానా భాగములయందును వ్యాప్తతలంది, సామాన్యముగ మూడుదినములలో, ఒకవృడు వారము దినములలోను, ఆంతరించిపోవును. ఈవ్యాధియందు మిగుల దుర్దగాని, జలవర్షముగాని, ఉండియుండును. ఋతుసార్వత్రికమునకు ముందుగా పడుచులయొక్క కాల్షపయన దయచుగ నీవ్యాధి సంభవించును. శరీరము వేడినంది యున్నపుడు చిల్లని నీళ్ళను దాగుటవలన నీవ్యాధి యేర్పడవచ్చును. బిడ్డలయందు వండ్లు వచ్చునపుడు యీవ్యాధి గావచ్చును. బిడ్డలయందు ధీ వ్యాధి సామాన్యముగ పిడుగులపైనయను గానెందీ

య భాగములయందును, దట్టస్థించును. విశేషము కృమముగా గాకుండినయెడల అందుకగు విశేషకారల నియ్యవలయును. ఈవ్యాధి అపాయకరమైనదిగాక బహు అరుదుగా జ్వరముతో నూడియుండును. రోగికినిచ్చు అహారపదార్థములు తేలికగ జీర్ణమగువియ్యె యుండి వలయును. అస్వస్థత భాగములయందు జింక్ ఆక్సైడ్ ను వాసలీన్ ను కలిపి రాయవలయును. జింక్ ఆయింక్స్ మెంటును రాసినను రాయవచ్చును.

చె మ ట.

నిప్పుదగ్గరకుగాని, ఎండలానికిగాని బోపుటవలనను, శరీరపరిశ్రమ దీనికొనుటవలనను గలిగెడి చెమటకును, యిట్టి కారణము లేవియు లేకుండగనే శరీరమంటనుగాని, శరీరమందలి కొన్ని భాగములయందేగాని అస్వస్థత కారణమున విశేషముగ గలుగు చెమటకును, భేదము కలదు. న్యూమాలియా మొదలగు కొన్ని జ్వరమాలలో శరీరమునందు వేడిమిని క్రమపగచు మధ్యభాగములు విశేషకాలముగాని కొద్దికాలమేగాని కలత నందుటవలన, శరీర వేడిని పిమ్మట యధాస్థానమునకు వచ్చినతరువాత గూడ, యీ మధ్యభాగముయొక్క అస్వస్థత అటులేయుండి శరీరమునగదు యీచెమట అధికముగగల్గువ్యాధి జనించును. ఒడలుయొక్క చర్మభాగములయందలి రక్తప్రచారముయొక్క చురుకుదనమునకు స్వేద ప్రాసమునకును, చాలవరకు సంబంధ ముండియుండినను, కొన్నికొన్ని సరముల సంబంధములగు కారణములచే చర్మభాగములయందు రక్తము కూడుకొని యుండియు పొడిగానుండుట తటస్థించి, శరీరము పాలియున్న పుష్కల చెమటతో మునిగి యుండుట దట్టస్థించును. కొన్నికొన్ని విషమజ్వరముల యందు మెదడుభాగము విప్రచేరితమగుటచే, స్వేదగంధులకు వ్యాపించు సరములయందును అస్వస్థత యేర్పడి ఉద్రుతమగు చెమట గారుటయు బ్రాంత సంభవము. అరసెతులయందీ అస్వస్థత యేర్పడినయెడల, చేతులు చల్లగానుండును. ఇట్టివారి చేతులు మురికిగా నుండును గాన నీటయినపనిని చేసిని జేయుటకును పిరలు పనికొరకు. ఈవ్యాధిచే బీడింపబడు వారలు సామాన్యముగ నారోగ్యస్థితియందు లేరనియే జెప్పవచ్చును. బ్రాగు బోతుదనము అధికమయి యున్నవారలందుచేతులు సామాన్యముగ చెమటపడుచునుండును. ఇట్టివారలందు చర్మము బిగువులేక, నూత్నరంధ్రములు కలదియు కొల్పినట్టిదియు అయి, మొటిమలువలె నొక విధమగు మెత్తదనమును వహించియుండురు. తేయాకు నీళ్ళు యొక్కవ దాగ్రుటవలనను, కొందరకు కాళ్ళను చేతులును చల్లని చెమటలు పోయును.

చి కి త్న.

చెమటలు కలుగు నీవ్యాధియందు సామాన్యముగ బలవర్ధ కావధములు అవశ్యకములయి యున్నవి. జ్వరకతుల ననుసరించి వచ్చిన వ్యాధి కృమముగా దానంతట అడయే సర్దుకొనునుగాని, క్విసీనును యిచ్చుటవలన లొందరగా సర్దుకొనగలదు. నేలైతిక్ అసిడ్, జింక్ ఆక్సైడ్ అను వైన రాయవలయును. పొటాష్ పర్మంగనేట్ కలిపిన బోషనుతో నస్వస్థత భాగములను గడుగుటయు మంచిది.

చెమట (మర్దంధసహితమగు).

స్వేద గ్రంథలయొక్క అస్వస్థతవలన, చెమట యందు మర్దంధ మెరుగును. ఈ చెమటయందు ఒక వైద్యకాస్త్రజ్ఞుడు దుర్వాసనను గలుగజేయు ఒక విధమగు పురుగులను గనుగొనియున్నాడు. పాండురోగమునందు యీవ్యాధి వ్యాప్తతనండి, ఋతుసౌఖ్యకాలమందు అధికముగ నుండును సంతోగ సంబంధమగు ఉద్దీకతయందును. యీమర్దంధ సహితమగు చెమట కొంతవరకు గలుగును.

చెమట అధికముగ నుండవలసిన ఆగత్యము లేదు. ఒకప్పుడు శరీరమంతటి నుండియు మిగుల అసహ్యమగు వాసన బయలుదేరి, చెమట అధికమయిన కొలదిని వాసనయు హెచ్చుచుండును. ఈ వాసన బెల్లెల్లినాసనను బోలియుండును. లేక తీక్షణముగా మాత్రమే ఉండును. మరూచి మొదలగు వ్యాధులయందు వాసనలు ఒక విధముగ ఆహితిముఖమగుండును. కీళ్ళజ్వరమందు, చెమట పులుపువాసన గలిగియుండును. గంధకము, ఆయోడిన్, ఇంగువ, కస్తూరి మొదలగు ఔషధములు లోనకు పుచ్చుకొను నపుడు, చెమట ఆయా వాసనలన గలిగియుండును.

శరీరాకోగ్యతయందలి లోపమేదయిన యున్నయెడల, అందులకగు జికిత్స జేయవలయును. ఈ వ్యాధి కుదిరిక నందుటకై పరిపూర్ణమయిన శుభ్రతను గలిగియుండవలయును. ఒడలు యొక్క శుభ్రతను గాపాడుటయేగాక, కట్టుబట్టలను, చక్కలను తరుచుగ మార్చుచుండవలయును. సాధారణ చెమట కగు జికిత్సనే దీనికిని జేయవలెను.

జ్వరములు.

పునఃప్రకోపజ్వరము (Relapsing Fever)

(కాటక జ్వరము.)

ఈ జ్వరము ఒక సారి వచ్చి వెళ్ళిపోయి క్రమకాలమున మరల వచ్చుటచే, పునఃప్రకోపజ్వర మనబడును. ఈ జ్వరము కాటకములయందు మిగుల వ్యాప్తతనండి యుండునుగాన కాటకజ్వరమనియు పిలువబడును. కాటకములయందు ఆకలిచేతను, అధరుపులేమి చేతను, భాధనొందు వానియందీవ్యాధి అధికముగ వ్యాపించి యుండును. ఇండియా దేశమునందును, కాటకములయందు యీవ్యాధి సర్వ సాధారణ మగు వ్యాపించియుండెను. గాని, 1897వ సంవత్సరమునందు మాత్రము యీదేశమునందు కలుపు గలిగియున్న అనేక జిల్లాలలో యీ వ్యాధి కనబడియుండలేదు.

ఈ వ్యాధి నందుటకు శ్రీమలయందుకంటే పురుషులయందుకంటె చిద్యక్తత ఉండి యున్నట్లు ఆసేమలు చెప్పియున్నారు. వయసునందేమియు వివేకత లేదనియే జెప్పరచ్చును ఈ వ్యాధి కాటకములయందు యొక్కవ తీక్షణత వహించియున్నను, తక్కిన కాలముల యందు బొత్తుగా ఉండుటకు పిలువదని చెప్పటకు అస్పదము లేదు. ఈ వ్యాధియందొక విధమగు పురుగు రక్తమునం దావహించి యుండును. మూత్రజ్వరమున దంతరి సహాయమున

నీపురుగును గనుగొనవచ్చును. వ్యాధియొదలి సందిగ్ధస్థితి (Crisis) సమయమువరకును ఈ పురుగు రక్తమునందుండును. ఈ సమయమునకు తక్షణవ్యాధి యీ పురుగులు సంఖ్యగాండు కొంచెముగా తగ్గిపోవును. శరీర వేడిని స్వాభావిక స్థితికొనవచ్చునరీతి, యీపురుగులు అంత రించిపోవును. జ్వరము తిరిగి వచ్చునరీతి యీపురుగు మరలి శరీరమునందు గనబడును. యీ పురుగులు రక్తముయొక్క పారుదలయందు ప్రహేళిక వశంపుజేయుదునని తెలియుచున్నది. ప్రహేళిక అగిరిపబడిన కొన్ని కోతులయందు ఈ పురుగును రక్తములోనికి యింజన్లు చేయుటచే నవి మరణము నొంది: మరణానంతరమున వాటిరక్తమును పరీక్షించగా అందు ఈపురుగులు కనుగొనబడినట్లు తెలియుచున్నది.

జనసమర్థ ప్రదేశములయందు ఈవ్యాధి విశేషవ్యాప్తత నందుచుండును. ఈవ్యాధి పీడితుడు ఆక్రమించుకొనియున్న, వెలుతురును గాలియు జక్కగా దోగని ఒక గదిలోనికి బోవుట మాత్రమున, నీవ్యాధిని ఆకర్షింపవచ్చును. రోగియొక్క ఉమ్మియందును ఈవ్యాధి సంబంధమగు పురుగు ఉండియుండును. గాని, ఊపిరి విడుచుట మూలమున నీవ్యాధి గాలి మార్గమున వ్యాప్తత నందుటకు పిలు కలుగుచున్నది.

లక్షణములు,

ఈవ్యాధి శరీరమునం దావహించిన కొన్ని గంటలలోనే ఒకప్పుడు ఉద్రోతస్థితిలోనికి రావచ్చును. ఎటులైనను యీ కాలపరిమితి ఐదు నాలుగు దినములకు మించదు. నకటనుసామాన్యముగ ఆయిదు పది దినముల మధ్యకాలములో ఉద్రోతగతి ప్రారంభ మగును.

ఈజ్వరము సాధారణముగా నకస్మాత్తుగ వచ్చును. ఈరోగి తన సామాన్యవ్యాపక మునందుండగానే తీవ్రమైన తలనొప్పి, తలతిప్పలు, చలి, వాంతియగుట — యీ లక్షణములు కనబడును. తలనొప్పి తరుచుగా నుడురువైపుల నుండును. కాళ్ళు, చేతులు వెన్ను — యీ భాగములయందును నొప్పలు సాధారణముగా గలుగుచుండును. నిస్సౌజియు గూడియుండును. ఈస్థితియందు కొన్నిగంటలు మాత్రమే ఉండినపిమ్మట, శరీరమునందు మంటవోగూడిన వేడిమి ప్రవేశించి శరీరవేడిమి 104, 108 డిగ్రీల మధ్యగ నుండును. నాడియొక్క తీవ్రతయు హెచ్చి నిమిషమునకు 110-120 బెట్టులకు, మధ్యగా నుండును.

ఈవ్యాధియందు ప్రధానసూచన లక్షణమగు తలతిప్పడువలన రోగి పరండియే యుండును. అప్పుడప్పుడు, అరంభగతియందే సందిగ్ధము జనింపవచ్చును. సామాన్యముగ మాత్రము యీగూణము కొన్ని దినములవఱకు కనబడదు. నాలుకపై సాధారణముగ బెల్లైన నట్టిగాని, కొంచెము పనుపువర్ణమును వహించినట్టిగాని, దళమైన పొడగమ్మ, వ్యాధిబోదుగు నను జాలవడయములలో నాలుక తడిగా నుండును. ఈస్థితియందు అతివీరచనములు సామాన్యముగా దట్టించవు. పేగులయందు సాధారణముగా మలబద్దమున కుచ్చుకత ప్రవేశించును. మాత్రము తీవ్రవర్ణమును వహించి పరిమాణమునందు మాత్రము, కనిపెట్టు బడగనిసంగి తగ్గుదల కనుపించదు. బడలు సామాన్యముగ మిగుల పొడిగానుండి, ఒకానొకప్పుడు మాత్రము మొదటి యిరువదినాలుగు గంటలలోను గొంచెము చెమటలు కనుపడవచ్చును. పచ్చ కామాల వ్యాధి ఒకప్పుడు అకస్మాత్తుగను ఒకప్పుడు క్రమక్రమముగను శరీరమునందు వ్యా

పించును. కాచిజము, ప్లేహ — యీరండు అవయవములును ఘనతనంది, చేతితో దానికు ఒకలన మృదుత్వమును వహించియున్నట్లు కనుగొన వచ్చును.

ఉదజ్వరము అయిదు దినములు మొదలు యేడుదినములవరకును వ్యాపించియుండి వివిధవిషయముల యందు శరీరవేడిమి 102 - 108 డిగ్రీలకు మధ్యగా నుండును. సామాన్యముగా, ఉదయము నందలి శరీరవేడిమి సాయంకాల మందలి దానికంటె తగ్గియుండును. మూడవ దినమునందు మాత్రము శరీరవేడిమి ఉదయమునను సాయంకాలమునను కొంచె మెక్కువయ్యవగ ఒకే గతియందుండును. జ్వరమునందంతటను రోగి బహుళత జెంది మిగుల నీరసగతియందుండును. జీర్ణాశయమునందలి పదార్థమంతయు వెలువడినప్పటికీ ప్రత్యక్షమును ఒకప్పుడు గర్భమును వెలువడుటకలదు. (పాచాపాయ విషయములందు ముఖపాత్ర) తమలయందు రక్తము కూడుకొని కనులన గతిని వహించియుండును.

అయిదవ దినమునకును యేడవ దినమునకును మధ్యగా, కొద్దిగా నతివిరేచనములు యేగ్గుడి, శరీరవేడిమి కొంచెము కాలము వరకు అధికమగును, అప్పుడప్పుడు పంధితోగూడ సంధిగస్థితి పరివేశమగును. శరీర వేడిమియొక్క తగ్గుదల బహు ఆశ్చర్యకరముగానుండి, యీ సంధిగస్థితియొక్క ప్రతీకారయే యితర వ్యాధియందును కారణము. ఒకేమారుగా యిరువది నాలుగు గంటల లోపల 10 డిగ్రీల వేడిమియు, ఒకప్పుడు అంతకన్నకుదును గూడ, తగ్గుదలనంది ఒకవిషయముతో 92 డిగ్రీలవరకు గూడ తగ్గియున్నట్లు మూర్పాడ్ అను నాయన చెప్పియున్నాడు. శరీరవేడిమి తగ్గుదల నందుటతోపాటు ఉద్రుతముగ చెవుటలు (పారంభ మయి యిందల ఫలితముగా, మాత్రముయొక్క పరివహమునందు మిగుల ప్రీతిగతి గలిగి యుండును.

తగ్గుదల నందిన శరీరవేడిమి క్రియముగా సాధారణవేడిమికి పోలిండును. రోగి యొక్క నాలుక పరిశుభ్రతనంది ఆకలియు బుట్టును. తలతిగ్గుట, నిద్రాణ, యీగుణములు పూర్ణముగా నశించి సంధిగస్థితి నాలుకయిదు దినములపిమ్మట రోగి నడచుటకుగూడ శక్తిని గలిగియుండును. కాని, జ్వరము ప్రారంభమయిన మూడు రోజు నాలుగు దినముల వరకు, సూదిగస్థితికి పిమ్మట ఏడు మొదలుకొని తొమ్మిది దినముల లోపలను మొదటిలక్షణములతోడనే అకస్మాత్తుగ వరకు జ్వరము ప్రారంభించును. ఇదియే పునఃప్రకోపజ్వరము యొక్క పరిధమ పునఃప్రకోపగతి యనబడుచున్నది.

ఆరంభగతియందుండి నూచన లక్షణములు యీప్రథమపునఃప్రకోపగతియందు సామాన్యముగ నుండనేరవు, శరీరవేడిమి అగమము 3 డిగ్రీల వరకు హెచ్చి రోగికి చలి ప్రారంభించును. కొన్ని విషయములయందు పునఃప్రకోపగతి లేకుండగనే, ప్రథమ ప్రకోపవ్యాధి అంతరించి పోవుటయు కలదు. ఈపునఃప్రకోపగతియందలి లక్షణములు ప్రథమగతియందలి వాటివలెనే యుండును. ఈ అవస్థయందు సామాన్యముగ ఆరంభమందలి ఉద్రుతకంటె తగ్గుదల నంది గాని లేక సామాన్యముగ గాని, యుండును. బహు అరుదుగా మాత్రము, దాని కంటె కా తక్కువను చెప్పించి యుండును. వాంతియగుట, పచ్చకాచుల, అతివిరేచనములు — యీ లక్షణము లన్నియు ఉద్రుతగతియందే యుండవచ్చును. పునఃప్రకోప గతియొక్క

కాలపరిమితి ఆంధ్రగతియందలి దానియంత ఉండనేరదు. ఈ రంపగుతులకును ఉండెడి సామాన్యశ్రేణి మిడియే అయియున్నది. ఈ వ్యాధి యుగతియందు శకటన మూడు మొదలు ఆయిదుదినముల వరకు నుండును. కొన్ని విషయములయందు యిందలకు హెచ్చుతగ్గులుండవచ్చును.

ఆరంభగతియందలి మాత్రము, పరిమాణమునందు ఆరోగ్యస్థితియందలి దానితో కొంచె మెచ్చుతక్కువగ సమానముగ నుండినను, పునఃప్రకోపగతియందు మాత్రము దీని యొక్క పరిమాణము అధికముగ హెచ్చియుండును. ఈగతియందు సందిగస్థితికి వచ్చు ముందర, ప్రతిగంటకును 6 లేక 7 బ్రెన్సుల మాత్రమును విసర్జించినట్టియు, దినమంతటను 84 బ్రెన్సుల మాత్రమును విసర్జించినట్టియు సందర్భములు కలవు.

రెండవ సందిగస్థితి ప్రధమసందిగస్థితిని బోలియే యుండును. ఈ సందిగస్థితికి పూర్వము, శరీరవేడిమి అత్యధికముగా నుండి ఒకస్కాత్తుగా నతి తొందరతో, మూతములు వేడిమికంటె కొన్ని డిగ్రీలు తగ్గిపోవును. చెమటలు పోయట ప్రధమ గతియందుకంటె అధికమగును. శరీరముపైన ఒకప్పుడు పొక్కులాను గనుపడును. శరీరవేడిమి అంతయొక్కవగా తగ్గిపోయినపుడు, నిస్త్రాణ అధికముగా నుండుట సహజలక్షణమే అయియున్నది. స్వాభావికముగ ఏస్థితియందు మాత్రపరిమాణము తగ్గుదల నందును.

ఇటుపిమ్మట స్వస్థావస్థ ప్రారంభమగును. ఒకానొకప్పుడు వ్యాధి ప్రారంభించిన నుండి యిరువదియొక్క దినం న ద్వితీయ పునః ప్రకోపగతి అందుకలెనందును. ఇది ఆరుదాగా తప్ప చూడదినములకంటె నెక్కువగ వ్యాపించియుండదు. వెనుకటి పాటులకంటెనిది సామాన్యముగ బహుసాధుగతిని వహించియుండును. మూడవ పర్యాయమును నాల్గవ పర్యాయమును, కొన్ని విషయములలో, నీ వ్యాధి మరల ప్రకోపించి యున్నట్లు దెలియుచున్నది. కాని, యిట్టివి బహు ఆరుదాగా దట్టించును.

ఈ వ్యాధియందు స్వస్థావస్థకాలము చాలదినములవరకు వ్యాపించి రోగి పరివ్రాణమైన ఆరోగ్యత నందుకరికి జాలకాలము పట్టును.

జ్వరగతియందు ఒకానొకప్పుడు అస్వస్థత వ్యాసకోశములకు వ్యాపించి, గొమ్ముపడి నెము ప్రారంభమయి, అరుదుగా న్యుమోనియా గూడ గలుగవచ్చును.

ఈ వ్యాధియందు మరణములు నూటికి ఆరుకంటె దక్కువగానున్నవి. అధిక విరేచనములు, ఊద్రుతమగు వచ్చుకాములు, మిగుల నిస్త్రాణయిని యొక్కవ అపాయకరముగ నెంచబడవలయును. వయసుమీస వారలయందును, చిక్కలతో గూడయుండిన గతులయందును. దప్పు, తక్కినవిషయములలో చేలికగా గుదురుబాటు నందును.

చి కి త్తు.

ఈ వ్యాధికి ప్రత్యేకమగు చికిత్స యింతవరకును గనుగొనబడి యుండలేదు. తోగిని, పరిశుభ్రమగు గాలి వెలుతురు వచ్చునట్టి గదిలో నుంచి, పరిశుభ్రతను గాపాడుచు, పాలనుగాని, యితరమగు బలమునిచ్చు అహార సదార్థములనుగాని, లోనకియ్యవలయును. వ్యాధి ప్రారంభమునందు మలబంధ మేర్పడియుండిన యెడల, 4 వ విరేచనకారి నుపయోగించు.

వలయును. ఒకటింటియు సామాన్యముగ ఉపకునీకృత్యో ప్రితినివమును చుడువవలయును. స్క్రిక్ సీక్ నుగాని, నక్కువామికాను గాని బలవర్ధకౌషధముగ నిచ్చుట వలన మిగుల ఉపయోగ ముడినట్లు దెలియుచున్నది, నాడి బహు మాంధ్యతను వహించి యుండినయెడల, స్పిరిట్టు ఆమ్మోనియా ఆరొ పీటిక్ ను తగు మోతాదులలో నియ్యవలయును. నిద్రారామికిని, వాంతు లకును, ఆతిరిశేపహులకును, దగు జిక్కిన చ్చేయు చుండవలయును. శరీరవేడిమి 106 డిగ్రీ అవ మించియు డివ యెడల, తడిగుడ్డలను ఒడలుపైజుట్టి, శరీరవేడిమి సామాన్యవేడిమికి తగ్గ వుండ జాగ్రత్తతో జూజుచుండవలయును. ఫస్ఫోకోపగతి రాకుండ జేయుటకుగాను ఆనేక జౌషధములు ప్రయోగించుట మూలమున బరీక్ష జేయబడెను. గాని, ఏవియు నుపయోగించి యుండలేదు. క్విన్సీను యిచ్చుటవలన నేమియు ఉపయోగము కనుపడియుండలేదు. రోగికి క్రిమియగు ఆహారపదార్థముల నిచ్చును, రోగియొక్క శరీరబలమును గాపాడు చుండవల యును.

విషమ జ్వరములు.

ఆంగ్లేయ భాషయందు చులేరియల్ జ్వరమును దానికే, మనము సామాన్యముగ చలి జ్వరమని వాడుచున్నాము. విషమ జ్వరమనియు కొందరు వాడుదురు. ఈ జ్వరములు ఒక విధమగు పురుగులచే కలుగుచున్నవి. ఈపురుగులు మనుష్యుల యందును ఒకతరగతి దోమ అయిందను నివాసము లేర్పూచు కొనును. మనుష్యులయందు రక్తములోని యెర్రని కణము లయందు తమ నివాసము శరీరరహస్యగాని, యీపురుగులు చలిజ్వరవ్యాధికి కారణము లగుచు న్నవి. సామాన్యముగ వ్యవస్థతో గూడిక జ్వరము, రక్తహీనత, ప్లిహయొక్క ఘనత జెం దుట, స్నాయుబంధముల యొక్క అల్లికలయందు మెలినిక్ ఆనబడు నల్లని వర్ణము నిలవ చేయబడుట — యీ లక్షణములతో నీవ్యాధి కూడి యుండును.

క్రిస్తుకమునకు పూర్వము నాలుగు అయిదు శతాబ్దములయందు, గ్రీసుదేశమును దలి హిపాక్రేటీస్ అను వైద్యశాస్త్రజ్ఞుడు యీజ్వరమును గుర్తించి యున్నాడు. క్రీస్తుకశ ము 1వ శతాబ్దమునందు, యీవ్యాధియందలి కొన్ని భేదములు గమనింప బడియుండెను. ఈ వ్యాధియందలి జ్ఞానముయొక్క నహిభివృద్ధి, 1840 వ సంవత్సరమునందు దక్షిణ ఆఫ్రి కాలోని పెరూసంస్థానముయొక్క గవర్నరు జనరల్ అయిన సింకోక్ అను నాయవలన బరోపాఖండమునందు సింకోక్ (క్విన్సీ) వృక్షము ప్రకృతపెట్టబడిన నాటినుండి ప్రారంభ మయినట్లు కనము యెంచవచ్చును. క్విన్సీను సకాలములూ నుపయోగించుటవలన నీవ్యాధి యందు తుదికి తరుచుగ గనుపడి యుండెను. గాన, నీ ఓషధి యీవ్యాధి మెడల శోధనపదా ర్థముగా మిఁకల ఉపయోగముగ నుండెను. 18 వ శతాబ్దపు ఆరంభమునందు, మురికోస్మి విశేషములు కనిపెట్టబడి యుండెను. 1803—23 సంవత్సరములయందు, ప్లిహయొక్క ఘనత జెందుట, ఈవ్యాధి లక్షణముగా దెలియబడెను. 2347వ సంవత్సరమునందు స్నాయు బంధములయొక్క అల్లికలయందలి నల్లనివర్ణము, యీ వ్యాధిలక్షణముగా మెకల్ అను నాయ వలన యీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగు కనుగొనబడెను. 1898వ సంవత్సరమునందురాస్ అను నాయవలన, దోమలయందలి పురుగు అభివృద్ధియందు చున్నదని గ్రహింపబడెను.

ఈవా్యాధి వ్యాపకమగుటకు యీక్రింది అంశములు ముఖ్యములయియున్నవి. (1) ఈ వ్యాధిసంబంధమగు పురుగు ఉండుట. (2) బహిఃప్రకృతియందు యీ పురుగు ఆభివృద్ధియంది వ్యాప్తత జెందుట కనుకూలమగు పరిస్థితి సంబంధమగు స్థితిగతులు ఆవరించి యుండుట. (3) ఈ పురుగు మనుష్య శరీరములోనికి జొచ్చుటకును, అనుకూలమగు గతులు ఉండి యుండుట.

పల్లపు భూములయందును, గోషపదులు సముద్రమునందు కలయునట్లు యందును, బుడవనీలల యందును — పురుగుకోటియొక్క నశిపురులనను, నీటియొక్క విస్తారతలనను, యీపురుగులు ఆభివృద్ధి నందుచున్నవని కొందరి యభిప్రాయమై యున్నది. ఇట్టి అనుకూల గతులు ఉండి యున్నను, దక్షిణ పసిఫిక్ దీవులయందలి కొన్ని స్థలములలో నీవ్యాధిలేకుండ గనే యున్నది. దీనిని బట్టి యీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగులు జీవించియుండుటకు, యితర ములగు అనుకూలతలును ఉండియుండ వలయుననెడి అంశము స్థిరపడుచున్నది. ఇలము దుర్లభమైన కొన్ని పర్వతపార్శ్వములయందు, యీవ్యాధి వ్యాపించి యుండుటనుజూడ, మృత్యుమండెడి పుత్రసంబంధములును, వాయువునందలి చెమ్మయును, యీవ్యాధి యొక్క ఆభివృద్ధికి కేవలము అగత్యములని జెప్పుటకు విలువగననని, ఈవ్యాధి సంబంధమగు పురుగులు స్వభావమునందు ఆభివృద్ధి నుడుటకు గాను, యీపురుగులకేగాని, యీపురుగులు నివాసములుగా జేసికొనెడి దోమలకుగాని, తమకంటె పెక్కుదూర బలాన్వితమైనట్టి శత్రువులు లేకుండగ నుండవలయును. సృష్టియందలి యిట్టి కారణాంతరములను విచారించుచును, యంతరము జంతుశాస్త్రజ్ఞులుగాని నైద్యశాస్త్రజ్ఞులుగాని పూర్వకొని యుండలేదు.

ఈవ్యాధియొక్క ఆభివృద్ధికి నీటియొక్క వ్యాప్తత అనుకూలమగు గలుగజేయుచున్నదని అందరను యొప్పుకొనియున్న అంశమే అయియున్నది వగదలు చచ్చునలనను, నగ్గవ సాయ కారణమున నీటిపారుదలను, కాలువలు, గట్లు మొదలగు వాటినిలన విస్తరించుకొనుట మూలమునను, యీ వ్యాధి వ్యాప్తత నందుచున్నది.

ఈవ్యాధి సంబంధమగు పురుగులు కొన్నిగజముల దూరముకంటె నెక్కువ గొంపో బడుటయందు జీవించియుండనేరవు. ఈపురుగులు ఉద్భవించిన స్థలమునుండి కొన్ని అడుగుల యెత్తుకంటె నెక్కువగ బయికి లేవనేరవు. మహుచి పొంగు వ్యాధులయందలి పురుగులవలె నీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగు విశేషకాలము జీవించి యుండనేరదు.

ఈవ్యాధి ఒకప్పుడు దోమ కుట్టుట మూలమునను, మరియొకప్పుడు తాగినదామచి నీళ్ల మూలమునను, యింకొకప్పుడు యీ సంబంధమగు విదనాయువును లోనికి బీజుట్టువలనను, యీవ్యాధి కలుగుటకు కారణములగును. ఈవ్యాధిసంబంధమగు విషవాయువు నూర్యోదయమానకు బూర్వమునను నూర్యా సమయమునకు దరువాతను, ప్రబలి యుండును. కాబట్టి, మన్యభ్రేషేశములలో యీ కాలములయందు బహిర్యాయువునకు లోపగుటవలన నీ వ్యాధిని గ్రహించుటకు మార్గము యేర్పడుచున్నది. మన్యభ్రేషేశముల యందు నేలపై బయిండుటవలన సామాన్యముగ నీవ్యాధి అంకురించుటకును జూడ, యీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగు వాయువునందలి అట్టడుగు భాగమున వాహించియుండునని చెలియవలెను. ఏ కారణము వల్లనైనను శరీరమునందు గలిగెడి జవనత్వము యొక్క తగ్గదల స్థితియందు యీ

వ్యాధిచంబాధమగు పుగుగు శరీరమానంద ప్రవేశించినయెడల, ఆపురుగు యొక్క నివాసమునకును అభివృద్ధికిని అనువు యేర్పడుచున్నది.

వ్యాధియొక్క వ్యాప్తయందు వయస్సు వివక్షిత యేమియు ఉండినట్లు కనుపడదు. ఈ వ్యాధి యెడల, బిడ్డలకును పెద్దవారలకును సమానమే ఉద్వృక్తతయే ఉండియున్నది. కాని, బిడ్డలయందు గలిగెడి యీ వ్యాధి యొక్కవ అపాయకరమైయున్నది. మట్టిపని చేయువారలయందు యీ వ్యాధి యొక్కవ శయ్యగ గలుగుటకు వీలుకలదు. ఈ వ్యాధి, అంటుగుణము యొక్కయెట్టి స్వాభావిక వృద్ధిపైనయును, ఒక మనుష్యుని నుండి మరియొక మనుష్యునికి వ్యాపింపనేరదు. ఈ వ్యాధి ఒకసారి కలిగిన పిచ్చుట, తదనంతర రాహిత్యత గలుగజేయుక, పోవుటయే గాక, యిందువలన ఫలితముగ గాని, నూతనగ్రహణము వలన గాని, మరల మరల వచ్చుట కుచ్చుక్తత యేర్పడును. కొందరి పెద్దవృత్తులయొక్క శోధనల వలన, మిక్కిటమగు మనస్సప్రదేశముల యందలి చిన్న బిడ్డలందరు దమర క్రమమునందు యీ వ్యాధి సంబంధమగు బురుగులను గలిగియుండునట్లు చలి యుచున్నది. ఈ బిడ్డలు పెద్దవారలైన కొలదని, యీ వ్యాధి గ్రహించుట కుచ్చుక్తత తగ్గిపోవుచున్నది. ఈ వ్యాధి శరీరమునందు పశ్యమునకు వచ్చు కాలపరిమితి చాల భిన్నములుగ నుండియున్నది. బహుశః యిందుమిగుల తక్కువయగు పరిమితి పెనిమిది దినములు మొదలు పదిదినములవరకుగా నెంచవచ్చును. విశేష పరిమితి ఒకప్పుడు కొన్ని సంవత్సరములు పట్టినను పట్టును. ఇంక కాలము పట్టినపుడు, వ్యాధి శరీరమునం దంతర్గతముగ నుండియున్నదని భావించవలయును.

విషమజ్వరములు ఇంటర్మిటెంట్ జ్వరము అనియు రెమిటెంట్ జ్వరము అనియు రెండుతెగలుగ విభజింపబడియున్నవి. ఈ రెండుజ్వరములను విడివిడిగ నీక్రింద వివరింపబడి యున్నవి.

ఇంటర్మిటెంట్ జ్వరము

(చలిజ్వరము)

ఇంటర్మిటెంట్ జ్వరమునకే ఆంధ్రయభాషయందు ఏకమై అను పేరును గలదు. ఈ జ్వరము, విడివిడివిడి వచ్చుచుండుటచే పారిజ్వరమనియు; చలితోగూడి యుండుటచే చలి జ్వరమనియు, విషయముపై శీతలతతో గూడియుండుట వలన విషమశీతజ్వర మనియు, పేరు వేర్వేరు పొందియున్నది. ఈ వ్యాధి మూడు విధములుగ దటస్థించును. మొదటి విధమునందు జ్వరము అనుదినమును వచ్చుచుండును. ఈ గతియందు జ్వరము సాధారణముగ ఉదయమున వచ్చుచుండును. రెండవ విధమునందు దినము విడిచి, దినము జ్వరము వచ్చుచుండును. జ్వరము సాధారణముగ పగలు సుమారు పందొండుగంటల సమయమున వచ్చుచుండును. మూడవ విధమునందు, మధ్యగా రెండుదినములు విడిచి నాల్గవదినమున జ్వరము వచ్చుచుండును. ఈ గతియందు జ్వరము సామాన్యముగ మధ్యాహ్నము తేలియందు వచ్చును. అనుదినమును వచ్చునట్టి జ్వరము, సాధారణముగ వచ్చుచుండును. కొన్ని జ్వరములయందు యీ క్రమము కనుపడక పోవచ్చును. ఈ జ్వరముయొక్క లక్షణములగు తీవ్రగతులగు చలి, శబ్ది

చెమటలు—కనుపడక పోవచ్చును. ఇట్టివి చలిజ్వరములుగా భావించబడి ఖిన్నములుగా నెంచవలయును. అన్ని విధములగు చలిజ్వరములందును వైన జ్వరబడిన త్రిగతులును ముఖ్య లక్షణములుగా నుండును. కొన్ని విషయములందు, జ్వరగతి ప్రారంభమగుటకు ముందుగా కొన్ని చిహ్నములు కనుపడెను.

లక్షణములు.

నిస్త్రాణ, నీరసత, ఆయాసము, ఆవలించుట, ఒళ్ళు విరచుకొనుట జీర్ణాశయమువైపుల నొకవిధమగు నొప్పి—యీలక్షణములు కొన్ని విషయము లుండుండును. చురకొన్ని విషయములందు కాళ్ళు, వెన్న, నడమ—యీ మొదలగు భాగములందు అసౌఖ్యత, లేక, బాధ కలిగియుండును. లేక, కండ్లు మంటలుగాని ఆరచేతులు మంటలుగాని, యెర్రడి చెవులలో ధ్వనులుపుట్టును. లేక తలనొప్పి మాత్రమే ఉండవచ్చును. తరుచుగ నాలుకపై పొర గొప్పియుండును. తరుచుగ వాంతివచ్చునట్లుండి ఒకానొకప్పుడు వాంతియు గలుగవచ్చును అంతట శరీరమంతటను ముఖ్యముగా వెన్న వైపులకు చలిపుట్టి ముఖాంతి తగ్గిపోయి చేతి వ్రేళ్ళు తెల్లబారి ముడుచుకొనిపోయి ఒడలంతయు సాధారణముగ గగ్గరు పొడుచును. ఈ చలిమూలమున ఉడుతమగు వణకుట ప్రారంభమయి, పండ్లుకొరకుటయు గలుగును. వైన జ్వరబడిన సూచనలక్షణములు లేకుండగనే యొకప్పుడు చలిగతి ప్రారంభమగును. వణకుట తోగూడి, పెదవులు చెవులు ముక్కు వివర్ణములై, ఊపిరిపీల్చుట త్వరితగతినంది, నాడి తొందరతోగూడి, శరీరవేడిమి హెచ్చుదల నందును. ఈ స్థితియందు నాలుక తెల్లనై ఆరుదల లంది, వెన్న నడమ పాదములు చేతులు—పిటివైపుల ఉడుతమగు బాధగలిగి, కడుపులో ద్రిష్కలయు, వాంతియగుటయు, అధికము కావచ్చును. ఇట్లు ఒకఆరగంట, లేక అంతకన్నకు కాలమును ఆయునపిమ్మట, అత్యుద్యోతమగు చలినుండి, క్రిమముగా అత్యుద్యోతమగు వేడిమిలోనికి మారును. ఈస్థితియందు, తలనొప్పి అధికమయి ముఖము యెర్రబారి, చేతులు వడిగాను పొడిగాను డిండి, నాడితూర్పమై చురుకుబారి, ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసములు తొందరనంది, వాంతియగుట అత్యుద్యోతతో తరుచుగ రావచ్చును. దాహము అధికముగా నుండవచ్చును, మాత్రము పరిమాణమునందు సీసమై తీవ్రక్షణమును గలిగి, మాత్రము వెలువడునప్పుడు మంటపుట్టవచ్చును. అప్పుడప్పుడు సంధిగుతుము కూడ గలుగవచ్చును. ఈఉష్ణగతి చెందు లేక మూడు గంటలవరకును ఒకప్పుడు అధికముగనువ్యాపించి యుండును. శరీరవేడిమి 104, 106, 107, డిగ్రీలవరకును, ఒకప్పుడు అంతకన్నకుండుగను వ్యాపించును. అంతట, పెడ నడురు ఆరచేతులు — పిటివైపుల చెమట ప్రారంభమయి క్రమముగా శరీరమంతటను వ్యాపించును. ఈస్థితియందు రోగియొక్క ఒడలుపై చెమట కాయట యేర్పడి, దుస్తులును పక్కబట్టలును దడిసిపోవును. ఈస్వేదగతి ప్రారంభించి నపిమ్మట జ్వరము కిక్కురితతో తగ్గిపోయి శరీరవేడిమి మామూలుస్థితికి వచ్చి, సుమారు ఒక గంటకాలములో కొంతనీరసతను బొందియుండుటనుదప్పి, రోగి తక్కిన అన్ని విషయములందును నెమ్మదినిబొంది పాథగతులందు వెంటనే లేచి తిరుగుటయు గలదు. ఈవ్యాధిగలిగిన అనేక విషయములందు, స్త్రీహ స్పర్శగోచరమగు, కాంజము కూడా కొంతవరకు యానీచిని

వహించియుండును. ఈరెండు అవయవములందును ఒకప్పుడు ఆసాఖ్యతగలిగి బాధయు గనిపింపవచ్చును.

ఈజ్వరముయొక్కతెర, వ్యాధియొక్క ఉద్యోతనుబట్టి, మూడు మొదలు ఆరు లేక యెనిమిది గంటలవరకును ఒకప్పుడు అంతకెక్కుడుగనుగూడ వ్యాపించును. స్వస్థావస్థయందు మూత్రము పరిమాణమునందు హీనమయి, తీవ్రవర్ణమును వహించి యుండును.

ఈవ్యాధి అంతరించినట్లు కనుపడినప్పుడు గూడ, అప్పుడప్పుడుకొన్ని విషయములలో శరీరవేడిమి హెచ్చుచుండవచ్చును. ఇట్టిస్థితి ఉండునంతవరకును, యీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగు నాశన మందియుండలేదని యెంచబడ వలయును.

స్వచ్ఛమయిన చలిజ్వరమందు, పైలక్షణము లేప్పుడును గనిపెట్టదగియుండినను, ముఖ్యముగా పరిమారు జ్వరతేరలు వచ్చిన పిమ్మట, చలిగతి. లేకుండగ నేగాని, లేక నూత్నముగా నుండిగాని, వణకుట లేకుండగ, శరీరవేడిమి హెచ్చుదలనందుట తరుచుగ దలస్థించును. ఈవ్యాధియొక్క ఫలితముగ కొన్ని విషయములందు జీర్ణాశయము అస్వస్థతనందినపుడు వాంతియగుట విశేషముగనుండి మందుగాని ఆహారముగాని నిలుచుటకు అన్యదము లేక పోవచ్చును. స్త్రీహ కారిజములయొక్క అస్వస్థతకు దోడుగా నొకప్పుడు, గుండెఆదరు, అతివిరేచనములు, తలనొప్పి, చెవులలోధ్వనులు, బాధకరమగుదగ్గు యివి అన్నియు కలుగవచ్చును. బహు అరుదువిషయములలో, మార్పునందిన రక్తము మూత్ర గ్రంథులనుండి వచ్చుటమూలమున మూత్రము మిగుల నల్లనివర్ణమును వహించియుండును.

వ్యాధితిగిన మనుష్యులయందు మరణప్రాప్తిని లేక్కనేయగా తక్కువ అయియున్నను, యీవ్యాధి వ్యాపించియుండెడి విరివినిబట్టి చూడగా, మొత్తముపైన మరణములు అధికముగా నున్నవి. ఇండియాదేశమునందు, కాలరా వ్యాధియందు కంటెను, యొయితర వ్యాధి యందుకంటెను, యీవ్యాధివలన మరణము లధికములయి యున్నవి. చిక్కుదలన వహించనట్టి సామాన్యస్వరములు ప్రాణభయమును కలుగజేయవుగాని, వ్యాధ్యనంతరము గలిగెడి రక్తహీనతవలన, వ్యాధి మరల ప్రకాశించుట కనువు యేర్పడుటయు, యితర వ్యాధులు గలుగుటకు యిరువు యేర్పడుటయు, కలుగుచున్నవి. ఈ ప్రకారముగ, నీవ్యాధి ఫలితముగ గలుగు యితర వ్యాధులవలన మరణము లేర్పడుచున్నవి.

ఉద్రుతగతులయందుండెడి యీవ్యాధి, అపరిచితులుగ గుర్తింపబడి, క్రమమగు జీకెన్సి జేయబడియుండల, యెప్పుడును అపాయకరమగును. ఇట్టివాటియందు మరణములు మాడింటికి ఒకటివోపున గలుగుచుండును. శరదృతువునందు గలిగెడి యీవ్యాధి వసంతముతువునందు గలుగుదానికంటె తీవ్రతను వహించియుండును. ఈ వ్యాధియందు న్నలబేధములనుబట్టి తీవ్ర గతులును మారుచుండును. పశ్చిమ అఫ్రికాయందుండెడి యీ వ్యాధి, ఐరోపాయందలి దానికంటెను, ఇండియానందలి దానికంటెను. మిగుల అపాయకరమైనదై యున్నది.

చి క్తి త్న.

చలిజ్వరమునందు: చలి ప్రారంభముకాగానే రోగి పరుండియుండి దుప్పటులను గప్పుకొనవలయును. రోగికి సాధ్యమయినంతవరకు అన్ని విధములను వేడిమి గలుగ జేయవలయును.

ఈ శీతలగతి మారి ఉష్ణగతి ప్రారంభమయి జ్వరము ఆరంభము కాగానే, రోగి చల్లనినీళ్లను ద్రాగుట మూలమున చెమట యధిమగునట్లు చేసి, సాధారణముగ ఉష్ణజలములతో స్పృశించి, ఒడంతయు దుడువవలయును. తలపై దడిగుడ్డనుగాని, అవస్థమైతే మంచుగుడ్డనుగాని, తెట్టుటవలన జ్వరమును తగ్గింప జూడవలయును. పిల్లలలో అప్ మెగ్నీసియాను కొద్ది మోతాదులలో నిచ్చుటవలన, చెమటను అధికపరచి, తీర్ణాశయముయొక్క రేగుదల ఆణిది చేయబడును.

రోగికి చెమటపోయుట ప్రారంభించి, చెమట విరివిగ నుండక పోయిన యెడల, శరీరముపై బాగుగ గప్పియుండుట వలనను, తేయాశనీశ్వరుని గాని చల్లని నీళ్లనుగాని యిచ్చుటవలనను, స్వేదము నభివృద్ధిపరచవలయును. నీరసముగానుండిన యెడల కొంచెము త్రాగిదీని నీళ్లలోగలిపి యిచ్చి, మార్చ రాకుండునట్లు రోగిని పయంబుట్టించి యుంచవలయును. చెమటతో దడిసిన గుడ్డలను దొలగించుటలో, రోగికి గాలి దగులకుండునట్లు జాగ్రత్తగా పొడి తుపాళ్ళతో ఒడలు తుడువ వలయును.

ఈ వ్యాధియందలి చికిత్స, ఒకజ్వర తైరమను మరియుక జ్వర తైరమను, మధ్య కాలమునందు చేయవలసియున్నది. ఈవ్యాధియందు క్విన్స్ తో సమానముగ బనిచేయు మరియుక బొవధము లేదు. విరేచనము క్రమముగ నగుచుండిన యెడల, చెమట పోయుట బాగుగ ప్రారంభింపగానే, 10 గ్రెయినుల క్విన్స్ సల్ఫేటుతో కేయబడిన గిలటీస్ పూతనందిన మాత్రలనుగాని, చక్కెరతో బొల్బుబడిన బ్రోజ్ వెల్కం అండ్ కంపెనీ యొక్క ట్రెబ్బాయిడ్జ్ (చిల్లెలు) ను గాని అవసరమునుబట్టి ఆరు గ్రెయినుల మోతాదులలో నుపయోగించుట యెక్కువ పీలుగనుండును. పిమ్మట మూడు లేక నాలుగుదినములు, దినమునకు ఒకపర్యాయము చొప్పున నందుగ్రెయినుల మోతాదులలో నియ్యవలయును. అటుతర్వాత వ్యాధి తిరుగబెట్టకుండునట్లు, మనసదప్పని ఆరువారములు మొదలు మూడుమాసముల వరకును, వారమున కొక్కదినమున రెండు 5 గ్రెయినుల మోతాదులను బుచ్చుకొనవలయును. ఈదినపు వేరువజాముననే సాధువగు విరేచనకాగిని బుచ్చుకొనుట ఉపయోగకారిగ నుండును. ఇటువంటి చికిత్సకు యెట్టివిషజ్వరమును సామాన్యముగ లొంగకపోదని పాట్రిక్ మాస్టన్ అను వైద్యకాశ్రుజ్ఞుడు చెప్పుచున్నాడు.

ఈ విషజ్వరములందు క్విన్స్ సకాలములో నిచ్చుటవలన, తరువాత తైరమసామాన్యముగ రానియ్యకయు, వచ్చినను, సాధుగతిలో వచ్చునట్లును జేయును. జీర్ణాశయము రేగుదల నందియుండి, మిక్కుటముగ, వాంతి యగుచుండినయెడల, ఉద్రుతగతియం దుండినట్లు యెంచబడని విషయములందు క్విన్స్ ను యెసిమా మూలమున పేగులలోనికి బ్రయోగించవలయును. ఇందులకు రెట్టింపు మోతాదును ఉపయోగించవలయును. ఈ యెసిమాను యిచ్చుటకు ముందుగా, వట్టి యెసిమాను ఇచ్చి పేగులను కుభింపరచవలయును. అసాయకరమగు జ్వరములందును, నాలుక చెడుసీతయందుండి, జీర్ణాశ్వస్థత గలిగియున్నదని సూచన లుండి యున్నప్పుడును, క్విన్స్ ను ద్రవీకరితముగ నియ్యవలయును. ఈ సందర్భమునందు (1) (2) బలవర్ధక బొవధయోగములను వాడవలయును.

క్విన్స్ ను చికిత్సకునోడుగా, విశ్రాంతి, వెచ్చదనము గలుగజేయుట, సంవిహారము -- యీమూడు సంగతులను ముఖ్యముగా గమనించవలయును. కొన్ని సందర్భములయందు క్విన్స్ ఒక గ్రెయిను నయినను వాడకుండ, యీ ఆంశములయందు జాగ్రత్త సందుటవలన వ్యాధి కుడికి నందినటుల దరియబడుచున్నది. ఈ సంబంధములగు జ్వరముల పిమ్మట కలిగెడి రక్తస్థిమితకు, ఆర్థరైజిత్ లోహము (Iron) ను, కొద్ది మోతాదులలో క్విన్స్ నుగాని నక్షివామి కా గాని గలిపిన బోషణమును, ఉపయోగింపవలయును. వీటికి సహాయములుగ బలమగు ఆహారము, కొద్ది మోతాదులలో బ్రాందీ, వెచ్చనైన దుస్తులను ధరించుట, ఆచిచ్చు దనము లేని శీతోష్ణస్థితి -- పనిచేయును.

క్లిహయొక్క సునతలందుటకు, వినిమెంట్ కయెడిన్ ను పైసరాయుటవలనను, 4 వ విశేషనకాళి బోషణయొగమును యిచ్చుటవలనను, క్విన్స్ నుగూడ లోహకిచ్చుట వలనను, గూమియ్యగలదు. ఆర్సెనిక్, సెసిన్, విద్యుచ్ఛక్తి, కొన్ని సహాయములందు ఉపయోగము లుగ నుండును. ఈ జ్వరవ్యాధిచే దరుచుగ బడిండు వారలు, తమ నివాసప్రదేశమును విడిచి, శీతోష్ణస్థితియందు మార్పు కలుగుటకై వేరు ప్రదేశమున కరుగుట మిగులనుంచిది.

క్విన్స్ కు బదులుగా వేరు బోషణము లనేకములు వాడబడియున్నవి. కాని క్విన్స్ ఆంత ఉపయోగముగా మరియెదియును గనుగొనబడి యుండలేదు. డీనిక్ దరువాత ఆర్సెనిక్ ఉపయోగముగ నున్నది. ఇండియాదేశమునందు, యీవిధజ్వరములందు టింక్చర్ వార్బర్గ్ ను మిగులవాడుచును. ఇందు చెనుటను బుట్టించు ఆనేక పీషధులును విస్తారము క్విన్స్ ను, గలవు. ఒకప్పుడు కేవలము క్విన్స్ పనిచేయుని విషయములలో నీ టింక్చర్ పనిచేసినది. ఈ బోషణమును లోహకిచ్చుటకు ముందుగా, చిట్టముగమునుగాని వేరు విశేషనకారిని గాని యిచ్చుట ములమున పేగులను శుభ్రపరిచి యుంచవలయును. పిమ్మట నీమందు ఒక ఆర బోనును సీత్య కలుపుకుండ లోహకిచ్చి, రోగిని స్వస్థతగా బరండబెట్టవలయును. మూడు గంటల పిమ్మట దీనినే మరియొక మోతాదును యిచ్చవలయును, ఒకటి రెండు మోతాదు లను బుచ్చుకొనుటకు సుధ్యకాలమునందును, రెండవమోతాదును బుచ్చుకొనిన పిమ్మట నొక గంటవఱకును, కేవలమును లోహకిచ్చుక రోగి పరుండి యుండునట్లే చేయవలయును.

ముందుజాగ్రత్తలు.

దోమలను నశింపుజేయుటకు తగు జాగ్రత్తలను దీసికొనవలయును. దురదృష్టవశమున వ్యవసాయమున కై మరువ్యక్తిత్వములవలన నీటిపారుదలను విస్తరింపు చేయుటమూలమున, నిండిండు దేశమునందు కొంతభాగమును, ఇండియా దేశమునందు కొన్నిభాగములును, యీ వ్యాధిభ్రూరితములుగ జేయబడినవి. నివాసములకు సమీపములనుండెడి మరిగిగుంటలలో కొంచెము కిరసనాయిలును పైనజల్లుట వలన, దోమలను బారదోలవచ్చును. ఇండ్లను యెత్తయిన ప్రదేశములయందు గట్టుకొనవలయును. ఈ జ్వర ఋతువులయందు ప్రయాణములను బెట్టుకొన గూడదు. మన్యప్రదేశములందు, బ్రయాణముల జేయనపుడుగాని, కొంచెము కాలము మాత్రమే నివసించియుండవలసి వచ్చినపుడుగాని, దినమునకు మూడు మొదలు ఆయద గ్రెయినుల క్విన్స్ వేసికొనుటవలనను గాని, వారమునందు ఒకదినమున గాని రెండుదినములు గాని దినము ఒకటికి రెండు లేక మూడు 5 గ్రెయినుల మోతాదుల క్విన్స్ ను వేసికొనుట వలనగాని, యీజ్వరము రాకుండ వేసికొనవచ్చును.

మన్యప్రదేశములయందు శరీరారోగ్యతమ బహు జాగ్రత్త గా పాడుకొన వలయును. కృమములను శరీరసాధకము, తినుతృగుటలయందు మితత్వము, అలసటను గలుగజేయుచు వ్యాధిము, మనోల్లాసము—వీటిని గలిగియుండుట, చలి, నీలబంధము, ఎండవేడిమి రాత్రులయందు చెక్కుతగ మేలుకొనుట, దోమకటులు, నూర్యోదయమునకు బుర్రమును మార్యాస్తమయమునకు బిచ్చుటను బయటికి బోవుట—వీటినుండి దప్పించుకొనుట, ముఖ్యములగు ఆంశములయి యున్నవి. తృప్త్యునలు మిగుల అపాయకములుగాన, జ్వరములేవు నెండట్టిపనులను జేయించరాదు. అట్టిపనులయందు యేర్పాటు చేయబడినవారు ఆచనులకు సమీపమునందు నిద్రించరాదు.

రెమిటెంట్ జ్వరము.

రెమిటెంట్ జ్వరము అనగా నడుమ నడుమ తగ్గుచు సాచ్చుచుండెడు జ్వరము. ఇది సామాన్యముగ చలి జ్వరమునకు భిన్నముగా వివరింపబడి యున్నప్పటికిని, తరుచుగ నిది చలి జ్వరము జాతిలోనిదిగ నే యెంచదగియున్నది. ఇది చలిజ్వరముగ భ్రాగింభమయి, విరామకాల పరిమితులు కృమముగ తిగిపోయి, కొద్ది రోజులపిమ్మట జ్వరము తగ్గుటమాత్రమే యేర్పడి శరీరముయొక్క సాధారణ వేడిమికి దిగకుండ నుండును. ఇదేవిధముగ రెమిటెంట్ జ్వరము చలి జ్వరము క్రిందను మార్పనందును. రెమిటెంట్ జ్వరమునందలి లక్షణములు, చలిజ్వరము నందలి స్పష్టమగు త్రిగతులను విరామకాలములను దప్పి, తక్కినవాటియందు అందలి లక్షణములనే బోలియుండును. రెమిటెంట్ తరగతియందలి జ్వరసూచనలు ముందుగా చలిని నపుడు ఈ మూచనలక్షణములను చలిజ్వరమునందలి సూచనలక్షణములును ఒకటియే అయి యున్నవి. జ్వరగతి, చలిజ్వరమునందువలె రెండు లేక మూడుగంటలలోనే అంతరించక, తరుచుగ నెనిమిదిగంటలవరకును వ్యాపించి, నాడి తొందరనంది, ఊరి బిల్చుటయం దాయాస మేర్పడి, రోగికి మిగుల కలతగలిగియుండును. తరుచుగా రెండవదినము సాయంకాలమునకు శరీరవేడిమి 106 డిగ్రీలక పొచ్చును. నాడి నిమిషమునకు 100 మొదలు 120 వరకుగొట్టుకొనుచుండును. ముఖము యెర్రబారి కన్నులు రక్తపూరితములై యుండును. తరుచుగా సంభిగుణము జనించి పచ్చకామాలవ్యాధిచే శరీరమంతయు ఒకప్పుడు ఆకస్మాత్తుగను మఱియొకప్పుడు కృమక్రమముగను పరుపు వర్ణమును వహించియుండును. ఒకప్పుడు తీర్ణాశయము రేగుదలనంది, వెక్కిరి బుట్టి, అకుపచ్చ పనుపు కలిపినట్టిగాని గోధుమవర్ణమువంటిగాని నల్లనయినట్టిగాని వాంతులుగలుగుటయు దట్టించును. చివరివిధమయిన వాంతులు కలుగుట చెడులక్షణమైయున్నది. జ్వరము ఉన్నతగతి నందినపిమ్మట సామాన్యముగ నారుగంటల కాలమువరకును, ఒకప్పుడు పండ్రెండుగంటల కాలము దాటనంతవరకును, తగ్గుదల యేర్పడదు. ఇంకలకు గుర్తుగా, చెమట, తగ్గుదలనందిన శరీరవేడియి, యెక్కువ మృదుత్వమును వహించిన నాడి, ఒకప్పుడు అలసట దీర్చెనునద్ర—యిది యన్నియు గూడియండును. ఈ తగ్గుదలి తరుచుగా కొంచెముకాలము మాత్రమే ఉండి బహుశః చలి రేకుండగనే జ్వరముయొక్క రెండవగతి ప్రాగింభమగును. సామాన్యముగ జ్వరము తగ్గుదలనంది యీర్ణితి మధ్యాహ్నమువరకు నుండును. ఉద్యోతగతులయందు యీతగ్గుదలను గమనించుట కష్టమే

గాని, యీవ్యవస్థను గనిపెట్టుట మిగుల ముఖ్యమయి యున్నది. రెమిటెంట్ జ్వరమునకు ఇంటుమిటెంట్ జ్వరము (చలిజ్వరము) నకును కలిగెడి భేదము, జ్వరలక్షణములు విడువకుండ నుండుటయందే యుండి యున్నది. రెమిటెంట్ జ్వరముయొక్క ఆరంభదినములందుండెడి లక్షణములను బట్టి, యీజ్వరమునకును టైఫాయిడ్ జ్వరమునకును గల భేదమును గుర్తించుట యెల్లప్పుడును పిలయినదిగాదు. ఈ కారణమువలన, రెమిటెంట్ జ్వరమును యెక్కువ వాగ్రతతో జూడవలయును. రోగిని వెంటనే పరుగునట్టుచేసి, శరీరవేడిమిని గ్రేకునుచు ద్రవసంబంధముగ ఆహారపదార్థములను మాత్రమే లోనకిచ్చుచుండవలయును. రెమిటెంట్ జ్వరముయొక్క ఒక తెరయొక్క కాలపరిమితి సకలున సుమారు యిరువదినాలుగు గంటల వరకు వ్యాపించియుండును. చికిత్సనేయట చే నీకాలపరిమితిని తగ్గించినవేదవ్వ, పిమ్మట తెరలయొక్క కాలపరిమితి క్రమముగ హెచ్చుచుండును. ఇట్టితెరలు వచ్చుచుండెడి వ్యాధి సామాన్యముగ నేడుదినములు మొదలు మూడువారములవరకును, వ్యాపించియుండును. ఒక పూడు యింతకన్నకుండు కాలమును వ్యాపించియుండును. ఏడు, పదునాలుగు, యిరువది యొక్క దినములు సందగ్ధస్థితి యేర్పడుదినములుగ నెంచబడి, అదినములందు సుగుణముగ మారుటగాని, దుస్థితి సూభవింతుటగాని, యేర్పడునని తలపబడుచున్నది. శరీరవేడిమి యొక్కయు నాడియొక్కయు తీవ్రత తగ్గుదల నందుట, జర్ణాళయముయొక్క రేగుదల షీణతనందుట, చెతుట అధికమగుట, - యివి సులక్షణములయి యున్నవి. అధికగ్రతనందెడి నీరసత, విరేచనములందు రక్తము పడుట, మూత్రమునందు రక్తముపడుట చల్లని చెతుట, సంధిగుణము, మగత - యివి చెడులక్షణము లయియున్నవి.

రెమిటెంట్ జ్వరములందు అంతరావయవములయొక్క అస్వస్థత యేర్పడుట సామాన్యముగ గలుగు చుండును. జీర్ణాశయముయొక్క అస్వస్థతను హర్షియిదివరచివ్రాయ బడియున్నది. ఇట్టి అవస్థ ఉం దొకానొకప్పుడు పంథి ఆహార పదార్థమును బోషణమును వెలువడజేయబడును. రెమిటెంట్ జ్వరముచే బాధనొందుచున్న వారలయందు, జ్వరమువలన నిట్టిజీర్ణాశయ అస్వస్థత గలుగుచున్నదని దెలియువలయును. ఈ జ్వరమునందు మొదలుపై గలిగెడు గుణఫలితముగను, జ్వరము తగ్గుదల నందియున్న స్థితిలో బహుశః అవివేకతవలన రోగిని లేవదీసి కూర్చుండబెట్టినపుడును, మూర్ఛతటస్థింపవచ్చును. ఈ వ్యాధియందు రోగిని లేవదీయకుండ వాగ్రతను వహించి యుండవలయును. మొదలుయొక్క గాని, మొదలును ఆవరించి యుండు పాకలయొక్కగాని, రేగుదలవలన గాని వాపుదల వలనయేగాని తలపయిన మిక్కిలుమగు వేడియేర్పడి సంధిగుణము జనించి, కండ్లుయెరువులెక్కి - యీ స్థితి క్రమముగా పూర్ణమయిన మయికములానికి దిగవచ్చును. రొమ్ముపకినెముగాని, న్యూమోనియాగాని, తలస్థయగుటయు గలదు. ఈ వ్యాధియందు యెడరొమ్ము అస్వస్థతలు యేర్పడి, జ్వర తీవ్రతవలన వీటిని వెంటనే గనుగొన వీలులేక పోవచ్చును. ఇట్టి అస్వస్థతలు తీవ్రగతి నందక ముందే చికిత్సను జేయవలసి యుండును. కారిజమునందను, మాత్రగ్రంథలయందును రక్తము కూడుకొనుట గాని, ఈ అవయవములయొక్క వాపుదలగాని, యేర్పడుటయు, దటస్థింపవచ్చును. అతివిరేచనము లుండినయెడల, విరేచనమును బరిక్షించవలసి యుండును. రెమిటెంటు జ్వరసంబంధముగ విరేచనము కాంతిగలిగిన సాధు పనులు వర్ణమును గలిగియుండును. టైఫాయిడ్ జ్వరసంబంధముగ విరేచనము రంగునంబెక్కువ ముట్టుగానుండును.

చీము, రక్తము గూడిన విరేచనములగుట పొరంబిం చినయెడల అతిసీరసతయును టైఫాయిడ్ జ్వరమున కద్యుక్తతయును యేర్పడినవని యెంచవలయును.

చి కి త్న.

సామాన్యగతులయ్యారు, అంతరావయ్యముల యొక్క అస్వస్థత కనుపడనపుడు 4 వ విరేచనకారి బౌషధయోగమును యియ్యచ్చును విరేచనము పరిహరణముగా నగువరకును, యీవిరేచనకారిని అనుదినమును ఉపయోగింపనగును జ్వరము తగ్గుదల నందగ నేగాని, 10 గ్రాయినుల క్విన్ మాత్రలమాపమునగాని, పొడి అయినయెడల ఒక అరద్రాము నిమ్మరస ములొను రెండు బౌషుల జలములొను గలిపిగాని, యియ్యవలయును. పిమ్మట 3 గ్రాయి నుల మోతాదులలో క్విన్ ను మాడు గంటల కొకపర్యాయము యియ్యవలయును. తిరిగి జ్వరము అధికమగుచున్నట్లు కనుపడగానే క్విన్ ను యిచ్చుట అపివేయవలయును రెండు దినములవరకు జ్వరము రాకుండినయెడల, క్విన్ ను యిచ్చుట తగ్గించవలయును. జీర్ణాశయ మయొక్క రేగుదలవలన, క్విన్ వాంతివెల్లి పోయినయెడల, చేదులేస్తాయు జీర్ణాశయము నందు యిమిడిక నందినట్టియు క్విన్ ను, 12 చుక్కల అసిడ్ తో ఒక బౌషు జలమునందు గలిపి, లోకయ్యవలయును. ఈ విధమగు క్విన్ ను యూక్విన్ అందును. మొదడు అస్వ స్థత నందినటు అండినను, అతివిరేచనము లగుచుండినను, క్విన్ ను యియ్యరాదు.

వ్యాధి యంతటను బలమునిచ్చు దవాచోరపదార్థములను యిచ్చుచుండ వలయును. అతిసీరసత ఉండిన యెడలనున్నా, మగత వచ్చునట్లుండిన యెడలనున్నా, నాలుక ఆరుదల నంది గోధుమవర్ణమును వహించి యుండిన మడలనున్నా, నీగనమైనట్టియు చురుకుబారి నట్టియు నాడి యుండిన యెడల నున్నా, సంధుకుణము జనించని యెడలనున్నా. బ్రాండ్లీ ఒకద్రాము మోతాదులలో క్రమకాలముల నిచ్చుచుండుట వలన మిగుల ఉపయోగ ముండ గలదు. టైఫాయిడ్ జ్వరము క్రింద చికిత్సలో బ్రాండ్లీచ్చుటను గురించు యేర్పరచిన పద్ధతుల ననుసరించి బ్రాండ్లీ యియ్యవలయును. రోగి బహుసీరసస్థితియందుండినయెడల పరుండియున్న స్థితినుండి లేవనియ్యగూడదు. అవసరమునుబట్టి టింక్చర్ వార్ బర్లీను ఉపయోగించవలసి వచ్చినయెడల, ఇంటర్మిటెంట్ జ్వరముక్రింద చికిత్సయందు వానియలడిన యీమందు ఉపయోగించు పద్ధతుల ననుసరించి దీనిని వాడవలయును. ఇంటర్మిటెంట్ జ్వరమును రెమిటెంట్ జ్వరమును మలేరియల్ జాతివే అయియున్నవి గనుక, ఇంటర్మిటెంట్ జ్వరమునందలి చికిత్సనుగూడ యీ సంబంధమున బాగ్యతతో గమనింపదగును.

“రెమి టెంట్” జ్వరమునకును “టైఫాయిడ్” జ్వరమునకును గల భేదములు.

“రెమి టెంట్”.

1. జ్వరము అకస్మాత్తుగ వచ్చును.
2. వణకుట యెక్కువ స్పష్టముగా నుండును.
3. మొదటి దినమునందే తరుచుగ శరీర వేడిమి హెచ్చును.
4. ఆరంభమునందు ముంబుగముండిపిమ్మట అతివీరేచనము లేర్పడ వచ్చును. విరేచనము నల్లనిపైతృముతో గూడిన వర్ణమును గలిగియుండును.
5. వాంతి అయినపిమ్మట, ప్రిహజేర్ణాశయముపైన మృదువుగానుండి యుండును.
6. శరీరముపైన యెర్రని పొక్కులు కనుపడవు.
7. అనుదినమును జ్వరమునకు తగ్గుదలచేర్పడి తగ్గుదల సామాన్యముగ నుదయమున గలగును, ఒకప్పుడు యితర కాలములయందును గలుగుచుండును.
8. వచ్చ కామల తరుచుగ సంభవించును.
9. జీర్ణాశయ అస్వస్థతలు సామాన్యముగ నెల్లప్పుడును ఉండును.

టైఫాయిడ్.

1. జ్వరము క్రమముగా వచ్చును.
2. వణకుట కొద్దిగా నుండవచ్చును.
3. మొదట కొన్నిదినములవరకు శరీర వేడిమి హెచ్చును.
4. అతివీరేచనములు సామాన్యముగ నాగంభ నుండియు నుండి, విరేచనము ముప్పురంగుతో గూడిన పసుపువర్ణమును వహించి యుండును.
5. పేగులు పచ్చిగా నుండి బాధతో గూడి యుండును.
6. శరీరముపైన యెర్రని పొక్కులు కనుపడవచ్చును.
7. జ్వరము కొద్దిగా మాత్రమే తగ్గి యిట్లు తగ్గుట సామాన్యముగ నుదయమున నుండును.
8. వచ్చ కామల బహు అరుదుగ వచ్చును.
9. వాంతివచ్చు నట్లుండుట, వేక్కిలి, వాంతి యగుట, మెదలగు జీర్ణాశయ అస్వస్థతలు అప్పడప్పుడు కలుగుచుండును.

“రెమి టెంట్” జ్వరమును “టైఫాయిడ్” జ్వరమును తరుచుగ నొకదాని కొకటి ప్రవతకలగా జేయునుగాన, యీరంటికి నుండి ముఖ్యభేదములను యీ పయిన వ్రాయించడమయినది.

ఇన్ ఫ్లూయెంజా.

ఇన్ ఫ్లూయెంజా అనునది మిగుల ఉద్రుతమగు, నిర్ణీతమైన, జ్వరముతో గూడిన అంటు వ్యాధి అయియున్నది. ఈ వ్యాధిసంబంధమగు పురుగు దూపిరి బీల్చుట ద్వారా శరీరమునందు బ్రవేశించిన తోడనే, తొందరతో వ్రాధానముగ నరములపై బనిచేయుటచే, జ్వరము ప్రారంభమయి, నాడి బహుతొందరగా గొట్టుకొనును. ఈ వ్యాధి పుట్టుకతోడనే బహు వివిధ వ్యాపించును. దీనినిబట్టి యీ వ్యాధిసంబంధమగు పురుగులు వాయువునందే అభివృద్ధిపండుచున్నవని తెలియ నిలగుచున్నది.

1773 వ సంవత్సరమునందు యీవ్యాధి ఇటలీ, జర్మనీ, ఇంగ్లాండుదేశములందు వ్యాపించియుండెను. పిమ్మట ననేకమారులు యీవ్యాధి పూర్వార్థగోళమునం దప్పడప్పుడు వ్యాపించియుండినను, బ్రిటిష్ దీవులను మాత్రము యెన్నడును దర్శించియుండలేదు. 1889వ సంవత్సరమునందు, యీవ్యాధి ఐరోపాఖండమునందు ఇంగ్లాండు సహితముగా పశ్చిమదేశములను దుడిచికొని పోయినపుడు, ఐరోపియను వైద్యశాస్త్రజ్ఞుల దృష్టి యీవ్యాధివైపులకు దిగియుండెను. అప్పటినుండియు యీవ్యాధి యెల్లరకు విదితమై, పూర్వార్థపశ్చిమార్థగోళముల రెంటినుండను వ్యాప్తత నందియుండెను ఇండియాదేశమునందును 1890, 91, 92 సంవత్సరములందు యీవ్యాధి వ్యాపించియుండెను.

చలిగాలివలన నీవ్యాధి కలుగకపోయినను, యిట్టిగాలి యీవ్యాధికి ఉద్యుక్తతను బుట్టించును. సుపూర్ణమగు ఆరోగ్యత లేకపోవుట, జనసమృద్ధత అనారోగ్యతను బుట్టించు పరిస్థరములు - యీకారణములు యీవ్యాధియెడల ఉద్యుక్తతను గలుగ జేయును.

లక్షణములు.

మిక్కిలి జలుబుచేసి పడిసెము కలుగుట, మిగుల నిస్త్రాణి, ఆయాసము, జ్వరము యివి యీ వ్యాధికి లక్షణములై యున్నవి. సామాన్యముగా దగ్గు ఉండి శ్వాసకోశ సంబంధమగు అస్వస్థత యేర్పడినను, యేర్పడును. తరుచుగా జీర్ణాశయము అస్వస్థతనంది, నాలుక తెల్లబారి, ఆకలియు రుచియు నశించి, వాంతివచ్చునట్లుండి, వాంతియు గలుగవచ్చును. సాధారణముగ ఒడలంతయు నొప్పలతో గూడియుండును. ఒడలు మొదట కడిగానుండి, పిమ్మట ఉద్రుతముగా చెమటలు పోసి, ఒకవిధమగు వాసన బయలు దేరును బడలయందును. ముదుసలల యందును, ఈవ్యాధి బహువీరసతను గలుగజేసి, మెదడు యెదుర్కొమ్మలయొక్క అస్వస్థతలకు అనువును గలుగజేయును. వ్యాధియొక్క పరిమితి నాలుగయిదు లేక పండ్రెండు దినములు పట్టును. గుండెరోగము, శ్మయవ్యాధి, ఉండియున్న వారలకు యీవ్యాధి తటస్థమయినయెడల ఈగలవలె మరణము నందుదురు. ఈవ్యాధివలన నితరవిధములంగ మరణ భయము లేదు.

చికిత్స.

ఈవ్యాధి తగిలినపిమ్మట ఆందు సంబంధమగు బాధలనుండి తప్పించుకొన యత్నించుట వృధా అయియున్నది. వ్యాధి తగిలినవెంటనే రోగి పరుండియుండి ప్రతిరంధు గంటలకును ద్రవపదార్థములను ఆహారముగ దీసికొనవలయును. జ్వరతను దగ్గించుటకు నీట్రైబ్ అఫ్ మెగ్నీసియాను దగు మోతాదులలో పుచ్చుకొన వలయును. జ్వరము తగ్గినపిమ్మట, దినమునకు మూడు మోతాదులుగా 2 లేక 3 గ్రాయినులు క్విన్ టిన్ యియ్యవలయును. ఈ ఔషధమును యీవ్యాధికారము కొద్ది మోతాదులలోనే యియ్యవలయును నాని యొక్క పగనియ్యకూడదు. ఒడలు నొప్పలకుగాను యీక్రింది ఔషధయోగము నియ్యదగును.

ఫెనాసిటిన్	...	గ్రాయినులు	20
టింక్చర్ జెనీమియై	...	మినిములు	20
స్పిరిట్సు క్లోరోఫారం	...	మినిములు	20
జలము	...	ట్రెస్సులు	2

అరబ్బీనునొప్పన రెండుగంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

సోడా సేలిఫైట్ 10 గ్రేయినులనున్న కెఫీన్ సిట్రిక్ 5 గ్రేయినులనున్న ఒక ఆరటంబర్లు జలములో గలిపి దినమునకు రెండు లేక మూడు పర్యాయములు భుజ్యుకొనవలయును.

స్వపావస్థగతియందు బలవర్తకౌచధముల నియ్యవలయును. లెకర్ స్ట్రీక్ నీస్ హైడ్రోక్లోర్ 3 మినిములును, ఆసిడ్ ఫాస్ ఫారిక్ డిల్యూట్ 10 మినిములును ఒకబొన్న జలములో గలిపి, దినమునకు రెండు లేక మూడు పర్యాయములకంటె నెక్కువగ బుచ్చుకొనగూడదు. ఎక్కువచిక్కయిన సితుతి శరీరసింఛితపుడు చురుకు దనమును బట్టింపుటకు బాగిందీ నిచ్చుట అవసర మగునుగాని, దీనిని కొద్దిమోతాదులలో మాత్ర మియ్యవలయును. హెచ్చుమోతాదులలో నిచ్చినయెడల మెదడునకు అస్వస్థతను బట్టించును గాన బహుజాగ్రత్తతో నియ్యవలయును.

టైఫాయిడ్ జ్వరము.

సుమారు నాలుగువారముల వఱకును వ్యాపించి, శరీరవేడిమి, ముఖ్యము గా ప్రారంభ దశయందు అనన్యసామాన్యమగు గతిని వహించి, పేగులయందు అస్వస్థతా మార్పులకలిగి, సాధారణముగ నుదరభాగమంతయు కచ్చిగానుండి, అతివిరచనములు యేర్పడి, చర్మముపై నగులాదివర్ణముగల పొక్కులు కనపడి, పేగులబలహీనతను గలుగజేసెడి అంటుసంబంధమగు జ్వరము టైఫాయిడ్ జ్వర మనబడును. దీనికి సన్నిపాతజ్వర మందురు.

ఈజ్వరము ఖేళలతో సంబంధించిన అస్వస్థతవలన నేర్పడినదగుటచే యెంటరిక్ జ్వరమనియు పిలువబడును. 1829 మొ సంవత్సరమునందు లూయీ ఆను ఫ్రెంచి వైద్యశాస్త్రజ్ఞుడు, యీజ్వరమునకు టైఫాయిడ్ జ్వరమని పేడి, యీవ్యాధిని గూర్చి అనప్రసిద్ధమగు గ్రంథమును బ్రకటించెను. ఈజ్వరముయొక్క స్వభావమును లక్షణములును సుదౌమ్మీదవ శతాబ్దమునందు మాత్రమే పూర్ణముగ గుర్తించబడెను 1849-52 సంవత్సరముల మధ్య సర్ విలియమ్ బెర్నర్ గారిచే బ్రకటింపబడిన ప్రఖ్యాతవ్యాసములందు యీవ్యాధియందలి లక్షణములు విశేషవివరములతో వ్రాయబడి యుండెను.

వ్యాప్తత.

సమశీతోష్ణ ప్రదేశములయందు యీవ్యాధి ముఖ్యముగ వ్యాప్తత నందియుండి సామాన్యముగ సంభవించెడి దీర్ఘవ్యాపకజ్వరములలో నిది చేరియుండును. ప్రపంచమునందన్ని భాగములయందును యీజ్వరము విరివిగ వ్యాపించి, ప్రాముఖ్యలక్షణములం దెల్ల స్థలములయందును యొకేవిధముగ నుండి, ప్రతి ప్రదేశమునందును ఆయాసంఘముల యొక్క ఆరోగ్యశాస్త్రజ్ఞానమును సూచించును. మరికిసిటి యొక్క జలదారుల యందలి లోపమును, త్రాగుట కుపయోగించు జలమునందు మాలిన్యము కలియుటకు ఆస్పదమును యీరెండు అంశములును టైఫాయిడ్ జ్వరసంబంధమగు క్రిములయొక్క వ్యాప్తత కనువులు గలగుజేయును. పెంటుటప్పలు, జనసమృద్ధత, ధారాళముగాగాలి ప్రసరించుట కాటంకుములు

యూపిఎయములు, వ్యాధిశరీరమునందు ప్రవేశించిన పిమ్మట దానిని ప్రతిరోధించుటకుండు మనుజునియొక్క శక్తిని హీనపరచును. వ్యాధిగ్రస్తునినుండి, చేతివ్రేళ్లమూలమునగాని, ఆహారపదార్థముల మూలమునగాని, ఈగల మూలమున గాని, వ్యాధి వ్యాపింప వచ్చును.

ఇంగ్లాండు దేశమునందు 1910 సం॥లో నీవ్యాధివలన 1848 గురు మరణమునంది యుండిరి. పౌజాసంఖ్య 100 0003,46వో॥ మడిసిరి పట్లటూల్లయందుకంటె పట్న వాసములయందు మరణము తక్కువై యుండెను.

ఇండియా దేశమునందు యీవ్యాధి విశేషముగా ప్రబలియున్నది. నిజాతివారలను యీవ్యాధిని గ్రహించుటయందు దూర్వులై యుండలేదు. మూడు వారములకు మించి వ్యాపించి యెడతెగకుండు నుండు జ్వరములలో నూటికి 80 వంతున ప్రైఫోయిడ్ జ్వర విషయము లగుచున్నది.

యూనైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా) లో యీవ్యాధి మిక్కుటముగ వ్యాపించి యున్నది, సంవత్సరమునకు 35,000 మొదలు 40,000 వరకు యీవ్యాధినుండి మరణమునందు చుండురని తెలియుచున్నది. సంవత్సరమునకు హీనము 5,00,000 జనమైనను యీవ్యాధికి లోనగుచున్నారనియు తెలియుచున్నది. పట్టణములయందుకంటె పల్లటూర్లయందు యీవ్యాధి విశేషవ్యాప్తత కలుగు చున్నదని మనము గ్రహించవలయును.

జర్మనీ దేశములో ఆరోగ్య కాస్ట్రునిధులను విశేషముగ గమనించు ముఖ్యపట్టణములలో నీవ్యాధి లేదనియు చెప్పవచ్చును. కడచిన 25 సంవత్సరముల లోపలను ప్రవ్యాదేశములో నీవ్యాధివలన ప్రతి 10,000 జనమునకును 2 కంటె తక్కువగ మరణము నందుచున్నారు. కొన్నిపల్లటూరి ప్రదేశములయందు దింకనుయీవ్యాధి వ్యాప్తత నందుచు నేయున్నది.

స్వైస్యమునందు యీవ్యాధి కలుగజేయు హాని యింతింతని చెప్పుటకు నీలులేను. ఈ మధ్య జరిగియున్న ఐరోపా మహాసంగ్రామమున విశేషజనులు మందుసామగ్రి కారణమున వికలాంగులైనను, జచ్చినను, లోగడ జరిగియున్న యుద్ధములలో మాత్రము యీజ్వర దేవతకే మిక్కుటమగు ప్రాణము లర్పింపబడి యున్న వని నిస్సందేహముగ జెప్పవచ్చును.

స్పెయిను - అమెరికా యుద్ధమునందు, సేనలో దాదాపు అయిదవవంతు అనగా 1,07,973 జనమునకును 20,738 యీజ్వరమునకు లోనై 1,580 మంది మరణమునందిరి. యుద్ధము ప్రారంభమైన 8 వారములలోపుగా 100 కి 90 పట్టణములలో వ్యాధి ప్రారంభించెను. ఆపశుభ్రత, ఈగలయొక్క సంచలనము, ధూళిమూలమున వ్యాధి గ్రహణము - యివి ముఖ్య కారణములై యున్నట్లు కమిషనువారు ఆభిప్రాయ పడిరి.

దక్షిణ ఆఫ్రికా యుద్ధమునందు అంగ్లేయ సైన్యము 5,57,658 జనమునకును 57,684 ప్రైఫోయిడ్ వ్యాధిగ్రస్తులు తటస్థమైరి; ఇందు 8,225 మరణించిరి. యుద్ధమునందు దగిలిన గాయముల మూలమున 7,582 మాత్రమే మరణము నందిరి. ఆరుబయటి ప్రదేశమున నంట చేసినానుటయందు సామాన్యముగ ప్రతిపదార్థమునందును ఆఫ్రికా దేశస్థితినిబట్టి యిసుక యెగిరివచ్చి పడుచుండెడిది. ఈయిసుక యందు ఘూత్రపురీష మాలిన్యము లాండటం పలన వ్యాధివ్యాప్తత కిరవు యేర్పడెడిది. ఇదిగాక ఈగలు విశేషించి యుండుటవలన నవియు గొంతవరకు ఆహార పదార్థములను త్రాగడి నీటిని వ్యాధిహితములుగ జేయుచుండెడివి.

రుహ్య జపాను యుద్ధమునందు ననీసాలోగ్య కాస్త్రపుష్పతులును జక్కుగ గమనించుట చేత నీవ్యాధియొక్క దీప్రత కనుపడియుండలేదు, అంతకుపూర్వము జరిగియున్న యే యుద్ధమునందును యీ వ్యాధినిషయమై యింత ముందుజాగ్రతలను బుచ్చుకొని యుండలేదు. ఆందువలననే యీ యుద్ధమునందు టైఫాయిడ్ మరణములు కొద్దిగమాత్రమే యుండెను.

ఈవ్యాధియొక్క వ్యాప్తత ఒక విధముగు పురుగు ఆభివృద్ధి నందుటను, ఆపురుగు మనుష్యశరీరమునందు జొచ్చుటకుండెడి ఆవకాశముల యొక్క అతిశయతలను అనుసరించి యుండును. ఇదిగాక వయసు, లింగము, శీతోష్ణస్థితి, ఋతువు—వీటి ననుసరించియుండును.

వయసు : — ఈవ్యాధి జీవితకాలములూ తొంటివయసునందు వచ్చుచుండును. ఎక్కువ విషయములలో 10.25 సంవత్సరములకు మధ్యగా గలుగుచుండును. పది సంవత్సరములకు బూర్జువయసునందు గలిగియున్న కొన్ని విషయము లుండియున్నను, పిన్నవయసునందు సంభవించు వ్యాధిగ నడియెంచబడి యుండకేదు. ఆరునెలల వయసునందును ఆప్పడుపుట్టిన పిల్లలకును యీవ్యాధి గలిగినకొన్ని సందర్భములు గలవు; నలుబది సంవత్సరములు దాటినపిమ్మట గలుగు విషయములు కొద్దిగా నుండును. ఆరువది సంవత్సరముల పిమ్మట బహుఆరుగు గా నుండును. ఆరువది సంవత్సరముల పిమ్మట నీవ్యాధి సంభవించిన యెడల జీవించుట కష్టము. జ్వరము విశేషముగ నుండదుగాని యితరములగు చిక్కులు సామాన్యముగ గలుగుచు న్యమోని ఈ వ్యాధికిని గుండె నిలుపుదలకును ఆస్పదము కలుగును.

లింగము : — టైఫాయిడ్ జ్వరమున కుద్య క్తతయందు స్త్రీ పురుషులలో భేదమేమి యులేనట్లు కనుపడుచున్నది గాని, బహుశః పురుషులయందీవ్యాధి కొంచెమెక్కువ పాలుగ గలిగియున్నట్లు దెలియుచున్నది.

శీతోష్ణస్థితి : — టైఫాయిడ్ జ్వరము ప్రపంచమునం దన్నిభాగముల యందును ఉండి యున్నది గాని ఒకప్పుడు సమశీతోష్ణ ప్రదేశములం దెక్కువ వ్యాపించియుండునని యెంచబడెను. ఇప్పుడు ఉష్ణచేశములయందు సర్వసాధారణముగ జ్వరముగ గుర్తింప బడియున్నది.

ఋతువు : — శరద్భుతువునందు గురినెడి వర్షమువలన యీజ్వర సంబంధముగ విషమతాగ్రుణ్ణియొక్క ఉష్ణత్తిస్థానములలోనికి పారుదలయగుటచే నీఋతువునందు యీవ్యాధి ముఖ్యముగ వ్యాపించియుండును.

ఈ వ్యాధి వ్యాప్తనందుటకు రెండువిధములగు పద్ధతుల ఊహింపబడి యున్నవి. మొదటిది : — ఈవ్యాధిఆదివరకు జనించలేకన్నను జీవసంబంధముగు పదార్థము కుగ్రిల్పి, నీటియందును, పీల్చుగాలియందును గలియుటచే నీవ్యాధి మాత్రముగ బుట్టవచ్చునని కొందరి అభిప్రాయమై యున్నది. రెండవది : — ఈ వ్యాధియొక్క స్వభావము ప్రత్యేకలక్షణముల వహించినదనియూ, యీవ్యాధి అవహించియున్న విషయము లనివరకు ఉండి యుండునచే కొంతగ నీవ్యాధి దానంతట అది పుట్టుటకు వీలులేదనియు, పేగులసంబంధముగు మలపదార్థముల మూలమున నీవ్యాధి గొంపోవబడుననియు, మరికొందరి అభిప్రాయమైయున్నది. ఈ రెండవ అభిప్రాయము జాలమందిచే నామోదము వడసియున్నది.

ఈ వ్యాధి వ్యాధిగ్రస్తులకు మారములు.

1. జలము:—తైఫాయిడ్ జ్వర సంబంధముగు పురుగు చాల విషయములలో జలము ద్వారా వ్యాప్తనందునని చాల కాలము క్రిందనే గుర్తించబడి యివాగ్ని యొక్క వ్యాప్తత సీతీకాష్టయొందులని దోషమువలన గలిగి యుండనని కనుగొనబడిన దృష్టాంతములు చాల గలవు.

2. పాలు:—ఏవురుగువల్లనైనను పాలు బహుత్వరీతముగా సహజము చేయబడును. ఈ వ్యాధిచే నంటుచేయబడిన జలమును పాలయందు గలుపుటవల్లనైనను, అట్టి సీతీతో పాలపాత్రలను గడుగుటవల్లనైనను, తైఫాయిడ్ జ్వరరోగిని సంరక్షించేయచున్న వారు పాలు పిడుకుట వల్లనైనను, పాల మాలముగా నీవ్యాధి వ్యాపింప జేయబడును.

3. ఆహారము:—ఈవ్యాధి సంబంధముగు ఆహారోగ్యత నందియున్న జంతువుల యొక్క గాని, యితర జీవపదార్థముల యొక్క గాని, మాంసమును భజించుటవలన నీవ్యాధి వ్యాపించగలదు. స్విజ్జర్లాండు దేశమునందలి శత్రులు తైఫాయిడ్ జ్వర సంబంధముగు యీ వ్యాధిని అప్పుడప్పుడు కలిగియుండునట్లు తెలియుచున్నది.

4. వాయువు:—దుర్వాయువు మూలమునను యీవ్యాధి వ్యాప్తనందునని కొంత కాలము అను అభిప్రాయము వ్యాపించి యుండెనుగాని, ఇప్పుడలయున్న నీవ్యాధి మిగులు ముగ వ్యాపించుననెడి ఊహ యెక్కువ స్థితినందిన వెనుక నీభిప్రాయము అమృతంబు దొర్లి క్కబడెను. తైఫాయిడ్ రోగియొక్క యెండుదల నందిన విరేచన పదార్థము వాయువు నందు గలిసి ఊపిరిని బిల్బులలో నీవిరుపదార్థము శరీరమునందు బ్రవేశించుట వలన నొకప్పుడు యీవ్యాధి కలుగుచున్నది.

5. వస్త్రములు:—తైఫాయిడ్ రోగులవలన మలినపర్చబడిన వస్త్రములు కారాల్లిక్ లోపిస్ వగైరాలవలన శుభ్రముచేయకుండిన గారణముచే నీవ్యాధి వ్యాప్తత నందగలదు. తైఫాయిడ్ జ్వరము, రోగి దగ్గరకు బోయినంతమాత్రమున, అంటుకొన జేరదు. తైఫాయిడ్ వ్యాధి పీడితులకు సంరక్షణ జేయువారలు, తమచేతులకు శుభ్రముగా గడుకొననందువలన నున్నూ, లేక ప్రక్కపై నాడుదలనందిన రోగియొక్క విరేచనమును దుమారముగా లానకు బిల్చినందు వల్లనున్నూ, యీవ్యాధిని ఆక్రమింపవచ్చును.

6. తైఫాయిడ్ వ్యాధిగ్రస్తులు:—ఒకసారి తైఫాయిడ్ జ్వరముచే బాధనొందిన వారు ఆరోగ్యస్థితి నందియున్నను, కొందరు గొన్ని సంవత్సరముల వరకును నీవ్యాధి సంబంధముగు పురుగులను పితృనాశములయందును పేగులయందును గొంభోవు చుందురు. జ్వరనిదేశములలో స్థానికబద్ధ పట్టణమునందొక రొక్కొంబుచేయు క్రింద కొన్ని సంవత్సరముల క్రిందట నీజ్వరముచే బాధనొంది యుండెను. ఈమెయొక్క విరేచనములను బరిశీలించిచూడ విశేషములగు తైఫాయిడ్ క్రిము లుండియుండెను. రొక్కొంబులలోనికి నచ్చుటగలిగి క్రొత్తపనివాడును తైఫాయిడ్ జ్వరపీడితుడగుట తలపించెను. ఇద్దరు పనివారలు మరణమును గూడ భొందరి.

7. ఈగలు:—1898 సం॥ నందలి స్పానిష్ అమెరికన్ యువములూ యీ వ్యాధిని వాస్తవ గలుగజేయుటయందు ఈగల యొక్క ప్రాముఖ్యతను స్పష్టముగ గ్రహించి యున్నారు. ఈగలు 'టైఫాయిడ్' కోగులయొక్క విరేచన ములపై స్రావి పిమ్మట సైనికుల యొక్క భోజనపదార్థములపై వ్రాలి యీవ్యాధిని వ్యాప్తపరిచుచుండెను. తమ ఆహారపదార్థములపై సూతలను వేసియున్న విషయములలో వ్యాధియొక్క వ్యాప్తత తగ్గియుండెను. 1902 సం॥ నందు అమెరికాదేశములో చికాగో పట్టణమునందు యీవ్యాధి విశేషముగ వ్యాపించియున్నపుడు మిక్కుటముగ పరిశోధనలు చేయబడెను. ఒక 'టైఫాయిడ్' జ్వరపీడితుని గదిలోనున్న ఈగలనుబట్టి బరితీరించగా యీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగులుదొరకెను.

8. పెంటువులు, దుర్గంధ జలదారులు, మురికి కుండలు:—ఇవి వాటంతట యవి 'టైఫాయిడ్' జ్వరమును గలుగజేయుచుగాని, యీవ్యాధి సంబంధమగు పురుగులు సజీవులై యుండుటకును ఆభివృద్ధి చెందుటకును అనువును గలుగజేయును.

కొందరు జనులు యీ వ్యాధియెడల మరికొందరికంటె దక్కువ ఉన్యక్తతను గలిగి యుండుట బహుశః నిజమైయున్నను, పూర్వ మొకసారి యీ వ్యాధిచే బాధ నొందియుండుట మాత్రము రక్షణను గలుగజేయు ననుటయందు సందియములేదు. ఈవ్యాధి చెండవ సారి గలిగియుండిన దృష్టాంతము లొందియున్నవి ఇట్టివి బహు అరుదైయున్నవి. ఈవ్యాధి రాకుండుటకుగాను 'రైట్' అయినాడన టికాలు వేయుటను గనిపెట్టెనుగాని, ఇందువలన నుపయోగ మొత్తివరకు యుండునదియు ప్రస్తుతములో నిశ్చయింప మీ గాకున్నది.

ఆవయవములలోని మార్పులు.

ఈ 'టైఫాయిడ్' జ్వర సంబంధమగు పురుగులు శరీరమునందలి కొన్ని ఆవయవములలో నుండుటకు యొక్కవ అనువును గలిగియున్నవిని చెప్పటకు నిదర్శనములుకలవు. ఈఆవయవములు —చిన్న పేగులు, ప్లీహ, కరిజము, మాత్రగ్రంథులు, క్వాసకోశములు, అయి యున్నవి. కొంతకాలము పిమ్మట నీఆవయవములందు యీ వ్యాధిసంబంధమగు పురుగులు విషమల వెలిబుచ్చుచుండుట వలన నీ వ్యాధియందలి సామాన్య లక్షణములకు కారణమగుచున్నది.

ఈ పురుగు సాధారణముగ నెక్కువ విషయములలో తీర్ణకోశ మార్గముననే శరీరమందు బ్రవేశించునని ఆభిప్రాయము కలదు. కొన్ని విషయములలో లోనకు బీల్చునారి ద్వారా యీ పురుగు శరీరమునందు బ్రవేశించినను, బ్రవేశింపజచ్చును. వ్యాధియొక్క ఆరంభము నుండియు న్యూమోనియా లక్షణములతో గూడియున్న యీ వ్యాధియందు, బహుశః క్వాసకోశమార్గమున నీపురుగు శరీరమునందు బ్రవేశించి యుండునని మనము తలపపచ్చును.

పేగులు —ఈవ్యాధియందు ముఖ్యముగా పేగులు అస్పష్టతనది పచ్చిగా నుండును. పేగులలో పుండ్లుపుట్టి ఉద్రుత వస్థయందు కొకానొకప్పుడు కొంత భాగమునకు రంధ్రములు పడవచ్చును.

ప్లీహ —ఈ ఆవయవము, వర్ణమునందు నలుపును, వహించి ఘనతనంది, స్వాభావిక పరిమాణముకంటె మూడు రేక నాలుగంతలు పెద్దదిగ నుండును.

గుండెకాయ—ఈ అవయవమునందు స్నాయువటుత్వము తగ్గి, పాకారస్థానములు అవ్వడప్పుడుపల్చనై యుండును. ఇదితరుచుగా పాలిపోయి చిగువు చెడిన స్థితియందుండును. సామాన్యగతులయందు యితర అవయవము శ్రమియు మార్పు నందవు.

లక్షణములు.

“ఈ వ్యాధి సంబంధముగు” పురుగు శరీరమునందు బ్రసేవించిన పిమ్మట, యెంత కాలము నను వ్యాధి పక్ష్యమునకు వచ్చుచియు, యింకను భృతపరులబడి గురుగడలేదు” ఈ కాలపరిమితి ఒక వారము మొదలు మూడు వారములవరకు కొందరిచే నేర్పరువబడియున్నది. కాలమందు ఈగి జబ్బును గ్రహించినను గహింపవచ్చును. లేకపోయినను శాసనోపచ్యును. విస్తార విషయములలో నేయితర జ్వరములయందు కంటెను యాజ్వరమునందు వ్యాధి యొక్క అరంభదశ బహుశా భుక్త్యమును వహించియుండును. వ్యాధినిగూర్చి కృతుశివారణ చేయుటకు త్వరితముగ వారంభించినను, వ్యాధి సరిగా యెడనమున ప్రారంభమైనదియు నిశ్చయించి చెప్పట మిగుల కష్టమైయున్నది. వ్యాధి ప్రారంభమయిన పిమ్మటను గూడ ఈగి కొంతకాలమువరకు నిటుంటు దిరుగుటకు శక్తిని గలిగియుండ వచ్చును.

మొదటి వారమునందలి అంశములు.

వ్యాధియొక్క ప్రారంభదశయందు జలపరమాగలిగి ఆసాఖ్యతయు బడలికయు బ్రసేవించి మఖ్యముగా రాత్రులయందు జ్వరమువచ్చినట్లుండును, తలనొప్పి కృధానముగా నుండును. ముఖ్యముగా కూర్చుండునపుడు తలతిగిప్పుట తరుచుగా నుండును. ముక్కువెంటి కొద్దిగాగాని విశేషముగాగాని రక్తముకారుట యేర్పడి యిందుతో జ్వరము కూడియుండిన యెడల టైఫాయిడ్ ను గురించి అనుమానింపటమే మంచి వారణముగ నుండును. దాహము ఆకలి లేకపోవుట, అవ్వడప్పుడు చిద్ధాస్థస్థత, ఉండును. నాలుక నడిగానుండి, ఆంతుల నున్ను కొనఘండున్ను యెర్రగానుండి, తక్కినభాగములందు ఒకవిధమగు తెల్లనైన పొరగమ్మియుండును. ఈ కాలమందలి శరీర వేడిమి గమనింపదగిన అత్యుత్తములను వహించి యుండును. ప్రతి సాయంకాలమునందును ఒకడిగ్గి లేక రెండు డిగ్రీలు పెచ్చుదలనంది మరుసటి ఉదయమున ఒకడిగ్గిగాని అంతకు తక్కువగాని తగ్గుదలనంది, ఆ మరుసటి సాయంకాలమునందుషణ్ణికొంచెము పెచ్చుదలనంది, అటుపిమ్మట ఉదయమునను కొంచెము తగ్గుదలను జూపి—యీ ప్రకారము జ్వరగతి పెట్టుచు నెక్కురికిని అనుదినమును పెచ్చుచుండును.

మొదటివారముయొక్క అంత్యమునకు, సాయంకాలమందు గలుగు శరీరవేడిమి 102 ° 103 డిగ్రీలు. లేక, అంత కెక్కుడుగను వహించి యుండును. నాడి చురుకుబారినను, శరీరవేడిమికి దగినట్లుగా చురుకుదల నందియుండదు. నాడి నిండు గను. చురుపుగను యుండును. ఒడలు పొడిగా నుండును. మలబంధము తప్పు కుండ నుండియుండును. ఉదరము భూమిలంకంటె పుష్టిగత నందియుండును. స్త్రీహృయొక్క మాంద్యత అధికమగును. మొదటివారముయొక్క అంత్యమునకు రోగి సాగిలబడిన స్థితిలో నే వచ్చి, మఖ్యముగా సాయంకాలమునందు చెక్కిలల వైపున ముఖము యెర్రబారి యుండును. కండ్లు వికాసితనంది, కనుపాపలు విస్తరింపునంది యుండును.

రెండవ వారమునందలి అంశములు.

మొదటి వారమునందలి లక్షణములే. ఉదాత్తను వహించి, రోగి వ్యాధియొక్క పట్టులో నెక్కువగా జిక్కినట్లు కనుపడును. శరీరవేడిమి, 103-104 డిగ్రీలవరకు హెచ్చి, ఉదయమున కొద్దిగా మాత్రమే తగ్గుదల నందును, సాయంత్రములందు మొదటివాగము కంటే అధికముగ గనబడును. నాడి, సాధుగతులయందు కొంచెము కాంతతను వహించియుండినను కొంతవరకు త్వరితగతిని వహించి యుండును. ఈవాగమునందు చర్మముపైని పొక్కులును పుట్టి, యివి అభివృద్ధి నందుచుండును. ఈపొక్కులు కొందరియందు గనుపడక పోవచ్చును. దోమ కాటులవలె నుండినను ఉండవచ్చును. ఇవి క్రమముగా నల్లబడి పోవుచుండును. ఈ రెండవ వారమునందే అతివీరేచనములు పుట్టును. ఈవీరేచనములందు బాధయేమియు నుండక, పేగులయొక్క అస్వస్థత ఉద్వేగగతిని వహించినను వహించ వచ్చును. లేక సాధుగ తినెనను వహించియుండవచ్చును. విరేచనము గోధుమవర్ణము కలిసిన పసుపురంగుతోగూడి దుర్వాసన గలిగియుండును. ఈ విరేచనమునందు జీర్ణతనందని అవశేషద్వారములు, పేగుల యందలి కురుపులయొక్క మలినపుతునుకలు ఉండియుండును. ట్రైఫాయిడ్ వ్యాధిసంబంధ మగు పురుగులును యుండుండి యుండును. విరేచనములందు రక్తముండి యుండవచ్చును. అప్పడప్పుడు విశేషముగ రక్తము పడవచ్చును. ఈస్థితిహంబు యందరము యొక్కచవిస్తరింపు నంది యుండును. నాలుకపై బొరగమ్మియే యుండును. కాని ఆరుదలనంది బీటికల దీప్తియుండును. ముఖ్యముగా రాత్రులందు సాధువగు సంధిగుణము పుట్టవచ్చును. పగటి యందు మానసికస్థితి క్రమముగనుండి, బహుశః యీసందర్భమునందు సామాన్యముగ గలగు చెపుడు మూలమున, రోగి మాంద్యతను వహించి నిర్లక్ష్యముతో గూడియుండును.

మూడవ వారమునందలి అంశములు.

రెండవ వారమునందలి లక్షణములే మూడవ వారమునందును సామాన్యముగ ఆత్మ్య ద్వేత గతియందు నడచుచుండును. శరీరవేడిమి కొంచె మెచ్చుతక్కువగా నెల్లప్పుడును విశీలించియే యుండి, ఉదయవేళలయందు మాత్రము కొంచెముగా తగ్గుదల నందుచుండును. నాడి నిమిషమునకు 110-120 వరకు తొందరతో నడచు చుండినను, నీరసతన వహించి యుండును. రోగి, ప్రక్కనంటుకని పడుండి, నిశ్చింత భావముతోడను నిరసతోడను జూచుచుండును. రోగి కష్టించి, పూయత్నముమీద పొయిపులు వణకుటనందును; కునుకు నిద్ర అధికమయి, మెల్లగా గొనుగుటతోగూడిన సంధిగుణము జనించును. క్వాసకోశ స్థంబంధమగు రక్తముయొక్క కూడికవలన, అధికమగు ఉబ్బాసన నిర్వాసములతోగూడిన దగ్ధతరుచుగా నేర్పడును. ఈవారమునందే, యీజ్వరము యొక్క యొక్కచ విక్రమదల అవస్థలు, అనగా, రక్తమువడుట, పేగులయందు రంభము యేర్పడుట — తటస్థించుట కాన్పదము కలుగును.

నాల్గవ వారము నందలి అంశములు.

జ్వరము స్వస్థసాధారణముగా నాలుగవ వారమునందు తగ్గుదల నందుచుండును. శరీరవేడిమి, ఉదయమునందు యొక్కవగా తగ్గుదలనంది, సాయంకాలమునందు పెనుకటంత

అధికవృత్తసందక, యుండును. రోగి, యొక్క వ సీరసక్తను వహించి యున్నను, ఆన్ని యిత రలక్షణములందును అనుమాలమగు మార్పులుగలిగి, రోగి స్వస్థావస్థస్థితిలోని కభివృద్ధి జెం దుట కారంభమగును. ఈ గతియందును జ్వరలక్షణములు కొద్దికాల పరిమితమగుటకు మరల గలుగుట కారంభించి, అడ్డుపెట్టడు స్పష్టమైన పునఃప్రకోపగతిని అవలంబింప వచ్చును.

కొన్ని విషయములందు నాలుగవ వారమునందలి అంశములేమియు మార్పునందకయే జ్వరము అయిదు లేక ఆరవ వారమువరకును తగ్గుదలనందు సూచనలు కనుపడక యుండును. అట్టి విషయములలో రోగి మిగుల శుష్కించి నిస్త్రాణ సందియించును.

ముఖ్య లక్షణములయొక్క పరిశీలనము.

ఆరంభము:— ఈ వ్యాధియొక్క ఆరంభదశ వివిధవిధములుగ నున్నది. కొన్ని విషయములలో జ్వరముయొక్క ఆరంభమే చెలిసికొనుట వీలులేకుండగ నుండును; మరికొన్ని విషయములలో, ఆరంభమునందే యితరవ్యాధి లక్షణములతో గూడి యుండుటవలన నీవ్యాధిని నిర్ణయించుటకు గట్టముగా నుండును. ఒకప్పుడు క్వాసకోశ సంబంధమగు న్యూమోనియా వ్యాధిలక్షణములు ఆరంభమునందే గనబడవచ్చును. బిడ్డలయందు మెదడు సంబంధ మగు ఆస్పర్శతలకలిగి, యీవ్యాధిని పొరబుచ్చవచ్చును. జ్వరము ఉండియున్నను, రోగి, తిరుగుచునేయుండి, రక్తస్రావముగాని శేగులయందు రంధ్రము పడుటగాని తటస్థించు సంతవరకును, టైఫాయిడ్ జ్వరమని చెలిసికొనుటకే వీలు లేకుండును.

శరీరవేడిమి:— జ్వరగతియే టైఫాయిడ్ జ్వరముయొక్క ముఖ్య చిహ్నములలో నొకటియై యున్నది. జ్వరముయొక్క పరిధిమగతియందు హెచ్చుట, రెండవగతియందు యెడతగకుండుట, మూడవ గతియందు తగ్గుట— యీ లక్షణము లుండియున్నవి. ఉదయ వేళలయందు కొద్దియో గొప్పయో జ్వరము తగ్గుదలనందుట యీ వ్యాధియొక్క ముఖ్యలక్షణమై యున్నది.

మొదటి వారమునందు ప్రతిదినము సాయంకాలమును వెనుకటి దినముకంటె నెక్కువ శరీరవేడిమి కనబడుచు, ఉదయమున కొద్దిగా తగ్గుదలనందుచు, వారముయొక్క అంత్యమగు సరికి సాధారణముగ శరీరవేడిమి ఉన్నతదశ నందును. రెండవ వారమునందు, శరీరవేడిమి యొక్క పట్టుదలతో నున్న తదశయిందండి, ఉదయపు వేళలయందు కొద్దిగా మాత్రము తగ్గుచుండును. మూడవ వారమునందు జాలవరకు యిదేప్రకారమండి, అటువచ్చుట ఉదయమునందలి తగ్గుదలని విశేషముగనుండి సాయంత్రమునందలి హెచ్చుదలలు అంత విశేషముగ నుండవు.

నాలుగవ వారమునందు, ఉదయపు వేళ శరీరవేడిమి సామాన్యముగ స్వాభావిక స్థితిలోనికి దిగి, సాయంకాలమందు కొద్దికాల పరిమితియందు మాత్రమే హెచ్చుదలనంది, త్వరలో నీగతి మారిపోయి క్రిమముగా వారోగ్యుతియందలి స్థితిలోనికి వచ్చును. ఒక వారము దినములవరకు శరీరవేడిమి ఉదయమునను సాయంకాలమునను ఒకేవిధముగా నుండిన యెడల, వ్యాధి అంత్యము నందినదని యెంచవచ్చును. కాని, యీస్థితియందు వ్యాధి తిరుగ బెట్టుట ఆసామాన్యము కానేరదు.

జ్వరముయొక్క అభివృద్ధియందు అనుదినమును శరీరవేడిమిని బరిక్షించుటలో రాత్రి యెనిమిదిగంటలకును పండ్రెండు గంటలకును మధ్యకాలములో నున్నతరగతి నందియుండు ననియు, ఉదయము ఆరు గంటలకును యెనిమిది గంటలకును మధ్యకాలములో క్షీణగతి నంది యుండుననియు, సాధారణముగ గనుగొనవచ్చును.

అతిచిరేచ్ఛనములు పాముఖ్యలక్షణము గా నున్న విషయములలో శరీరవేడిమి అత్యున్న తదశనంది తరుచుగా నెక్కువ తగ్గుదలలు కనుపడవు. పేగులయందు రక్తస్రావము కలిగిన చో, శరీరవేడిమి యందు ఆకస్మిక మయినట్టియు, గుర్తింప దగినట్టియు, తగ్గుదల వెంటనే కనబడును.

శరీరవేడిమి 106 డిగ్రీలును అంతకు పైనయైన ఉండట సాధారణములు కావు; ఇట్లుండినచో అపాయకరముగ నెంచవచ్చును. స్వస్థావస్థయందు భోజన పదార్థములయందు మార్పువలనగాని, లేచి తిరుగుటవలనగాని, శరీరవేడిమియందు గ్రహముగ నుండవలసిన దాని కంటె కొంచె పెచ్చుతగ్గులు కలుగవచ్చును; ఈస్థితియందు శరీరవేడిమిని దరుచుగ బరిక్షించుట మంచిది.

రక్తప్రచారము:— వ్యాధి అతిశయత నొందిన కొలదిని నాడి యెక్కువ దరుచుగ గొట్టుకొనుచు, అతినిరేచ్ఛనము లుండినయెడల, యింకను యెక్కువగ నుండును. నాడి మొదలలో నొండ్రుగను మృదువుగను నుండి, పిమ్మట సన్ననై యుండును. జ్వరముయొక్క తదంతర గతులయందు నాడి అస్థిరతనొంది క్రమము దప్పినదై యుండును. పెద్దవారలయందు నిమిషమునకు 130 సంఖ్య దాటినయెడల అదుర్దాన జెందవలసి యుండును.

రక్తస్రావము కలిగినయెడల నాడియొక్క సంఖ్య అధికమయి శరీరవేడిమి దగిపోవును; పేగులయందు రంధ్రము పడినయెడల రక్తప్రచారమునందు క్షీణగతియొక్క లక్షణములు కనుపడవు. స్వస్థావస్థయందు శరీరవేడిమి పెంతశ్చిద్రతో బరిక్షించుట యవసరమే నాడినకూడ అంతే శ్చిద్రతో బరిక్షించుట అవసరమయి యున్నది.

ప్రేఫాయిడ్ జ్వరముయొక్క ఫలితముగ నొకప్పుడు యేదైన నొక కాలక్షుబ్ధివు అపరీక్షదరక్తనాశమునందు రక్తముగడ్డఃట్టుటవలన రక్తప్రచారమునకు కొంతవరకు అటంకముకలిగి ఆకాలు వాయుట తలపించును. ఈవ్యాధి సామాన్యముగ నెడమ కాలానకు తలపించును. ఇది జ్వరముయొక్క అంతిమధాగమనం దయినను, స్వస్థావస్థయందయినను దటపించును. ఇది బాధకరమయినను సామాన్యముగ నపాయముతో గూడియుండదు.

క్వాసావయవములు:— జ్వరాస్వస్థత లనేము లందువలెనే వ్యాధి అభివృద్ధినిందిన కొలది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసము అధికము లగుచుండును. కొన్ని క్వాసకోశ సంబంధముగ ఆస్వస్థతలు సామాన్యముగ గలుగవచ్చును. రొమ్మపడినెము సాధారణముగ గలుగుచు, దగ్గుతోగూడ తమడగటాతిమగు గురక ఉండవచ్చును.

జీర్ణావయవములు:— నాలుక యొక్కస్థితి యిదివరకే నివరింప బడియున్నది. అట్టి ఋసిస్థితియందు గొంతు యొక్క లేగుదల స్థితివలన, మింగుట కష్టముగా నుండవచ్చును. దాహము, ఆకలి లేకపోవుట, ముఖ్యలక్షణములై యున్నవిగాని, సాధుగతులయం దవికాన

రావు. పోరంభగతియందు, సామాన్యముగ వాంటి ఉండదు. కాని, వాంటియగుట ఉద్భుత స్థితిని వహించగనే, వ్యాధి మీరు చున్నదని గ్రహింప వలయును.

అతివిరేచనములు, టైఫాయిడ్ జ్వరముయొక్క సూక్ష్మ లక్షణమేగాని యిది యెల్లప్పుడును. ఉండనేరదు. ఇది అప్పుడప్పుడు ఆంగంభమునుండియే ఉండును. గాని సాధారణముగ రెండవవారమునందు గనబడి జ్వరముయొక్క అంతము వలయును, ఊడి, వ్యాధి తిరుగబెట్టినపుడు మరల రావచ్చును. విరేచనముయొక్క పరిమాణము చాలవరికు మారుచుండును నట్లున దినమునకు నాలుగ్గ లేక అయిదు పల్లనివిరేచనము లగును. ఉద్యోతగతులయందు వడి మొదలు యిరువదివఱకునుండును. ఈఅతివిరేచనములయొక్క ఉద్భుతి పేగులయొక్క పుండును బట్టియుండునని చెప్పటకు పిలు కాకపోయినప్పటికిని, దీని కిదియే అపాయకరమై తరుచుగా మృత్యుమును గలుగజేయుచున్నది. కొన్ని విషయములలో నారంభమునుండియు మలబంధ మేర్పడియుండును. విరేచనకారుల నిచ్చుటవలన అతివిరేచనముల గలిగించును. గాన, దీనికై బహుజాగ్రత్తతో జకిత్సను జేయవలసి యుండును.

అతివిరేచన మూలమునగాని, యితర కారణముల మూలమున గాని ఉదరము విస్తరింపు నొందుట మిగుల అసాఖ్యతను గలుగజేయును. ఇది తరుచుగా సంభవించుట, ఉద్యోతలక్షణముల గనబరచుచు, పేగులయందు రంధ్రముకలుగుటకు, యెక్కువపిలునుగలుగజేయుచున్నది.

టైఫాయిడ్ జ్వరముయొక్క అన్ని లక్షణములయందును పేగులయందు రంధ్రముపడుటయే మిగుల భీతికాదవలసిన అంశమయి యున్నది. అయితే యిట్టివిషయములు నూటికి రెండు మూడు కంటే నెక్కువగ దట్టస్థించుట లేదు. అతివిరేచనములు, రక్తస్రావము, ఉదరముయొక్క విస్తరింపునందుట—యీమూడు లక్షణములును ప్యాముఖ్యముగ నుండినపుడు సామాన్యముగ నిది దట్టస్థించును. కాని అప్పుడప్పుడు యిది మలబంధము మొదటి నుంచీయు ఉండియున్న స్థితులయందును గలుగుట కలదు. ఇది చాల అలస్యముగ ఆనగా సాధారణముగ మూడవవారము లేక నాలుగవవారమునందును, ఒకప్పుడు స్వభావస్థయందును, వ్యాధి తిరుగబెట్టిన యవస్థయందును, గలుగు చుండును. మనకు స్పష్టముగ గనబడు నన్ని హిత కారణ మేమియు లేకుండగనే యిది కలుగవచ్చును. మరియొకప్పుడు అహారవద్ధానము నందలి లోపమువలనను, వాంటియగుట యందలి శ్రమమువలనను, విరేచనముగుట యందలి ముక్కుట వలనను, పక్కనుండి ఒత్తిలిటు వలనను—యీరంధ్ర పేగుడుట తటస్థింపవచ్చును. ఈ అస్వస్థత కలుగగనే, ఉదర భాగమునందు అస్థిగముగ విశేష బాధ కలిగి, యీ బాధ శరీరమంతటను వ్యాపించి, వాంటి అయి ఊగతిలక్షణములతో ముగియును.

మూత్రము:—అన్ని జ్వరములయందును ఉండునట్లులే మొదలుగా యీజ్వరము నందును మూత్రమునందలి ఘనపదార్థము లధికములయి నల్లని వర్ణమును వహించి యుండును. జ్వరము తీవ్రత వహించిన కొలదిని యూరియా యూరిక్ ఆమ్లములు అధికము లగుచుండును. శ్వేతధాతువు కొద్దిగ నుండవచ్చును.

సరములు:—ఆంగంభమునందు గలుగు తలనొప్పిని గూర్చి యిదివరకే వ్రాయబడి యున్నది. సాధుగతులయందు సంధిగుణము లేకుండగనే యుండవచ్చును. సామాన్యవిషయ

ములందు మొదటి వారమునకు పిమ్మట రాత్రులయందలి సంధిగూము సాగ్రాణాంశ మే అయియున్నది. పౌరంభగతియందొకానొకప్పుడు కాళ్ళు పట్టు పట్టవచ్చును. ఈ వ్యాధి యందు మూర్ఖులు కలుగుట బహుఅరుదై యున్నది. చెవుడు, ఒకప్పుడు ఒక చెవియందు మాత్రమేను, మరొకప్పుడు రెండు చెవులయందును, యేర్పడవచ్చును. ఈ చెవుడు పిమ్మట నెమ్మదింది పోవును. స్థిరమగు చెవుడు యేర్పడుట బహు అరుదైయున్నది. దృష్టి యందు దస్యస్థత గలుగదుగాని, కనుపాపలు విస్తరింపునంది కన్నులు కొంతవఱకు మెరయు నట్టి సితిలో నుండును.

జ్వరముయొక్క తిరుగ బెట్టుట,

స్వస్థానస్థయందొకానొకప్పుడు వ్యాధి తిరుగ బెట్టవచ్చును. ఈ కాలమందు ఆహారమునందలి మాంస్యులవలనను, స్పష్టమగు నితర కారణములవలనను, గలిగెడి సూక్ష్మమగు శరీరమాయొక్క అధిక వేడిమిగిని, జ్వరముయొక్క తిరుగబెట్టుటకును, భేదమును గమనించవలసి యుండును. వ్యాధియొక్క పెద్దపాలులయందు యీ తిరుగబెట్టుట సామాన్యముగ దట్టస్థింశుచుండును. దీనిను దును మొదటితడవ కనుపడిన లక్షణములే మరల గనుపడును. శరీరవేడిమి కలిమముగా నధికమగుచు నాడియొక్కయు అరుదలనందిన నాలుకయొక్కయు, అతివీచనములయొక్కయు, లక్షణములు వెనుకటివలెనే యుండును ఈగతి మొదటి కాల పరిమితి కంటె దక్కవగానుండి గుణములయందును, సాగుత్వమును వహించియుండును. కాని దీని వలన నొగి విశేషముగ కుష్మించినను, చాలవిషయములలో స్వస్థత నందవచ్చును. కొన్ని విషయములలో మాత్రము అతిసర, రక్తస్రావము, పేగులలో రంధ్రము పడుట, వీటివలన మరణము సంభవించును.

సులక్షణములు.

రాత్రులయందు 103 డిగ్రీలకు హెచ్చునట్టియు, ఉదయపువేళల బాగుగా తగ్గు నుండనట్టియు సామాన్యజ్వరము పెద్దవారలయందు (నిమిషమునకు) 100 కి హెచ్చునట్టియు చిడలయందు 120 కి హెచ్చునట్టియు నాడి, చెమ్మతోగూడినట్టియు యొక్కవగా పొరగమ్మినట్టియు నాలుక; మెత్తనైనట్టియు, సవలినట్టియు, ఉడరము, చిక్కస్థితుల లేక పోవుట — యివి అన్నియు సుగుణములుగా నెంచదగును. వీటికి దోడుగా నొగి శుభ్రముగా నిద్రింపను, పక్కలూ దనంతటాను కదలుటకు శక్తిగలిగియుండినయెడల, కొంత కురకు నన్నకముతో వ్యాధి కుదురుబాటునందునని చెప్పవచ్చును. కాని మిగుల సాధువైన విషయములందుగూడ రక్తస్రావము, పేగులయందు రంధ్రముపడుట, ఒకప్పుడు తటస్థమగుగాన సాయంకాలమునందలి శరీరవేడిమివరుసగా పదిదినములవరకును మాములుగా నారోగ్యతయందుండు స్థితిని వహించి యుండునంతవరకును అసాయమునండి పూర్ణముగా దోలీ యుండినట్లు యెంచుకూడదు.

దుర్లక్షణములు.

రోగి మత్తుగానుండి, సంధిగుణము వహించి, పక్కలూ గదలుటకు శక్తిలేక వెల్లకిలి పరుండి యుండిన యెడల - దుర్లక్షణముగా నెంచదగును. వాంతియగుట, మాత్రము నిలువయుండుట, మాంసిమును మలమును వెలువడుటయందు రోగియొక్క స్వాధీనము తప్పి

యుండుట, ఎడతెగని చెవుడు, ఉద్యోతమగు అతివిరేచనములు (దినమునకు 10 లేక 12 - ఇవి అన్నియుగూడ చెడులక్షణములు గా దలచ వలయును. 120 కి మించియున్న నాడియును నిర్లక్ష్యము చేయలేకది కాదు. నాడి 130 ని మించియున్నయెడల ఆపాయము సమీపించి యున్నదని గుర్తింప వలయును, శరీరవేడిమి 101 డిగ్రీలుగాని అంతకు మించిగాని ఒకే విధముగానుండి, ఉదయమున స్పష్టమయిన తగ్గుదల లే కుండినయెడల, కఠినమయిన విషయముగా నెంచవలయును. మూడవవారమునందీ శరీరవేడిమి వ్యాపించియుండి తగ్గుదల లక్షణములు కనుపడ కుండినయెడల వ్యాధి బహుశః యిరువదియైదిదినములవరకును వ్యాపించును. దీనితో పైన తెల్పబడిన దుర్లభములు కఠినయున్న యెడల, చెమ్మగిని కలుగుటను గురించిన ఆశలు వదలుకొనవలసి యుండును.

పొక్కులుగా ని, చుక్కలుగా ని, శరీరముపై వ్యాపించియుండునంతవరకును, వ్యాధి నెమ్మదించునని యనుకొనుటకు పీలులేదు.

రక్తస్రావము మొదటి పదిదినములు దాటినపెనుక కలిగిన యెడలనున్నూ, శరీరవేడిమి యెక్కువగా తగ్గుదలనంది తిరిగి హెచ్చుకపోయిన యెడలనున్నూ, యిందునుగురించి యెక్కువగా నాలోచించవలసి యుండును. అయితే, నలుబది యెంమిది గంటలలోగా మరలి రాకుండ, శరీరవేడిమి మామూలుస్థితికి వచ్చియుండి యెడల, ఉపద్రవములేదు.

పేగులయందు రంధ్రము పడుటవలన సాధారణముగా నెల్లప్పుడును స్క్రిణాపాయముతో గూడియుండును. ఇది దానంతట అదియే స్వల్పకొనుట బహు అరుదైయున్నది. శస్త్రముచేసి బాగుచేయుట యైనను బహు కష్టమయియున్నది.

ఈ వ్యాధియందు తిరుగ బెట్టుట, సామాన్యముగ సాధ్యగతిని వహించి యుండును. ఈ స్థితియందు నెమ్మదించుట యెక్కువ కష్టములోనిది కాదు. తిరుగ బెట్టు స్థితియందు సాధారణముగ నొకపక్షముకంటె నెక్కువగా నుండజరదు.

స్వమోలిమా సంబంధమగు చిక్కులు కలిగినయెడల మరణము చాలవరకు నిశ్చయమే అయియున్నది. గర్భిణి ఉండియున్నయెడల, కఠవునకు స్క్రిణాపాయము కలుగుటయుగాక, తల్లికిని బాల అపాయమును గలుగజేయును. టైఫాయిడ్ జ్వరము, పుష్పవసంబంధమగు స్థితితో గూడియుండినయెడల, విశేషముగా నెంచ వలసి యుండును.

ఇతర వ్యాధులతో గూడియుండుట.

స్వస్థావస్థయందు మాతమేసామాన్యముగ గలిసింపునట్టి దద్దురోగము (Erysipelas) యీ టైఫాయిడ్ వ్యాధితో బహుఅగుదుగా గలిసియుండును. జ్వరావస్థయందుగాని స్వస్థావస్థయందుగాని పొంగు కనుపడవచ్చును. బిడ్డలయందు అటలమ్మ కనుపించిన విషయములు గలవు.

చలిజ్వరమును టైఫాయిడ్ జ్వరమును ఒకేకాలమందు గొగి ననుసరించి యుండవచ్చును. యీ రెంటిని గలిపి యొకటిగా నెంచి చికిత్సజేయ బ్రయోజనముండజాలదు.

టైఫాయిడ్ జ్వరమునకు ముందుగా ఇక్షల్లాయంబా లక్షణములు కనుపడ వచ్చును. లేక, రెండును యేక కాలమందు శరీరము నావహించి యుండవచ్చును.

తయవ్యాధి ప్రైఫాయిడ్ వ్యాధితో గలిసి యుండవచ్చును. తయవ్యాధిగ్రస్తుడు ప్రైఫాయిడ్ జ్వరమును గ్రహింపవచ్చును.

ప్రైఫాయిడ్ జ్వరము తీవ్రవిషయమందుండినపుడు అతిమాత్ర రోగియొక్క మాత్రము నందు మధుపదార్థము కనుపడక పోవచ్చును.

ప్రైఫాయిడ్ జ్వరములో తరగతులు.

ఈ జ్వరమునందలి పలువిధములగు గుణలక్షణములను బట్టి వ్యాధిని శీఘ్రముగా గుర్తించుట కష్ట సాధ్యమయి యున్నది. ఈజ్వరము అనేకవిధములుగా పరిణమించుచుండును, కొన్ని విషయములలో సామాన్య జ్వర లక్షణములే ఉద్రుతావస్థయందుండును. ఇంకొన్నిటిలో వ్యాధి యొక్క నడకయందు మార్పుదల కలుగచుండును. మరికొన్నిటిలో కొన్ని ప్రత్యేక అవయవములపై విషప్రయోగ మకటవలన చిహ్నముల స్థిరము కలుగును. మొదట సంబంధమగు నస్వస్థత యొకప్పుడు యేర్పడును. మాత్ర గ్రంథులొకప్పుడు చిహ్నముల స్థిరమిచ్చును. శ్వాసావయవము లొకప్పుడు అనారోగ్యతనము జెందియుండును. ఈవ్యాధి ప్రత్యేకించి యొకమార్గమున నడచునని చెప్పుటకు వీలైనదికాదు. వివిధములగు నస్వస్థతలును యొకప్పుడు కొద్ది తోడనే సమాప్తి నందవచ్చును; లేక, మరియొకప్పుడు తీవ్రములయి యుండవచ్చును. ఇట్టి అనేకమార్పులు కలిగిన లక్షణములను వహించిన యీ వ్యాధిని గుర్తించుటయం నొకప్పుడు వైద్యులు పొరబడవచ్చును గాన విగుల బుద్ధిశక్తితో నుపయోగించవలసి యుండును. ప్రైఫాయిడ్ జ్వరమును యీక్రింది 5 తరగతులుగా విభజింపవచ్చును.

1. సామాన్యమనస్థియు అనపాయ మై నస్థియు తరగతి:— ఇందు జ్వరము వచ్చినను, రోగిని పడకపేయుట కవసరములేకుండ జేయును. బిడ్డలలో ముఖ్యముగా నిది ఆకస్మాత్తుగా రావచ్చును. వ్యాధిలక్షణములు మాత్స్యములై, నాడిసంఖ్య విశేషముగ నుండక, జ్వరము అరుదుగా తప్ప 102 డిగ్రీలకు మించకుండ నుండును. సామాన్యముగా ఒడలుపైన గులాబీచుక్కలు కనబడును. ఈచుక్కలు తెల్లవారలయందు మాత్రమే ముఖ్యముగ కనబడును గాని, ఇండియాదేశపు జనులయందు కనుపడటం ఆరుద్రయైయున్నది. పీసా యొక్క అభివృద్ధియు కనుపడును. ఆతివీరేచనము లరుద్రయైయున్నది. ఈవ్యాధియందు తిరుగబెట్టుటయు ఉండియున్నది. ఇట్టి సామాన్య విషయములలో నజాగ్రత్తను వహించుటవలననే సంఘము నందు యీ వ్యాధి చిరకాలముగ వ్యాపింపటకు మార్గ మేర్పడుచున్నది.

2. అపాయకరమగు తరగతి:— ఉద్రుత జ్వరము, స్పష్టమగు మొదట యొక్క అస్వస్థతలు, యీ తరగతియొక్క లక్షణములై యున్నవి. స్పష్టమైన వ్యాధితోడను, మాత్రగ్రంథుల యొక్క అస్వస్థతతోడను, ఉద్రుతమగు శ్వాసాయాస్వస్థతలతోడను, మొదట సంబంధమగు నస్వస్థతల తోడను, ప్రారంభమగు కఠినజాతులు యీ తరగతియందు గలిసి యుండును.

3. అంతర్గత తరగతి:— ఈ తరగతియందులి లక్షణములు సామాన్యముగ స్పష్టములై, రోగి పడకపేయుటకు దగినంత వ్యాధితీవ్రత కనుపించదు. రోగి బడలికజెంది, బహుశ:

కొద్ది అతిపరేచనములు గలిగి, వ్యాధిగతియం దంతటను తనవనుట జేసికొనుచు, తిరుగుచు నుండును. ఈతరగతియందే కొన్ని విషయములలో నకస్మాత్తుగ సంధిగణన జనింపవచ్చును. ఈ అంతర్గతతరగతి విషయములలో నొకప్పుడు రక్తసాగ్రవమేగాని లేక పేగులయందు రంధ్రముపడుటగాని మొదటగా గుర్తింపదగిన అక్షణముగా నేర్పడవచ్చును. ఈ వ్యాధియందు సరియైనచికిత్స లేకుండ వ్యాధిగ్రస్తుడు దూరప్రయాణము చేసిన విషయములలో నిట్టి అపాయనీతులు సంభవించునని సర్ విలియమ్ జెన్నరుగారు చెప్పుచున్నారు.

4. రక్తసాగ్రవ తరగతి:—ఇది ఆరువైయున్నది అంభమునుండియే రక్తసాగ్రవము అధికమై యుండవచ్చును; కాని, యెక్కువ సామాన్యముగ వ్యాధియొక్క మధ్యగతియందు సాగ్రవము తటస్థమగును. ఈతరగతియందు నిశ్చితముగా మరణము కలుగ ననవచ్చినవగును.

5. జ్వరములేని టైఫాయిడ్:—కొందరు వైద్యగ్రంథకర్తలు జ్వరము మాత్రము లేకుండ తక్కినలక్షణములుండిన టైఫాయిడ్ వ్యాధిని ఒప్పుకొని యున్నారు. ఈ రోగికి, బడలిక, మాంద్యము, తలనొప్పి, బొడుకట్టిన నాలుక, అకలి భోజనోభి, నాడియొక్క మాంద్యత, ఒడలుపై చుక్కలు, పుగిసాదిన ప్లీహ — యీ లక్షణములన్నియు, నుండును. ఇట్టి యొక్కవిషయములో పదునారవదినిన శరీరవేడిమి మాములువలెనే యుండియున్నట్లు సర్ విలియం ఆస్లరుగారు చెప్పుచున్నారు.

టైఫాయిడ్ రోగిని విడిగ నుంచవలయునా ?

కుటుంబములోని యితరులెవ్వరును (రోగి కువచారముల జేయుటయందు యోగ్యము లేనివారలు) సాధ్యమయినంతవరకు రోగి పరుండి యుండు గదిలోనికి బోకుండ నుండుటయే శ్రేష్ఠమని చెప్పవచ్చును. ఉపచారకులు, యీ వ్యాధియందు ‘ముందు జాగ్రత్తలు’ అనుకరి కత్తిరింద వ్రాయబడిన యంశములను ముఖ్యముగ గమనింప వలయును. రోగి కుదిరికనందిన పిమ్మట గదియంతయు శుభ్రీకరించి సున్నమును గొట్టవలయును.

కదిచిన కొద్ది సంవత్సరములలో, జర్మనీదేశమునందు, యీ వ్యాధిని గుర్తించిన విషయములలో సాధ్యమైనంతవరకు ముందుజాగ్రత్తలను బుచ్చుకొని, రోగినుండి వ్యాధి యితరులకు వ్యాపింపకుండ జేయుటకు అవసరమగు కట్టుబట్టుములను సరిపి పనిచేసి యున్నారు. ఈ వ్యాధి మిక్కిలముగ వ్యాపించియున్న ట్రీయరు అను నొక జిల్లాయందు డాక్టరు కోచ్ గారు కొంతమంది సహాయవైద్యులతో నొక హరికోధనశాల నేర్పరచి, యచ్చటనున్న ప్రతి టైఫాయిడ్ రోగిని విడిగానుంచి, వ్యాధియొక్క అంటుదల శంతమాత్రిమము ఆస్పదము లేకుండునట్లు జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొనుచు, యీ వ్యాధి సంబంధమగు పుగుల నన్నివిధముల చేతను హతము గావించుచు, మూడుమాసములలో నామిట్టుప్రక్కల నెక్కడను టైఫాయిడ్ పురుగుగాని ఆవ్యాధిగాని లేకుండ రూపుమాపిరి.

చి క్తి త్న.

టైఫాయిడ్ జ్వరముచే బీడింపబడుచున్న రోగికి, సంరక్షణ చేయుటయందును, అవరోధము నిమ్మటయందును, తగు జాగ్రత్తలు బుచ్చుకొనుట, యీ వ్యాధి యందలి చికిత్స

అంగ్లేయ వైద్య చింతామణి యున్నది. రోగిని, విశాలమయినట్టియు, గాని ధారాళముగా రా దగినట్టియు, గాలియొక్క రాకపోకలకు దగిన యేర్పాటులు జేయబడి యున్నట్టియు, యొక గదిలో నుంచవలయును. కిటికీ మార్గమున గాని యితరమార్గమున గాని గాలి స్వేచ్ఛగావచ్చు చుండినను, యీ గాలియొక్క ఉద్రేక రోగిపై దగులకుండు స్థలమున, రోగిని పరుండబెట్టి యుంచవలయును. పొన్నులున్నవ పుత్తగాగాని, యెక్కువగట్టిగాగాని, ఉండకుండ నుండవలయును. ప్రతి నాలుగొకటలకు గాని, అవసరమైతే అంతకు దక్కువ కాలమునకేగాని, శరీర వడిమిని తెర్చుపెట్టుటతో చెరిసికొనుచు, వ్రాసి యుంచుకొన వలయును; ఆహారము నెప్పుడెప్పుడు డిచ్చినదియు, యెంతెంత యిచ్చినదియు, రోగి యెంతకాలము నిద్రించి యున్నదియు, యీవివరములను గూడ వ్రాసి యుంచుకొనుట మంచిది. వైద్యుడు లేని సమయమున రోగియొక్క లక్షణములందుగాని, కైఖరియందుగాని, యేవైనమార్పులు కలిగియున్నయెడల, పిచ్చి బాగ్య త్రతో గమనించవలయును. రోగియొక్క నోరును, బోరిక్ లోషనుతో పుక్కిలింపి ఉప్పువేయుట వలన, పరిశుభ్రముగా నుంచవలయును. రోగియొక్క శరీర మంతయు ఉడుకునీళ్ళతో ముంచిన స్పృశతో దుడువవలయును. ఒడంబడికలు సాడిగానుంచి యెచ్చటనైతే ఒత్తిడి తగునని ఊహించుటకు వీలుండునో యచ్చట పుండ్లు యేర్పడకుండ బాగ్యత్రగ బరిక్షించుచు, రోగిని ఒక పక్కనుండి మరియొక ప్రక్కకు అప్పుడప్పుడు దిప్పి పరుండవట్టు వలయును. మొదటివారము పిమ్మట నుండియైనను రోగిని లేవదీయకుండ, మలమూత్రముల పక్కనుండి విసర్జించు నటులనే యేర్పాటుచేసి, యింట్లకు దగు పరికరముల (Urinal and Bed Pan) నుపయోగించవలయును. చూడవచ్చువారల రాని యర్థక రోగిని, పూర్ణమై విశ్రాంతిని గలిగియు ధునట్లు చేయవలయును. ట్రెఫాయిడ్ బ్యూరమునందు యోగించగలగిన కర్మశీలమగు నాహారము పాలగ వైద్యకాస్త్రజ్ఞులందరును ఏకీభావముతో నొప్పక నియన్తాగు. ఈ పాలను యెక్కిన తరువాత గాని, యెక్కిన పరిమాణములుగ గాని, యియ్యగాదు. పృతి రెండున్నర లేక మూడుగంటలకు, నాలుగు బౌన్సుల చొప్పున నిచ్చిన సరిపడగలను. లేకలము దానిని యిచ్చినను, లేక, కొంచెముగా నీటితోగాని, తైలముతోగాని, సోడా వాటరుతోగాని, కలిపి యియ్యవచ్చును. ఇరు పది నాలుగు గంటలలో నిచ్చిన మొత్తపు పరిమాణము రెండున్నర లేక మూడు పైంట్లను మించి యుండగూడదు. పాలు క్రమముగా జీర్ణమగు చున్నచో లేవో కనుగొనుట మిగుల అవశ్యకమయి యున్నది. ఇందుకుగాను, రోగియొక్క విరేచనమును క్రిమ కాలముల తుండు పరీక్ష జేయుచు, విరేచనమునందు జీర్ణముకానట్టి తోడుకొనిన పదార్థ ముండి యెడల, కొంతకాలమువరకు ఆహారమువలసియుండును. లేక, పరిమాణము నుడు తగ్గించవలసియైన యుండును. లేదా, బలమునైన మిశ్రమము చేయవలసి యుండును. పాలను తగ్గించినపుడు, గాని నీటివేసినపుడు గాని, బాక్టీరీయ, బాగుగా వడపోసిన పీట్జావ. కోడిగుడ్డలొని బెలుపు, పాలను గుడ్డను గలిపి పచ్చగావండినది (Custard) నీటిని ఉపయోచవచ్చును. కాని ఆహారమునందీటిమార్పులను జేయుటవలన, అతివిరేచనములు పుట్టుకుండునట్లును అతివిరేచనము లది వరకే ఉండియుండిన యెడల సధిశము గాకుండవలయును. బాగ్యత్రను మాత్రము పుచ్చుకొనవలసియుండును, ఆహారమును రాత్రివివలు యిచ్చుచుండవలయును. రోగి, స్వప్న ప్పిన అవస్థయందుండినయెడల, క్రిమకము కాలములందు ఆహారమును బుచ్చుకొనుటకు, మేల్కొలుప వలయును. రోగి కాంతమగునద్ర నందునుండినయెడల, లేవకుండుటయే మంచి

చిది. జలమును విరివిగా నియ్యవచ్చునుగాని, ఒక్కొక్కమారు కొద్దిగ సుత్రమునే యిచ్చుచుండవలయును. ఎక్కువగా నిచ్చుటవలన నొకప్పుడు అతివీరిచనము లధికము గావచ్చును.

ఆహారము సరిపడుచుండియెడల, జ్వరగతియందు రోగియొక్క ఆహారమునందేమియు మార్పును గలుగ జేయరాదు. కాని, శరీరవేడిమి స్వాభావిక స్థితికి వచ్చి, స్వస్థావస్థ ప్రారంభమయినటుల గనబడినయెడల, తేయాకునీళ్ళు కాఫీలకు దోడుగా బ్రాత్ (Broths) లను బహు మెలకువతో నుపయోగింప బ్రాగంభింపవచ్చును. ఆహారమునందు జేయబడు ఇట్టి మార్పు లన్నింటియందును, విరేచనము బరిక్షించి జీర్ణత కలిగియున్న నున్న సంగతిని తెలిసి కొనుచుండ వలయును. శరీరవేడిమిని కూడ బ్రాత్ బరిక్షించుచు, ఇందు పుచ్చమగు అధికవ్యత కనుపడినయెడల జ్వరమునందలి ఆహారమునకు మరలవలయును. ఏ యితరవ్యాధి యందలి స్వస్థావస్థయందు కంటేను, యీవ్యాధియందలి స్వస్థావస్థయందు దెక్కువ జాగ్రత్తను వహించి యుండవలసియుండును.

తైఫాయిడ్ జ్వరమునందు బ్రాండ్లని యుపయోగించుటయందలి ఆవశ్యకతను గూర్చి వేరువేరు అభిప్రాయము లుండియున్నవి. తైఫాయిడ్ యొక్క అన్ని విషయము లందును బ్రాండ్లని ఆవసరములేదనునది నిశ్చయమే, ఒకప్పుడు బ్రాండ్లని అధికముగ నుపయోగించుట వలన గూడ అపాయము కలుగుచుండును. సాధుగతిని వహించిన విషయములందు, మరకు దనమును బుట్టించవలసిన ఆవసరమును ను చించు లక్షణములు, కనుపడిన గనుపడవు. రక్త ప్రసారము యొక్కయు, మెదడు సంబంధ మగునట్టియు లక్షణములను బట్టి బ్రాండ్లని ఉపయోగించుటయొక్క ఆవశ్యకతను నిర్ణయింప వలసి యుండును. విశేష కాలము అధిక వేడిమిని వహించి యుండుట యొక్క గాని, అతివీరిచనములయొక్క గాని, ఫలితముగ, గుండెకాయ నీరసత నంది, గుండెబుల్లులు నిస్తాగితో గూడిగాని కృమితదప్పిగాని యుండి, నాడి మాంద్యతను వహించి యుండిన యెడల, బ్రాండ్లప్పుక గుణమునిచ్చును; ఒకప్పుడు నిద్రను రప్పించుట యందును, ఉద్యోగ లక్షణములతో గూడిన తైఫాయిడ్ యొక్క అలస్యగతలయందలి ముఖ్యలక్షణములగు అయాసము సంధిగుణములను సర్దుపరచుట యందును, బ్రాండ్ల పని చేయును. బ్రాండ్ల నిచ్చుట యందలి మోతాదును నిశ్చయించుటకు వైద్యునియొక్క వివక్షజ్ఞానము నుపయోగించి, పని చేయవలయునుగాని, యిందును గురించి మోతాదును స్థిరపరచుటకు వీలులేదు. ఎట్టి విషయములందును, యిరువదిసాలుగు గంటలలో ఆరు లేక యెనిమిది బౌన్సులకంటే నెక్కువ బ్రాండ్లని యియ్యవలసరములేన అంశములు బహు అరుదై యుండును. బ్రాండ్ల నిచ్చి పిమ్మట, దానియొక్క గుణమును కనిపెట్టి మరియు, దానిని మరల మరల నిచ్చుచుండ వలయును. దీనిని నిచ్చుటవలన, రోగియందు కలత అధికమయినయెడల, మోతాదును తగ్గించుటనుగాని, బ్రాండ్లని అసలే ఆపివేయుటనుగాని, చేయవలయును. బ్రాండ్లతో గూడిగాని బ్రాండ్లకి బదులుగా గాని, స్పిరిట్సు ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్, టింక్చర్ డిజెటాలిస్, లైకర్ ప్రికేసిన్ హైడ్రోక్లోర్, మొదలగు గుండెకాయకు మరుకుదనమును బుట్టించు బౌధిమ్యములను వాడవచ్చును.

అతి విచేషణములు కొద్దిగా నుండినయెడల ప్రశ్నేకవికితన అవసరములేదు. కాని, చాలవిషయములలో అతివిచేషణము లధికమయి మందలలు అవసరముగ గనుపించును. అహారమునందు నూ గుప్పను గలుగు జేయుట మూలమున నీ అతివిచేషణము లవృద్ధిపప్పుడు అగిహారమును. అహారమును చూర్చుటయందు పైన సూచించబడిన ప్రకారము చేయవలయును దినమునకు యెనిమిది లేక తొమ్మిది పర్యాయముల కంటే సధికముగ విరేచనములయిననే దప్పు మందులనియ్య నవసరములేదు. పల్విన ఇసికాక్ కో రెండు గ్రెయినులును బిస్కోత్ సబ్ నైట్రస్ రెండు గ్రెయినులును గలిపి ఉదయమానను సాయంకాలమునను యియ్యవచ్చును. బిడలకు పల్విన క్రేటా ఆరోమేటిక్ క ఓపీయం ను యియ్యవచ్చును. ఉదరముయొక్క ఉబ్బుదలను సాలిసైల్ ను గాని బిస్కోత్ నేలి సైలిన్ ను గాని యిచ్చుటవలన, నిలాపు చేయవచ్చును. కర్పూరతైలమును 20 మినిముల మోతాదులలో నిచ్చుటవలన నుపయోగముగ గనుగొనబడెను. దీనిని ఉదరముపయిన రాసి వేడి కాపడములను గాచుటవలనను ఉపయోగముండగలదు. ఉదరముపయినవంచును ప్రయోగించుట మూలమునను యొకప్పుడు మిగుల లాభకరముగ గనుపించెను.

జ్వరముయొక్క య పద్ధతి యందును సాధారణముగ మలబంధ మేర్పడి యుండును. ఈ సందర్భమందు ప్రతి మూడు లేక నాలుగు దినముల నొకసారి చిట్టాముదమును ఒక ద్రాము చొప్పున నియ్యవలయును. అవణ సంబంధమగు విరేచనకారక నిచ్చుటవలన అపాయము కలుగవచ్చును.

రక్తస్రావమునకు, రోగికి పరిపూర్ణమయిన విశ్రాంతి నియ్యవలయును, లైకర్ మూర్ఖియా హైడ్రోక్లోర్ ను 25 లేక 30 మినిములను ఒక బోన్సు జలములో గలిపి యిచ్చి పిమ్మట ప్రతి రెండు లేక నాలుగు గంటల కొకసారి 10 మినిముల చొప్పున నియ్యవలయును. ఈనీతియందు అహారమును మిక్కుటముగ తగ్గించవలసి యుండును. తదవకు ఒక అరబోన్సు పాలకంటే నెక్కువగ నియ్యరాదు.

వేగులయందు రంధ్రముపడుటకు మందుల వలన చికిత్స చేయబడును. లైకర్ మూర్ఖియా హైడ్రోక్లోర్ ను యిచ్చుటవలన బాధను కొంతవఱకు తగ్గింప వచ్చునుగాని, కుదురుబాటు సందుటయను వినియుండలేదు. శస్త్రమును చేయుటకు బూసుకొను నెడల, యీ ఆవస్థ సందర్భించిన పందొండుగంటల లోపల నీ పనిని జేయింపవలయును. శస్త్రమువలన నుపయోగముండుట బహు అరుదు.

రోగియొక్క పడకయందలి తీరును చూర్చుచుండుట వలన కురుపులు కలుగకుండజేయవచ్చును. కురుపు యేర్పడిన యెడల, బోరిక్ ఆసిడ్ ను వాసలీన్ నుగాని, జింక్ ఆక్సైడ్ ను వాసలీన్ నుగాని, కలిపి రాయుటవలన నెమ్మదింపగలదు.

స్వస్థావస్థయందును, నెమ్మదిగా గనబడిన జాలకాలమువరకును, ముఖ్యముగా అహారము పరిశ్రమల విషయమయి యొక్కవ జాగ్రత్తను బుచ్చుకొన వలయును. ఈ ప్రకారము చేయుటవలన, ప్రస్తుతా పాయములనుండి దప్పించుకొనుటయే గాక, దీర్ఘకాలము వ్యాపించబోవు నీరస్థితినుండియు, అక్షేప్త వ్యాధినుండియు, తప్పించు కొనడమగును. ఈవ్యాధిచే బాధనొందిన వాగులకు, తరుచుగ నక్షేప్తవ్యాధి సంప్రాప్త మగును.

ప్రత్యేక చికిత్సా పద్ధతులు.

1. శరీరవేడిమి యెడల జేయబడు చికిత్స. 2. టైఫాయిడ్ ఫురుగుల యెడలను, తజ్జనిత విషవదార్థముల యెడలను, జేయబడు చికిత్స.

1. శరీరవేడిమి యెడల జేయబడు చికిత్స.

జ్వర నివారణలగు బౌవధములు చాలనుండిచే నుపయోగింప బడుచున్నవి. ఆస్పెక్, కార్ ఆను వైద్యకాస్త్రిజ్ఞులు తమ ఆనుభవములవలన నివి ఉపయోగింప దగవని చెప్పుచున్నారు. టైఫాయిడ్ జ్వరమునందు, జ్వరము స్థిరమయినట్టియు నిర్జీతమయినట్టియు గతి ననుసరించి యుండునుగాన, జ్వరనివారణలగు బౌవధముల నుపయోగించుట స్వాభావికమగు జిత్తు కానేరదు. శరీరవేడిమి అత్యుద్రేకతాస్థను వహించియున్నపుడుదప్పు నితరవిషయములందీ ఓషధుల నుపయోగించుటవలన కార్యకారిగ నుండలేదని మీరలు చెప్పుచున్నారు. ఈ ఓషధుల నుపయోగించుట వుండెడి కారణము, అతిశయవేడిమి వలన గుండెయందలి స్నాయువునకు గలుగు నష్టమును గలుగకుండ జేయుట మాత్రము, అయియున్నది.

ఇందులకై యే ఓషధినియునను ఉపయోగించదలచిన యెడల షేమకరమయి న్నీయు కార్యసాధకమయినట్టియు ఓషధి క్విస్ నీన్ మాత్రమే అయియున్నది జ్వరము యొక్క అత్యుద్రేకతావస్థయందలి మిగుల ఉపయోగకరముగ నుండవచ్చును. వ్యాధియొక్క స్థితినిసంబంధించి 15 మొదలు 25 గ్రెయినులవరకు నుపయోగింపవలయును ఆంటిఫిబ్రిన్, ఆంటిసెయరిక్, మొదలగు బౌవధముల నుపయోగించ గూడదు, వాటి నుపయోగించుట వలన గుండెయందస్వస్థత యేర్పడి, శుద్ధరక్తనాళముల యందలియు అపరిశుద్ధ రక్తనాళముల యందలియు రక్తము కలియుటవలన ఒడలునకు నీలవర్ణమేర్పడి, ప్రాణాపాయకరమగు క్షీణగతి ప్రారంభింపవచ్చును. ఇదిగాక వీటివలన శరీరమునందలి టైఫాయిడ్ విషములు తొలగింపబడుట అటంక పరచబడును.

నీటివైద్య పద్ధతులపై జిత్తుచేయుటవలన నెక్కువ జయపరదములగు ఫలితములు పొందబడెను. ఈ పద్ధతులయందు బ్రాండ్ యొక్క పద్ధతి యొక్కను ముఖ్యమైయున్నది. ఇంగ్లాండు దేశమునందు యీ పద్ధతి యొక్కను వాడుకలోనికి దేబడక పోయినప్పటికిని, బోంబాయిపట్టణమున దిశరదేశములందును అమెరికాఖండమునందును, యీ పద్ధతిని బోంబాయి వాడుకలోనికి చెప్పుటవలన నాశ్చర్యకరమయిన ఫలితములు గాంబబడెను. ఆపయమమునందు దీనికొనబడిన శరీరవేడిమి ఫారెన్ హీట్ 102. 2 డిగ్రీలకు మించియుంబినపుడు రోగిని ఫారెన్ హీట్ 65 డిగ్రీలకు మించియుండుని వేడిమిగల నీళ్ళతోబైలో స్నానము చేయించవలయును. స్నానము చేయునీళ్ళ వేడిమికంటె 5 డిగ్రీల తక్కువ వేడిమిగల నీళ్ళయందు మంచిన తడిగుడ్డును శిశువునయియు, భుజములపైనయును ఉంచవలయును. రోగిని నీళ్ళ తొట్టియందు పడునయిదు నిమిషములు ఉంచవలయును. ఈ కాలమందు రోగియొక్క పరిచారకులు రోగియొక్క శరీరమంతయును జక్కగ రుద్దవలయును. రోగిని తనంట తానును యీ పద్ధతి జేయ బోతానావసరప వలయును. ఇట్టిరావడివలన శరీరమునందలి ఉష్ణవిభాగముల

యందు రక్తచూరము పుట్టిపరుపబడుట ఉద్దేశంపబడినదిగాన, యిట్టిరాపిడి మిగుల ముఖ్యమయినది. ఈ స్నానము ఆగంభించిన యెనిమిది లేక పదినిమిషములకు వణకుట తరుచుగా నాగంభిచుచు గాన, ఇది లక్ష్యము చేయవలయును. పదునయిదు నిమిషములను బూరి యగునంత వరకు యీ నిధి క్షేమములయ్యును. ఈ కాలమునందు పిచ్చుట నోగిని నీళ్ళతోట్రాటునుండి దీసి పొడిగుడ్డతో దుడిచి, దున్నటిని గట్టి. పాదములను హస్తములను తుభాముగా పొడిగా నుండునట్లు దుడిచి, చేతులతో కడిగలుగునట్లు రుద్దవలయును. ఈ స్థితియందు కొంచెము బ్రాంతిని యియ్యవచ్చును. శరీరవేడిమి ఫారెన్ హీట్ 102.2 డిగ్రీలకు తక్కువగా నుండిన నేదప్పు, యీ స్నానమును పృథివీమాడు గంటలకును చురచివరల చేయించుచుండవలయును. ఆహారపదార్థములుగ ద్రవపదార్థములను మాత్రమే యియ్యవలయును. ఓషధులేమియునియ్యవలయును.

ఈవిధిత్వ యందలి కన్నమై యెక్కువగనున్నను, యీపద్ధతిని యధావిధిగా జరపు ఆనవాయితీయందు, టైఫాయిడ్ జ్వరము వలని మరణములయొక్క సంఖ్య చాలవరకు తగ్గుదల నందియుండెను. ఈస్థితియందలి గహస్యము శరీరవేడిమిని తగ్గించుటయందుగాక, శరీరమునందుండి టైఫాయిడ్ విషమును దొలగించుట యందిమిడియున్నది. ఈపద్ధతివలన మాత్రాభివృద్ధి అయి శరీరమునందలి టైఫాయిడ్ విషము అధికపరిమాణములుగ వెలువడుచుండును. ఇందువలన దుర్బలమగు గుండెకాయ కలచాలకు నదురు సంభవించు నేమోయని జడువకలసియున్నది. అట్టివిషయములలో, గదివేడిమితో సమానమగు వేడిమిగల నీటియందు స్నానమును జేయించవలయును. ఈపద్ధతివలన రక్తస్రావముగలకు ఆనవును అధిక పరచిన వారలమగు చున్నామను గారణముచే కొందరు ఈపద్ధతిని నిషేధించెదరుగాని టైఫాయిడ్ యందలి అపాయకరమగు రక్తస్రావము యెల్లప్పుడును పుండులేక తురుపు సంబంధమయినది గనుక బహిరావస్థలవలన యీ రక్తస్రావ మెట్లు కలుగునదియు తెలియ వీలుగా కున్నది.

జ్వరముయొక్క ఉద్యుతిగతియందు చల్లనినీళ్ళను, మంచును, పైన ప్రయోగించుట వలన మిగుల ఉపయోగముండగలదు. చల్లనినీళ్ళలో స్పృశని మంచి దుడుచుట వలనగాని, తడిగుడ్డలను గట్టుటవలనగాని తేలికగ శరీరవేడిమిని తగ్గింపవచ్చును. శరీరవేడిమిలో సమాన పైన వేడిమిగల నీటియందు రోగిని ఉంచి, క్రమముగా నీ నీటియందు చల్లని నీళ్ళను గల పుట వలన నీటి వేడిమిని తగ్గించుట మూలమునను రోగియొక్క శరీరవేడిమిని తగ్గింపవచ్చును. ఈ పద్ధతియందు గుండెకాయకు అదరు కలుగుటకు వీలులేదు.

బార్ ఆను నాయన వలన యేర్పరుపబడిన యింకొక నీటివైద్యపద్ధతి, రోగియొక్క శరీర వేడిమి కంటే కొన్ని డిగ్రీలు తక్కువ వేడిగా నున్న నీటియందు జ్వరగతి యందంత టను రోగిని ఉంచి యుండుట, అయియున్నది.

2. టైఫాయిడ్ పురుగుల యెడలను, తిజ్జిత విషపదార్థముల యెడలను,

జేయబడు చికిత్స.

క్షుశ్మకుండ వేసెడి ఓషధుల నుపయోగించుటవలన జ్వరముయొక్క పరిమితి కాలమును తగ్గించు టకుగాను అనేక పర్యయత్నములు చేయబడినవి ఈ విషయ మందు

పరిపూర్ణముగ జయము కలుగక పోయినను, కొంతవర కనుహలముగ ఫలితము లందబడి యుండెను. పేగులయందు క్రొళ్లకుండ జేయుట ఆసంభవమే గాని, కొన్ని నీచక్షుల నుపయోగించుటవలన మలమునందలి కంపును బోగొట్టుటకు మాత్రికము వీలుకలదు. ఈనీచక్షులయందు సాలోల్ బహుశః అన్నిటికంటె నెక్కువగ నుపయోగింప బడునట్లు యున్నది. దీనిని పృతి నాలుగు లేక ఆరుగంటలకును 10 గ్రెయినుల మోతాదులతో నియ్యవచ్చును. గ్వయిషల్ కార్బనేట్ కూడ మంచి గుణము నిచ్చును. జ్వరగతియం దంతటను, పైప జెప్పబడిన వాటిలో దేనితోనైనను గలిపి క్యాలామెల్ (రసభస్మము) నిచ్చుటవలనను మిగుల నుపయోగముండగలదు. బాగుగ వాడుకయందుగల యితరములగు క్రొళ్లకుండ జేయు బొప్పములు - చిన్నత్ సేలి సైలిస్, టర్పెన్టీస్, యూకలిప్టస్ ఆయిల్, తేమల్ ఆయిలున్నవి.

ఈ పై బొప్పము లేమియు రోగికి హానిని కలుగజేయవు. జ్వరముయొక్క పరిమిత గతినిన్ని తగ్గింపజాలవు. పునఃపక్షోప గతినిర్మి ఆటంకపడువ జాలవు. మలమునందలి కంపును మాత్రము బోగొట్టి పరిచారకులు లోనగు అపాయములను తగ్గింపవచ్చును. పుండుయొక్క తీవ్రతను తగ్గించి వ్యాధియొక్క కారిన్యతను తగ్గింపవచ్చును.

మందు బ్రాగతాను.

టైఫాయిడ్ జ్వర సంబంధముగు విషము, ముఖ్యముగా దాగిగడు నీళ్లద్వారా, శరీరమునందు వ్యాప్తత నండుచున్నది. కావున నీటిసప్లయయొక్క ఉత్పత్తి స్థానమునందును, నీరు పారుదలయగు మార్గములందును, మరియులు కలవకుండు నట్లుల బాగోతగ దుచ్చుకొనవలయును. గృహమునందలి వరిశుభ్రతను గాపాడుచు, అన్ని విధములగు పాత్రలను శుభ్రముగా నుంచుకొనవలయును. త్రాగెడు నీళ్లయందును పాలయందును యే విధముగ అనుమానమున్నను, వాటిని ఉడయోగించుటకు ముందుగా గాఢవలయును. ఈ వ్యాధియొక్క అంటు దగిలియున్నటుల అనుమానమున్న ఆహారములను ద్వజించ వలయును.

టైఫాయిడ్ రోగియొక్క మలమాత్రముల సంబంధముగు దుర్వాసయవులను బోగొట్టుట యందును, యివద్దార్థములను బరిష్కరించుట యందును, యెక్కువగు శ్రద్ధను దీసికొనుట మిగుల పాపము ఖ్యతను వహించిన ఆంశమయి యున్నది. మలమును బారవేయుటకు ముందుగా, 1 & 40 వంతునగాని, 1 & 20 వంతునగాని కార్బాలిక్ ఆసిడ్ తలసిన సోల్యూషన్ ను దానితోగలిపి, రెండు లేక మూడు గంటలు నిలువ చేయవలయును. 1 & 500 వంతున గలపబడిన మెర్క్యూరీ పెర్ క్లోరేయొక్క సోల్యూషన్ నుసను యిందులకు పనికివచ్చును.

రోగికి నాడుక జేయబడిన పనిముట్లను, పాత్రలను, కార్బాలిక్ ఆసిడ్ సోల్యూషన్ నులతో నడుగవలయును. రోగియొక్క మలముతో మాత్రస్యమునందైన పక్కబట్టలను కాని, యితర బట్టలనుకాని, కార్బాలిక్ సోల్యూషన్ నులతో నానవేయ వలయును; లేదా, ఉదుకుటకు ముందుగా ఉడుక బెటడము నైనను జేయవలయును. రోగియొక్క పరిచారకులు, రోగికి విరేచన మునపివ్వట్ల. రోగియొక్క గుదపానమును దుద్బలముగు కార్బాలిక్ సోల్యూషన్ నుతో దుడువవలయును. రోగికి ఉదపారములను జేయువారలు తమ చేతులను గూడ కార్బాలిక్ సోల్యూషన్ నుతో శుభ్రముగా గడుగుకొను చుండవలయును.

నీటివైద్యము.

జ్వర చికిత్సయెడల నీటి వైద్యముయొక్క లాభమును పందొమ్మిదవ శతాబ్దమునందు బాగుగ గుర్తించియున్నారు. 1861 సం॥ నుండి జ్వరవిషయములలో స్నానములయొక్క ఉపయోగమును గూర్చి డాక్టరు బ్రాండ్ గారు విశేషముగ నొక్కి చెప్పియున్నారు.

టైఫాయిడ్ జ్వర సంబంధముగ విషము శరీరమునందు విశేషముగ నావరించి యున్నచని కనుగొన విషయములలో, నోటి వ్యాధి పీతైంతవరకు విరివిగ నీటిని తానికొచ్చుట వలన నుపయోగ ముండగలదని డాక్టరు అస్థరుగారు చెప్పుచున్నారు. ఈనీటియందు తొటై స్నానములను గూడ చేయించవలయును. ఈ విషయములో దినమునకంతకును 4 మొదలు 10 బౌన్సుల వరకు కిస్కిని యిచ్చుట వలనను ఉపయోగ ముండవచ్చును. తల నొప్పియు, మగతయును, ఉండినయెడల, మంచు గడ్డనుగాని తడిగుడ్డలనుగాని శీరస్సుపై నగట్టవలయును. మగతను వహించిన ప్రతి రోగిని బాగ్రతగా కాపాడవలయును. ఇట్టిరోగుల విషయములలో నిద్రపోవచ్చునట్లు చేయుట మిగుల ముఖ్యమైయున్నది; ఇందులకు త్రోర్ మాల్బియా ప్లాష్కోక్టోర్ ను లోనకియ్యవలయును. మెదడు సంబంధముగ అస్వస్థతలు యేర్పడినపుడు, జలమును లోనకిచ్చుటవలనను, స్నానములు మొదలయినవి చేయించుట వలనను, యీ రెండు విధములగు నీటిచికిత్సలను మిగుల సహాయకారులుగ నుండునని సర్ విలియం అస్థరుగారు చెప్పుచున్నారు.

నీటి చికిత్సయందు వాడుక చేయదగిన ముఖ్యములగు ముడుపడ్డతులు గలవు.

1. స్పంజిని నీటిలో మంచి రోగియొక్క ఒడలు తోముట, జ్వరముయొక్క తీవ్రత ననుసరించి, గోరువెచ్చని నీళ్లు, మంచుతో సమానముగ చల్లని నీళ్లు—నీటిలో స్పంజిని గాని మెత్తని గుడ్డనుగాని ముంచి, ఒడలంతయు దోవవలయును. 15 నిమిషములు మొదలు 20 నిమిషములవరకు నిట్లుగాజేయవలయును. జ్వరము అత్యుద్గ్రతావస్థను వహించి, మంచుతో సమానముగ చల్లని నీళ్లలో స్పంజిని ముంచుచు ఒడలంతయు దుడుచుట అవసరమయినప్పుడు, పూర్ణమయిన స్నానమును జేయించుటయే మంచిది. ఇట్టి సంపూర్ణస్నానమునకు రోగియొక్క బుధువులుగాని స్నేహితులుగాని అధ్యంతరము చెప్పినప్పుడు, రెండవ పక్ష మాన యీవిధముగా స్పంజిని ఒక్కొక్కకాలును ఒక్కొక్క చెయ్యిని దుడిచి, పిమ్మట పీపును ఉదరమును దుడువ వలయును.

2. తడిగుడ్డలు శరీరమునకు జాట్లుట టైఫాయిడ్ జ్వరమునందు యీపద్ధతి అంత ఉపయోగముగ గలపించదు. కాని, తొటై ఆందుబాటునందు లేనపుడును, మెదడు సంబంధముగ అస్వస్థతలు స్పష్టముగ గనబడినపుడును, యీపద్ధతి నవలంబించి ఉండి ఉండి యీ తడిగుడ్డలపై చల్లని నీళ్లను బోయుచుండ వలయును.

3. తొటైస్నానము రోగియొక్క శీరస్సుతప్ప తక్కిన యావచ్చురీతును నీటియందుంచుటకు విలయింతటి పాడుగా నున్నది యుండవలయును. శరీరవేడియ 102 డిగ్రీలకు మించి యుండినపుడు తొటైస్నానము చేయించుటకు కొందరు వైద్యకామ్రుజ్ఞులు సలహా

నిచ్చుచున్నార. రోగిని 15 లేక 20 నిమిషములు నోడ్యులలోనుంచి, పిమ్మట అందునుంచి తేవదీసి, పొడిబట్టను జుట్టి, బరువులేని దుప్పటిని గప్పవలయును. రోగి, ట్రాకెలో నున్నప్పుడు, చేతులను కాళ్లను ఉదరమును శుభ్రముగా చేతితో రుద్దవలయును మొదటి స్నానము నెప్పుడును రాత్రికాలమందు చేయించరాదు. గోరునోచిని నీళ్ళలో మొదటగా రోగిని గూర్చుండబెట్టి క్రమక్రమముగా చల్లని నీటిని గలఘటవలన గోగి అస్త్రాల్లో ఉండనేరదు. ఈస్నానమును జేయించుటయందు ఉండెడి ఉపాసమును బట్టియు జాగ్రత్తను బట్టియు రోగికి ఈస్నానమువలన కలుగు ఆయాపమును నిర్ణయింపవలయును. స్నానానంతరము ఆహారమునుగాని, యొకప్పుడు చురుకును బట్టియు పదార్థముగాని, యియ్యనగును. స్నానమైన పిమ్మట చలి కలిగినయెడల మరేమియు నొందరాదని. రక్తస్రావము, ఉదరభాగమునందు నొప్పి, మిగుల నీరసత—యీ సందర్భములందు ట్రాకెలోస్నానమును చేయించరాదు.

స్నానము వలన నీ క్రింద ఉపయోగము లుండును,—

1. సంధిగుణము తగ్గును వెలుగుదలయు తగ్గును. విషలక్షణములు కొంతవరకు అంతరించును.
2. మూత్రగ్రంథల మూలమున హైస్ట్రాయిడ్ విషములు వెలువరింపబడును.
3. రక్తప్రచారమునందు చురుకుదనము పుట్టును. గూడెయొక్క కొట్టుకొనుటయందలి తీవ్రత తగ్గును. నాడి బలమును వహించును.
4. రొమ్మపడిసెనుయొక్క ప్రారంభగతియందు మంచుగుణము నిచ్చి, క్వాసకోశ ములయొక్క ఆహుభాగమున రక్తముయొక్క కూడిను నిలుపుజేయును.
5. ఒకతీరుగ వరుండుటవలన గలిగెడి కురుపుల కాస్తదము తక్కువగ నుండును. ఒడలు శుభ్రతను వహించి ఆరోగ్యకరముగ నుండును. స్నానమునప్పు నీటిలో ఒకఆరిపాను పటికను గలిపి యెడల నుపయోగముగ నుండగలదు.

6. శరీరవేడిమి తగ్గువలన నందునుగాని యిదియే ప్రాముఖ్యముగ నంశము కాదు.

7. ఇందుమూలమున నీ వ్యాధియందలి మరణములు తగ్గును. ఈ విధముగ చికిత్స వలన ప్రపంచమునందున్న దెద్ద ఆసుపత్రిలలో 100 కి 6 మొదలు 8 వరకు మరణములు తగ్గింప బడినవి.

డెంగ్యూ జ్వరము.

తలనొప్పి, ఆయాసము, చలి, నీరసత, వెన్ను గాళ్ళు చేతులు కీళ్ళు కనుగుడ్డు— వీటివై పులఅధికమగు కాఫ, కొద్దియొ గొప్పయొ జ్వరత— యివి యన్నియు డెంగ్యూజ్వర ముయొక్క ఆరంభ లక్షణములై యున్నవి, కాని ఒకానొకప్పుడు యెదియొ ఒకటిగానందు ఆకస్మాత్తుగ పోటు కలుగుట మూలమునను, యీ జ్వరము ప్రాంతము కావచ్చును. పిమ్మట కొద్దికాలములో సామాన్యముగ పండెందు గంటల లోపల, ముఖము, ఎదురొమ్మ ఆరచేతులు, యింక నికరస్థలములందును, యెరగనిపొక్కులు యేర్పడి, యివి మూడు నలు బయ్యెనిమిది గంటల పిమ్మట నశించును. జ్వరము 103 లేక 104 డిగ్రీల వరకు వచ్చి

నాడి నిమిషమునకు 120 చబ్బులవరకు వ్యాపించును. పొక్కులు తగ్గిపోయిన కొలదిని జ్వరమును నొప్పులును తగిపోవును. జ్వరము మరల అధికమయి, రెండవసారి పొక్కులు కనుపడి యీ పొక్కులు బహుశః ఆరంభమునందు ఆరవేతులలో కనబడి, పొంగును బోలి యుండును. ఈస్థితి కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉండి, అంతరించిపోయినను బోవును. లేక రెండు దినముల వరకు ఉండినను ఉండును. ఒక నొకప్పుడు యీ రెండవసారి కనుపడిన పొక్కులు “మక్కు ముండ్లు”ను బోలియుండి, దురద విశేషముగ గలిగి, నను గలుగవచ్చును. ఈ రెండవతెర వచ్చినప్పుడు రోగికి మిగుల బలహీనత గలిగి, కీళ్లయందు నొప్పులు కలిగి, మెడయందలియు గజ్జల యందలియు, గ్రంధులు వాపుదల నందవచ్చును. ఈ వ్యాధి యందు మూడవ తెరగూడ గలుగవచ్చును. ఈవ్యాధి పెద్ద వారలకును, బిడ్డలకును, పసిపిల్లలకును, గలుగవచ్చును. బిడ్డలయంద, ఈ బాధవలన గలుగు అదరుటలు, మూర్ఛలుగా భ్రమింపబడును. పెద్దవారలయందు గనబడు అనంతర బాధలు, బిడ్డలయందును పనివారలయందును యేమియు గనబడక, త్వరితములా గుదిరిక నందును.

చి కి త్న.

విశేషన కారణ నిచ్చుటవలన రోగి తరుచుగా కడలుట తటస్థించును గావున ఈవ్యాధి యందు విశేషన కారు లుపయోగ నీయములు కావు. తిడిగడ్డలతో కరీమును దుడుచుట వలనను చల్లవనమునిచ్చు ద్రావపదార్థములను ద్రాగటవలనను, రెండు లేక మూడు మేతాదులను ఘనానీటితోను యిచ్చుటవలనను— జ్వరమును తగ్గించవచ్చును. ఆహార పదార్థములు తేలికగ జీర్ణమగునవిగ నుండవలయును. చివరదిఫాను లేదినపొక్కులు అంతరించు వలెను, రోగి పరుండియే యుండవలయును. నొప్పులు నయము గాక పోయినయెడల పొటాసియం ఆయోడైడ్ ను సేవించవలసి యుండును. ఉడుతమగు పాలుల పిమ్మట వాయువునందలి మార్పుకొరకై యితరస్థలములకు బోవుట మంచిది.

నొప్పులనున్న, జ్వరమునున్న తగ్గించుటకు టింక్చర్ బెలడోనాను 10 మినిముల మేతాదులలో దినమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును. దీనివలన నుపయోగము లేకపోయినయెడల డయూరిటిక్స్-డయఫారిటిక్స్ లా 2 వ ఔషధయోగమును వాడవలయును.

త ల నొ ప్పి.

తలనొప్పి యున్నది ప్రత్యేకమగు నొకవ్యాధిగాక, సామాన్యముగ నింకొక వ్యాధి యుక్కు సూచనలక్షణమై యున్నది. ఈవ్యాధియందలి ముఖ్యవిధముల నీ క్రింద వివరించడమయినది.

1. అజ్జిరి సంబంధముగ తలనొప్పి.

జ్వరము, పేగులు, కారీజము — పీటియందలి దేని అస్వస్థి వల్లనైనను, యీ సంబంధముగ తలనొప్పి కలుగవచ్చును. జ్వరమునందలి యస్వస్థత అధికముగ నుండిన

యెడల నువ్వరుపై పోట్లు పొడిచినట్లునుండి, వాంతి వచ్చునట్లు ఉండును. తినుటయుండ గాని, త్రాగుటయుండుగాని అవి తిత్తిముగాను దాల్చిన ద్విధశోధకము శీఘ్రము శోకుండు తలనొప్పిచూపు ముండును. పొత్తికడుపు యున్న కలుక్కుముని యున్నట్లు చూచినచో, యేది యో యొక యజ్జీర్ణపదార్థము జీర్ణశయమునుండి పేగులలోనికి వెనలియుండునట్లు తెలియవలయును. ఇట్టి ఆవస్థగలిగినవంటనే తలనొప్పి, నిలచిపోవును. ఇట్టి తలనొప్పి, సోడావాటరును త్రాగుట వల్లను, ఒక పెద్ద చెమిచా కొలతగల సిట్రిటు ఆఫ్ మిగ్నీసియాను జుముల వేసి ద్రాగుటవల్లను, సర్దుకొన గలవు, కారణముగాని పేగులుగాని యస్వస్థతయు ఉండినయెడల, శరీరము కడ్డముగా విగ్రహ యేర్పడి, బాధ ఉద్భుతగతియుండుండును. అట్టి విషయములలో 4 వ విధిచనకారి బొంధయోగము నవయోగించవలయును. వైద్యసంబంధమగు తలనొప్పికిని యిదే చిత్తము జేయవలయును.

2. కరముల సంబంధమగు తలనొప్పి.

ఈ సంబంధమగు తలనొప్పి, ఎల్లప్పుడును గూర్చుండి వనిచేయుట కలవాటు పడి యుండిన దుర్బలల యందును, నిష్పత్తువలన అడువారలయందు బుతుసావకాత సమీపము నందుచు, కలుగుచుండును. ఈ తలనొప్పి కలవాటు కడిన వారు, సామాన్యముగ పాలియుండి బలహీనతను వహించి, తేలికగా నుద్రేకు అగుచుండును. మనస్సంబంధ మయినట్టిగాని, మనో వికార సంబంధమయినట్టిగాని, ఉద్రేకత యెంతమాత్రముగలిగియున్నను, యిట్టివారలయందు తలనొప్పికలుగుచుండును నొప్పిఒక స్థలముననేగాని, ఒక పార్శ్వముననేగాని లేక అన్ని ప్రాంతముల గానియుండవచ్చును. చెడిపోయిన కండ్లకలనాగలకు యీవిధముగబాధ దవుడలయందుండి నట్లు వోచును. హిస్టేరియావలన బాధనొందు పడుచులయందు తలలో నేదో యుక్తభాగ మని మేకును గొట్టినట్లుండును. మూర్ఛివచ్చు ముందరను యిదివిధమగుబాధ కలుగవచ్చును. ఈ విధమగు తలనొప్పి వచ్చువారలు సాధారణముగ తెరవచ్చు ముందర కలిగి బొందుచు, నిర్లక్ష్యతతోగూడిన మాంద్యతను వహించియుండురు. ఇట్టివారలు ఉదయమున గొంకకట్ట మతో నిద్రలేచెదరు. లేక నిద్రలేచుట యందే ఉద్రేకముగ బాధనందుచు, ఆహారమును మింగుటయుండు గట్టము నందుదురు.

ఈ సంబంధమగు తలనొప్పి మాన్యునందుటకు గాను అలవాటులను మార్చి వలసి యుండును. ఆపరిమితముగ కాఫీనిగాని తేయాకు నీళ్ళనుగాని ద్రాగువారు, పాలను సోడావాటరును ద్రాగవలయును. పనుల మూలమునకారి యితరకారణముల మూలమునగాని కఠినకాలముల యందు భోజనముల జేయనివారు, ఆపద్య తిని మార్చవలయును. సోమరితనముగ, ఉండు వారుగాని, యెప్పుడును గూర్చుండి పనిచేయు వారలు గాని, కఠినముగ శరీరపాదకము బుచ్చుకొనుచుండ వలయును. చుట్టలను విరామములేకుండ గాల్చువారలు, యీ అలవాటులను దప్పించవలయును. లేదా, తగ్గించినను తగ్గింపవలయును. ఫలహారములకు బదులుగా ఆశ్వాత్థమును ఆహారమును భుజింపవలయును. బుతుసావకాలమున అడువారల కిట్లొప్పి కలిగిన యెడల పోటాసియం బ్రొమైడు (1 వ అల్టరేటివ)ను నీవించవలయును. ఫానాసిటిన్ 5 గ్రాములను లను కేఫీన్ సిట్రిన్ 4 గ్రాములనులను గలిపి యిచ్చుట వలనను గూఢియ్యగలదు.

3. పార్శ్వపు నొప్పి.

కపాల సంబంధమగు ఆయిదన సరముయొక్క ఉపరికాళి అస్వస్థత నందినపుడు కంటి లోనొప్పి కనుపడవచ్చును మధ్యకాళి అస్వస్థత నందినపుడు పై దభ్రుడయిండు నొప్పి కను పడవచ్చును. క్రిందికాళి అస్వస్థత నందినపుడు క్రిందిదభ్రుడయిండు నొప్పి పండు చెడిపోయి యున్నయెడల ఆయా దభ్రుడల ననుసరించి యున్న పండ్లయందును నొప్పి యేర్పడును. ఈ నొప్పి ఒకప్పుడు ప్రొద్దుగంకగనే తగ్గిపోవును. ఈవ్యాధికిని ఈక్రింద వివరింపబోవు నుచు రుపోటునను ఒక లే చికిత్సను జేయవగును.

4. నుదురుపోటు.

మధ్యప్రాంతములయందు సాధారణముగ వ్యాపించి యుండెడి యీ నుదురుపోటు చలిజ్వరమునకు బదులుగా వచ్చుచుండును; అనగా, ఒకనాడు చలిజ్వరమును, రెండవనాడు నుదురుపోటును, గలుగుచుండును. ఈ నుదురుపోటునందు కనురెప్పకు యీడ్చునట్టిబాధ గూడ గలుగుచుండును. బాధ అతిశయమై తెరలు తెరలుగా వృద్ధియగుచు, కన్నులవెండి యు నీరుకాగును, రోగి యెట్టి విధమయిన పనిని జేయుటకు వీలు లేకుండును. ఒకానొక ప్పుడు సరముయొక్క మార్గమునందు యెర్రని గీత కనుపడవచ్చును. ఈబాధ దినమంతయు ఉండవచ్చును. కాని, సామాన్యముగ రెండుమూడు గంటలలో నంతరించవచ్చును. ఈపో టునకుగాని సరముల సంబంధమగు ఇతర పోటునకుగాని ఉన్మక్తితను వహించియున్న వార లందు జీర్ణాస్వస్థత గలిగినపుడెల్లను ఈవ్యాధి తలస్థింపవచ్చును. ఇట్టివారల మనస్సునం దెట్టిబాధ కలిగినను యీవ్యాధి జనించును. సూర్యాతపమునకు లోనగుట, అలసట, రాత్రు లయం దెక్కువగ బనిచేయుట, చలి, జ్వరము, చెమ్మ, బలమగు భోజనములు, మామూలు విశ్రాంతి లేక పోవుట—యిట్టి కారణములన్నియు నీవ్యాధిని ప్రకౌపింప జేయవచ్చును. స్త్రీలయందు, తరుచున బిడ్డల గనుట, దీర్ఘకాలము స్తవ్యమునిచ్చుట, అధికమగు ఋతు స్రావము కలుగుట—యిట్టివన్నియు సరసంబంధమగు నొప్పు (నాడీవ్యాధి) లకు కారణము లగుచున్నవి.

చి కి త్స.

ఇండియాదేశమునందు ఈ నుదురుపోటుయొక్క ఆరంభగతులు సామాన్యముగ చలి జ్వర సంబంధమయినవి ఆయియుండును గనుక అవసరమయిన యెడల 4 వ బొవధయో గమును విరచనకారిగ నిచ్చి, ఆయిదు లేక ఆరు గ్రెయినుల క్విస్ వే మోతాదుల పృతిమా డుగంటలకును యిచ్చినయెడల, కుదిరిక నందవచ్చును. విద్యుచ్ఛక్తి సంబంధమగు బ్యాట రీని బ్రయోగించుటవలన నొకప్పుడు నెమ్మది గలుగును. మిగులబాధగానున్న ప్రజేశమందు వేలిలో నొక్కిపట్టుటచే నొకప్పుడు ఉపశాంతి కలుగవచ్చును. తలచుట్టును తడిగుడ్డను గట్టుటవలన నొకప్పుడు నొప్పి తగ్గవచ్చును. చీకటిగదిలో నెమ్మదిగా బయండుటవలనను ఒక ప్పుడు నొప్పి సర్వకొనవచ్చును. చేతులలో తలపయిన పట్టుకొనుటవలనను అత్తుడెత్తుడు ఉపశాంతిని గలుగ జేయవచ్చును. వేడి తయారునీళ్లు, వేడి కాఫీ — వీటివలన సుపయోగ ముండవచ్చును. కణితపయనగాని నుదుటిపయనగాని చిన్న మచ్చునట్టిని వేయవచ్చును.

సమానభాగములగు క్లోరల్ హైడ్రేస్ ను క్యాంఫర్ (కర్పూరము) ను గలిపి తైలముగాజేసి మద్దనచేయుటవలన సామాన్యముగ జాలవరకు గుణమిచ్చును. జేడి కావడము వలననుగుణము కలుగగలదు. కాని చాలావిషయములలో చల్లని ద్రవముల రాయుటవలనను మంచుగడ్డను గట్టుటవలనను యొక్కవగుణ మిచ్చినట్లు కలియుచున్నది. ఈవ్యాధి తిరిగి తిరిగి వచ్చినయెడల చలిజ్వర సంబంధమయి నట్టియు బలహీనతతో గూడినట్టియు కాంతానులకు దోడుగా జీర్ణాశయము యొక్కగాని కారిజము యొక్కగాని ఆస్వస్థు లుండి యుండునుగాన, అవసరమును బట్టి అందులకగు చికిత్సను జేయవలయును. పిమ్మట క్వినీన్ గలిసిన 1 వ బలవర్ధకౌషధము నియ్యవలయును. ఇది 15 దినములు వాడిన పిమ్మట నుపయోగము గనుపడక పోయిన యెడల 4 వ బలవర్ధకౌషధమును వాడి చూడవలయును.

5. మాడుపాటు.

పైన వివరింపబడిన తలనొప్పులకు భేదమైనట్టి మాడుపాటు మెదడున కధిక రక్తము పారుటవలన గలుగుచున్నది. ఇట్టి వ్యాధి సామాన్యముగ పెద్దవానలయందు గలుగుచుండును. మూర్ఛ, అంగికుత్పరిగము, ఎండవెచ్చ—యిట్టి ఉద్రుత వ్యాధులకు సూచన లక్షణముగా నది తటస్థించును గాన, యిందువిషయమై బహు జాగ్రత్తగా నుండవలయును. మూలకంక యందలి రక్తస్రావము ఆగిపోవుట వలనను, శరీరము ఆలవాటునందిన యితర రక్తస్రావము లేమయిన ఆగిపోవుట వలనను యీవ్యాధి తటస్థింప వచ్చును. ఉద్రుతగతులయందు బాధ అతిశయమై, కండ్లును ముఖమును యొగ్రబాణ, తలవైపుల చిగువునంది, చెవుల పునుకను భారముగానుండి, దాహము జ్వరతలతో గూడియుండును.

చికిత్స.

బాధ కొద్దిగా నుండినయెడల 4 వ ఔషధయోగమును విరేచనకారిగ నియ్యవలయును. చురుకుదనమును బుట్టించు బ్రాండ్లవైగరాల నియ్యగూడదు. ఆవర వదార్థముల యందు జాగ్రత్తను వహించి మెదడున కేమియు పనికి గలక జేయక, ఎండజేడిమికి లోనుగాకుండ జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనుచు, సాధారణమగు శరీర సాధకమును బుచ్చుకొనుచుండవలయును. బాధ ఉద్రుతముగానుండి జ్వరతను గూడియుండిన యెడల, కూర్చునియుండియే పూర్ణమైన విశ్రాంతిని బుచ్చుకొనుచు, తలకు జల్లని ద్రవపదార్థములను పైన రాయవలయును. పెండ్లుకలను బొట్టిగా నుండునటుల గత్తిరించవలయును.

6. కీళ్ళ సంబంధమగు తలనొప్పి.

శరీరముపై చర్మము ననుసరించియున్న స్నాయువుల యొక్కపాత సంబంధమగు నొప్పులవలన నొకానొకప్పుడు తలనొప్పి కలుగవచ్చును. నొప్పి శరీరమునకు స్పృశభాగమున నుండియున్నట్లు గన్పట్టును. నుడురును ముడుచుకొనుటవలన బాధ అతిశయమగును. ఇతర స్థలములయందును నొప్పిఉండి, మాత్రమునందు యొర్రగని శలవచ్చును. వాతరోగమునకును, గొట్ నకును, నియమింపబడిన జీర్ణాశయ దీనిని జేయవలయును.

7. బలుబువలని తలనొప్పి.

బలుబువలన గలిగెడి తలనొప్పికి క్యాలూమెల్ (రసభస్మము) ను విరేచనకారిక నియ్యవలయును. 10 గ్రాయినుల ఆమ్మోనియం క్లోరైడ్ నున్న 20 మినిముల స్పిరిటుస్ ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ నున్న ఒక బౌన్సుజలములో గలిపి నాలుగు గంటల కొకపర్యాయము యియ్యవచ్చును. ఆమ్మోనియా కార్బనెస్ ను వాసన జూడవచ్చును.

తా మ ర.

తామర యనబడు చర్మవ్యాధి అంటుసంబంధ మయిన దయి యున్నది. ఇదిసామాన్యముగా బిడ్డలయొక్క తలలయందు లేచును. తరుచుగా ముఖము, శరీరము, కాళ్ళు, చేతులు, గోళ్ళయొక్క మొదట్లు, గడ్డము—యీభాగములయందును గనుపడుచుండును. ఇది యొక విధమగు పురుగుయొక్క యభివృద్ధివలన గలుగచుండును, ఒకానొకప్పుడు అన్ని విధములైన తామరలును ఒకేవిధమగు పురుగువలన గలుగుచుండెనని తలవబడెనుగాని, ఇటీవల నీ పురుగునందనేకజాతులుండియున్నట్లు కనుగొనబడెను. ఒకజాతి పురుగు, బాలవరకు శరీరమునందు వెండుకొలుండెడి భాగములను మాత్రమే, ననగా, తల, గడ్డము, కనుబొమ్మలు యితర రోమప్రదేశములు—పీటిని ఆన సరించి యుండును. ఇంకొకవిధమగు పురుగు, చర్మమును, గోళ్ళను, అనుసరించి యుండును.

1. తలలోని తామర.

తామర ఆరంభమగుటకు ముందుగా, ఆస్వస్థత నొందిన చర్మభాగములు యెర్రై, దురదతోగూడి యుండును. ఈ అవస్థయందు యీ వ్యాధిని దెలియక పోవచ్చును. రెండు లేక మూడు దినములలో గోళాకారములుగ చిన్న పొక్కులు ప్రారంభమయి, యీ పొక్కులు కొద్దిగంటల కాలములోనే ద్రవసహితములై యుండును. ఈ పొక్కులు పగిలి అందలి స్రావము వ్యాప్తమంది, ఆ భాగములందు కొత్తపొక్కులు యేర్పడి, వెనుకటి నలేనే నిలియును అభివృద్ధి నందుచుండును. ఈ పొక్కులను దురదచే గోకుటవలన వక్కులు కట్టించుండును. ఈ ఆస్వస్థత భాగకలందలి వెండుకొలు పగిలియుండును.

చి కి త్న.

తలలో తామర యుండినయెడల, ఆయా భాగములయందలి వెండుకొల నన్నిటిని కుట్టముగా గత్తిరించ వలయును. అటుపిమ్మట దినమునకు రెండుసార్లులు మాటికి ఆయిదు వంతున కార్బాలిక్ ఆసిడ్ కలిపిన సోల్యూషనుతో గాని, కార్బాలిక్ సబ్బుతోగాని, తల నంతయు కుట్టిముగా గడుగవలయును. గాఢమయిన కినిగర్ నుగాని, ఒకబౌన్సునందు నాలుగుద్రాముల పటిక కలిపిన సోల్యూషను గాని, ఆస్వస్థతభాగములపై నద్దవలయును. ఈ వ్యాధికి ఉపయోగించు యేమందునైనను ఆస్వస్థత భాగములయందు బాగుగా జొచ్చు నట్లును, పెంపుకలయొక్క కదుళ్లలోనికి బోవునట్లును, గట్టిగా రద్దవలయును. ఈ వ్యాధి సంబంధమగు పురుగులని వెండుకొలయొక్క గుడుళ్ల ననుసరించి యుండునుగాన, మందులు,

ఆ కుదుళ్లలోనికి జొరబట్ట మిగిలి ఆనశ్శయము గలుగ్నది. ఈ వ్యాధియొక్క అంటు గుణము, త్రాకటవలనను గాల్గవలసిన బహువ్యాధులను గనుక, యెన్నఁ న బాగ్గికమ బుచ్చుకొనవలయును. ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉపయోగించు దుష్కర్మలను బ్రహ్మణులు, తున్నాళ్లు, సబ్బుబిళ్లలను, యితరులు ఉపయోగించరాదు.

గోవా పవుడరును ఐనిగర్ లోగాని నిమ్మరసములోగాని కలిపి ఆస్వస్థభాగముల రాయవలయును. గోవా పవుడరుతో చేయబడిన క్రైసోలోజ్ ఆనునది మిగుల ఉపయోగముగ నుండును. క్రైసోఫానిక్ అసిడ్ ను వానలీక్ లో గలిపి రాసినను రాయవచ్చును. సబ్బుతోను ఉడుకునీళ్లతోను ఆస్వస్థభాగములను గడిగిన పిమ్మట ఒక ద్రావము ప్రిసిపిటే టేడ్ సల్ఫర్, ఆనిద్రావము ఆమ్మోనియే ట్లైడ్ మెయ్క్యూరీ, ఒకబొన్ను లానోలీక్ - యీ మూడును గలిపిన ఆయింగ్ మెంటును ఉపయోగించవలయును. దీర్ఘవ్యాధిపితమగు విషయము లలో ప్రతి దినమును ఒకసారి లినిమెంటు అయెడి, ను రాయవలయును. ఆస్వస్థభాగము పుండు పడునంతవరకు గాని, పచ్చిగా నుండువరకుగాని, దీనిని రాయవలయును.

2. ఒడల్పు తామర.

శరీరమునం దితరభాగములయందు యేర్పడు తామర విషయమందు, కార్బలిక్ సబ్బులో దినమునకు రెండుసారులు కడుగవలయును. 8 బొన్నుల జలములో 2 ద్రావము సోడా బైకార్బోనేట్ కలిపిన సాల్వేషన్ తో స్పృశి చేయవలయును. పిమ్మట జింక్ సల్ఫేట్ ఒక ద్రావమును లానోలీక్ ఒకబొన్నును గలిపియున్న ఆయింగ్ మెంటును రాయ వలయును. తలలో నేర్పడు తామరకు నియోగింపబడిన మందులను దీనికి ఉపయోగించనగును.

తిమురు వాయువు.

తిమురు వాయువు లేక ఉబ్బువాయువు అనువ్యాధికే ఆంగ్లేయ భాషయందు టెరిబెరి అందరు సింహళభాషయందుబెరి అనగా బలహీనత అని అగము టెరిబెరి అనగా అతిబల హీనత అని అర్థమిచ్చుచున్నది. శరీరమునం దుపరిభాగములకు వ్యాపించియుండేది సరముల యొక్క వాపుదలవలన నీ వ్యాధి సంభవించుచున్నది. అతిసీరసత, కార్బును పిడుదులును కట్టు పట్టి వంగనండుట, యీ భాగములు తిమరుగా నుండి ఉబ్బుదలనందట, కార్బును చేతులను ఉపయోగించుటయందు బహుకష్టముగా నుండుట—యీ లక్షణములతో గూడియుండును. వేర్వేయొక్క కొనలయందును తిమురు కలుగవచ్చును. కొద్దిదినములలోగాని, లేక కొద్దిగంటల లోనేగాని, శరీరము ఉబ్బుదల జూపి, ఊపిరిని బిల్చుట తొందరతోగూడి, వాడి నీరసతనంది, మాత్రము అతిహీనమై, దాహ మధికముగా నుండును. అతివీరచనము లాను, తిమురును, పిమ్మట యేర్పడును.

ఈవ్యాధి కొన్ని నిర్దేశనములయందు మాత్రమే గలుగుచుండును. ముఖ్యముగా నుష్ణప్రేక్షకములయందు యీ వ్యాధి వ్యాపించియుండును. చలికాలము, కీళ్లనొప్పులు,

రక్తహీనత—వీటివలన నీ వ్యాధి గలుగుచుండునని కొందరి ఆంగ్లేయ వైద్య శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క అభిప్రాయ మయియున్నది. మరికొందరు, వ్యాధిహితమయిన పరి ఆస్నమునుభవ జించుటవలన నీ వ్యాధి కలుగుచున్నదని అభిప్రాయమైయున్నారు. సారజనక సంబంధిమగు ఆహారపదార్థములయందలి లోపమువలన నీవ్యాధి కలుగుచున్నదని యింకొక అభిప్రాయము కలదు.

ఈవ్యాధి చీనదేశమునందు బహు పూర్వకాలమునుంచి యుండియుండెనని తెలియుచున్నది. ఇండియా దేశమునందు ఆంగ్లేయ వైద్యశాస్త్రజ్ఞులయొక్క దృష్టి యీవ్యాధికి 1833 వ సం॥ ప్రాంతముల దిగెను. జపానుదేశమునందలి దేశీయ వైద్య శాస్త్రజ్ఞుల యొక్కయు విదేశీయుల వైద్యశాస్త్రజ్ఞుల యొక్కయు పరిశ్రమలు ఈ వ్యాధియెడల జ్ఞానము నభివృద్ధిపందింప జేసినవి, ఈ వ్యాధి, ఇండియాదేశమునందు కంటే, మలయాదీవుల యందును, చీనా, జపాను, దేశములందును, విశేషముగ వ్యాపించి యున్నది. ఫిలిప్పయిను దీవులయందు యింకను విశేషముగ వ్యాప్తిపందియున్నది. ఆస్ట్రేలియా దేశమునందును ఆగ్నే డక్కడ యీ వ్యాధి ప్రవేశించి యున్నది. దక్షిణ ఆమెరికా కొన్ని భాగములయందును యీ వ్యాధి కనబడుచున్నది.

ఉడుకు, జననమర్తత వాయువునందు తేమ అధికముగానుండుట, భూప్రదేశము చెమ్మగిలియుండుట—యీవ్యాధి కనుకూల కారణములై యున్నవి. ఉష్ణదేశములలో వర్ష ఋతువునం దీవ్యాధి అతిశయించి యుండును. ఇతరదేశములందు వసంతఋతువునందు శరదృతువునందును, యీ వ్యాధి యెక్కువగ వ్యాపించియుండును. ఈవ్యాధి సంబంధమగు పురుగులు మనుష్య శరీరమునందు బ్రవేశించునని కొందరి అభిప్రాయమై యున్నది. ఈ పురుగులు శరీరమునందు బ్రవేశించక, భూమిలోనుండియే విషమును వెడలింపజేయుననియు, అట్టివిషమును బిట్టలు మూలమునగాని, మింగుట మూలమునగాని, యీవ్యాధి సంభవించు ననియు మరికొందరి అభిప్రాయమై యున్నది. ఈ రెండవ అభిప్రాయమే యెక్కువ ఆమోదమును పడసియున్నది.

జపానుదేశమునందు చేయబడిన పరిశోధనల వలన తెల్లబియ్యమును భుజించెడి వారల యందు యీ వ్యాధి వ్యాప్తత జెందుచున్నదని తెలికొనబడెను. ఉప్పుడు బియ్యమును తినెడి వారలకు యీవ్యాధి రానేరదు. కాని తెల్లబియ్యమును భుజించెడి వారలయందును చాల మంది యీ వ్యాధికి లోనుగాకుండుటను జూడ, యందునకు యితరమగు కారణమేదియో సహాయకారక సుంపునని తలపవలసి వచ్చుచున్నది. ఎట్లయినను, యితర కారణములకు దోడుగ నీ తెల్లబియ్యపు భోజనము సమకూడి నపుడు యీవ్యాధి ప్రవేశించునని స్పష్టమగుచున్నది. ఫ్రైయిట్స్ నెటిల్స్ లో కొందరు మనుష్యులు తెల్లబియ్యమును భుజించుటకు ప్రారంభించిన ఆరువది దినము లలో నీ వ్యాధిని గ్రహించిరి. ఉప్పుడుబియ్యమును భుజించుచున్న కొందరికి యీవ్యాధి కలుగలేదు.

ఫిలిప్పయిను దీవులలో నొకపటాలమునకు ఆహారమునకై అదివర కిచ్చుచున్న 20 టొన్నుల తెల్లబియ్యమును మాన్చి 16 టొన్నుల ఉప్పుడు బియ్యమును యిచ్చుట ఆంభించిరి. ఆహారమునందు మార్పుచేయుని 1908, 1909, సంవత్సరములలో 619 యను 553 యను

ఈ వ్యాధిని గ్రహించిరి. ఆహారముగలను జేసిన పిమ్మట 1910 సంవత్సరములో 500 మంది యీ వ్యాధిని గ్రహించిరి. 1911 సం॥ నందు మొదటి ఆయిదు మాసములలో కొక్కడు మాత్రమే యీ వ్యాధిని గ్రహించెను. క్రియముగ నీ ఆహారముగల అంతటను కలుగజేసిన పిమ్మట యీ వ్యాధి మరల కనపడనే లేదు.

ఈ వ్యాధి, భాగ్యవంతులకును పేదవారలకును జీవించుచుండుటయందు వివేచిత లేకుండ గనే, గలుగుచుండును. మిక్కిలి పసిబిడ్డలకు దప్ప తక్కిన అన్నివయసుల యందును యీ వ్యాధి కలుగవచ్చును. ఇరువది ముప్పదియైదు సంవత్సరముల వ్యవస్థ వసున్నవనిది, యెక్కువ వ్యాప్తి నందియుండును. ఎనిమిది సంవత్సరముల లోపువయస్సునందును, వృద్ధులయందును, యీ వ్యాధి బహు అరుదుగ దట్టించును.

చి కి త్తు.

ఈ వ్యాధి వ్యాపించియున్న స్థలమునుండి రోగిని వెంటనే యుత్తరస్థలమునకు దీసికొని పోవలయును. ఆహారపదార్థములందు తేలికైనవియును బలమునిచ్చునట్టివి యును ఉపయోగింపవలయును. తాజాయైన కాకపదార్థములు, విత్తరసము, పాలు, గుడ్డు, మాంసము-- వీటిని ఉపయోగింపవలయును. ఈ వ్యాధియందు అన్నమును దినకూడదు. వ్యాధి ఉన్న తస్థితి యందుండినయెడల, రోగి పరుండి యుండవలయును. రోగి యెక్కువ జబ్బుస్థితిలో లేకుండినయెడల, శాహాటకుయిన గాలిలో నెక్కువ కాలమును గడపువలసి యుండును. పరుండు స్థలము, భూమికి మిగుల యెత్తయిర ప్రదేశమునందుండి, పొడిగను, వెలుతురు గాలి వచ్చునట్టిదిగను ఉండవలయును. మాత్రమును వృద్ధిపరచుటకుగాను, 30 మినియూల హెతాదులలో స్పీరిట్ ఈతర్ పైట్రోన్ ను పగటియందు మూడుసార్లు లియ్యవలయును. రాత్రులయందు 8 లేక 10 గ్రెయినుల పల్వీస్ ఇపికాక్ కోను యియ్యవలయును. వ్యాధియొక్క అత్యుక్రమస్థలయందు విరేచనకారిగ 4 వ బౌపథయోగమును వాడవలయును. గుండె కాయ నీరసతనండిన రేగుడలతోగూడి విస్తరిపు నందినయెడల క్రియము దప్ప కుండ టింక్చర్ డిజిటాలిస్ ను యియ్యవలయును. శ్వాసకృచ్ఛము యేర్పడినయెడల పైట్రోగ్లి సెరిన్ ను అలస్యము లేకుండ సంపూర్ణమయిన హేతాదులలో దరుచుగ నియ్యవలయును. లోహమును మొదటినుంచియు వాడవలసియుండును. దినమునకు 2 లేక 3 గ్రెయినుల వాడవచ్చును. ట్రిపిన్ ను కొద్దిహేతాదులలో నుపయోగించుట వలనను ఉపయోగ ముండవచ్చును. ఈ సందర్భమున 3 వ బలవర్ధకౌపథయోగమును వాడవలయును. రోగి వెచ్చనను గలుగజేయు దుస్తులను ధరించవలయును.

తుంటినొప్పి (Saiatica)

తుంటియొక్క వెనుకవైపునుండి పోవు పెద్దనరముయొక్క అస్వస్థతవలన నీవ్యాధి కలుగును. ఈ భాగములయందు ఉన్మత్తమయిన వెజ్జినొప్పి వ్యాపించియుండును. కదలుటవల

నను ఆభాగములయందు ఒత్తి పెట్టుటవలనను బాధ అధికమగును. జలుబువలన గాని, తడి స్థలమందు గూర్చుండుటవలనగాని, యీవ్యాధి తటస్థింపవచ్చును. ఒకప్పుడు నులబంధము వలనను గలుగవచ్చును. ఈ సందర్భమునను నొప్పి యెడమ నైపులమందును, విశ్రాంతి తీసి కొని ఆ భాగమునందు వెచ్చనైన దుస్తులను ధరించుచు వేడి కాపడములను గాచుచు మిగుల బాధగానున్న చోట మస్తకపట్టీలను వేయవలయును. 4 వ ఔషధయోగమును విరేచన కారిగ నియ్యవలయును. వాతరోగముతో సంబంధించిన విషయములందు అందులకుగ జకి తనను వేయవలయును. 15 గ్రాముల సోడా నేలినైలిస్ తో 5 గ్రాముల ఆంటిపైరిన్ ను గలిపి ప్రతినాలుగు గంటలకును యిచ్చుటచే ఉపశాంతి కలుగ గలదు. ఎలిక్టిక్ వ్యాధిరీతి ఉపయోగించుట వలన నొకప్పుడు గుణమియ్యగలదు.

దగ్గు.

దగ్గు, ప్రత్యేకించి ఒక వ్యాధికంఠ; యితర అస్వస్థతలయొక్క ఒకలక్షణ మయి యున్నది. దగ్గుయొక్క గుణము దానికగు కారిణము ననుసరించియుండును. శ్వాసకోశముల నుండి రక్తమును గ్రహించుకొను వ్యాధియందు రక్తము వెలువడును. శ్వాసకోశముల ననుసరించియుండి పొంలయొక్క వాపుదలయందు ప్రక్కభాగములందు పొట్లతో గూడియుండును. కింకవాణు సంబంధమగు దగ్గునందు లోహసంబంధమగు ధ్వని వహించియుండును. పొంగునందు, ముక్కు వెంబడి ద్రవపదార్థము వెలువడును. కండ్లవెంబడి నీళ్లు కారును. శ్వాస సంబంధమగు పడిసెము (రొమ్ముపడిసెము) నందు, దగ్గువెంబడి జగట యైనట్టి కఫము వెలువడును. బిడ్డలకు పండ్లు వచ్చునపుడును, దగ్గురాత్రులయందు విశేషముగ నుండును. కొండనాలుకయొక్క వాపుదలయందును, కర్ణరోగములయందును, హిస్టీరియావ్యాధియందును, జీర్ణాశయము కారిణము అస్వస్థతలయందును, స్వరపేటికయొక్క అస్వస్థత యందును-దగ్గు కలుగ వచ్చును. ఈ వ్యాధుల యందును, యింక నితర వ్యాధులయందును, దగ్గు, స్పష్టమైనట్టియు ప్రధాన స్పష్టమైనట్టియు లక్షణముగా నుండును.

టింక్చర్ క్యాంఫర్ శో	ద్రాములు 3
స్పిరిట్స్ ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్			ద్రాములు 2
జలము	బౌన్సులు 8

ఉబ్బిన తెరల యందును, దీర్ఘవ్యాధితమగు శ్వాస సంబంధమగు దగ్గుల యందును, ప్రతి రెండు లేక మూడు గంటలకు ఒకబౌన్సు చొప్పున వ్రేచుందును యియ్య వలయును.

టింక్చర్ క్యాంఫర్ శో	ద్రాములు 3
వైసం ఇసి కాక్	ద్రాము 1
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రస్	ద్రాములు 3
జలము	బౌన్సులు 7

జలుబువలన గలుగు దగ్గుయందును, యితర విధములగు దగ్గులందును, కఫము వెలువడక పోయినయెడల, యీమందును ప్రతి మూడు లేక నాలుగు గంటలకు ఒకబౌన్సు

చొప్పన నీయవలయును. ఒక సంవత్సరము నయనునందున్న బిడ్డలకు ఒక ద్వాయు చొప్పన నియ్యవలయును. ఇంతకు మించిన పత్తి సంవత్సరము వయసునకును, మేతాదును సంవత్సరమున కొక ద్వాయు చొప్పన హెచ్చింప వలయును.

దద్దురోగము. (Erysipelas.)

ఈ దద్దురోగము, ఒకవిధమగు పుగుగుమాలమున చక్కము యొక్క కొంతభాగమును అందుకొంది సామ్యపుల యొక్క శ్లీకలును, ఉబ్బుదల నందుటవలన గలుగుచున్నది. శరీర మయొక్క సహజసర్వులత్వమువలనను, తాగ్రుడు అధికమగుట వలనను, చెడుఆహారము వలనను, పరిశుభ్రతను ఆరోగ్యసంబంధమగు పద్ధతులను గవనించక పోవుటవలనను, కొన్ని ఆకుప తులనుండియు జెయిలంభానాలనుండియువచ్చు దుర్వాయువునకులొనగుటవలనను—యావ్యాధి సంభవించుచున్నది. ఈవ్యాధిముఖముమీద నెక్కువగా గలుగుచుండును, దన్నుభాగముమెదయును యెర్రైనెమటగలిగిమిగుల వాపుదలనందియుండును. ఈదద్దురువలన నొకప్పుడు ముఖమునుగర్తించుటకే పీలు లేకుండును. చలి, వణకుట, తలనొప్పి, హఠి వచ్చునట్లుండుట, పిమ్మట వాంతి కలుగుట, ఉద్రుత జ్వరము, మలబంధము—యీలక్షణములతో గూడియుండును. ఈ వ్యాధి పసిదినములు మొదలు పడునాల్గు దినములవరకు వ్యాపించి, యందులో నాణుగదినములు ఉబ్బుదల అతిశయములు పుండ్లు యేర్పడిన పిమ్మట పొగులుగా నూడిపోవును.

ఆత్మద్యుతావస్థయందు 105—104 డిగ్రీల జ్వరమంది, సందిగుముగూడ కనుపడ వచ్చును. అస్వస్థతాభాగమందు పోటు విశేషముగానుండి మాలిన్య మేర్పడిన ప్రణాములుగా చేలి, మిగుల ఆపాయకరమై యీవాపుదల మెదడునకు వ్యాపించిన యెడల శీఘ్రముతో మరణము సంభవించినను సంభవించువచ్చును.

పుండ్లుపడిన భాగములయందుగాని, శస్త్రమునందిన భాగములయందుగాని, టీకాలు వేసినప్పుడుగాని, చుట్టుభాగమంతయు యెర్రైన ఉబ్బుదల నందియున్నపుడు యీవ్యాధి తటస్థించువచ్చును. ఒక గాయమునం దీవ్యాధి ఆవరించినపుడు స్రావము ఆగిపోయినను పోవును. గాయము దాదాపు కుదిరిక నందియుండిన యెడల తిరిగి తెరపు నందును.

చి క త్న.

అస్వస్థతభాగముపైన వేడినీళ్ళలోమంచిన లింట్నువేసి, పైన చమురుగుడ్డను వేయ వలయును. చుట్టును యెర్రగానున్న భాగముపైన 1 జొన్ను బలములో 10 గ్రెయినుల సిల్వర్ నైట్రేట్ను గలిపిన సాల్వ్యాంనును రెండు అంగుళముల మేరను రాయవలయును. ఇట్లు రాయుటవలన వ్యాధి వ్యాప్తత నందనేరదు. 4 వ జొషధయోగమునుగాని చిట్టాము దమునుగాని విశేషనకాంగ నిచ్చి రోగియొక్క బలము తగ్గకుండునట్లు మంచి ఆహారము నిచ్చుచుండవలయును. 5 గ్రెయినుల ఫెనాసిటిక్ 4 గ్రెయినుల సిల్వర్ను గలిపి పత్తి నాలుగుగంటలకు జ్వరము తగ్గుటకుగాను యియ్యవలయును. బొబ్బలుగా చేలినయెడల మిగుల పెద్దవైన నీ తప్ప వాటినిగిల్లకూడదు. మాలిన్యమేర్పడినయెడల శస్త్రముఅవసరమయి యుండును. కార్బలిక్ లోషనుతో దీనిని గడిగి ఆయెడో ఫారమును వేసి జ్యైన్ చేయ వలసి యుండును.

రోగి పగుండు స్త్రీమునకు పరిశుభ్రమగుగాలి వన్చునట్లుండవలయును గాలియొక్క పీనుటలు మాత్రము రోగిపై రాకుండ నుండవలయును. రోగి యెడల మీగుల శుభ్రతను గాపాడవలయును. ప్రక్కపైబట్టలను తరుచుగ మార్చుచుండవలయును. రసించే వలినమునం దిన గుడ్డలను వెంటనే దీసివేయ వలయును. ఇట్టి వస్త్రములను కార్పాలికు లోషనుతో గడుగవలయును. రోగియొక్క విరేచనముల యెడల కూడ జాగ్రత్తను వహించి యుండ వలయును.

దాహము.

అతిదాహము వ్యాధియొక్క లక్షణమయి యున్నది. అరోగ్యస్థితి యందలి దాహము శరీరములోని రక్తమునందలి జలభాగము యొక్క హీనతను సూచించును. అతిదాహము కొన్ని విధములను అట్టి వ్యాధులనుగూడ నంటిచుండును. ఇది అతి మాత్రవ్యాధి యొక్క ప్రధానలక్షణమయి యున్నది. అన్ని విషయములందును దాహమును నిలుపుచేయుట బగాను పరిశుభ్రమగు జలమును మితముగ నుపయోగింప వచ్చును. వ్యాధి కుండలి అతిదాహమునకు సిక్యేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను తగు మోతాదులలో నుపయోగింపవలయును.

ధాతునష్టము

(మాత్రగ్రంథుల యొక్క క్షీణదశ)

మాత్రగ్రంథుల యొక్క అస్వస్థత అనేక విధములుగ నుండును. మాత్రగ్రంథుల యొక్క వాపుదల వలన నొకవిధమగు వ్యాధి వ్యాపించుచున్నది. శరీరమునందు గ్లాస్ స్థితి యేర్పడుట వలనను, సారాయిల స్రోవక ద్వారగుట వలనను, —మాత్ర గ్రంథులకు యింకొక విధమగు అస్వస్థత యేర్పడును. త్రియవ్యాధి యందును యితరములగు అలసటను కలుగజేయు వ్యాధుల యందును, మరియొక విధమగు అస్వస్థత పుట్టును. వ్యాధి యేవిధమ గునది యైయున్నను, మాత్ర గ్రంథులయొక్క నిర్మాణమునందు కొన్ని మార్పులు కలిగి, పలువిధములగు లక్షణములు కనపడును. మిగుల ప్రాముఖ్యతను వహించినట్టి ఆరంభ లక్షణము, మాత్రమునందు అల్బుమిన్ ఆనబడు శ్వేతధాతువు నష్టమగుట, అయి యున్నది. ఇది కంటికి గనబడదుగాని, దీనిని కొంచెముగా నొక గాజు గొట్టములో గాని, ఇనుము తీక పెండి చెమిచాలో గాని, వేసి కాచిన యెడల, అల్బుమిన్ ఉండి యుండినచో నిడికొద్దియో గొప్పయో తెల్లగానగును. ఒకటి లేక రెండు చుక్కలబలమగు నైట్రిక్ ఆసిడికి ను గలిపి నచో, నమోతయి స్వచ్ఛమయిన వర్ణమును దాల్చినయెడల అల్బుమిన్ ఉండియున్నదని స్పష్టమగు నిదర్శనముగా నెంచవచ్చును. మాత్రమునందు అల్బుమిన్ ఉండియున్నంత మాత్రమున మాత్రగ్రంథి క్షీణదశన ది యున్నదని యెలప్పుడును అనుకొనుటకు వీలులేదు. చన్నీర్లలో స్నానముజేసిన పిమ్మట గాని, మిగడ, పిండివంటలు, గును మొదలగు అపకర పదార్థములను భుజించిన పిమ్మటగాని, ఒకప్పుడు మాత్రమునందు అల్బుమిన్ తెలివద

వచ్చును. ఏకారణము వల్ల సెనను ఆజీర్ణత ప్రవేశించి యుండిన యెడలను, కొందరి యొక్క మాత్రమునందు యీవ్యాధి కనుపడ వచ్చును. కారణము అస్వస్థవాచనముననుండి ప్రేమముగా బనిజేయబడినపుడు, లేకుదలను గలుగజేయు కొన్ని అల్పములను మాత్రగ్రంథులకు పోనిచ్చుటవలనను, అల్బుమిన్ మాత్రమునుండి వెలువడవచ్చును. చలిజ్వర స్కాల్డెట్ జ్వర వ్యాధులయందును, యీవ్యాధుల పిమ్మటను, ఒకప్పుడు యిట్లు తటస్థింపవచ్చును. కొందరియందు, అధిక స్నాయు పరిశ్రమను పిమ్మట నిది కలగవచ్చును. ఈ యన్నివిషయములందును మాత్రగ్రంథుల యొక్క క్షీణదశ లేదనియే జెప్పవచ్చును. మూత్రమునందు, అల్బుమిన్ కు పోడుగా, మూత్రమును స్పృశించు మూత్రనాళములయొక్క పొర సంబంధమగు పదార్థములు కనుగొన బడినయెడల, మూత్ర గ్రంథులయొక్క క్షీణదశ ఉండి యున్నట్లు నిశ్చయింపదగియున్నది. ఈపొర సంబంధమగు పదార్థములను కనుగొనుటకు, మూత్రమును నూత్నదర్శన యంత్రముచే బరితీ జేయవలసి యుండును. మూత్ర గ్రంథుల యొక్క క్షీణదశను కనుగొనుటకు, అల్బుమిన్ ఉండుటయేగాక ఆరంభదశయందు యీ కింది లక్షణములను కనుగొన వగును. (1) మూత్రము యొక్క పరిమాణమునందు తగ్గుదల (2) మూత్రమును విసర్జించుటకు రాత్రులయందు ఆసక్తమారులు నిద్రలేచుట. (3) వెన్న యొక్క క్రింది భాగమునందు యొకపిదమగు నొప్పి (4) అజీర్తి (5) స్పష్టమగు కారణమేమియు లేకుండ నీరసత ఇట్టి లక్షణములతో కూడి మాత్రమునందు అల్బుమిన్ ఉండి యుండిన యెడల, యీవ్యాధి స్పష్టముగా నుండియున్నదని జలంపవలయును. వ్యాధి అభివృద్ధి నందినకొలదిని తలనిొప్పి, మత్తు, పాలిపోవుట, కండ్లయొద్ద ఉబ్బుదల జూపుట, ఊపిరిని బిల్బుటయం దా యాసము, ముఖ్యముగా రాత్రులయందు దరుచుగా మూత్రమును విసర్జింపవలెననిడి యిచ్చు అజీర్తి లక్షణములు, వాంతి వచ్చునట్లుండుట, వాంతికునుట— యీ లక్షణములు వ్యాపితనందుచుండును. అనంతర గతులయందు తరుచుట నంజు ప్రవేశింపవచ్చును. శ్వాససంబంధమగు అస్వస్థతలు, మూర్చలు, అంగవికృతిరొగము, కలగవచ్చును.

చి కి త్న.

మాత్రముద్వారా అల్బుమిన్ అనబడు శ్వేతభాతువు నష్టమగునట్టియు, మాత్రము చేరకు మాంసగ్రంథి క్షీణదశ నందునట్టియు, వ్యాధులయందు బహు భాగముగా చికిత్స చేయవలసియుండును. ఈ వ్యాధియొక్క ఉద్యోగగతులయందు రోగిని పెంట్లనే పరుండ ఇట్టి ఉద్యోగ లక్షణములన్నియు తగ్గువరకును, రోగి చలి గాలి తగలబడునట్లు చేయవలయును. ఈ వ్యాధియందు ఆహారపదార్థములుగ, పాలు, బాల్డ్లీక్సు, జావలు, మాత్రమే ఉపయోగింప వలయును. మాంస సంబంధము లగునవి మాత్రగ్రంథులకు బనిని యొక్కర జేయునుగాన, వాటి సంతమాత్రమును ఉపయోగింప గూడదు. వ్యాధి మిక్కుటమగు ఉద్యోగ గతి యందుండిన యెడల, దినమున కంతయు ఒకటి లేక రెండు సైట్లు పాలరు సోడావాలరుతో గాని బాల్డ్లీక్సుతో గాని కలిపి యియ్యవలయును. ఆకలి మందగించి యున్నపుడు, ఎన్నడును యింతకెక్కువగ నియ్యగూడదు. సాధుగతులయందు మూడు లేక నాలుగు సైట్లును యియ్యవచ్చును.

దాహము నణచినేయుటకు గాన, సాయస్యజలమును గాని లేమనేదనను గాని పిరి విగా దాగినచున్నను. సారాయి పదార్థములను ద్యజింపవలయును. ఉష్ణ ద్రవపదార్థములను దాగిగుటవలెనను, శరీరమునకు ఆవిరిని బట్టుటవలెనను, రోగికి ఆడుగునను వైసయును వెచ్చగఁగునట్లు దుప్పట్లను గప్పియుంచుట వలెనను, చెమట పుట్టనట్లు చేయవలయును. వెన్నువయిపుల నొప్పి అధికముగా నుండినయెడల, కాపడములను గాచవలయును. టింక్చర్ జాబరాండిని 30 మినిముల చొప్పున నాలుగు గంటల కొకసారి యిచ్చుటవలెన చెమటను వృద్ధిపరచును. గాని, దీనివలన కొందరకు గుండె అస్వస్థత గలిగి క్షీణగతి సంభవించుటయు, కొందరియందు కడుపులో తిగిప్పు వాంతి గలుగుటయు, సంభవించునుగాన, యీ మందును బహు జాగ్రత్తతో నియ్యవలయును. సోడా సల్ఫేటును గాని, మెగ్నీషియా సల్ఫేటును గాని, కొద్ది మోతాదులలో నిచ్చుచు, విరేచనము యెక్కువ ద్రవరూపమున నగునట్లు చేయవలయును. విరేచనములు అధికముగ గాఢుండగను, యిందువలన నిస్త్రావిణ గలంగతుండగను, జాగ్రత్తను వహించి యుండవలయును.

రక్తమునందు మాత్రము గలిసి యుండు స్థితి సంభవించిన యెడల, చెమట యధిక మగునట్లును, విరేచనముల సులభమున అధిక ద్రవపదార్థము వెలువడు నట్లును, పనిచేయవలయును. నంజా ఉండియుండిన యెడలనచ్చు, యీ జీకెన్ నే అధికముగ జేయవలయును.

వాంతి ఉండినయెడల, బిస్మత్ సబ్ సైట్రేట్ నిచ్చుచు, ఆహారమును గొద్ది పరిమాణ ములుగ నిచ్చుచుండ వలయును. గుండెకాయ విస్తరింపునందుట వలన నీరసతన వహించి యుండిన యెడల, డిజీటాలిన్ ను, స్ట్రిక్ నీన్ ను యియ్యవచ్చును. ఈ వ్యాధియందు మాత్రమును ప్రోక్సిపింపజేయు ఔషధముల నియ్యకూడదని జాలమంది తలంచును. గాని, పిట్టిని వాడుటవలన ఆపాయము లేమియు గలిగియుండలేదు. ఇందుకుగాను సిక్రేట్ ఆఫ్ పొటాష్, డిజీటాలిన్, కెఫీన్, మిగుల ఉపయోగపీయములు. పిట్టిలో చివరది మిగుల బలమగు మాత్రప్రోక్సిపకారి అయియున్నది. యీ వ్యాధియందు దీనియొక్క గుణము త్వరలో పట్టుబడిపోవును. జలమును విరివిగా నుపయోగించుట వలన మాత్ర ప్రోక్సిపకారిగ బని చేయును. ఉద్యుతిస్థితియందు శ్వేతిభాతునను దగ్గించు ఓవధి యొడియు గొప్పెట్టబడి యుండలేదు గాని, వ్యాధి శాంతిత నందిన పిమ్మట ఆర్సెనిక్ (పాపాణము) యీ విషయమున తరుచుగా నుపయోగముగ గనుగొనబడి యుండెను.

స్వస్థావస్థయందలి రక్తస్థానతై విరస్ ను ఉపయోగింపవలయును. వ్యాధి దీర్ఘవ్యాధి పక స్థితియందుండినను, ఆహార విషయములందును, శరీరమునకు చెమటను గలుగజేయు విషయము లందును, విరేచనకారక నిచ్చుట యందును, పై అంశము లనే గమనంపవలయును.

నంజా.

నంజా, యితగవ్యాధులయొక్క ఫలితముగ గాని, లక్షణముగ గాని, దట్టస్థించును. రక్తముయొక్క జలభాగము రక్తనాళములయొక్క పొరల గుండా వాటిని జాట్టి యుండెడి స్నాయువుల యొక్క ఆల్బిక్ లోనికి బ్రవేశించుటవలన యేర్పడెడి వాపుదల, నంజా అన

బడును. రక్తప్రసారమునకు గలిగెడి నేటియో అటంకము వలనగ న్నియు పునహించుండ నిలుచుట మూలమున నీవ్యాధి వ్యాపించునట్టి భాగములు, సామాన్యముగ పాదములను ఉదరమును ఆయియున్నవి. మూత్రగ్రంథులు, గండకాణ—నీటియొక్క వ్యాధులయందు, ముఖమును, ఒకప్పుడు శరీరమంతయును, యీ ఆస్వస్థత యేర్పడును. ఈ వ్యాధి బయటకు చేరినపుడు, ఆస్వస్థత భాగములను వేళ్ళతో నొక్కినయెడల గుంటలుపడి, యీగుంటలు క్రమముగా నగుకొనును.

సంజ, యింకొంది కారణములతో నేనివ్వలసిన గలగ నచ్చును. — గలిగలి తగుట, మూత్రగ్రంథుల యొక్క ఆస్వస్థత గుండకాణ యొక్క గాని క్వాసకోశముల యొక్క గాని, ఆస్వస్థత, కారిజముయొక్కగాని స్త్రీహముయొక్క గాని ఆస్వస్థత రక్తహీనత లేక పాండురోగము, ఋతుస్రావ సంబంధమగు ఆస్వస్థతలు, చలిగాలికిగాని చెమ్మకుగాని లోనగుటవలనను, శరీరమునకు విరివిగా పడుట గలుగుచున్నపుడు చల్లనిగాలిలో గూడ్చిండుట వలనను, సంజ కలుగవచ్చును. క్షయించుమున, చర్మముయొక్క వ్యాపారము ఆకస్మాత్తుగా నిలుపుచేయబడి, రక్తమునందలి జలభాగము స్నాయువులయొక్క అల్లికలయందు నిలివ చేయబడుటవలన, నీవ్యాధి కలుగుచున్నది. మూత్రగ్రంథులను దరుచుగ నస్వస్థతనంది, మూత్రగ్రంథులయొక్క క్షీణదశకు ప్రారంభదశగ దటస్థించినను, దటస్థింపవచ్చును. చలిగాలి ప్రోకుటవలనగాని, యితర కారణముల వలనగాని, చెమటపట్టుట నిలిచిపోయి, శరీరమంతటను ఆకస్మికముగ సంజాకనబడినయెడల, శోగికి చెమ్మగానుండునట్లు తగుజాగ్రత్తలను బుచ్చుకొని; పెగుల్పై బునిచేయించును, నీళ్ళు విరేచనము లగుటకును, శుభ్రపద్యయోగమును విరేచనకారక నియ్యవలయును, చర్మముపై బని చేయుటకుగాను, వర్షిన్ ఇపికాక్ కోను 5 గ్రెయినుల మేతాడులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును. మూత్రము అభివృద్ధి అగుటకు గదు ఆరద్రాము మేతాడులలో స్పిరిట్ ఈతర్ వైట్రీస్ను యియ్యవలయును. వేడినీళ్లస్నానములును ఉపయోగ నీయములగు నుండును.

మూత్రగ్రంథులయొక్క ఆస్వస్థత నలగలిగెడి సంజాయందు కనురెప్పలును బిసినేంద్రియభాగములును నడలింపునంది, పాదములును కాళ్ళును త్వగలో నస్వస్థత నందును. కారిజముయొక్కగాని స్త్రీహముయొక్కగాని ఆస్వస్థతవలన యేర్పడిన సంజాయందు ఉదరభాగము ముందుగా ఉబ్బుదల నందును. దీనివ్యాపితమగు త్రాగుబోతుతనము వలనను కొలుకు రోగము వలనను, జీర్ణాశయ ఆస్వస్థతవలనను, యిట్లు సుభనించును.

రక్తహీనతవలన గలిగెడి సంజ, వేగులలోని పురుగులవలన గలిగినదప్పు, యీ వ్యాధి అంతరావయవములకు వ్యాపించదు. ఈవ్యాధి, పాదములు చీల మండలు, కనురెప్పలు—యీ భాగములయందు మాత్రమే సామాన్యముగ నావరించి యుండును.

ఋతు సంబంధమగు ఆస్వస్థతవలన గలిగెడి సంజ, యెక్కువ అపాయకర మయినదిగాక, సామాన్యముగ పాదములను మాత్రమే ఆశ్చర్యించి యుండును. ఒకప్పుడు చేతులయందును ముఖమునందును గూడ ఉబ్బుదల కనుపడి, సాయంకాల నవయములందు అధికముగ నుండును.

ఈ అన్ని విధములగు సంబంధములను, ఆయా అంతరావయవముల యొక్క అస్పష్టత ఫలితముగ దెలియనగుచున్నవి గనుక, అట్టి అంతరావయవముల యొక్క అస్పష్టతను దగ్గర జీకిత్యుల గావించుటవలన, నివ్యాధి ఖరీదక నందగలదు. గుండెనంజను కగు జీకిత్యును గూర్చి మాత్రము యీక్రింద వివరించడ మయినది. మూత్రగ్రంథులయొక్క పీడనవలన గలిగెడి సంజన్మ అవ్యాధి సందర్భమున జూడనగును.

గుండెనంజనును జీకిత్యు:

గుండెయొక్క అస్పష్టత యేర్పడిన రోగియందు, జలుతురు, గాలి, శరీరసాధకము, నిశ్శాంతి, నిద్ర — పీడిత విషయమై బహుభాగ త్రను దీసికొన వలయును. అహారవిషయ మున, జీర్ణాస్వస్థత గలుగకుండ బలము నిచ్చు పదార్థములను బుచ్చుకొనవలయును.

గుండెఆవరణ ఉద్రుతావస్థయందుండినయెడల, రోగి పూర్ణమైన విశ్రాంతిని దీసికొన వలయును. ఏతీయన బరుండియుండిన రోగికి మిగుల సౌఖ్యకరముగ నుండునో, ఆతీయన బరుండియుండవలయును. శరీరమునందు ఉబ్బుదల యేర్పడకుండ, జీర్ణాస్వస్థత మాత్రమే ఉండియుండినయెడల, శేవలము ద్రవపదార్థములను మాత్రమే ఆహారముగ నిచ్చుచుండ వల యును. ఉబ్బుదల ఉండియుండిన యెడల ఆహారమునందు ద్రవపదార్థము అతిశయముగ నుండరాదు. గుండె అస్వస్థతలయొక్క విశేషగతులలో, యిందు సంబంధముగ బలవర్ధకావధ ములు అవసరములగును. ఈ బలవర్ధకావధములు టింక్చర్ డిజిటాలిస్, టింక్చర్ స్ట్రీఫాం తన్ నూ అయియున్నవి. జీర్ణాస్వస్థత గలిగియున్నపుడు, శీఘ్రముగ ఫలితములు కావలసి వచ్చిన యెడల, స్ట్రీఫాంతన్ ను ఉపయోగించుటయే ఉత్తమమయి యున్నది. నంజ అతి శయ్యచుగా నుండి, మూత్రపరిమాణము పీడమయి యున్నయెడల, డిజిటాలిస్ మెక్కువ ఉపయోగమయియున్నది. జీర్ణాస్వస్థతో గూడిన జలుబు ఉండియుండిన యెడల, కొద్దిమోతా దులలో, పిల్కూలా హైడ్రోజెన్ గాని, హైడ్రోజెన్ కంక్రేటా (గోవపుడగు) గాని, క్యాలాపెల్ (రసభస్మము గాని, ఇయ్యవలయును, నంజ మిగుల తీవ్రతగలిగియుండున యెడల, నీళ్ళుచిరేచనము లగునట్లు చేయు లవణసంబంధముగు విరేచనకారల (4 వ ఔషధ యోగము) జలము యెక్కువగ గలుగవకుండ నియ్యవలయును. మాత్రము విరివిగ యగునందు లకుగాను, సిటీట్ ఆఫ్ పాటామ్, అపీట్ ఆఫ్ పాటామ్ లను యియ్యవలయును. మాత్రమునందు అగ్నిమిక్ (శ్వేతధాతువు) ఉండియుండినయెడల, గుండె సంబంధముగ బల వర్ధకావధ ములు దీని పరిమాణమును తగ్గింపజేయును. గుండెసంబంధముగ బలవర్ధకావధముల వలన మాత్రము జలువడుట పూర్ణముగ నుండినయెడల, పైనజెప్పబడిన సిటీట్ ఆఫ్ పాటామ్ అసిటేట్ ఆఫ్ పాటామ్ లకు దోడుగా కెఫీన్ ను ఉపయోగించుటవలన మిగుల గుణముగా నుండును. నిద్రపట్టుకపోయినయెడల, కొంచెము బ్యాండ్ నైనను లేక సల్ఫానల్ నైనను యియ్యవచ్చును. నిద్రపట్టుటకును, రక్తప్రచారమును వృద్ధిపరచుటకును, లెకర్ మార్షియా హైడ్రోక్లోరమున్న ఉపయోగింపవచ్చును. పేగులయందు వాయువు కూడు కొని యుండినట్లుండి, ఉబ్బరమును గనుపరచి నపుడెల్లను, కార్బి కేబ్ మిక్చర్ ను యిచ్చు టవలన మిగుల ఉపయోగమందగలదు.

నడుము నొప్పి.

నడుము నొప్పి మందు, బాధ ఉద్దుతమగు, నడుము యొక్క స్నాయువులు పచ్చిగా నుండి, కదలుటవలన, బాధ అతిశయమయి, నడుముటచుండి నొగిని నిర్బంధ పరచును, ఈ స్థితి తరుచుగ నాకస్మికముగ గలుగచుచును. దీనిని ఒకవిధమున వాతరోగముగ నెంచ వచ్చును. ఈవ్యాధి ఒకప్పుడు తీవ్రము అలవాటులేని పనులను జేయుటయందు గలుగను. మాత్రగ్రింధులయొక్క అస్యస్థివలన గలిగెడి బాధకును ఈ బాధకును భేదమును గుర్తింప వీలుకాక పోవచ్చును. కాన, కదలుటవలన యీ నడుము నొప్పి భాధ అతిశయమగును. ఈ వ్యాధియందు, మాత్రములో శ్వేతప్రదార్థ ముండుటగాని, తమచగ మాత్రము విసర్జింపవలెననెడి యిచ్చగాని, ఉండదు.

చికిత్స.

ఈ నొప్పియొక్క తెరవచ్చుటగా ముందుగా మలబద్ధ మేర్పడి మాత్రము తీవ్ర వర్ణమును వహించి యుండినయెడల, 4 వ విశేషణ కార్యమును 8 గ్రేయిసుల పొటాష్ నైట్రేట్ ను గలిపి. దీనిని దినమునకు మూడు మోతాదుల నొప్పున నియ్యవలయును. విశేషము క్రిమముగా నగుచుండి, మాత్రము సాధారణ వర్ణముతో కూడి క్రిమపరచాణముల యందుండినయెడల, వేడికావడములతో గాదుట మిగుల నుపయోగముగ చుడును. మద్దర్లు పట్టిలను వేయవచ్చును. వెన్నుపైపుల వేడి చమురుతో రుద్దులయును గాతులయును బాధ ఉద్దుతముగా నుండినయెడల పల్విన ఇసిరాక్ కోసుకని, స్ట్రోల్ ప్రియడ్రీన్ ను గాని, ఉపయోగింపవచ్చును.

మాత్రము తీవ్రవర్ణమును వహించియు దినచో కీళ్ళనొప్పల కగు మందు నుపయోగించవలయును. జ్వరతగానుండియెడల డెయూంటిక్యులో 2 వ బొమ్మయొగము నుపయోగించవలయును. పైన రాయుటకు సమర్థములగు కిక్కుగతలము నున్న చిమరు నున్న గలిపి రాయవచ్చును. లినిమెంట్ ఆయెజిన్ నున్న పైన రాయవచ్చును. లినిమెంట్ క్లొరోఫా మనున్న లినిమెంట్ పీపియమునన్న గూడ పైనరాయుట నుపయోగింపవచ్చును. విద్యుచ్ఛక్తి సంబంధమగు బ్యాటరీని ఉపయోగించుటవలన నుపయోగముండ గలదు. అత్యుద్యోత వస్థలయందు మార్షియాను నూదిద్వారా లోనికి యింజిట్టు చేయవలసి యుండును.

నల్లంసకత్వము.

జననంద్రి యవయవము యొక్క కామవ్యాపారములకు అవసరమగు నరముల సంబంధమగునట్టిగాని, విద్యుచ్ఛక్తి సంబంధమగునట్టిగాని, రాకపోకలకు ఆటంకము కలుగుట వలన, నీ ఆవయవమునందు గలిగెడి నిర్వాహకత్వము నల్లంసకత్వ మనబడు చున్నది. ఈ ఆటంకమువలన, నీ యవయవమునందలి నరములయొక్క అల్లికలుగాని, స్నాయువులుగాని, దుర్బలతనంది, తమ స్వభావసిద్ధమగు శక్తిని నష్టమందు చున్నవి. ఈ అస్వస్థత,

సామాన్యముగ పురుషులయందు గలుగుటను గురించి చూత్రమే, వాడుకలోనున్నది. కాని స్త్రీలయందును యిట్టివిధముగ నన్వేషితం జూడెయ్యుండుటకు ఆస్పదము ఉండియున్నట్లు, శారీరకాస్త్రవృత్తులు చెప్పవచ్చును. స్త్రీలయందొట్టి ఆస్వస్థత ఉండుటకు పీలు ఉండియున్నదని దెలియనందున, స్త్రీలయందు గలుగు యీ విధముగ ఆస్వస్థత లోపమునకు సరియగు పదమా, ఆంధ్రభాషయందు నిర్మాణము నందియుండలేదు.

కామోద్వేగత యందు జననంద్రియ భాగములు ఘనతనండుటకు గాను, స్నాయువులు, రక్తనాళములు, నరములు—యివియన్ని సమకూడి పనిచేయువలయును. వీటిల్లొట్టి లోను ముఖ్యమయినది, నరముల సంబంధముగ—మెదడునందలియు, వెన్నుపాము నందలియు, కూపకమునందలియు—నరములయొక్క మధ్యస్థానములను, వీటినుండి యీ అవయవభాగములకు వ్యాపించు నరములయొక్క అవసానభాగములను, అయియున్నవి. కొన్ని నరములు తెగిపోవుట వలన నపుంసకత్వమేర్పడవచ్చును. ఈ నరములయొక్కయు, నరముల మధ్యస్థానముల యొక్కయు పరస్పరసంబంధములు, కొద్దికాలమువరకే చెడుటవలన గాని, వ్యాధివలన స్థిరముగ జెడుటవలన గాని, యీ ఆస్వస్థత యేర్పడవచ్చును. ఈ నరములయొక్క మధ్యస్థానముల యందుండి శక్తి ఉడిగిపోయినప్పుడు, యే మందుల వలనను యీ నష్టమును పూర్తిపరచుటకు పీలుండజాలదు.

సపుంసకత్వము కలుగుటకు సామాన్యమయిన కారణములు—ఇంద్రియమును దీసివేయుటయందలి కొన్ని దురభ్యాసములు, అధిక సంభోగము, సుఖసంబంధ వ్యాధులు—అయియున్నవి. గనోరియా వ్యాధియొక్క అతిశయ గతులందు సపుంసకత్వము కలుగును. కొలుకు రోగమునందును, ఒకానొకస్థితియందు సపుంసకత్వము తలస్థించును. ఈ రెండు వ్యాధులకును హక్కుదారుల విషయమై చెప్పనే అవసరములేదు. ఇట్టి వారలు తమవ్యాధి ఫలితములను సంతానములకు వ్యాపింపజేయుటకు పీలులేకుండ సపుంసకత్వ మేర్పడుట లోకమునకు పీలు గలుగుటయే గదా? ఒక పక్షవాతమునందును, పాండురోగమునందును, అతి మూత్రమునందును, ధాతు నష్టముయొక్క తీవ్రదశయందును, నీసపు సంబంధముగ విషప్రయోగము లందును, ఒకప్పుడు సపుంసకత్వము తలస్థింపవచ్చును. ఇట్టి విషయము లందు అయా వ్యాధులకు జీక్ష్మలను జేయవలయునుగాని, సపుంసకత్వమునకై జీక్ష్మజేయుచు ఆసలువ్యాధిని ఆశ్రద్ధజేయుట కూడదు. చుట్టూల్పుటయు, నల్లనందును వాడుటయు, ఆహారము అయినవారలయందు యీ ఆస్వస్థత యేర్పడుట కలగవచ్చును. గవదవ్యాధి యందు ఒకప్పుడు వృషణములు ఆస్వస్థత నందుటమూలమున, సపుంసకత్వ మేర్పడవచ్చును. గుల్మపుసవారి చేయుటయందును, బైసికిల్ సవారి చేయుట యందును, జీషలు సరిగా లేక జననంద్రియములయొక్క మృదుభాగముల కొత్తిడి దగులుటవలన, నీవ్యాధికి ఉద్యుక్తత యేర్పడవచ్చును. —

జీయప్రదమగు జీక్ష్మలను చేయుటకు గాను, మెదడునందలి భాగములకు బలమును గల గజేయు మందులను పయోగింపవలయును. అనుక్రమణిక యందు యీ వ్యాధికింద మాధింపబడిన బొంబములను బహు బాగ్యంత్రో వాడవలయును. ఇందు, దామియానా సంబంధ

మగు యక్ష్మాస్పిష్ట డామియానా (సాలిడ్)ను మాత్రల గాతేసి పుచ్చుకొనుటవలన, మిగుల ఉపయోగముగ గనుగొనబడెను. మెదడునకు బలమును గలుగజేయుటకు స్పీక్ నీస్ (విషముప్రే) నున్నూ, ఉపయోగింప నగును.

నాడీ వ్యాధి.

(తలనొప్పి చూడుడు)

నా లి కు రు పు.

నాలికురుపు సంబంధమున నాలిపురుగు, ఆఫీరీకా, దక్షిణ అమెరికా ఖండము బండును, యిండియా, పర్షియా, తురుష్కస్తాన. ఆరేబియా దేశములందును వ్యాపించి యున్నది. ఈపురుగు, ఒక అడుగు మొదలు ఆరు అడుగులవరకు పొడుగును, 1/10 అంగుళము లాపును, అగువరకు యెరుగును. ఈ పురుగుల యందు మగపురుగు తెలియబడి యుండలేదు. ఈపురుగు మనుష్యశరీరమందు త్రాగెడు మంచినీళ్ళద్వారా ప్రవేశించును. ఈపురుగు శరీరమునందు బ్రవేశించిన పిమ్మట మాడుమాసములకును పండ్రెండు మాసములకును గల మధ్యకాలములో నభివృద్ధి నంది కురుపుగా బయటికి బేలును. ఈకురుపులు సామాన్యముగా కాళ్ళపైనగాని పాదములపైనగాని బేలును. నాలి పురుగు, యిట్లు రోర్పడిన కురుపుద్వారా బయటికి మార్గమును గనుగొనిన పిమ్మట కుమారు పద్మనైదుదినములకు దాని యొక్క గర్భాశయమునుండి అండములను వెలిబుచ్చి మనుష్యశరీరమునుండి వెలువడి పోవుటకు సంసిద్ధము యుండును. ఈస్థితియందు దీనిని పైటికి లాగుటకు వీలుగనుండును. సాధారణముగ నొక్కసారి ఒక పురుగుమాత్రమే గనబడుచుండును; రెండు మూడు కనబడుటయు సామాన్యమయి యున్నది. ఒక్కొక్కపుడు దజ్వల కొలదియు కనబడవచ్చును. ఈ పురుగు బయటికి బేలు ముందర జ్వరమును దద్దురును కలుగవచ్చును. అస్వస్థతభాగ సమీపమున సన్నని దారమువలె నుండును. ఈపురుగుతెల్లగా నుండును.

చికిత్స.

నాలిపురుగు వ్యాపించియుండిన ప్రదేశమునందు ఆనుమానస్థలముల యందలి ఖంబి నీళ్లను గాచి త్రాగవలయును. మంచినీళ్ళ స్థలములకు సమీపమున నీవిధమున కురుపులను గడగనియ్యగూడదు. పురుగుయొక్క కొన బయటపడగనే ఒక చిన్న పుల్లకు దీనినిబాట్టి, యీ పుల్లతో బురుగును అనుదినమును కొంచెముగా బయటికి లాగుచుండవలయును. పురుగు తెగి పోకుండునట్లు పటికనీళ్ళతో దడిపి లింబును గట్టవలయును. ఇట్లు చేయుటవలన పురుగు తెగిపోకుండ గట్టిపడగలదు. పుల్లతో నీపురుగును పైటకులాగుటలో బహు సమ్మదిగా లాగవలయును; ఒకప్పుడు ఒక అంగుళము మాత్రమే పైటికి వచ్చును; ఒక అడుగువచ్చినను రావచ్చును. పురుగుయొక్క మార్గమున కొంచెము చమురుతో యిది రుద్దుటవలన దానిని సడలింపు నందజేయును. అస్వస్థతభాగమున భారగా నీళ్ళను బోయుటవలన, పురుగును బయ

టికి లాగుటయందు నీలుకలుగును. పురుగు తెగిపోయినయెడల కురుపుగాదేలి జ్వరము పొరంభింపవచ్చును. అంతట పిండికట్లను గట్టి మాలిన్యమును దొలగింపవలయును; పురుగుయొక్క కొన మరల నందినయెడల వెనుకటివలెనే జేయవలయును.

1 కి 1000 చొప్పున చేయబడిన మెర్క్యూరీ పెర్ క్లొరైడ్ సాల్ఫ్యూరమును హైపో డెర్మిక్ పిచికారీతో పురుగుయొక్క శరీరములోనికి బంపినయెడల, పురుగు చనిపోవును. అంతట దానిని బయటికి తేలికగా పెవిధముననే లాగవచ్చును. ఒకచుక్క కార్బాలిక్ ఆసిడ్ నైనను పురుగులోనికి పిచికారీచేసి దానిని చంపి పిమ్మట బయటికి లాగవచ్చును.

నిద్రరామి.

నిద్రించుటకు యిష్టములేకుండ నుండవచ్చును; లేక, నిద్ర కలతజెంది యుండవచ్చును. పగటియందు నిద్రగలిగి రాత్రియందు నిద్రపట్టక పోవచ్చును. రక్తహీనతతో గూడియుండిన పాండురోగము మొదలగు వ్యాధులందు నిద్ర పట్టదు. ఆజీర్ణత, మనోవ్యాధి, మనోచేకత, ఆలస్యభోజనము, సారాయి, పొగాకు, రాత్రిలందు ఘోటయిన తేయాకునీళ్ళు, కాఫీలను ద్రాగుట, శరీరసాధకము లేకపోవుట, గాలి క్రమముగా జొరని గదులు, మిగుల కఠినమైన పాన్సులు, అతిదీడిమి, దోమలు — యీ కారణములతో దేనివల్లనైనను నిద్రపట్టక పోవచ్చును. అజీర్ణ వ్యాధికలవారు, భోజనమువెంటనే నిద్రించు యత్నించరాదు. రాత్రిలయందు సారాయి, పొగాకు, తేయాకునీళ్ళు, కాఫీలను ద్యజించవలయును, ఇట్టి వారియందు శరీర సాధకము అవసరమయి యున్నది. దినవ్యాపారమును గురించి రాత్రిలలో మనసునం దుంచుకొనక, కల్పనా కథలను జదువుటయు మానవలయును. మనస్సునకు పరిపూర్ణమైన విశ్రాంతి నియ్య వలయును. శరీరముయొక్క బలము తగ్గుదల యందుండినపుడు, రాత్రిలయందు తేలికయిన పదార్థములను భుజించుటవలన దేలికగా నిద్ర కలుగ గలదు. పరుండు గదిలోనికిగాలి బాగుగా వచ్చుచుండునట్లుండవలయును. ముడుసలులు గాని, రక్తప్రచారము దుర్బలముగ నున్నవారిలో గాని, పరుండునపుడు పాదములయొద్ద వేడినీళ్ళతో నింపియున్న సీసాలను బెట్టుకొనవలయును. పొటానియం బ్రొమైడ్ (1 వ అల్బరెటివు)ను పరుండు ముందర దీసి కొనవలయును. పగటి యందు నిద్ర కలుగుచు రాత్రియందు నిద్ర రాకపోవుట యందు, యీ ఔషధము మిగుల ఉపయోగముగ నుండును. జీర్ణావయవముల స్వస్థతయందుండి, విరేచనము క్రిమముగా నగుచుండిన యెడల, అప్పుడప్పుడు క్లోరల్ హైడ్రేస్ ను వాడనగును. క్లోరల్ హైడ్రేస్ ను అలవాటగునటుల మాత్రము ఉపయోగింపగూడదు.

నిద్రరోగము.

పట్టుమ ఆఫ్రికా యందు వ్యాప్తతనంది యున్న యీ నిద్రరోగము మొదడు సంబంధ మగువదిగా నెంచబడుచున్నది. ఈ కొన్ని నిర్దేశస్థలములకే చెంది యున్నదిగాని, యీ నిర్దేశ స్థలము లందలి మనుష్యులు యితరచేకముల కేగిన గొన్ని సంవత్సరముల

పిచ్చుట నీ వ్యాధిని జెందవచ్చును. ఈ మధ్యకాలములో నీ వ్యాధి శరీరము నందు పక్షము నందుచుండ వచ్చును. కొంతకాలము క్రిందట నీగ్రోవాతివారలు మాత్రమే యీ వ్యాధి నందుచుందురని యొక అభిప్రాయ ముండెడిది. గాని, యిప్పుడు అట్లు అనుకొనుటకు పీలు లేదని స్పష్టమయినది. ఈ వ్యాధి గలుగుటకు కారణము లింతవరకు నిశ్చయించబడి యుండలేదు.

లక్షణములు.

నిద్రోగము బహు నెవ్వరిగ బ్రవేశించును. క్రమముగా హెచ్చెడి మంద్యత, శరీరాయాసము, అప్పుడప్పుడు తలనొప్పి, తలతిరుగుట, జ్వరము, నిద్రమత్తుతోగూడిన ముఖము—యివి యీ వ్యాధి లక్షణములై యున్నవి. క్రమక్రమముగా పైకము అధికమయి రోగి, తనపనిని చూనివేసి; యింటిలో నేదియో ఒకమూల, పూర్ణమైన నిద్రనుగాని, అర్థ నిద్రనుగాని, ఆందుచుండును. కొంతకాలము పిచ్చుట భోజనము మానివేయును. రోగి యొక్క శరీరమునందలి చార్ల్యత తగ్గి, వణకుట, మూర్ఛయందలి గతులు, పక్షవాతము—యివి అన్నియు కలుగవచ్చును. వ్యాధియొక్క అభివృద్ధి యందు వెళ్ళివాని యందలి లక్షణములు తరుచుగ గనబడి పోవుచుండ వచ్చును ఒడలంతయు, పొడిగాను, మిట్టచల్లముగాను తరుచుగా పొక్కులతో గూడియ, ఉండును. మెదయొద్ద మేదన్ను పారెడు నాళములు సామాన్యముగ వాపుదలనందును, ఈ రోగి, నాలు గయిదు మాసములలో గాని, ఒక ప్పుడు నాలు గయిదు సంవత్సరములలో గాని, మంజము నందును. సకటున ఒక సంవత్సరమునకును, పడు నెనిమిది మాసములకును మధ్యకాలము యీ వ్యాధియొక్క కాలపరిమితి ఆయి యున్నది.

చికిత్స.

ఈ వ్యాధికి యే చికిత్సయు స్థిరముగ నుపయోగముగ నుండినదిగ, యింతవరకు గను గొనబడి యుండలేదు.

నీరుడుతి త్తియొక్క వాపుదల.

గాయమువలన, గాని, చలిగాలికి లోనగుట వలనగాని, మూత్రాక్రచ్చమువలని లేకు దల వలనగాని, గవోరియా వ్యాధియందలి “స్టిక్చర్” వలనగాని, నీరుడు తి త్తియొక్క వాపుదల కలుగవచ్చును. కొపేబా యొక్కగాని, కంతారిడిన్ యొక్కగాని, అధిక మోతా దుల వలనను యీ వ్యాధి కలుగ వచ్చును. పనిముట్లయొక్క ఉపయోగించుట యందలి నేర్పు తక్కువచేతను గూడ, యిట్లు కలుగ వచ్చును. స్త్రీలు లభికముగ నొప్పలు పడట వలన గాని, ప్రసవమైన పిచ్చుట మూత్రావిసర్జన చేయుటయందు దృశ్య వలనగాని, యాస్థితి కలుగవచ్చును. వణకుటతోడనుగూడ చార్లరంభమయి, మనోవిచారము, జ్వరము, చాహము బాధ, నీరుడుతి త్తిపైన ఒత్తిడివలన పచ్చిగా నుండుట—యీలక్షణములతో గూడి యుండును. ప్రయాసమీద మాత్రము కొద్ది పరిమాణములుగ తరుచుగ, వెలువడుచు, బాడఅధిక

మనుచు, మంట్రతో గూడియుండును. మూత్రమునందు పొగ సంబంధమును పదార్థములును, ఒకానొకప్పుడు రక్తమును, ఉండియుండును. ఈ వాపువలన, బహు అరుదుగ పేగులకు వ్యాపించుటయు, మూత్రగ్రంథాలకు వ్యాపించుటయు కలదు. ఈ రెండవ గతియందు మూత్రము నిర్బంధింపబడి రోగికి సంధిగుళియు జనించి రక్తమునందు మూత్రము కలియుటయు యేర్పడవచ్చును.

చి కి త్స.

ఉడుకునీర్లలో స్నానము చేయుటవలన ఉపశాంతిగలుగగలదు. పేగులయొక్క అడుగు భాగములందు వేడికాపడములను గాచవలయును. బాన్స్ నీర్లను ఆహారముగా నిచ్చుచు, వ్యరము ఉండినయెడల సిఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను యియ్యవలయును విరేచనకారిగ 4 వ బౌచధయోగము నియ్యవలయును రాత్రులందు 10 గ్రెయినుల పల్మిస్ ఇపికాక్ కోను గాని, 15 గ్రెయినుల క్లోరల్ హైడ్రేస్ ను గాని, యిచ్చుటవలన గుళిము కలుగగలదు. ఒడలు వేడిగానున్నా బొడిగానున్నా ఉండినయెడల, మొదటి బౌచధము మిగులఉపయోగ ముగ నుండగలదు. రోగి కరుండియే యుండునట్లుల జేసి, పాలు మొదలగు తేలిక పదార్థములనే ఆహారముగ నిచ్చుచు, మత్తుపదార్థములను సంతృప్తముగ ద్యజింప జేయవలయును.

నీరుడుతి త్రియొక్క రేగుదల.

స్వప్నముగ కారణములేకుండ మూత్రము విసర్జింపవలయు ననెడి తరుచుగ గలుగు యిచ్చవలన నీరుడుతి త్రి రేగుదల నందియున్నట్లు గ్రహింపవచ్చును. మూత్రకృచ్ఛమువలన నను, నీర్వాధి కలుగవచ్చును. పేగులయందలి పురుగులవలనను యిట్లు కలుగవచ్చును. ఋతువు మారి శీతలత ప్రజేపించినపుడు ఒకప్పుడు క్వాడ్రికాలమువరకు యీమార్పు కలుగ వచ్చును. కారభుద్రవములను దాగుటవలనగాని, బలహీనత వలనగాని, ఒకప్పుడు యిట్టి రేగుదల యేర్పడవచ్చును. పెద్దవార లందు మూత్రమును నిలిపియుండుటకు శక్తి తప్పిపోయి నపుడును, యీలోపమును గలిగించుటకు స్వప్నముగ వ్యాధిగాని కారణముగాని కనుపడ నపుడును, రాత్రులందు 15 గ్రెయినుల క్లోరల్ హైడ్రేస్ ను యిచ్చుమండుట వలన తప్పక గుళి మియ్యగలదు. వ్యాధి తగ్గిన కొలదిని యీమోతాదును కూడ తగ్గించుచు, దీని అల వాటును దప్పించవలయును. కొట్టిపదార్థములైన ఒకచుక్క క్రియోసోట్ నువేసి మూత్రగా జేసి, పుచ్చుకొని నందువలనను గుళిమియ్యగలదు. బిడ్డలు నిద్రలో మూత్రమును విసర్జించు టను ఆపు జేయుటకు, 5 మొదలు 10 చుక్కలవరకును టింక్చర్ బెండోనాను యియ్య నగలదు.

న్యూమోనియా.

“డిప్లోకాకన్ న్యూమోనియా” లేక “న్యూమోకాకన్” అనబడునట్టి పురుగుల యొక్క వ్యాపారమువలన, క్యాసకోక మయొక్క స్థానికాభివృద్ధి యేర్పడిన గుర్తులతో

డను, లక్షణములతోడను, గూడియుండి, శరీరప్రకృతిసంబంధమైన ఉద్యోతమును కలతలలో రక్తప్రచార సంబంధమైన ముఖ్యమయియుండిన, తీవ్రమును అంబుసంబంధమైన జ్వరము—స్వప్రమానియా జ్వరమని పిలువబడుచున్నది.

ఈ వ్యాధి సంబంధమును పురుగులు శ్వాసమార్గముల ద్వారా శరీరమునందు బ్రవేశించును. ఆరోగ్యతయందున్న వారలయందును యీ పురుగు లుండియుండ నచ్చును. కాని, యీ పురుగులు సంఖ్యయం దెక్కువ అయియుండినపుడు గాని, యితర సహాయ కారణముల వలన యీ పురుగులు స్పృశ్యపులయొక్క అల్లికలను దుర్బల పరచుటయందు జయము దుటవలన గాని, యీ వ్యాధి కలుగుటకు మార్గమేర్పడవచ్చును. స్వప్రమానియా జ్వరము తరచుగ వచ్చుచుండెడి గృహములయొక్క నల్లింటి యందును, కప్పపైసయందు, యీ వ్యాధి సంబంధమును పురుగులు గనుగొనబడి యుండినట్లు తెలియుచున్నది. ఈ పురుగులు శ్వాసమార్గము ద్వారా శ్వాసకోశములయందు బ్రవేశించి, ఈ ఆవయవములందు స్పృశ్యమును హాని గలుగ జేయుచున్నవి. మెదడు, మూత్రగ్రంథి, ప్లీహ, రక్తము యీ భాగములందును యీ పురుగు కనుగొనబడుట వలనను, యితర ఆస్పృశ్యతలు కలుగుచుండుట వలనను, యీ వ్యాధి యొక్క పర్యవసానము యింతటితో సమాప్తమగుట లేదని గ్రహింపవలెను. ఈ వ్యాధి సంబంధమును పురుగులు ఒకవిధముగా విషమును వెల్లివిడుపుటవలన నీశరీరకలత కలుగుచున్నదని ఊహింప బడు చున్నది. ఈ విషయమునను విరుగుడుగా బని చేయుటకు, రక్తమునందు “అంటి స్పృమోటాక్స్ నైక్” అనబడు మరీయూ పదార్థము పుట్టుక నందుచున్నది. ఈవ్యాధి నుండి స్వస్థతనందిన వారలలో వారిజిమ్మియందు యీ వ్యాధిసంబంధమును పురుగు ఒకసంవత్సరమునకు మించిన కాలము వరకు, ఉండియుండునని కొందరి వలన గనుగొనబడినది.

సహాయ కారణములు.

1. శీతోష్ణస్థితి:—వాయువునందు గలుగుచుండెడి ఆకస్మికముగు మార్పుల వలన నీ వ్యాధికి ఉద్యోతత యేర్పడునుగాన, తరుచుగ చలికాలికి లోనగు వారియందు యీవ్యాధి యెడల సుద్యోతత తక్కువగా నుండును. సావితుల కంటె పట్టణములయందు నివసించు వారలు యీ వ్యాధియెడల నెక్కువ ఉద్యోతతను వహించి యున్నారు.

2. లింగము:—ఈవ్యాధి స్త్రీలయందుకంటె పురుషులయందు నెక్కువ వ్యాప్తత నందియున్నది. కాని, స్త్రీలయందు గలిగిన విషయములందు వరణము తక్కువగా నుండి యున్నది.

3. వయస్సు:—పదిసంవత్సరముల లోపు వయసు నందు ఈవ్యాధి యెక్కువ తరుచుగ గలుగుచున్నది. పిమ్మట యిరువదియైదు సంవత్సరముల వరకును దక్కర అయి యున్నది. తరువాత, నలభదియైదు సంవత్సరముల వరకును సాధారణముగ గలుగుచున్నది. అటు తరువాత వయస్సునందు స్వస్థసాధారణమై యున్నది.

4. వెనుకటి ఆరోగ్యత:—యీ వ్యాధియందు వెనుకటి ఆరోగ్యత మిగుల ముఖ్యమయి యున్నది. ఇన్ ఫ్లూయెంజా, టైఫాయిడ్, రొమ్ముపడిసెము, శ్వేత ధాతునష్టము, అతిమూత్రము, మొదలగు వ్యాధులయందు, యీ వ్యాధియెడల నెక్కువ ఉద్యోతత యే

ఛేదించును. ఈవ్యాధి ఒకసారి కలిగిన యెడల మరల మరల గలుగుట కుద్యుక్తత యే ఛేదించుండును గాని, యీవ్యాధియెడల రాహిత్యత కలుగనేరదు. ఒక మనుష్యునియందు యిరువదియేనిమిది పర్యాయములు యీవ్యాధి కలిగిన అంతము గ్రంథస్థమయి యున్నది.

శ్వాసకోశముల అస్వస్థత నందుటయందు ఒకప్పుడు ఒకకోశమే అస్వస్థత నందును; ఒకకోశము నందును, అస్వస్థతభాగము వృద్ధిపండు చుండును. ఒకప్పుడు కొంతకాలము పిమ్మట రెండవకోశము అస్వస్థత నందును. ఈస్థితిని గురించి నిర్ణయించుటకు పీల్చెనది కాదు. శ్వాసకోశములయొక్క అస్వస్థత భాగములందు రక్తము కూడుకొని వాయుబిలముల యొక్క ఉపరి భాగములు మడ్డిగానుండి, రక్తమును యితర ద్రవపదార్థములను స్రవించుచుండి, యీవాయుబిలములన్నియు రక్తమును యితర ద్రవపదార్థములను స్రవించుచుండి, యీవాయుబిలములన్నియు క్రమశాసనమున శరీరమువలననే పీల్చుకొనబడి, స్వస్థస్థానమున యేర్పడును. స్వస్థస్థానము దగ్గర యాహారములు కలుగ నంతవరకును, శరీరము నందలి జ్వరము మొదలగు కలతలు తగ్గకనే యుండును.

లక్షణములు.

ఈవ్యాధియందలి లక్షణములు, ఋతువులను బట్టియు, స్థలములను బట్టియు, రోగి యొక్క వయసును బట్టియు, వ్యాధికి పూర్వమందలి రోగియొక్క అరోగ్యతను బట్టియు, ఉండును. ఈవ్యాధి షక్యమందుటకు ఒకటిన్నర లేక రెండు దినములు పట్టును. వ్యాధి యొక్క ఆరంభమునందే ప్రక్క భాగములయందు ఉద్యుత్తమగు బాధ ప్రారంభమయిపోటు పొడిచినట్లుండును. ఈబాధ ఎదురొమ్మనందుగాని, ఎదురొమ్మనకు వెనుక వైపులగాని, కొంచెము క్రిందుగాగాని, యేర్పడవచ్చును. ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసము లధికములయి, ఆయాస మేర్పడి, మాటాడుట యందు యొగ ఊపిరిని బీల్చుచు — యీస్థితియందు పది నిమిషములు మొదలు యిరువది నిమిషముల వరకు ఉండిన పిమ్మట, అధికజ్వరము ప్రారంభమవును.

వ్యాధిప్రారంభించిన రెండవ దినమందే, కొన్ని చిన్నములు సూచనగ నుండును. రోగి వెల్లకిలి పడుండి యుండును. నిస్త్రాణిచే నధికమగు సాగిలపడిన స్థితియందుండును. ముఖము యెర్రబారి, కొద్దిగా విపర్లముగ నుండవచ్చును. ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసము లధికమగును. ముఖవైఖరి, బాధతో గూడినట్లుగను, దీనత్వమును వహించినదిగను, ఉండును. నోరుచుట్టును పొక్కులు లేవవచ్చును. శరీరవేడిమి, 103, 104 డిగ్రీలవరకునుండవచ్చును. ఉచ్చాస్యన నిశ్వాసముల అధికవృత్తను సరిపోవునట్లు నాడియొక్క చురుకుదనము అతిశయిత నందకపోయినను, నాడి తొందరతోగూడి, నిండుయై, ఉబుకుచుండును. దగ్గు కొద్దిగానున్నను బాధతోగూడి యుండటవలన, రోగికి కష్టముగా నుండును. తెనుడ కొద్దియైయున్నను, కొద్దియో గొప్పయో రక్తపుగీరలు కలిగి, వాయువుతో గూడియున్నందులకు గుర్తుగా బుడగలు గలిగి జగటగా నుండుటవలన వెలువడుటయందు శ్రమతో గూడియుండును.

వ్యాధియొక్క పరిమిత కాలము సుమారుగా యేడుదినములై యున్నది. ఈకాలమందు శరీరవేడిమి అధికవృత్తయందే ఉండి ఉడయపు వేరలందు ఒక డిగ్రీ ప్రాంతముల తగ్గు

చుండును. తుదకు అయిదవ లేక ఏడవ లేక తొమ్మిదవ దినమున, కొద్దిగంటల కాలమునే సందిగ్ధస్థితి (Crisis) యేర్పడి, శరీరవేడిమి అకస్మాత్తుగ స్వాభావిక వేడిమికాని, దీని పోవును. శరీరమునందు అధికజ్వరము ఉన్నంతవరకును, రోగియొక్క దురవస్థ యెడతెగ కుండును. రక్తప్రచారమునందు ప్రతికూలత కలిగి, నాడి మృదువు క్రమముదస్పీయించును. సందిగ్ధమును కొంతవరకు వ్యాపించియుండును. నాలుకపై తెల్లని పొరగమ్మి యుండును. ఆకలియు జీర్ణకయు అనేక విధములగు అస్వస్థతల నందుచుండును. ఒకప్పుడు ఆకలి బహుఅదృష్టముగ స్వస్థత నందియుండును. మఱియు తీవ్రజ్వరమును వహించి ఒకా నొకప్పుడు శ్వేతధాతువును గలిగియుండును. సందిగ్ధస్థితియందు శరీరవేడిమితగ్గనే రోగి యొక్క దృష్టి తగ్గిపోయి శరీరస్థితి ననుసరించి నాడి క్రమతనందును. కొద్ది గంటల కాలము క్షేమము వికాసకరమగును. ఈ వ్యాధియొక్క స్వస్థావస్థ యితర వ్యాధులయందు కంటే త్వరిత గతినంది తేలిక అయినదై యున్నది.

సామాన్య లక్షణములు.

శరీరవేడిమి, యిదివరకు తెప్పబడి యున్నట్లు యెల్లప్పుడును యెడతెగక నుండి పోవచ్చును. కొన్ని విషయములలో—ముఖ్యముగా బిడ్డలయందు—న్యూమోనియా జ్వర మున కభివృద్ధి నందకమాందు, యితరజ్వర ముండి యుండినపుడు శరీర వేడిమియొక్క పెం పుడుట తక్కువ అస్పదము నందియుండును. అత్యుద్యుత వేడిమి నందునది ఒకటి రెండు దినములు పట్టవచ్చును. ఆప్పుడు జ్వరవేడిమి 108 లేక 107 డిగ్రీలవరకు వ్యాపిం పవచ్చును. బిడ్డలయందును త్రాగుబోతుల యందును జ్వరము ఆతిశయగతుల నవలంబించును. ఆప్పుడప్పుడు జ్వరము మూడవదినముననే తగ్గవచ్చును. ఒకప్పుడు జ్వరము అకస్మాత్తుగ తగ్గిపోయి మరల హెచ్చవచ్చును. ఇది దోహదసందిగ్ధస్థితి యనబడుచున్నది. నిజమైన సంది గ్ధస్థితి అయిదవ దినమునకు లోపుగా గలగ శరీరము. సందిగ్ధస్థితి చేసిదినముల గలగుననిపైన సూచించబడిన విషయమందు యెక్కువ లక్ష్యముంచవచ్చునైనను. సందిగ్ధస్థితి కొరకయి యెదురు చూచుటలో నొకప్పుడు జ్వరము అనుదినమును కొద్దికొద్దిగా తగ్గుట యేర్పడి శరీ రవేడిమి కొన్ని దినములలో స్వాభావిక స్థితిని నహించును. ఇట్టివిషయములలో స్వస్థావస్థ కలుగుట ఆలస్యమగును ఈ స్థితియందు దోహదనొకప్పుడు జ్వరము మరల నంకురించవచ్చును. న్యూమోనియా జ్వరము నిజముగ తిరుగ బెట్టుట బహు అరుదయి యున్నది.

ఈ వ్యాధియందు దగ్గులొ తెమడ గలుగుట సరాజలక్షణమే గాని బిడ్డలయందు తెమడ కనుచుడక పోవచ్చును.

రక్తప్రచార సంబంధముగు దృగ్విషయములు ఈ వ్యాధియందు బహుముఖ్యములై యున్నవి. ఈ వ్యాధియందలి శ్వాసకోశస్వస్థతకంటే రక్తప్రచారము నందలి క్రమము దప్పటలను యెక్కువశ్రద్ధతో గమనించ వలయును. దార్ఢ్యము కలవారియందుగూడ నాడి 100 కిని అంతకు మించియును అధికమగును. బిడ్డల యందొకను అధికమగును. పెద్దవారల యందుగలగు నాడియొక్క అధికసంఖ్య విషయమయి బహుజాగ్రత్తతో జూడవలయును

నాడియొక్క సంఖ్య అధికమై నాడియొక్క మృదుత్వము అధికమగుచు, బలమునండును కాలపరిమితుల యందును కృమము దప్పిన యెడలనున్నూ, మణికట్టునందు నాడిని స్పృశించుటకు వీలులేక పోయినప్పుడెన్ను. సందిగ్ధస్థితి రాబోవుచున్నదని, తెలియవచ్చును. సందిగ్ధస్థితి వింటనే గలుగక పోయిన యెడల కుడరుపాట నకు ఆక వదలు కొన వలసినదై యున్నది. రక్తప్రచారమును భంగముకలుగుట వలనను, నే స్థితియందయినను మరణము సంభవింపవచ్చును. పాదములును హస్తములును జల్లబడి, స్పృశి కప్పిపోయి, రక్తము పరిశుద్ధము కాబడుట అగిపోవుటవలన మరణము సంప్రాప్తమగును. ఒకానొకప్పుడు ఆపాయము కలుగుట కేమియు తగు కారణముల గాంచకుండినపుడే ఆక సాస్త్రుగ గుండెయొక్క వ్యాపారము నిూపు చేయబడుటవలన, నొగి తత్కాలమే మరణము నందవచ్చును.

ఈ వ్యాధియందు మొదడుసంబంధముగ ఆస్వస్థతాలక్షణములు తరుచుగ నుట్టముగా గనబడుచుండును. బిడ్డలయందు యిట్టివి తక్కిన లక్షణముల గనబడ కుండ జేయవచ్చును. తలనొప్పి, వాంతులు, మూర్ఛలు, — యీలక్షణములు కొద్దిగంటల కాలములోనే స్ఫుటించి దప్పింపవచ్చును. సంధిగుళిమును కనుపడవచ్చును. శరీరవేడిమి అధికమయిన కొలదిని, సంధిగుళిమును హెచ్చుదల నందుచుండును. న్యూమోకాకస్ పురుగులు మొదలు యందలి పోషకాగములకు వ్యాపించుట వలన ఆ యా భాగముల వాపుదల యేర్పడి నేరు విధమగు వ్యాధి (పెనింజైటిస్) గలుగవచ్చును.

క్వానోశములయొక్క ఉపరిభాగములందు బరిక్షించుటవలన వ్యాధి యంతవరకు వ్యాపించియున్నదియు కనుగొన నగును. చేతియొక్క త్రాగ్రదు వలనను సైతన్ కోప్ వలనను యీ పరీక్షను జేయవలసియుండును.

నూచనలు.

ఈ వ్యాధియందు మరణములు నూటికి పదునాలుగు మొదలు ఇరువదివరకును ఉండి యున్నవి. దేశకాలస్థితులను బట్టి యీ మరణాప్రాప్తి మారుచున్నది. చుట్టుపట్ల అదివరకు ఉండిన యితర పరిస్థితుల ననుసరించి యీ వ్యాధియొక్క గతిని నిర్దేశింపవచ్చును. క్వానోశముయొక్క సిరికింటెను శరీరవేడిమికంటెను ప్రతిదినమునను ప్రతిగంటయందును ఉండు నాడియొక్క యగుండెయొక్క స్థితినిబట్టి యీ వ్యాధియొక్క గుణాగుణములను నిర్ణయింపవచ్చును. యితర జ్వరములయందువలెనే యీ జ్వరమునందును శరీరవేడిమివలన గుండెకాయ ఆస్వస్థతనందు చున్నది. క్వానోశముయొక్క విశేషభాగమునందలి పదార్థము పేరు కొనుట వలన గుండెకాయయొక్క పని అనేక విధములుగ హెచ్చుగుంచున్నది. ఇది కాక వ్యాధి సంబంధముగ వినపదార్థములు రక్తప్రచారవయవములపైన ముఖ్యముగా చనిచేయుట వలన నది దుర్బలత నందుచున్నది. నాడియందలి మృదుత్వ మధికమగుచున్నయెడల రోగిని బహుభాగ్యులలో జూచుచుండవలయును. దగ్గుటవలనగాని కదలుట వలనగాని నాడియందు మార్పుకలిగిన యెడలనున్నూ, చెడుసూచనయై యున్నది.

మంచి ఆకలియు, యిచ్చిన ఆహారమును జీర్ణించుకొనుటయు, మంచి శూచకతైయున్నవి. ముఖముపయిన మిక్కిటముగ పొమ్మలు గలుగుటయు చుంబిసూచనయై యున్నది.

దుర్వాసనతో గూడిన నోటివాయువును, దుర్వాసనలో గూడిన కఫము వెలువడుటయును శ్వాసకోశమునందు పుండు యేర్పడి మాంసము కుళ్ళించునని తలచు చేయును. ఇది అపాయముతో గూడి యున్నది.

తాగుమేతుల యందును, ఆతిసూత్రవ్యాధిచే బాధ నొందువారి యందును, గుండె కాయ మూత్రగ్రింధి లేక యితర అవయవములు దీర్ఘవ్యాధితనుగు అన్యస్థత నందియున్న వారియందును—యీ వ్యాధి కలిగినయెడల నెమ్మదించుట కష్టమైయున్నది.

చి కి తన్.

ఈవ్యాధియందు జ్వరమునకు జికిత్స ఆరంభించుటలో మాత్రము, యితర జ్వరము లందే చికిత్స జేయనగునో, యందును ఆచే చికిత్సను జేయనగును. శ్వాసకోశ విషయకమగు వ్యాధిని గురించి యెక్కువగా నెంచ నక్కర లేదు. పరిశుభ్రమగు గాలి రోగి పరుండి యుండు గదిలోనికి విశేషముగ వచ్చుచుండుట, పాదాభ్యంత్రము యున్నది. గాలి రాకుండ మూయబడుట కంటె, ఉద్యుతమగు గాలి వీచుటయే తక్కువ అపాయముతో గూడి యున్నది. గదిలోనికి గాలి వచ్చుచుండ వలయును. గాని, రోగి గాలి వీచుకొను స్థలములో మాత్రము పరుండబెట్టిబడి యుండవలయును. సూతనమగు కీతల వాయువు వలన రోగికి యెక్కువ అపాయము కలుగునెడి ఊహామిగుల పొరబాటు అయియున్నది. కావున, పరిశుభ్రమైన విశేషమగు గాలియు, సాధ్యమయినంత నెలతడయ లోనకు వచ్చుట మిగుల ముఖ్యమయి యున్నది. ఇట్టి పొరబాటు జరుగుచుండిన యెడల, దానిని పనిచేయుట తోడనే రోగియొక్క ఆదివరకు నీరసంతో గూడిన రక్తప్రచారమునందు యెట్టి అభివృద్ధి కలుగునో చూచుటకు బహు వింతగా నుండును.

రోగియొక్క బలమును యెక్కువ జాగ్రత్తతో గాపాడుట రెండవ అంశమయి యున్నది. రక్తప్రచారము నందు భంగము కలుగకుండ గాలియందుండుటయు ముఖ్యమయి యున్నది. అకలి యందును ఆహారమును జీర్ణము జేసికొనుట యందును పలుపుర్రయందు భేదములు కలుగుచుండును. కొందరు మొదటి ఒకటి రెండుదినములందు దేనిని బుచ్చుకొనుటకును యిట్టపడదు; మరికొందరు పాలుమొదలగు ఆహార పదార్థములను ఆహారంతో బుచ్చుకుండురు. మొదటివారలకు బలమగు ద్రవ ఆహార పదార్థములను కొద్ది పరిమాణములలో మందువలెనే ప్రతి మూడుగంటలకును యిచ్చుచుండవలయును. రెండవ తరగతివారలకు ఆహారమును భోజనక్రియముల ననుసరించి యియ్యవచ్చును. దుర్బలమగు అకలిగల వారలకు, ఒక పూడు ఒక గ్రేయిను లేక రెండు గ్రేయినుల క్యాలొమెట్ (రసభస్మము) ను గాని, హైడ్రోజెన్ కం శీటా (కేఫవడరు)ను గాని యిచ్చుటవలన నుందిగించిన అకలియందు ఆకర్షకరమగు అభివృద్ధి కనుపడును.

చాల విషయములలో మొదటి రెండుమూడు దినములపిమ్మట బ్రాందీనిచ్చుట వలన మిగుల సహాయకారిగ నుండగలదు. బ్రాందీలో నీళ్లుకలిపి యిచ్చుటవలన దీని ఉపయోగ మధికముగ నుండగలదు; కాచినవాలతోగాని తేయాకునీళ్లతో గాని కాఫీతోగాని యిచ్చుటవలనను ఉపయోగకారిగ నుండగలదు. తొందరలేని విషయములలో ఆరబొన్న గాని

బొమ్మగాని ఆరుగంటలకొకసారి యిచ్చుట చాలును; రోగియొక్క స్థితి యెక్కువ అపాయనంతో గూడియుండినయెడల అట్ల పరిమాణమును రెండుగంటల కొకసారియు, అవసరమయితే యెక్కువ తరుచుగాను యివ్వవలెను. కొందరు రోగులు, బ్రాందీయొక్కవాడుక లేకుండగనే, బాగుగ నుండురు. నాడియొక్క నడకనుబట్టి బ్రాందీని ఉపయోగించ వలసియుండును. నిండుయిన్నటియు ఉబురుచుండు నట్టియు మొదటి ఒకటిరెండు దినములయందుండెడి నాడి వ్యవస్థయి నీరసస్థితిని వహించినప్పుడు, బ్రాందీయొక్క ఉపయోగమునకు అవసరమును నూచించును. దగ్గుటనూలమునగాని, కదలుటనూలమునగాని, అస్వస్థత నందియున్న నాడి మిగుల కలతనందుట పారంభి మయినపుడు, బ్రాందీని యెక్కువ తరుచుగ నిచ్చుచు, మోతాదునుకూడ హెచ్చింపవలయును. పెద్దవారియందును, నీరసస్థితియందున్న వారలందును, త్రాగుట అలవాటు ఆయియున్న వారలందును, బ్రాందీని ఉపయోగించుట త్వరితముగ వారంభించి, మోతాదులనుకూడ హెచ్చింప వలసి యుండును. త్రాగుడువారలందు బ్రాందీని నిలపు చేసిన యెడల మిగుల అపాయము కలుగగలదు.

బ్రాందీకి పిచ్చుట గుండె సంబంధముగ బలవరకొవడముల నుపయోగించుట యందు శ్రద్ధను వహించవలయును. మొదటి రెండునూడు దినములందును, సాధుగతుల యందైనయెడల జ్వరగతియం దంతటను, యీ బొవడములు అవసరములయి యుండవచ్చును. రక్తప్రచారమునకు గలుగువాని వృద్ధునందిన కొలదియు, నాడియొక్క నడకలయందు గలుగు మార్పులను బట్టి యీస్థితిని గమనించుచు, యీ బొవడముల నుపయోగించ వలెను. ఈబొవడములలో మిగుల ఉపయోగమయినది టెంక్యర్ స్ట్రాఫాంతస్ ఆయియున్నది. ఈమందును దినమునకు నూడు పర్యాయములు మొదలు ఆరు పర్యాయముల వరకును 10మినిముల మోతాదులలో నివ్వవలెను. డిజిటాలిన్ ను కూడ యదేవిధముగ నుపయోగింతురుగాని మొదటిదియే ఉత్తమముగ నెంచబడుచున్నది. కొన్ని విషయములలో స్ట్రాఫాంతస్ తో కూడ లైకర్ ట్రిక్లొసిక్ హైడ్రోక్లోర్ ను గలిపి వాడుటవలన నుపయోగముగ నుండును. రక్తప్రచారలోపము ఉద్బుద్ధముగా నున్న స్థితులందు స్ట్రాఫాంతస్ ను యెక్కువ తరుచుగ వాడవలయును.

చాలవిషయములలో ఎదురొమ్మనొప్పికి ఉపశాంతిల జేయవలసి యుండును. ఈ నొప్పిని తగ్గించుటవలన రోగియొక్క సామాన్యస్థితి అభివృద్ధింపనును. ఇంద్రురక్త, పేడి పిండికట్లను, కర్బుర తైలము రాసి పేడికాపడములను గానుట, యీ పనులను జేయవలయును. మంచుగడ్డవేసిన పంచిన ఉపయోగించుట రోగికి యిచ్చవలసినయెడల దీనిని ఉపయోగించవచ్చును.

ఆయాసమును, నిద్రలేమియును, మిగుల విచారణీయాంశములయి యున్నవి. ప్రక్క గుండలయొక్క లేతకఠినము, పడకగదియొక్క చల్లదనము, పరిశుభ్రమగు గాలియొక్కవచ్చుదల— యీవిషయముల కెక్కువగ గమనింప వలసియున్నది. సందర్భముల ననుసరించి ఒడలంతటనుగాని, కొంతవరకేగాని, తడిగడ్డలను జాటుటవలన యీవిషయములు మిగుల ఉపశాంతిగ నుండగలదు. ఇట్టి పనిని చేయుటయందు రోగికి యంతమాత్రమును ఆయాసము కలగకుండ బహుజాగ్రత్తతో జేయవలయును. విటికి దోడుగా లైకర్ మార్షియా హైడ్రోక్లోర్ ను సా

మాన్యమోతాదులలో నిచ్చుటవలనను ఉపయోగ ముండగలను. క్లారక్ హెడ్రీను 15 గ్రాములు మొదలు 20 గ్రాములవరకు నిచ్చుటవలన కొద్దిగంటల పేపు నిద్రగలుగుటయేగాక, రక్తప్రచారమునకు స్థిరతను గలుగజేయును.

జ్వరమును దగ్గించుటకు గాను పరీత్యేక్ బౌషెనుములు అవసరములేవు. పైన చెప్పబడిన తడిగుడ్డలతో జాటుట యీవిషయమునను బని చేయును. ఇందు విషయమై బౌషెనులు ఉపయోగించుట అవసరమయినయెడల, క్విన్సీను ఆంటిపెరిన్ ను ఉపయోగింపవలెను. ఆరంభమునుండియు లైకర్ ఆమోనియా ఆసిటేట్ న్ ద్రవ్యాన్ని ఉపయోగించుట వలన కొన్ని విషయములలో రోగికి మిగుల ఉపకారముగ నుండగలదు.

వ్యాధియొక్క అభివృద్ధియందు గలుగు యితర అస్వస్థతలకై ఆయావ్యాధులకగు జీకెస్సుల జేయవలయును.

స్వస్థావస్థయందు రోగియొక్క స్థితినిబట్టి క్విన్సీ, ఐరన్ (లోహము), స్ట్రీక్ నీస్ (మినుమ్స్), ఆర్సెనిక్ (పాపాణము), కాడ్మియమ్ ఆయిడ్ - యీవిషయములను యిచ్చునగును. ఈ స్థితియందు బాగ్మికీకరణ ఉపయోగింపవలెను. స్వస్థావస్థయందలి అభివృద్ధి వాడియొక్క గతినబట్టి కనుగొనవలెను. ఈ స్థితియందు ఫలమును మార్చుట వాంఛనీయము కాని, యిట్టి మార్పునందలి యేర్పాటు రోగియొక్క నివాసము, శరీర ప్రకృతి, ఆభిరుచుల దృవ్యశక్తి, ననుసరించి యుండును. వ్యాధి మౌల ప్రకోపించుటకుండెడి ఉద్యమ కృతను గమనించుచు, రోగి పరివ్రాజ్యస్వస్థత నందినట్లు వైద్యుడు నిశ్చయత నందవలయును. రోగినుండి వెలువడు కఫముయెడల నున్నూ, యితరవిధముగను, దుర్వాయువులను గోగొట్టుట కుపయోగించు కార్బారిక్ ఆసిడ్ మొదలగు వాటిని వాడుకయందుంచుటతో తోషమును జేయరాదు.

నేత్రరోగములు.

1. కనురెప్పయంచున వాపుదల.

కనురెప్పయంచున నుండెడి వెండ్లుకలయొక్క కుదుళ్ళలో నొకటి వాపుదలనంది, అచ్చటి గ్రంథికూడా అస్వస్థతనందుటచే నొక బాధకరమగు చిన్న కురుపు యేర్పడును. దీనిని ఉడుకు నీళ్ళతో బాగుగా కావడములనుగాంచి, కురుపు తేలిక పిమ్మట నూదితో గురిచ్చి మాలిగ్యమును దీసివేయవలయును. ఆనీర్లతస్థితివలన శరీరముయొక్క సీరస్ గతివలనను, తరుచుగ నెట్టి కురుపులు కలుగుచుండును.

2. కంఠజలకః.

కన్నయొక్క గాని కనురెప్పలయొక్క గాని, బొంగలు వాపుదల నందుటవలన యీ వ్యాధి యేర్పడుచున్నది. సాధుగతులయందు యీవాపుదల కంటియొక్క తెలుపు భాగమును మాత్రమే ఆక్రమించియుండును కంటిలో నిరుక ఉండినట్లుగా నుండును. వెలుపలను జూచుట బహుకష్టముగా నుండి, కన్ను దుర్బలము నవహించియుండును. రతిసోపి

కూడా ఉండి తరుచుగా కొంచెము జ్వరత వుండవచ్చును. కండ్లనుంచి మొదటగా పల్లనైన రసి కారుచు, పిమ్మట దళమైనట్టియు కొంచెము పసుపువర్ణముతో గూడినట్టియు రసి యేర్పడును. నిద్రయందు కండ్లు అంటుకొనును. ఒక కప్పు గాని రెండు కన్నులుగాని అస్వస్థత నందవచ్చును. ఒక కన్ను మొదటగా అస్వస్థత నందినపిమ్మట రెండవకన్నును గూర్చి తిగుజాగ్రత దీసికొనినయే దప్పు, రెండవకన్ను గూడ అస్వస్థత నందటకు అనువు యేర్పడును. ఈ వ్యాధిగరుంచి ఆరంభములోనే తగుజిత్తు జేసి యెడల త్వరలోనే నెమ్మదించగలదు, చీము పట్టువరకును ఆలస్యము చేసినయెడల యెక్కువ కఠినమై అంటుగుణమును వహించగలదు. కాబట్టి యీ సంబంధముగు వ్యాధులన్నింటిలోను వ్యాధిగ్రస్తులు ఉపయోగించు దువార్లు సబ్బులు నీళ్లు మొదలగు సరియితరలను ఉపయోగించరాదు. వ్యాధి యొక్క పరిమితి కాలము కొద్దిదినములేగాని లేక అనేక వారములు గాని పట్టవచ్చును.

చి కి త్త.

రోగిని చీకటిగదిలో నుంచి కండ్లపైన ఆకుపచ్చగుడ్డను కట్టి తరుచుగా వేడినీళ్లతో కండ్లను గడుగుచుండవలయును. కండ్లు అంటుకొనకుండునట్లు రాతులందు వాసలీన్ ను గాని గ్లిసేరిన్ ను గాని కనురెప్పల అంచులకు రాయవలయును. కండ్లు అంటుకొని యుండినయెడల వాటంతట అవి యెడమిచ్చునట్లుగా దడుపవలయును. గాని బలవంతముగా కనురెప్పలను విడదీయగూడదు. నులబడ్డ మూడినయెడల 4 వ ఔషధ యోగమును విశేషకారిగ నియ్యవలయును. ఆరంభకఠులయందు చిట్లాముద్రమును కనురెప్పలక్రింద రెండు చుక్కలను వేయుటవలన బాధకు ఉపశాంతి కలుగగలదు.

3. చీముతో గూడిన కండ్లకలక.

వైవిధ్యము కండ్లకలకను ఆశ్చర్య చేయుటవలనగాని గనోరియా సంబంధముగు స్రావము కండ్లకు దగులుటవలన గాని చీముతో గూడిన కండ్లకలక యేర్పడవచ్చును. ఈగల మూలముగాయీ వ్యాధి వ్యాపింపజేయబడును. ఈ వ్యాధియందు వాపుదల అతికఠినుగా నుండి బాధయు పెచ్చుగా నుండును. ఈ గతియందు పల్చి ద్రావము వెలువడ కుండ కండ్లనుండి విశేషపరిమాణములుగ చీము వెలువడుచుండిను. ఈ వ్యాధియొక్క పరిమితి కాలము వదిదిసములు మొదలు రెండులేక మూడు వారముల వరకు వ్యాపించును. ఇందు మూలమున కనుపాపలో వుండు యేర్పడుట గాని కనురెప్పలక్రింద సగ్గబియ్యమువలె చిన్న అణువు లేర్పడుటగాని తటస్థించును.

చి కి త్త.

ఔషధయోగములలోని వేడి ఉయిన బోరిక్ లోషన్ తో కండ్లను గడుగ వలయును. ప్రతి రెండు లేక మూడుగంటలకునా వేడినీళ్లతో కాపడములను గాచవలయును. రోగిని చీకటిగదిలో నుంచవలయును. విశేషము క్రమముగా గాకపోయినయెడల అందులకగు సాధకముల జేయవలయును. కండ్లు అంటుకొనకుండ కనురెప్పల కొనలకు రాతులయందు వాసలీన్ ను రాయవలయును. వాపుయొక్క ఆరంభఉద్యత తగ్గిన 2 ఔషధుల జలములూ 5 గ్రెయిసుల జింక్ సల్ఫేట్ కలిపిన సోల్యూషన్ తో కండ్లను దరుచుగ గడుగుచుండ వల

యును. వ్యాధి కాలముందు రోగికి బలమును గలుగజేయు ఆహారముల నివ్యవలయును. కన్నులనుండి చెడలు స్రావము ఆరుదలనగుది యీ సంబంధముగు ఆహారము గాలిలోనికి బొచ్చి యితరుల నేత్రములలో బ్రజ్వలించుట వలన నీ వ్యాధి వ్యాప్తి నందజేయును. కాని, పరిశ్రమగు గాలి యొక్క రాకపోకలవలన నీ అపాయము తగ్గుదల నందగలదు.

పై సాధకముల వలన సువయోగము లేకపోయినయెడల, ఒకబౌన్న జలములో 10 గ్రెయినుల సిల్వర్ నైట్రేటును గలిపి సాల్వ్యానుగా జేసి, అందలి ఒకచుక్కను బ్రెస్కో సినునకు రెండుసారులు కంటిలో వేయవలయును. దీనివలన మంటగానుండినను, తరుచుగా నెక్కువ ఉపయోగకారిగ నుండగలదు. మంటలేకుండుటకుగాను, సూటికి పనివంతున జేయబడిన కొక్స్ సాల్వ్యాన్ రెండు లేక మూడు చుక్కలను కంటిలో ముందుగావేసి, పిమ్మట సిల్వర్ నైట్రేట్ సాల్వ్యానును వేయవచ్చును. సిల్వర్ నైట్రేట్ నున్నా, తిన్ని బంధమగు సాల్వ్యానున్నా నీలపు నీసాలలో నుంచవలయును. తనకు నేడిపోగలపు.

4. కంటిపాపలోని పుండ్లు, పుళ్ళువేయుట.

కండ్లకలకను గాని, కనురెప్పల క్రింద సగ్గరియ్యమువలె చిన్న అణువు లేర్పడుటను గాని అశ్చర్యజేయుటవలన కనుపాపవలయుండు పుండ్లు లేర్పడుట తలంపింతును. ఈవ్యాధి యందు ఒకటిగాని, అంతకెక్కుడగాని దక్షవాళములు సంభవించి ముగ్ధులును బోవుటను గాంచవచ్చును. పాపయందు యెదియో నొకభాగమున ప్లెబ్ నెవహచ్చ (పుండు) న బడును. వెలుతురును, బాచుట బహుకష్టముగానుండి, కండ్లవెంబడి నీళ్ళు కారుచుండును. దీనికి క్రమ కాలములో దగు చికిత్సను జేయని యెడల, వ్యాధి ఆతిశయమయి, క్రిమముగా చూపు తగ్గిపోయి, అంధత్వము కాడయేర్పడును.

చికిత్స.

రోగి చికిత్సగదిలో నుంచబడి, పరిశ్రమగు గాలి మాత్రము వచ్చునట్లుండ వలయును. కంటి యొక్క తెలుపు భాగము యొక్క యెరుపుదల తగ్గి వరకును తరుచుగ వేడినీళ్ళతో కాపడములను గాచు చుండ వలయును. కంటియొక్క పరిశ్రమ విషయమయి యెక్కువ జాగ్రత్తను బుచ్చుకొన వలయును. ఒక బౌన్న జలమునందు రెండు గ్రెయినుల సిల్వర్ నైట్రేట్ ను గలిపిన సాల్వ్యాను నుండి రెండు చుక్కలను పుండుపైన వేయవలయును. పదినిమిషముల పిమ్మట, 5 గ్రెయినుల బోరిక్ ఆసిడ్ ఒకబౌన్న జలములో గలిపిన లావసుతో కంటిని గడిగి, కాటన్ డిబ్బో వయిన కట్టును గట్టవలయును ఇటు నిమిషము రెండుసారులు, పుండు పెద్దయైన యెడల యెక్కువ వ్యాయాములను చేయవలయును. బలము నిచ్చు ఆహారపదార్థముల నిచ్చు చుండవలయును. క్విన్ టిన్ లోని కియ్యములను. కంటికి వెలుతురు తగులకుండ గాపాడు చుండ వలయును.

ఈ పుండుయొక్క అరంభగతులయందు, ఒకబౌన్న జలములో రెండుగ్రెయినుల ఆట్రోపిన్ కలిపిన సాల్వ్యానులో, ఒక చుక్కను దినమున కొకసారి గాని రెండు సారులు గాని కంటిలో వేయవలయును.

(నేత్రసంబంధమును యితరవ్యాధులందు శస్త్రము అవసరమయి యుండును, గాన స్వర్ణమును జూపించవలసి యుండును.)

పడిసెము (శ్వాస సంబంధము)

(రొమ్ముపడిసెము)

శ్వాసనాళము యొక్కయు, యీ నాళకాఖిల యొక్కయు, అచుమును గలగజేసెడి నిర్మాణముల యొక్కయు, నిర్మాణముల అంతర్భాగముల యొక్కయు, జలుబుతో గూడిన ఉన్మత్తముగ, నాపుడల — రొమ్ముపడిసె మనబడుచున్నది. ఈవ్యాధి సామాన్యముగ చలి గాలిపలన నేర్పడి, బలుబు లక్షణములతో నారంభమగును. మొదటగా ముక్కువెంబడి నీరు కారుచు, చేతులయందును కాళ్ల యందును చలిగలిగి, నొప్పులు పుట్టును. శరీరవేడిమి యందు కొద్దియగు హెచ్చుకల, దాహము, నిస్త్రాణి, తలనొప్పి, పొరగిమ్మిన నాలుక, ఆకలి తీరించుట, ఆయాసము — యీ లక్షణములతో గూడియుండును. ౫ రొమ్ము యొక్క మధ్యయొక్క వెంబడి పచ్చిగానుండి, ఎదురొమ్ము అంతయు బిగువుగా నుండును. జ్వరము తరుచుగా వర్తమయి, నాడి 120 వత్తునుగాని, అంతకు హెచ్చుగగాని, ఉండును అనుకుల విషయములలో, మూడు నాలుగు దినములలో దగ్గు తెగుట అరంభించి, తెమడ వెలువడుట ఆధికమగును. అరంభగతులయందలి తెమడ నురుగుతోగూడి తెల్లగా నుండును. క్రిమ్రమముగా తెమడ దళమయి ఆకుపచ్చ పసుపు కలిసిన వర్ణముతో గూడి — యీస్థితి యందు యెదురొమ్మునందలి పచ్చియును, బిగువును, తగ్గిపోవును. ఈవ్యాధి యొక్క తే నుండు, ఊపిరితో ఒక విధమయిన ధ్వని వినిపిండును. చేతితో యెదురొమ్ముపై దాకిన యె డల ధ్వనులను గనుగొనవచ్చును. తెమడ వెల్లిపోయినప్పుడు యీలక్షణములు తగ్గవచ్చును. గాని, తిరిగి తెమడ కూడు కొనిన వెంటనే మరల యీ లక్షణములను గమనింపవచ్చును. శ్వాసనాళ కాఖిలయందు నిండియున్న జగటుయైన తెమడ (ఆవము) గుండా వాయువు పోవుచుండుట నలన గలుగు ధ్వనులవలననే పైనచెప్పబడిన ధ్వని యేర్పడుచున్నది. పరిశ్రమ చేయుటవలనగాని, చలిగాలికి లోనగుటవలనగాని, దగ్గును, ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసములయందలి ఆయాసమును, ఆధికమగును. అనుకుల విషయములలో, సుమారు యెనిమిదవ దినమునకు ఊపిరియందలి ఆయాసము తగ్గుదల నంది, విశేషకష్టము లేకుండ తెమడ వెలువడుచు, జ్వ రము తగ్గుదల నందును అననుకుల గతులలో ముఖ్యైఖిరి ఆదర్దాతో గూడి, నీలవర్ణమును వహించి, ఊపిరిని బీల్చుటయందు ఆయాస మధికమగును, పెదవులు నీలమును యెరువును కలిసిన వర్ణమును గలిగియుండును. సందిగుణము జనించి, రోగి ఆచుమును దగ్గి చేయుట కళ వుడై, ఊపిరి తిరుగక మరణము నందును. రక్తప్రచారమున కాటంకము గలుగుట వలనను మరణము సంభవించును.

చి క త్స.

రోమ్ము కడిసెము కలిగిన పెంటనే రోగిని వేడినీళ్లలో స్నానముచేయించి రాత్రి యందు 8 లేక 10 గ్రెయినుల పల్విస్ ఇపికాక్ ణో ను యిచ్చి ప్రతి మూడు గంటలకును ఆరవారము స్పిరిట్ ఈతరు సైట్రస్ ను 'రెడుబొమ్మల జలములో గలిపి యిచ్చుటచే, చె మటను వృద్ధిపరచ వలయును. అరంభ గతులయందు వేడి ద్రవపదార్థములను ఆహారముగ నియ్యవలయును రోగికి చలిగాలి తగుల కుండునట్లు బాగ్రి త్తవరదీ, గస్యోందు నీటి ఆవిరిని వడలుటవలన, వాయువునందు తేమ గూడి యుండునట్లు చేయవలయును నీటి ఆవిరిని లో నకు బీల్చుటవలనను ఉపయోగ ముండగలను. ఎవరోమ్ముపైనవేడి కాపడములను గాయము వేడి పిండికట్టును గూడ కట్టవలయును. అవస్థనిమయినచో విరేచన కారల నిచ్చుచు, విరేచ నము క్రమముగా నగుచుండునట్లు చేయవలయును. పైన జెప్పబడిన ఆననుకూల గతుల యందు, బ్రాందీ, ఆమ్మోనియా కార్బనస్, స్ట్రిక్సనీస్, యియ్యనగును, దగ్గు బాధకరము గానుండి నిద్ర పట్టుటలేనని రోగి యొక్కవగా మూలినను, పైన జెప్పబడిన పల్విస్ ఇపికాక్ ణో యందు ఉండియున్న కొద్ది నల్లమందు కంటె వెక్కువ మోతాదులలో నల్లమందు కలిసియున్న బొమ్మలముల నియ్యరాదు. నల్లమందు కలిసియున్న మందులను యొక్కవగ నిచ్చుటవలన నిద్ర అధికమయి, స్వేచ్ఛగా వెలువడు తెమడను ఆహారపరచి యొక్కవ ఆపాయమును గలుగజేయును.

నీరసగతియందున్న రోగులయందు తెమడ అధికముగా వెలువడును. ఈ విషయ ములయందు టింక్చర్ బెలడోనాను 10 మినిముల మోతాదులలో నిచ్చుచు విరేచనము కుభ్రముగా నగునట్లు జూడవలయును. బిడ్డలయందు తెమడ వెడలు ప్రాయత్నములు అసం పూర్తిగ నుండవచ్చును. ఇట్టి సందర్భమున వైసెం ఇపికాక్ ను తగు మోతాదులలో నియ్య వలయును. పెద్దవారిలయందు గుండెకాయ నీరసత నందియున్నయెడల టింక్చర్ డిజిటాలిస్ స్ట్రిక్సనీస్, బ్రాందీ—వాడవలసి యుండును. ఈవ్యాధిలో సాధుగతియందు యీక్రింది బొమ్మలయొగములు వాడవచ్చును.

టార్టర్ ఎమిటిక్	...	గ్రెయిను 1
టింక్చర్ క్యాలఫో ణో	...	ద్రాములు 2
జలము (ఉడుకు)	...	బొమ్మలు 12

బాగుగా కలిపిననీళ్లుట చల్లార నియ్యవలయును. ప్రతి రెండు లేక మూడు గంట లకు ఒకబొమ్మను చొప్పున యియ్యనగును.

వ్యాసనాశములయందు యీడ్లు గలిగినట్లు దోచినయెడల, సైటోగ్లిస్సరిక్ టెబ్టా యిడ్ (బిల్లను) నుగాని, స్పిరిట్టు ఆఫ్ క్లొరోఫారంను గాని, టింక్చర్ ఓపియంను గాని, టింక్చర్ బెలడోనాను గాని, టింక్చర్ లాజేరి మాను గాని, ఈతగును గాని, వాడనగును.

వ్యాధిగగ్నిడు కీళ్ళొకప్పుల (వారోగము)తో గూడియున్నయెడల, సోడా సేలి సైల్ఫును గూడ వాడవలసి యుండును. రోగి గ్యాక్తో గూడియుండి యూరిక్ ఆమ్ల విష బాధితుడైనట్లు దోచినయెడల డయూరిటిక్సులో 3 వ బొమ్మయొగమును వాడవలయును ఆహారమును గూడ ఈవ్యాధికి సరిపడునట్లు యియ్యవలయును.

పచ్చకామాల.

ఈవ్యాధియందు చర్మము పసుపువర్ణమును వహించి యుండును. కారణమునుండి పిత్తద్రవముయొక్క పారుదలకు, కారణముయొక్క వెలుపలి ఆటంకమువలనను ఒకప్పుడు కారణమునందే గలుగు ఆటంకమువలనను, పిత్తద్రవము రక్తముచే బీల్చుకొనబడి, యావ్యాధి కలుగుచున్నది. కండ్లలోని తెలుపులు, ఆకుపచ్చని లేక పసుపు వర్ణమును దాల్చియుండును చూచుటకునుడ నొకప్పుడు ప్రతిపస్పృశ్యమును పసుపువర్ణమును గలిగియుండునట్లుండును. పేగులయందుండు పురుగులైన సాంటూనిక్సు బుచ్చుకొనుటవలనను యొకప్పుడు యిట్లు కలుగవచ్చును. పేగులయందు మలబంధ పేర్పడి, విరేచనము తేల్లగాగాని రేగడియొక్క వర్ణముగాగాని యుండి, మాత్రము ఉద్దృతిమగు పసుపువర్ణముతో గూడి యుండును. ఒడలుపై దురదగానుండి, నోటిలో చేదుగానుండి, నాలుకపై పొరగమిక్కి, ముళ్ళిముగా ఉడయములందు తిప్పవటతో గూడియుండును. వీటి క్షుటికిని కారణము రక్తమునందు పిత్తద్రవము కలిసియుండుటయే అయియున్నది. అనేక కారణములలో నేదియొయొక కారణమున పిత్తద్రవము రక్తములలోని బీల్చుకొనబడి, మూత్రిగ్రంథుల వలన మూత్రిముద్వారా వెలువరింపబడును. ఈ అస్వస్థస్థితి సీరముగ నుండినను ఉండవచ్చును. లేక కొన్ని దినములలానే ఆంతరిప వచ్చును.

సీరముకానటి పచ్చకామాలవ్యాధి, కారణమునందు రక్తము కూడుకొని యుండుటయొక్క ఫలితమయి యుండవచ్చును. పైత్యవ హిక యవదలి రక్త ప్రవాహమునకు పైత్యశల (Gallstone) అడ్డుపడుటవలనను, యావ్యాధి కలుగవచ్చును. సామాన్యముగ బిచ్చైన పిత్తనాళములయందు రక్తము కూడుకొని యుండుటవలన నీ ఆస్థిర పచ్చకామాల కలుగుచుండును. ఇందులకు 4 వ విరేచన కారిని ఉడయమునను సాయంకాలమునను కొన్ని దినములపాటు వాడుటవలన నుపయోగించగలదు. కారణముపయిన మస్తద్దపట్టిని ఆస్వద్రవ్యము వేయుచుండ వలయును. అహారము తేలికయినదియును బలము నిచ్చునట్టిదియును ఆయి యుండ వలయును. బ్రాందీ మొదలగు మత్తుపదార్థముల నుపయోగింప గూడదు. 3 వ విరేచన కారిని గుండ వాడనగును. అతీర్ణవ్యాధితో గూడియుండినయెడల పొటాష్ పైకార్బోనేట్, పొటాష్ సైట్రేసు, టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ గలిపిన బొషధమును వాడనగును.

పక్షి వాయువు.

ఈవ్యాధియందు, యేలైన నొక అవయవముయొక్కగాని, కిరీములలోని సగభాగముయొక్క గాని, కదలికకు వలయు శక్తియొక్క నష్టమును నూచించును ఈ వ్యాధిఅనేక తరగతులుగ నుండియున్నది.

1. మెదడు యొక్క అస్వస్థతవలనగాని, మెదడునకు గలుగు హానివలనగాని యేర్పడు పక్షి వాయువు; ఇది అంగవికృతి రోగమునకు పిమ్మటగాని, లేక, శివలము మెదడుయొక్క అస్వస్థత వలననేగాని కలుగుచుండును.

2. వెన్ను పామునకు గలుగు హానివలనను పక్షవాదువు కలుగుచుండును.

3. వెన్ను పాముయొక్క అస్వస్థతవలనను పక్షవాదువు కలుగుచుండును. నడుము యందును కాళ్ళయందును నిష్క్రాంతిచేయును, పాశములందు బలపరముతోడను, యివాగ్ధి ప్సారింభమగును. ఊరువులయందును కార్లయందును నొప్పులు ప్సారింభమయి, తెరలు తెరలుగా పోట్లు పొడుచుచు, విద్యుచ్ఛక్తివలన గలుగు అదరువలె నుండును. ఇది, మొదటగా కీళ్ళనొప్పలుగా భ్రమింపబడును. ఇది, సామాన్యముగ కొలుకురోగము యొక్క ఫలితముగ గలుగుచుండును. వ్యాధి అభివృద్ధిచేసిన కొలదిని స్నాయువులు క్షీణింప నందుచుండును. కొన్ని విషయములలో, దృష్టి చెడిపోయి, రాత్రులయందు నుత్తరమును నిలుపు చేసికొనుటయందు స్వాధీనము తప్పిపోయి, బహుశః జనసేంద్రియమునుండి స్పృహములు కలుగుచు, నడుముపైపుల అణచి పట్టినట్లుండును. పోట్లు అధిమయిన కొలదియు, రోగి యొక్క కాళ్ళపై స్వాధీనము తగ్గిపోవు చుండును. నడువబోయినపుడు చూలుటకు ఆరంభించును. ఆసాన లేకుండనడువజాలడు. పారములను ఆననముగ మిగుల యెత్తున కత్తి ముందునైపులకు కాలిమడిమలను విమరుతో క్రిందవేయును. పాదముల నైపుకు జూచుచున్నపుడు క్రోమముగా నడువవచ్చును. కండ్లు మూసికొని నడుచుట యందుగాని, చీకటిలో నడుచుటయందుగాని, బహుశః క్రిందవడును. స్పర్శయొక్క ఇంద్రియజ్ఞానముగూడ అస్వస్థత నందియుండును. నీరుడుతి తియొక్క నాపుడల యేర్పడవచ్చును. కాని, సామాన్యముగ ఎదురొమ్మ అస్వస్థత యేర్పడును. ఈ వ్యాధులయొక్క సరిమితికాలము కొన్ని సంవత్సరములు వచ్చినను బట్టును. బలముగ ఆహారముల నివృత్తయందును, బలవర్ధకావధముల నివృత్తయందును, చికిత్స యిమిడియున్నది. కొలుకురోగముగాని, శరీరప్రగ్లితి సంబంధమగు యితర వ్యాధులుగాని, ఉండినయెడల, ఆందలకగు బ్రత్యేక చికిత్సలను జేయవలయును.

ఈ వైవిధములగు పక్షవాదువు, కొలుకురోగముయొక్క సాధుగతియందైన తప్ప, కుదురుబాటు అగుట అరుదైయున్నది. సాధారణఆరోగ్యత కగుకృద్ధను బుచ్చుకొను చుండవలయును.

4. మత్తుపదార్థముల నుపయోగించుటవలన గలిగిడి పక్షవాదువు, మత్తుద్రోవముల వెక్కువగ నుపయోగించుటవలన, ముఖ్యముగా నాడువారలయందు పక్షవాదువు కలుగును. ఈ వ్యాధి క్రమముగా పోవును. బాధతోగూడి, కార్లయందును పాదములయందును తిమరులేర్పడి, మోకాళ్ళయందు బలహీనత గలిగి, శక్తిహీనమయి, నడుచు రీతి యందు వికృతి కలిగియుండును. వ్యాధి అభివృద్ధి నందికొలదిని రోగి మంచము వట్టును. ఈ వ్యాధి చేతులకు సాధారణముగ వ్యాపించదు. ఈ వ్యాధి ఆ స్థానములలో నరముల ననుసరించియే యుండును. గాని మొదటను వెన్నుపామును అస్వస్థతనందియుండవు. మత్తు ద్రోవములను పూర్ణముగా ద్యజించవలయును. సంచితఆహారము, బలవర్ధకావధములు, యెంతటికీ బ్యాటిరీడీపయోగింపవలెను. వ్యాధి మిగుల అభివృద్ధి చెందిన స్వస్థత నందుటకు వీలుకలదు. 1 గ్యాయిను ఫాస్ఫేటస్, 12 గ్యాయినులు యిక్సాక్సాట్ ఆఫ్ సోడ్ పామికా, 50 గ్యాయినుల ప్యెసిఫిలేటెడ్ కార్బానేట్ ఆఫ్ వింక్, —పీటిసన్నిటిని గలిపి

50 మూతలుగా జేసి దినమునకు మూడుమాత్రలను సేవించవలయును. కొద్దిమోతాదు లలో వైకర్ స్పైక్ సీన్ కూడ ఉపయోగముగ నుండును.

5. రంగుపని చేయువారలను సీసపు సంబంధమున పనులను జేయువారలను మణి కట్టుయొద్ద పక్షవాతమును గలిగి చెయ్యి పడిపోవును. ఈ విధముగ పక్షవాయువు నందు పండ్లచిగుళ్ళపైన నీలపుగీత కనుపడును. ఇట్టివ్యాధియందు ఆపనిని మానివేసి విరేచనకారుల నుపయోగింపవలయును. పిమ్మట 3 వ అల్పరెటివునందలి పొటానియం ఆయోడైడ్ ను ఉపయోగింప నగును.

6. ముఖ సంబంధముగ పక్షవాయువు శరీరమునందలి పక్షవాయువుయొక్క ఒకభాగముగ గాని; చలిగాలి ప్రోకుటువలనగాని, యీ వ్యాధి కలుగవచ్చును. ముఖము నందలి యొకవైపుల స్నాచువులు అస్వస్థత నందుటవలన ఆ భాగము కదల్చుటకు పిలువేతుండ నుండును. ఒకవిధముగ కీళ్ళనొప్పవలన యీ వ్యాధి కలుగవచ్చును. వేడి కాపడములను గాచుచు డైకార్బోనో ఆఫ్ సోడా, కార్బిక్ వైస్, స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రస్, గలిసిన్ బోషిగయోగమును వాడవలయును.

7. బిడ్డలయందు గలుగు పక్షవాయువు : పుట్టుకతోడనే నొకప్పుడు బిడ్డలకు యీ వ్యాధి కలుగుట గలదు. పండ్లు వచ్చునపుడుగాని, సరిపడని ఆహారము నిచ్చునందు వలనగాని, నీరసత వలనగాని, పేగులయందు బుగుగు నుండుటవలనగాని, యీవ్యాధి కలుగవచ్చును. జంటపండ్లు వచ్చునపుడును యిది సంభవించవచ్చును. కొన్నిదినములు జ్వరముగా నుండిన పిమ్మట మామూలు విధముగనే నిద్రపోయిన తరువాత ఆకస్మాత్తుగ నొకదినమున ఒక చెయ్యియేగాని, ఒక చెయ్యియు రెండు కాళ్ళుగాని స్పాష్టికము తన్నినట్లు కనుగొనవచ్చును. ఈ స్థితి కొద్దిదినములేగాని, కొద్దివారములుగాని ఉండినపిమ్మట బిడ్డయొక్క ధారకమునందు క్రమము కలిగినపిమ్మట నెమ్మదించిపోవును. పుట్టుకతోడనే యీ వ్యాధికలిగి యుండిన యెడల స్వస్థత కలుగుట మిగుల కష్టమయి యున్నది. బిడ్డను పరిశుభ్రముగ గాలిలో తరుచుగ దిప్పించుట వలయును. కాళ్ళను నేతులను దరుచుగ బట్టుచుండవలయును. సిరిప్ షెర్ర్యు ఆయోడైడ్ ను వయసును బట్టి తగుమోతాదులలో నియ్యవలయును.

8. హిస్టేరియా సంబంధముగ పక్షవాయువు : హిస్టేరియా వ్యాధియందు, కీలుగాని మోకాలుగాని, కాళ్ళుగాని, యీ వ్యాధి నందవచ్చును. ఆరోగ్యమున కగు పద్ధతుల నవలంబించుటవలన దీనికి నెమ్మది కలుగవచ్చును.

9. వ్రాయుట యందలియు, రైలిగ్రాఫ్ కొట్టుట యందలియు, పక్షవాయువు వాత పని అధికముగ గలవారియందు దాకానొకప్పుడు మణికట్టుయందు పక్షవాయువు కలుగ వచ్చును. ఇట్టిఅస్వస్థత రేర్పడుచున్నదని సూచనలు కనుపడగనే, ఆపనులను ఆపివేసి విశ్రాంతి దీసికొనుచు బలవర్ధకావధముల వలనను, పరిశుభ్రముగ గాలివలనను, శరీరసాధకము వలనను, అస్వస్థత భాగమున కన్నివైపులను దరుచుగ బట్టుచుండుటవలనను, నెమ్మది కలుగగలదు.

ప్రసవ సంబంధముగు జ్వరము.

ప్రసవమైనపిమ్మట నొకానొకప్పుడు మిగుల అపాయకగమగు జ్వరము తటస్థించుట కలదు. గర్భాశయమునందు నిలువయున్న కుర్చిపోయిన పదార్థము శరీరముకానికీ బిల్లు కొన బడుటచే రక్తము విషయత మగుటవలన నీ జ్వరము కలుగుచున్నది. ప్రసవమయిన కొద్దికాలములోనే చలికలిగి శరీరవేడిమి అధికమయి, చెమటపోసిన పిమ్మట స్త్రీవము క్రమముగ నగుచు, స్తనములు ఉబ్బువలనందిన పంటనే ఉపశాంతి కలిగినయెడల—యిది పాలజ్వర మనబడును. చెమట పోసిన పిమ్మట ఉపశాంతి కలుగక స్తనములు బిగితిప్పి చిన్నవై స్త్రీవము తగ్గుదలనందిగాని లేక అనలే అగిపోయిగాని, నాడియొక్క చిల్లి నిమిష మునకు 120 కంటే హెచ్చియున్నయెడల ప్రసవసంబంధ జ్వరమే అని ధృవపర్చవచ్చును. నిస్త్రీణ యేర్పడి ఊపిరియం దాయానముకలిగి, పాలు నిలుపు కానినయెడల, యివిధ మగు జ్వరమునుకూర్చి నిత్యయతనంది, అనుమానము నెంతమాత్రమును ఉండుకొన నక్కర లేదు. పేగులయెడల బాధయు, పచ్చితనమును—తిరుచున్నట్టియు, ప్రిముఖ్యమైనట్టియు లక్షణములైయున్నవి. వైద్యసంబంధమగు వాంతి, దాహము, ఉద్రేకమును చెమట—ఇవియు కూడియుండును. నాలుకపై మాల్సిన మేర్పడి నోరు అనన్యముగానుండి ముఖము పాలి పోయి, బహుశః అతిచిరేచనము తేర్పడి విరేచనమునందు గట్టిపడిన నులపదార్థము వెలు వడు చుండును. ఈ విధమగు జ్వరము అంటుగూఁమును గల్గియుండును. గాన ఒక బాలింత రాలు నుండి యింకొక బాలింత రాలునకు వ్యాపించుపండ్ల బాగితలను అవసరమునుబట్టి పుచ్చుకొనవలసియుండును. విరేచన మగుటకును చెమట పోయుటకును అవసరమగు బొవధ ముల నారంభమునందే యియ్యవలయును. 4 వ బొవధయోగమును విరేచనకారిగ నియ్య వలయును. రెండు బొన్నలు చిట్టాముదమును పది లేక పండ్రెండు బొన్నలు సబ్బితోగలిపిన నీళ్ళను—యెనీమాగా ఉపయోగించవలయును. జ్వరవేడిమిని తగ్గించుటకు గానునీట్రేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియాను గలిపిన జలమును ప్రతి నాలుగు గంటలకును ద్రాగవలయును. ఉడుకు నీళ్ళను భగరంధ్రము ద్వారా పిచికారీని జేయవలయును. ఉదరముపైన వేడియైన అవినీపిండి కట్టుతను గట్టవలయును. గదిలోనికి గాలియొక్క రాకపోకలకు పిలుగ నుండవలయును. దుర్వాసనను బోగొట్టినట్టి పదార్థముల విరివిగ నుపయోగింపవలయును. బలమునిచ్చు పాలు మొదలగు ఆహారపదార్థముల నిత్యవలయును.

పంటి నొప్పి.

పంటియొక్క నరము రేగుదల నందుటవలనగాని, వాపుదల కలుగుటవలనగాని, పంటి నొప్పి కలుగును. నరము బడుట బడువంతవరకును పన్ను తీడించి యుండుట సామాన్య కారణమైయుండును. పంటియొక్క తీగత బడుట వైపునగాని కుడురువయిపునగాని పుట్టి లోనకు విరేచించును. పండ్ల మధ్యనుండే ఆహారము కుళ్ళుటవలన అమ్ములవలెనే ఈవల్ల పదార్థము పండ్లవయిన పనిచేయును. నోటియందుండే పుట్టికొమ్మజాతి సంబంధమగు ఒక పురుగు పుష్పివన్నుల నావరించి తీగితికి సహాయము చేయును. పంటియొక్క తీగతయొక

పుడు నొప్పి వలనమాత్రమే తెలియదగి యుండును. గర్భవత్సరమున అడువారల యొక్క పంపు చెడిపోవుటకు యెక్కువ యుద్యోగతతను వహించును. కావున నీ సమయమునందు శ్రమలు యెక్కువగా జాగ్రత్తను వహించియుండవలయును. పండ్లపండ్ల అయిదు ఆకలియును ఆమమును యిరువత్తొనకుండ జూడవలయును. దళపండ్లనన్నియు జోట యయి నట్టియు ఉమ్మినీరు యేర్పిడునపుడు మంచి పండ్లపాడి నుపయోగించుచు, బ్రష్తో బండ్లు దోముటకు బ్రారంభించవలయును. చాల పండ్లపాడులు మొరుముగానుండి పండ్లను గీరునీతి యందుండును గాన, నవి హానికరములైయున్నవి. వీలయినయెడల పృతిభోజనము పిమ్మటను పండ్లను తుభ్రము చేయవలయును.

పండ్లను తుభ్రము చేయుటకు ఉపయోగించెడి పండ్లపాడి పండ్లకు ఒరయి కను గలగజేయనట్టిది గను, పురుగులను నాశనము చేయునట్టిదిగను పండ్లచిగుళ్ళకు రేగుదలను బుట్టించనిది గను, ఉండ వలయును. ఈ అన్ని గుణములును కాల్యూర్ట్ న్ కార్బాలిక్ టూత్ పుడుదు నందు కలవు. కార్బన యీ పండ్లపాడిని ఉపయోగింపనగును. ఒకానొకపుడు నరములసంబంధమగు ఒక విధమయిన తలనొప్పికలిగినపుడు ఆ రోగ్యతను వహించియున్న పంటియందుగూడ కొన్నియున్నట్లు గానించును. ఇందులకు ముందుగా విరోచనకారి నుపయోగించి పిమ్మట క్విన్స్ ను సేవించవలయును.

పంటియందు గుంటపడి, బాధ అధికముగా నున్నయెడల, గుంటయందు లింటతో గాని కాటన్ డోల్తోగాని పొడిగానుండునటుల దుశిచి, ఒక గ్రేయిను క్యాంఫరు (కర్పూరము), ఒక గ్రేయిను ఓసియం (నల్లమండు), ఈ రెంటితో గలిపి చేసిన పేస్టుతో ఆ గుంటను పూడ్చవలయును. లేక స్పిరిట్సు ఆఫ్ క్యాంఫరు కొన్ని చుక్కలను లింటతో నద్దినను అద్దవచ్చును. ఒకటి రెండు చుక్కలను క్రియోరేట్, క్లోరోఫారం, టింక్చర్ ఓసియం, పెప్పర్ మంట్ ఆయిల్, క్యాజిపట్ ఆయిల్, పీటితో చేసినైనను చూడ నద్దవచ్చును క్లోరల్ హాయిడ్రేన్ నున్నా, క్యాంఫరునున్నా సమానభాగములుగ గలిపి, యాద్రవమును పంటియందు పూయొగింపనగును. బ్రోంట్ వెల్కం అండ్ కంపెనీయొక్క రొకేన్ పేస్టాయిడ్ ను (1/6 గ్రేయిను) పంటియొర్రును దుంచి కాటన్ డోల్తో గప్పి యుంచవలయును పంటియొక్క క్షీణత నాపుదల జేయుటకు వీలలేనంతవర కభివృద్ధినిొంది యున్నపుడు పంటిని దీయించివేయుటయే ఉత్తమమయినది.

పంటిచిగురుల వాపు.

పంటియొక్క చిగురులు వాపునందిన పిమ్మట, కొన్ని విషయములలో కరువులుగా చేపవచ్చును. అక్కడ జీవనయెడల నీకుగువులు చెందగూడ కూడ చేపవచ్చును. అస్వస్థ భాగమునందు మిగుల పోటుతో గూడియుండును.

వేడి కాపడములను గాచుటవలనను, వేడినీళ్లను నోటిలో పోసికొని పుష్టిలించి ఉమ్మినేయుటవలనను, ఆరంభమానం దుపయోగముగ నుండగలవు. వాపుదలను గలగజేసిన

పన్ను యొక్క వక్షిణగతి సందియమైనందున, దానిని అంగీకరించుటయే మంచిది. లేనిచో యీక్షరపులు మరల మరల కలుగగలవు.

పాము కాటు.

ఇండియాదేశమునందు 213 తరగతుల పాములు కలవు. ఇందు 219 మూతమే విష సంబంధమైనవై యున్నవి. ఈవిష సంబంధమైన వాటియందు, 'వైపర్స్' కలెక్టర్స్ అని రెండు తెగలు కలవు. మొదటివాటికి మొండితోకలును, త్రికోణాకారమును వహించిన తలలును ఉండును, రెండవ తెగవాటికి పడగలుండును. నీటికి మనము త్రాచునాము లందుము. ఈ త్రాచుపాములందు రెండే విష సంబంధముగ గొలుండును. అంగిలియందు వేరుపంపు ఉండి యుండును గాని, యివి విషమునకు సంబంధించి యుండవు.

లక్షణములు.

విషసర్పములు కరచుటవలన, కాటుయొక్క గుర్తులు రాదా మాత్రమే కనుపడును. రెండుగుర్తులకంటె నెక్కువగా నున్నప్పుడు, విషసర్పము కనుపడేదని గాని, విష సంబంధములకు కోరవలన కాటు గలిగియుండలేదని గాని యెంచవచ్చును. పాము కరువగనే, యేని యొకటైనట్లుండును గాని, అరంభమానందు విశేషభాధ ఉండనేరదు. నిస్సాగి, వాంతి వచ్చునట్లుండుట, కాళ్ళు నిలువలేకపోవుట, మత్తు, ఒకప్పుడు వాంతికలుగుట, -- యివి తరువాత శివుముగ గలిగెడి లక్షణములై యున్నవి. పిమ్మట, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములై ఆయాసముతో గూడి యుండి, నాడి చరుకుబాకి కలతపడియుండి, మూట్లాడుటకును, మ్రింగుటకును, శక్తులు నశించి, నాలుక ముందుకు తోసికొనివచ్చి, నోటినుండి నుగుగులు వచ్చుచుండును. చేతులను, కాళ్ళను కదల్చుటకు శక్తి తప్పిపోవును. చల్లని నోమట పోసి తెరలుగా మూర్చలు కలిగి, రోగికి స్పృహతప్పిపోయి, కొద్దిగంటలలోనే క్షీణగతి నొందును. ఆయినను, చాల విషయములలో రక్తమా విడుదలైతేమై, వ్యాధి చాల దినములకు వ్యాపించుటయు గలదు. కాటుగలిగినచో వివర్ణమై, అవయవము డబ్బుదలనని యెద్దియో యొక భాగమున గురువుగా దేలవచ్చును. ఒకానొకప్పుడు అది విరేచనములు కలిగి, కాటు కలిగిన స్థలమునుండి రక్తము కారవచ్చును. ఇంకొన్ని విషయములలో మాత్రము రక్తయంతమై యుండవచ్చును. లేక ముక్కువెంబడి పేగులవెంబడి పండ్లచిగుళ్ల వెంబడి రక్తము కారవచ్చును. బయమువలన గలిగెడి మనోహరి విషప్రేరణకు స్వహాయ ముచేయును. గాయములోనికి జొచ్చిన విషముయొక్క పరిమాణమునబట్టి, వ్యాధియొక్క లక్షణములు ఉద్భవమును వహించి యుండును.

చికిత్స.

ఈ విషయమునకు పరియగు విరుగుడు యింతవరకు గనిపెట్టి యుండక పోయినప్పటికిని, శివుమైనట్టియు సామర్థ్యముతో గూడినట్టియు చికిత్సను జేయుటవలన బాణమును

గా పాడవచ్చును. ఈకింద జెప్పబడిన పనులను వెంటనే జేయవలసి యుండును. కాటు కాలుమీదగాని చేతిమీదగాని అయి యున్నయెడల, గాయమునకు కొన్ని అంగుళములపైగా కట్టును గట్టవలయును. ఈకట్టు రక్తస్పృహారమున కాటంకము గలుగునంత గట్టిగా గట్టవలయును. కట్టునకు క్రిందిభాగము యెర్రపడి, పిమ్మట నల్లపడుటవలన కట్టు క్రమముగా గట్టబడినట్లు గ్రహింపవగును. దీనిపిమ్మట కాటు భాగమునుండి రక్తమును నోటితో పీల్చవలయును. ఈపీల్చినదానిని ఉమ్మివేసి నోటిని శుభ్రముగా గడుగుకొన వలయును. ఇట్లు చేయువాడలకు నోటియందుగాని పెదవుల యందుగాని యేవిధమయిన పుండుయును లేకుండజూడవలయును. ఆస్వస్థభాగమున అనగా కాటుగలిగిన భాగమందు కత్తితో కొంచెము యెక్కువగా గీసి, వేడినీళ్లలో ముంచుటవలనగాని, వేడినీళ్ళను వైన బోయించుండుట వలనగాని, రక్తస్పృహను నశిపృథ్వి పరచవలయును. కట్టుకట్టిన ఒక ఆరగంట కాలుములో పైన జెప్పబడిన లక్షణము లేమియు గనబడని యెడల, ఆస్వస్థభాగమును గడిగినపిమ్మటకట్టను. ఊడదీయవచ్చును. లేనిచో, నంతట ఇది యుపయోగము లేక పోవుటయే గాక, అపాయకరము గూడ గావచ్చును. కాని, అవయవము వాపుదలనంది చల్లదనమును వహించి యుండినయెడల, పైచికికిని జేయకపోయినప్పటికిని కట్టు విప్పవలసి యుండును. పైన జెప్పినట్లుల కాటునందు ఒకచుక్క స్ట్రెగ్గిక్ ఆసిడ్ గాని కార్బాలిక్ ఆసిడ్ గాని వేయవలయును. లేక ఒకడ్రామ్మనీళ్ళలో 5 గ్రేయసుల పొటాష్ కార్బొంగనేట్ కలిపిన సోల్యూషనును గాని గాయములోనికి పోనియ్య వచ్చును.

చురుకునుబట్టించు పదార్థములలో బార్మిడి, స్పిరిట్సు ఆమ్మోనియా అరో మేటిక్, లైకర్ ఆమ్మోనియా (యూడిల్యూస్) సిటిలో నేది అందుకాటు నందుండినయెడల దానిని వెంటనే యియ్యవలయును. యూడిల్యూస్ 30 చుక్కల మోతాదును ఒక ఆరబొన్న జలమునందు గలిపి యియ్యవలయును. స్పిరిట్సు ఆమ్మోనియా అరో మేటిక్ ను పెద్దమోతాదులో జలమునందు గలిపి యియ్యవలయును. విషముయొక్క ఉద్యోతకలితమానందు తగ్గుదల కనుపడునంతవఱకును యేబొవ్డము నుపయోగించినను ప్రతి పడునైదు నిమిషములకును దానిని మరల మరల యిచ్చుచుండవలయును. నిస్త్రాణ అధికముగా నుండినయెడల చల్లనినీళ్ళను నూఖముపైసయును శిరముపైసయును జల్లి మద్యపట్టిలను గుండెపైసయును జీర్ణాశయముపైసయును వేయవలయును. అంతకాల మందునను, రోగికి విశేషమగు పరిశుభ్రమయిన గాలి వచ్చునట్లు చేయవలయును. ఒడంతయోను ముఖముగ పాదములపైవులను వెన్నగానుండునట్లు చేయవలయును. అనంతర స్థితియందు గాయమునకు పిండికట్టును గట్టవలయును. విషముయొక్క ఉద్యోతకలితములు తగ్గగనే బలమును గలుగజేయు ద్రవపదార్థముల నావారముగ నియ్యవలయును. అవయవము వాచినంతవఱకును యేమేయు జీతన నొందియుండుని యెడల పైన జెప్పబడిన చురుకు బుట్టించు బొవ్డములును, పిండికట్టును ఉపయోగించ వలసి యుండును.

పాండురోగము.

పాండురోగమునందు రక్తహీనతను నూచించుచుగాని, రక్తమునందలి రొచ్చల్లక దీనియొక్క ప్రధానమగు సహజ లక్షణమయి యున్నది. ఆరోగ్యతయందుండి రక్తము

నంను యెర్రనికణము లధికముగ నుండుటవలన రక్తమునకు యెరువురగు కలుగుచున్నది. ఈ యెర్రని రక్తకణములు సంఖ్యయందు తగ్గువలన యుట వలనను, విగ్న (లోహము)ను గలిగియుండినట్టియు, డిజిరియందు లోపక బీల్చు ప్రాణ వాయువును శ్వాసకోశమునండి శరీరమునందలి యన్ని భాగములకును గొంపోవుటకు శక్తిగలిగియుండినట్టియు, హామోగ్లోబిన్ ఆనబడు యీ యెర్రని కణముల యందలి యుక్తభాగము తగ్గియుండుట వలనను — యీ పాండురోగము యేర్పడుచున్నది. రక్తమునందు జలభాగము అధికమయి రక్తమునందలి మరకొన్ని పదార్థములును వాటి గుణములయందు మార్పును కలుగజేయుచున్నవి.

చాలని అహారము; నూర్గరస్సి చాలినంత లేకపోవుట; నీటికిగడులతో నివసించుట; చాలినంత పరిశుభ్రముగకాలి, శరీరపాదకము లేకపోవుట — యీవి అన్నియు ఆకలికి మీదతను గలుగజేసి, శరీరమునకు బలమును గలుగజేయవు. అతి బడలికవలన శీర్షావయవములు కూడ దీయగలుగు దానికంటె శరీరమునం చెక్కువ నట్లమును గలుగ జేయును. అలచాటుగ నేర్పడిన మలబంధమున దు, మలమునందలి కొన్ని ఉష్ణప్రదార్థములు శరీరములోనికి బీల్చుకొనబడి, విషములుగ బయడేయును. అధిక మనోపరిశ్రమవలన, నిద్రాభంగము కలిగి శీర్షాస్పృశలు గలుగును. మనోవిచారము వలన మనస్సులు పాలిపోవు విషయమై మనము తరుచుగ వినుచునేయుంటిమి. చెమ్మతో గూడినట్టి ప్రదేశములును మన్మథదేశములును యీవ్యాధి కుద్యుక్తతను, బుట్టించును. మూత్రగ్రంథులయొక్క మీదకక, మూలశంక, ప్లిహవ్యాధి, ప్రకొపించుచుండేడి చలిజ్వరము, అధిక ఋతుస్రావము — దీని వ్యాపితమైన యీ అన్ని వ్యాధులయందును పాండురోగము ఫలితముగ గలుగవచ్చును.

ల త్స ణ ము లు.

ఈ వ్యాధియందు బడలు పాలిపోయి యుండును. స్వశీయల యందు చర్మము నందలి మెరుపు తగ్గిపోయి, ఆరచేతులు యెక్కువ తెల్లదనమును వహించి యుండును. నేత్రములలోను తెలుపులు యెక్కువ తెలుపులై, కనురెప్పలు, ముక్కు, నోరు, — బిట్టియొక్క లోపలిభాగములును, నాలుకయు, పెదవులును పాలిపోయి యుండును. చెంపలయందు రక్తము హీనమైనను శరీరమంతయు బరువునందు తగ్గిపోయినను ముఖము నిండుగానుండి ఉబ్బుదల నందినట్లుండును. రోగి నిస్త్రాణనంది చలితోగూడి పరిశ్రమను ఆయిష్టుడై యుండును. ఆరచేతులు తరుచుగా మండుచుండును. పాదములు సాధారణముగ జల్లగనుండును. జలుబు ప్రవేశించి గొంతునందు పచ్చి యేర్పడి, శ్వాసనాళములు తగుచుగ నస్వస్థతస్థితియందుండును. వాయువునందు గలుగు మార్పువలన అతిరిచేనము తేగ్గడవచ్చును. అకలి సామాన్యముగ మౌదగించి యుండును. మూత్రము సాధారణముగ తెల్లనైయుండి, ప్రేగులయందు మలబంధ మేర్పడును. కణితలసమీపమున తలనొప్పియు పోటుతో గూడి యుండవచ్చున భోజనము చేయుటవలన పరుండి యుండుట వలనను యీనొప్పి స్వస్థకొనవచ్చును కూర్చుని యుండుటవలన గాని, పరిశ్రమను జేయుటవలన గాని, యీ నొప్పి అధికమగును కాళ్ళను చేతులును లాగుట తరుచుగా నుండును శ్రీలలో ఋతుస్రావమునం దస్వస్థత యేర్పడును. కుసుమవ్యాధి(బుకొరియా) తరుచుగ గలుగుచుండును. గుండయొక్క అడర

యేర్పడును, వ్యాధి అభివృద్ధి నందిన కొలదిని ఉచ్చాస్య నిశ్వాసముల యందు ఆయాస మేర్పడును. నిస్త్రాణ అతిశయమగును. జీతముందలి అస్వస్థతయు పెంపందుచుండును. చెడిపోయిన రక్త ప్రవాహమువలన మెదడును అస్వస్థతనందుట కారంభించును. రోగికి కోపము అధిక మగుచుండును. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువయి దేనియందైనను దృష్టినిలుపుట యందలి శక్తి హీనత నందును. వ్యాధి కొంత కాలమువరకు వ్యాపించిన పిమ్మట స్త్రీహ ఘనతనంది సాదములును మడమలును వాచుట యేర్పడవచ్చును.

పైన జెప్పబడిన లక్షణములు అన్నియు ఒకేమారుగా గనబడుననిగాని ఒకటి తరువాత నొకటి కనబడుననిగాని యొచరాదు. రక్తముయొక్క స్వీణగతినందుట, ఒకప్పుడు ఒక అవయవమును, యింకొకప్పుడు యింకొక అవయవమును అస్వస్థత నందుచు, కొన్ని మాసములుగాని, ఒకప్పుడు కొన్ని సంవత్సరములుగాని పట్టవచ్చును. పాండురోగము అనేక అంచెలతో గూడిన స్థితులతో శరీరమునందు బ్రవేశించును. అనేక లక్షణము లతిశయిత నంది, కేవలము నిస్త్రాణ వలననేగాని, లేక అంగవికృతిరోగమో పతనాయువో ప్రవేశించుట వలనగాని రోగి మరణము నందవచ్చును. ఈ వ్యాధియొక్క సూచన లేమాత్రము గనబడినను నిర్లక్ష్యము చేయరాదు.

చి క్రి త్త.

ప్రతిదినమును సామాన్యమగు శరీరసాధకమును బుచ్చుకొనుచుండవలయును. రోగి నివసించుచుండు, నిద్రించుచుండు, విచేయుచుండు స్థలములందు పరిశుభ్రమగు గాలియొక్క రాకపోకల కనువు లేర్పడియుండవలయును. ఆహారము బలమయి నదిగ నుండవలయును. అజీర్ణమును గలుగజేయు వాటిని దృఢజింపవలయును. సారాయి మొదలగు వాటిని బహుమితముగా బుచ్చుకొనవచ్చును. చన్నీళ్లలో స్నానముగాని గోరువెచ్చని నీళ్ళలో స్నానముగాని మిగుల ఉపయోగముగ నుండగలదు. వాయువు నందు మార్పులు గలుగుటకై యితరప్రవేశముల కరుగుటయు మంచిది. పైన జెప్పబడిన కారణమువలన ఐర్న్ (లోహము) కలిసియుండు బలవర్ధకావధములు యెక్కువ ముఖ్యములైయున్నవి. ఈ లోహము శరీరమునందు పట్టుపట్టుటకుగాను ఆరోగ్యత కవసరమగు యితరపదార్థులను అవలంబింపవలయును. ఐర్న్ సంబంధమగు మందులలో సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఐర్న్ ను ముఖ్యముగ సుపయోగింపనగును. దీనిని 2 మెదలలు 5 గ్రెయినులవరకు రెండు లేక మూడు బోన్సుల జలములో గలిపి యిచ్చువలయును. నాలుక బండబారి వెడల్పుగను, తెల్లగను, పండ్లచే నొవ్కులు పడుచుండు స్థితిలో నుండి నపుడు, యిది యెక్కువ ఉపయోగముగ నుండును. మలబంధ మేర్పడి యుండికయెడల విరేచన కారుల నవసరమునుబట్టి ఉపయోగింపనగును. ఋతుసాగ్రవ అస్వస్థతతో గూడియుండిన యెడల ఆందులకగు చికిత్సలనే జేయవలయును.

పాండురోగము స్థిరతనంది చాలకాల ముండియుండినపుడు నీలిగిరి ఎర్రత పొంతములందు కొన్ని దినములు నివసించబోవుటవలన మిగుల ఉపయోగముండగలదు. కొద్దిసాటి సముద్రీయ మాణిములనను గూణవియ్యగలదు. బోవిధయోగముల కిందిపాడనగును. ఋతుసాగ్రవసంబంధమగు అస్వస్థతతో గూడియెడల 5 వ బలవర్ధకావధమును వాడవలయును.

శరీరముయొక్క వర్ణము తిరుగుదల నందుచున్నపుడు, లైకర్ ఆర్చినికాలిస్ 40 మినిములును 8 బౌన్సుల జలముతో గలిపి ఒక బౌన్సువోషన్ దినమునకు మూడు పర్యాయములు భోజనానంతరము పుచ్చుకొనవలయును. మలబద్ధము డిరుదల అందులకగు చికిత్సను కేయవలయును. ఆకలి సరిగా లేనియెడల ఆహారముతో ఫేర్చెల్డ్స్ పెప్సిన్ పిల్లాయిష్ట నుపయోగింపనగును. బిడ్డలకు ఒకగ్రామును మొదలు రెండు గ్రాములవరకు దినమునకు మూడు సార్లు కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ను యియ్యవగును. ఈ వ్యాధియందు బుక్రీట్ వెల్కిం ఆండ్ కంపెనీయొక్క బిఫ్ ఆండ్ ఐర్న్ వన్ మిగుల ఉపయోగపడు ఆహారముగ నుండగలదు.

స్త్రీ హ వ్యాధులు,

స్త్రీ హ అనెడి ఆవయవము ఎదుటివైపున జీర్ణశయమువలనను, నెనుకొని వైపునకొక యొడుకలవలనను మాయబడి, ఆరోగ్యస్థితియందే త్రాగుటవలన తేలికగా గనుగొన వీలు ఉండదు. స్త్రీహయొక్క అనేకవ్యాధులు చలిజ్వరమువలన గలుగు చున్నట్లు యెంచబడుచున్నవి. స్త్రీహవ్యాధియందు ముఖ్యమయినవాటియందు రక్తము కూడుకొనుట యేర్పడుచున్నది. ఈరక్తము కూడుకొను నీతి ఉద్భుతగతియు దీర్ఘవ్యాపకగతియు అని రెండు గతులుగ నేర్పడియున్నది.

ఇందు ఉద్భుతస్థితి, చలిజ్వరమందు యొక్కవ తరుచుగ నకస్మాత్తుగ గలుగుచుండును. చలిగతియందు ఉపరిభాగమునుండి రక్తము అంతరావయవములకు గొంపోబడి స్త్రీహయందును అధికరక్తము ప్రవేశించి యందలి ఆల్బికలు విస్తరింపునంది, యొక్కవ ఒత్తిడిని బొందుచున్నవి. ఎడమవైపునందలి ప్రీక్ష్మాకలక్రింద బాధగనుండి వచ్చిననుగూని కాధ నడుమువరకుగాని యెడమ భుజమువరకుగాని వ్యాపించియుండుట వలన రోగి యెడమవైపుల స్వస్థతగా బయండుటకు వీలుండదు. తిర్వటయు వాంతియు ఉండవచ్చును. వాంతియందు రక్తముండ వచ్చునుగాని విరేచనమునందు తరుచుగా రక్తము కనుపడును. చలిజ్వరము రానివారలయందు యీవ్యాధి కలుగుట బహు ఆరుద్ర యున్నది. ఉద్భుతస్థితి నివహించిన యీవ్యాధి కొద్దిదినములు చెమటపోయుట వలనను ఆతివిరేచనము లగుటవలనను మూత్రమునందు దళవయిన గసి తేలుటవలనను నశించిపోవును. మొదటిపర్యాయము యీవ్యాధి కలిగినపిమ్మట రక్తము కూడుకొనుట పూర్ణముగా నధికమగును గాన తరుచుగ నిట్లు కలిగినయెడల యీ ఆవయవమునందలి ఒత్తిడిగలిగిన ఆల్బికలలో రక్తసంబంధమగు పదార్థములు నిలువయుండుటవలన నీ ఆవయవము మరల స్వాభావిక పరిమాణము నందజాలదు. ఇందు మూలముననే స్త్రీహస్థిరముగ ఘనకనండుటను గలిగి చేతితో చాకుట మూలమున దీనిని గనుగొనవచ్చును.

దీర్ఘ వ్యాపక గతియందున్న యీ వ్యాధి, యీ వ్యాధియందలి ఉద్రుతస్థితి అనేక మారులు కలిగినదాని ఫలితముగ గలుగవచ్చును. కాని తరుచుగా స్థితి క్రమక్రమముగను బాధ లేకుండగను బ్రకేరించి చాలా కాలము ఆశ్చర్య జేయబడుటవలన, తుదకుఁను సందిన యీ అవయవము బరువై యెడమ వైపుల బడసోప్పి ప్రారంభమగును. ఈ అవయవము యొక్క అస్వస్థత అధికమయినప్పుడు మిగులపెద్దదియై, ముఖ్యముగా బిడ్డలయందు ఉదరము విస్తరించి హిమచుకొని వచ్చినట్లుండును. ఈస్థితియందు శరీరవేడిమి సామాన్యముగ సాయంకాలమునందు 100 డిగ్రీలవరకు హెచ్చును. ఈ హెచ్చుదల విడువకుండ గలుగుచుండినయెడల వ్యాధి పెంపందుచున్నదని చెల్పవచ్చును. బిడ్డలయందును పెద్దవారల యందును స్లిహా ఘనతనంది యున్నపుడు పచ్చిగాను పెళుసుగాను ఉండి బద్దలగుటకు యెక్కువ అనువుదేర్పడి యుండును.

ఈ అవయవముయొక్క అస్వస్థత చేర క్తమునందలి యెర్రగిని కణములు తగ్గదలనందుటవలన పొండురోగము ప్రకేరించి మనసి పాలిపోయి నాలుక తెల్లనై వణక స్థితియందుండి కండ్లయందలి తెల్లపులుకూడ మెరయునట్టి వర్ణము కలిగి అతివిరేచనములు తరుచుగ గలుగవచ్చును. కొంత స్థితివగతును నెమ్మదించుటకు వీలు ఉండును. స్లిహా యొక్క ఘనతనొందుట అధికమయి, రోగి మరియొ పీరసతిసంది ఉదరమునకును కాళ్ళకును నంజామాపి అతి విరేచనములు గాని ఆమదిరేచనములు గాని స్థిరములై రోగి మరణము నందును.

స్లిహా ఆకస్మికముగా బాధనందినపుడు వేడికాపడములను గావలయును అతి విరేచనములు లేకుండినపుడు 5 వ విరేచనకారిని వాడుటవలన విరేచనము లగునట్లు చేయవలయును. అతివిరేచనము లుండియుండిన యెడల అదేబోషధ యోగమును సోడానత్సేటు లేకుండ వాడవలయును. చలిజ్వరముండిన యెడల, అందులకు చికిత్సను జేయవలయును. జ్వరము లేకుండ స్లిహా వ్యాధులయందును విరేచనము క్రమముగా నగుచుండుట అవసరముగాన జరూరునుపట్టి 5 వ విరేచనకారిని వాడవలయును. బిడ్డల పాలు విశేషముగ పుచ్చుకొనుచుండ వలయును. ఇందుతో లైంపాటరును కొంచెముగా గలుపనగును. సల్ఫేట్ ఆఫ్ విరనును 2 మొదలు 5 గ్రెయినుల వరకును 2 లేక 3 బౌన్సుల జలములో గలిపి యిచ్చునగును. ఉదరమువైపుల ఫ్లానల్ గుడ్డను సామాన్యమగు బిగింపుతో గట్టుట వలన నుపయోగముండగలదు.

వీలున్నచో 40 గ్రెయినుల పల్విస్ జాలస్ కో తో గూడ 5 గ్రెయినుల సల్ఫేట్ ఆఫ్ విరన్ ను గలిపి పూర్తి ఉదయమునను యిచ్చుచు 3 వ బలవర్ధకావధమును దినమునకు మూడు పర్యాయములు వాడవలయును. దీర్ఘ వ్యాపక స్థితిలయందు 10 గ్రెయినుల ఫెర్రయి ఆరెనస్, 1 గ్రెయిను స్క్రిక్ నీక్, 40 గ్రెయినుల క్వినిన్ వీటి నన్నిటిని గలిపి 40 మాత్రలుగా భాగించి, దినమునకు మూడు మాత్రల చొప్పున సేవించ వలయును. లినిమెంట్ ఆయెడిన్ ను, పుండు పడకుండనట్లు జాగ్రత్తో నెమ్మదిగా నైన రాయవలయును. హైడ్రో జరై ఆయెడైడ్ ఆయింట్ మెంటును ప్రతిదినమును రుద్దనగును. బిడ్డలకు నవో పోస్ట్ లిని మెంటును వైభాగమున సెమ్మడితో రుద్దవచ్చును.

పులిపిరి కాయలు.

స్పష్టమగు కారణ మీదుగా దెలియకుండ ముఖ్యముగా పడుచు వాగల యొక్క చేగు లపై పులిపిరి కాయలు తేచును. తదుచుగా వాటంతట అవియే కలుగునుగా నవలెను. ఈ పులిపిరి కాయలు యెదుగుటలో చర్మముపైన నెత్తుగా నుండిన చువల బలమైన దారము నకు పైనమురాసి వాటిచుట్టును బిగించి కట్టినచో ఒకటి రెండు దినములలో నవి తగి పడి పోవును పిమ్మట పరిశీలనమును వాటిని పటికతో నద్దవలయును. వేడినీళ్లతో గడిసి, పత్తి రాత్రియును గుడ్డను వినిగిలో దడిసి పైన వేయుటవలన కొన్ని పులిపిరి కాయలు యిడిపోవును. వాటిని కోయటముగాని రేగుటలను గలంగ జేయటముగాని, హాదము.

పాదములమీద నయ్యెడు కాయలు.

పాదములపైన యెత్తయిన భాగములయందు ఒత్తిడితగులుటవలన కాయలుగ నేర్పడును వీటిని యెప్పుడును గోయగూడదు. మిగులబిగువైనసూట్టుగాని స్ట్రాప్ గునికొడుగుటవలన నిటు కలిగినయెడల, వాటిని స్తరిచేయుటవలన నయుము కాగలవు. మెత్తనైన కాయలు అయిన నయెడల, ఒత్తిడిని దొలగించుటవలన నవి నర్దుకొనగలవు. వినిగిలో దడిసినపిమ్మట కాయల మీద రాత్రిలయందు ఒక వారమువరకు గట్టినయెడల, ఉపశాంతి గలుగగలదు. ఈ పాదములవలన నుపయోగము లేక పోయినయెడల, ఆసిటిక్ ఆసిడ్ నుగాని సైట్రిక్ ఆసిడ్ నుగాని తేలికగాపైన అద్దవలయును. ఈ ప్రకారము కాయయొక్క మధ్యభాగమును మాత్రిమే అద్దవలయును. దానిచుట్టును చుమరునుగాని హానలనుగాని రాయటవలన, ఆసిడ్ ప్రక్క భాగములయందు దగులకుండ జేయవలెను.

పురుగులు.

మనుష్యునియొక్క పేగులయందు వీడించునట్టి పురుగులు మూడు సామాన్యజాతులుగ యేర్పడియున్నవి. (1) టేప్ పురుగులు—ఒక విధమయిన వీటికిపాము (Tape-worm); ఈపురుగులు సామాన్యముగ పెద్దవారిలయందు మాత్రమే గలుగు చుండును. (2) గుండ్రని పురుగులు (Round-worms): ఈ పురుగులు విడదలయందు ఎక్కువగా గలుగుచుండును. (3) నులిపురుగులు: విడదలయందగు పెద్దవారిలయందగును గలుగుచుండును.

1. టేపు పురుగులు.

ఈ విధమగు పురుగునందు ఆనేక తగలు గలవు. ఇది చిన్న పేగులయందు గాని, పెద్ద పేగులయందుగాని, నివసించును. ఒక్కొక్కప్పుడు పేగుల యంతటను వ్యాపించి యుండును. దీనియొక్క పొడుగు విశేషముగనుండి, అరు అడుగులు మొదలు ఇరవది అడుగుల వరకును, ఒక్కొక్కప్పుడు యంతకు మించియును ఉండును. ఈపురుగుననుపై, తెల్లగానుండి, టేపుదారమునుబోలి, అంతంగకమునకు సంబంధముగల గురి, మూడు ఒక అంగుళపు

పురుగులు గా నలుగురును, ఒక కేసుకు లోపలే యింకొక కేసును పోయెను, సంపూర్ణముగ నభివృద్ధియందు పురుగునందు యీ ఆకుకులు 1,100 పరకులూడ వ్యాపించి యుండును.

ఈ పురుగుయొక్క శ్రుతిజలపునందు పుగవభాగమును శ్రీభాగమును గూడ గలవు. కాబట్టి ప్రతిభాగమును అనేక పురుగులతో చేర్చిన పంక్తిగా నెంచదగి యున్నది. ఈ పురుగుయొక్క తలవైపున పన్నునై ఆదోకగానుండును. కిరము త్రికోణాకారముగనుండి సుమారు గుండుసూదియొక్క తలయంత యుండి, నాలుగు నల్లనిచచ్చలుండి యీభాగములతోనే బేగులను బట్టియుండును. ఈ పురుగు పెడయొద్ద కొన్ని కలుపులు రేర్పడుచుండుటవలన పొడుగునం పెడుగుచు, తోకయొద్ద సంపూర్ణాభివృద్ధి నందిన కలుపులు, మలముతో బడిపోవునుండును. ఇట్లు బయలు పెడలిన తునుకలయందు యీపురుగుతో సంబంధించిన అంశము లనేకము లెక్క లేకుండనుండును. ఈ అండిములయందలి పిల్లలకు బోరియలను జేయుట కవసరమగు ఉపకరణము లేర్పడియుండును. మలముతో వెలువడిన నీపురుగుయొక్క కలుపులు కుప్పట, యారంభించిన నే, అందలి గుడ్డు, గొట్తోగాని, నీటితోగాని, యితరమగు కాగణముల మూలమునగాని, ఆకస్మికముగ నెట్లు గొంపోబడిన నట్లు తమ గవ్యస్థానమును జేరుచున్నవి. ఈగుడ్డు కేవల ఆకునముతో, పశువులయొక్కయు, పండులయొక్కయు మేకలయొక్కయు, యితరజంతువులయొక్కయు, జీర్ణాశయములందు జేరవచ్చును. జీర్ణాశయమునందు యీగుడ్డు పగిలి పిల్లలయి బోరియలు జేయుటకును పనిముట్లతో మాంసము లోనికి మార్గముల జేసికొని, అందు తిత్తిసంబంధమగు పదార్థముగా నభివృద్ధి నందుచుండును. మాంసమును దినుటలో యీ పదార్థమును భుజించినవారల యొక్క పేగులందు యిది పేపుపురుగుగా నెదుగును. కారగాయలయందును ఆకస్మికముగ నీసంబంధమగు పురుగు స్థానము చేర్చరచుకొని యుండినయెడల, నట్టివానిని దినుటలేనను యీ వ్యాధి సంభవించవచ్చును. ఎట్టి పదార్థములును బాగుగా నుడికిన యెడల, అంగుండు రేసంబంధమగు పురుగులను గుడ్డును నశింపునంది తీరవలయును. కాబట్టి సగము ఉడికిన పదార్థముల భుజించుట పనికిరాదు.

పేగులయందునొప్పి, విరేచనము క్రిమముగా గాకపోవుట, విరేచనమగునపుడు ముక్కుట, ఊపిరిగాలియందు దుర్వాసని, నాలుకపై పొరగముట్ట, క్రిమముదప్పుచుండు ఆకలి, మూత్రాశయముయొద్ద రేగుదల, ముక్కుయొద్దను ఆసనుయొద్దను దురద—యీలక్షణములతో కూడియుండును. నిద్రయందు పండ్లుకొనుట, బిడ్డలు భయముతో నేడ్చుచు నిద్రలేచుట—యీ అంశములును గవసరమిది గుప్పిరి. తలనొప్పి, వికారము, పొడిదగ్గు, గుండెదరు, నిద్ర—వీటినిగూడ నీ వ్యాధిలక్షణములుగా నెంచవచ్చును.

చి కి త్త.

పురుగులకై ఉపయోగించెడి మందులు ఆ పురుగులకు క్రిమముగా దగిలిన యెడల చావనైన జచ్చును. లేక వెలువడినైన వెలువడును. పేపుపురుగు విషయముతో ముఖ్యముగా మందులు పురుగుయొక్క కిరమునకు దాకవలయును. లేనిచో, యీ పురుగుయొక్క పొడగునం పెట్టగ జములు వెలువడిపోయినను, కిరము నిల్చియుండిన యెడల పురుగు మరల అభి

వృద్ధి నంది పనుకటి లక్షణములే మరల పుష్కరింపబడును. ఈ పురుగులముక్కు శరము పేగుల యందలి అమమునందు గట్టిపట్టును బట్టియుండును. కావున యిట్టిపురుగునకే మందు నిచ్చ నపుడు కొన్ని మందు జాగ్రత్తలను బుచ్చుకొనవలసి గుంపనది. మూ హాదినములు ముందుగా పాలు రొట్టె మొదలగు తేలిక పదార్థములను భవజీవనములాగును. బంగాళాదుంపలు, పిండి వంటలు మొదలగునవి తృణింపవలయును. మూడవదినము గాత్రీయందు చిట్టాముదమును గాని, 4 వ బౌషధయోగమునుగాని, విరేచన కారిక బుచ్చుకొనవలయును. మనచేతి ఉదయ మునగాని, యీ విరేచన కారి పని చేసిన పిమ్మట గాని యిందుల కేగ్గడిన మందును ఉపయోగించవలయును.

ఈ క్రింద చెప్పబడబోవు బౌషధములు దొరకనియెడల దానిస్థానమును వాడ నచ్చును. (దానిమ్మచేతయొక్క టెరడు, పచ్చిచైనముడల 2 బౌస్సులును యెండుదయిన యెడల 3 బౌస్సులును 2 పయింట్ల నీళ్ళలోజేసి ఒక పయింటి అగునట్లుగా కాచి వడ పోయవలయును. దీనిని మోతాదు ఒకటికి రెండు బౌస్సుల చొప్పున నుపయోగించవలయును. దానిమ్మకాయయొక్క బెండు అయినచో అదేప్రకారముగా కాచి దీనియొక్క మోతాదు ఒక బౌస్సు మొదలు ఒకటిన్నర బౌస్సువరకు మాత్రమే అయియన్నది. ఈ 3 పాయమును మొదటి విధముగా జేయబడిన దైనయెడల 2 బౌస్సుల చొప్పునను రెండవవిధముగా జేయ బడిన దైనయెడల మోతాదును తగ్గించియును, అగంట కొకపర్యాయము చొప్పున ఆరు మారులు పుచ్చుకొనవలయును. అటుతరువాత నాలుగు గంటలవరకును విరేచనము గాక పోయినయెడల చిట్టాముదమును బుచ్చుకొనవలయును. ఈ విరేచనములగుండా పురుగు పడి పోవును. పురుగుయొక్క శరము విరేచనములందు గనబడక పోయినయెడల మరునటి వార మునందు మరల యిదేపద్ధతి ప్రకారము పనిచేయ నలయును).

ప్రదానికంటె మంచిమందులు:—(1) మేల్ ఫెస్ యొక్క చమురు (లిక్విడ్ టార్) (2) స్పిరిటు ఆఫ్ టర్పెంటిన్; (3) కాసో (Kousso) మొదలగు మందు ఒక దాని మును మూడు భాగములుగా జేసి గంజినిళ్ళలోగాని జావలోగాని గలిపి అరగంట కొక మోతాదు చొప్పున ముమ్మారు యిచ్చవలయును. రెండవమందు అరబెస్సును రెండు మోతాదులుగాజేసి జావలోగలిపి అరగంట కొకమోతాదు చొప్పున రెండుమారు లిచ్చవలయును. మూడవమందు (కాసో) పొడి అరబెస్సును ఒకటంబరు ఉడుకునీళ్ళలో అయియనిమిషములు ఉంచినపిమ్మట అంతయు గలిపి గోరువెచ్చని వేడిగానన్నపుడు ఒక్కమారుగా దాగివల యును. ఈ మందులను పైనజెప్పిన ప్రమమును గమనించినపిమ్మట పరగడుపున బుచ్చుకొన వలయును. మూడులేక నాలుగు గంటలపిమ్మట చిట్టాముదము నొక మోతాదును బుచ్చుకొన వలయును. పిమ్మట పండ్రెండు గంటలవరకును ద్రవపదార్థమును మాత్రమే అహరిముగ బుచ్చుకొనవలయును. మూడవమందు (కాసో) ను విడ్డలకు నియ్యగాదు. వైషధతుల పైన ఏ సాంజోసిస్ ను గూడ నిచ్చి పిమ్మట చిట్టాముదమును యిచ్చుటవలన నొకప్పుడు గుణమియ్య గలదు, ట్రెమార్ (వామపుత్ర) 20 గ్రాముల వరకును మాత్రగా జేసి పుచ్చుకొనుట వలన నొకప్పుడు గుణమియ్యగలదు.

2. గుండ్రని పురుగులు.

వీటినే సామాన్యముగ ఏటిక పాములు అని వాడుచుండురు. ఇవి పేగులను జీర్ణాశయమును ఆశ్రయించి యుండును. ఇవి ఒకప్పుడు వాంతియగుటలో బయటికి వచ్చును. ముక్కు లానికే జొచ్చుటయు గలదు. ప్రేగులలోనికి జొచ్చుటవలన పేగుల యొక్క వాపుదలను బుట్టించును. కారీజములలోనికి జొచ్చుటవలన పచ్చ కామాళ వ్యాధిని బుట్టించవచ్చును. ఈ వ్యాధియందలి లక్షణములు శేపుపురుగు సంబంధమే యుండును. ఈ పురుగువలన బిడ్డల యందు మూర్ఖులు కలుగవచ్చును.

ఈ క్రింది బొంబము దొరకనపుడు శేపుపురుగు వ్యాధికింద యేర్పరుపబడిన రీతిగనే దానిమ్మ కషాయమును యియ్యనగును. నాలుగు గ్రెయినుల సాంటోసీన్ ను రాత్రి పరుండు ముందర యిచ్చి మరుసటి ఉదయమున ఒక ఆర బౌన్సు చిట్లాముదమును యియ్యవలయును దీనివలన నుపయోగము లేక పోయిన యొడల శేపు పురుగు వ్యాధికింద చెప్పబడిన రీతిని టర్నెన్ టీన్ ను ఉపయోగింపనగును. రెండుసంవత్సరముల బిడ్డకు రెండుగ్రెయినుల సాంటోసీన్ ను యియ్యనగును ఇందువలనని పశ్చిమ తీర్థము వయసునకు ఒక పావుగ్రెయిను చొప్పున మోతాదును హెచ్చింప వలయును. సాంటోసీన్ ను చక్కెరలో గలిపి పవుడరుగా దీసికొనగునను. సాంటోసీన్ ను యిచ్చిన దినమున బిడ్డలకు ద్రావణములను మాత్రమే యియ్యనగును. సాంటోసీన్ కు వెలుతురు తగిలినయెడల చెడిపోవును గనుక యిది యుంచబడిన బుడ్డిపయిన బ్రావునుకాగితము నంటించవలయును. సాంటోసీన్ ను ఉపయోగించిన పిమ్మట మాత్రము తివ్రపిష్టమును వహించి యుండును. నేత్రము కూడ నొకప్పుడు ఆస్పష్టత నందవచ్చును. ఈ ఫలితములు శీఘ్రముననే అంతరింప గలవు.

3. నులిపురుగు

నులిపురుగులు, నుమారు మూడవవంతు ఆంగుళము పొడుగుగలిగి కొంచెముగా వంగి యూడి, తెల్లనై యుండును. ఇవి నులముతో బయట పడి పోవుచుండును. వీటి వలన విశేష చనము ఆసుముతోగాని, రక్తముతోగాని గూడి యుండునట్లుల జేయుచుండును. దుర్బలులైనట్టియు, మౌనస్థియుగా నుండఁజ్ఱియు బిడ్డలయందు యిది విశేషముగ వందల కొదియ వేలకొలదియు ఉండును.

చికిత్స.

పెన్సివాలను 5 వ విశేషన కారిని వాడవలయును. బిడ్డలకు చిట్లాముదము నియ్యనగును. శరీర మృదుభృత మిగుల ఆవస్థనుయి యున్నది. రెండు బౌన్సుల వాస్టెన్ లో ఒక ద్రాము గార్బాలిక్ ఆసిడ్ ను గలిపిన ఆయింట్ మెంటును ఆననము చుట్టును రాయటవలన అచ్చటనుండడి యీనంబంధముగు గుడ్డు నళింపు నందును.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೃಶ್ಯ.

నాలుకపై పొంగముట్ట, ఉన్నాడు. అయిదుడు. అతని ముచి, చురు, కలనా
ప్పి, విరచనము కలిమముగా గాక విరచనము నల్లమును మట్టము. వర్షము తప్పి యిండుట,
ఆనందపూడు వైత్య సంబంధముగా అభిరచనముగా. అందుగా నుండునా, 4 డిసెంబరు బద
పుగానుండును— యీ లక్షణములం బేర్చియైనను ఉన్నానని నానా యు డింబడు ప్రత్యో
క్షిక ముండినట్లు యెంబడును.

[illegible]

సోడియం పొటాషియం ఫ్లోరైడ్ (సోడి) 120 గ్రాములును, సోడియం క్లోరైడ్ 40 గ్రాములును, బాదామి నూనె 100 గ్రాములు, గాఢ దీనిని 5 బెన్జిన్ ల జలములో గలిపి, కిక్కురింప 33 గ్రాముల హైడ్రాక్సి ఆసిడ్ ను దీనిలో గలిపి, యీ పొంగు వచ్చు జలమును దాగివలయును.

ప్రాంగు.

(నేడు పుష్య)

పొక్కులతో గూడినట్టియు, సామాన్యముగ బిడ్డలునుండు వచ్చునట్టియు, అంటు సంబంధముగనట్టియు, జ్వరము పొంగు ననబడును. ఈవ్యాధికి కారణమునం దావరించినది మొదలు పక్షమునకు వచ్చువరకి యెనిమిది దినములు మొదలు పదునాగున దినముల వరకును బట్టును. ఈవ్యాధికి చితితోడను, జ్వరముతోడను, జంబు తోగను ప్రారంభమగును. నేత్రములు యెరిగిన పచ్చిగానుండి నీళ్లు కారు నుండును. గొంతు పచ్చిగా నుండ వచ్చును. గుమ్మట, ముక్కువెంబడి నీళ్లు కారుట, దగ్గు, ఉండును. నాలుక తెల్లగానుండి కొనలు యెర్రగా నుండును. చూడవ దినము అంశ్యమునగాని నాలుకపొసము అంశ్యమునగాని, మొదటగా నుండురు. ముఖము, పొడ, కడుపు, ప్రాణము పిప్పిట పొక్కు చేతలమీదను పొక్కులు కనుగడును. కరిగినదిగు 103 మొదలు 104 వరకి వచ్చు వచ్చును. పొక్కులు చివ్వనై యెరిగిననుండి నోవ పంటువలె నుండును ఇది అన్నియు కలిగియుగా కలిసిపోయి యెరువునపు కలిసిన వ్యాధును వహించి చర్మ గునకన కొంచెము యెక్కుగానుండును. జ్వరమును దగ్గును ఉండుచునే నుండునుగాని దగ్గునడలింపు నందును. పొక్కులు కనబడిన చూడు నాలుగు దినములకుముందుగా ముఖము మీదిబిడ్డల పిప్పిట చేతులు కాళ్ళపైనలియును, పొక్కులు వాడనారంభించును. సుమారు రెండు దినములలో పొక్కులు అంతరించి పోవును. పొక్కులు అతికఠముగా నున్నపుడును, తగుదలనందుట కారంభింప

గనే శ్వామ్యమునము గాత్యుద్ధవనందును, ఇన్ము 103 డి గ్రీసుమించియుండునపుడు, ఒకవిధమగు వాసవశోగు డి యుండేపుడును, ఉన్న తక్కుగా సంచనలసియు, ఉన్న అతినిస్త్రాణ, పొడి యెనట్టియు గోధుమార్ద్రయు గలిగినట్టియు వాలుక, కటియొగ్గిని పొక్కులు — యివి అపాయమును ను చించును.

కొన్ని ఉష్ణగోళములందు కొమ్ముపడినెను స్యుప్రెనియా లానికి దింపవచ్చును. వ్యాధ్యనంతరము సంస్కలక కలుగు వచ్చును.

చి న్ని త్త.

వ్యాధి అంతురంగగనే రోగిని పునొండవల్లవలయును రోగిని గాలి పుచకుండు బాగ్గిరి పడవలయును. చి న్ని త్త తగిలినయువల స్యమోనియాత్రింద జేలవచ్చును. వ్యాధి పొగ్గిరంభముననే వేసేనీళ్లలో స్నానము చేయించుటవలన పొక్కులు త్వరలో దేలగలవు. రోగిని సూత్రము గాలిపచకుండ నుండవలయునుగాని, రోగి పరుండియుండు గదిలో గాలియొక్క రాకపోకలకు నీరుగు మార్గము లేవ్వచ్చి యుండవలయును. కండ్లయెదుట యొక్కవ నెల్లరు లేకుండ జేయవలయును. బిడలు పొడిగా మన్నియెడల గోరువెచ్చని నీళ్లతో శరీరమునం దొక్కొక భాగము సూత్రము స్పృంజి చేయించువలయును. చేతులకును పాదములకును వానలీనను గుద్దుటవలన వేడియయెడలన బిగువుయెడలను ఆపకాంతి కలుగగలదు. దాహము విశేషముగా నుండును గాన పాలు నిశ్శు కలిపిగాని, లేకుండనుగాని, యియ్యవచ్చును. విశేషబద్ధముగా నుండినయెడల, చిట్టాముదము నియ్యవలయును. విశేషకాయల నెక్కువ గా నియ్యరాదు. దగ్గు ఉండినయెడల 247 వ పుటయందలి కొండవ బొడధయోగమును వాడవలయును. మూడుభాగములు ఉష్ణజలమును ఒక భాగము వినిగర్ను గలిపిన దానియందలి ఆవిరిని లోనకు బీల్చుటవలన ఉపయోగముగ నుండగలదు. పొక్కులు ఆకస్మాత్తుగ తగ్గి పోయి నిస్త్రాణగ నుండినయెడల వేడి నీళ్ల స్నానమువలన ఉపకారతిగ నుండగలదు.

ఈ వ్యాధి అందు అంటుగుణము విశేషముగ నుండియున్నది. కాని రోగియొక్క బట్టలను విడిగానుంచి, కార్బాక్ ఆసిడ్ సాల్యూషనులో గడగ వలయును. ఈ అంటుగుణమును పొక్కులు కనుపడినయెడల విశేష ఉద్యుతస్థితియందుండును. పొక్కులు కనుపడక మునుపు జలుబునీతియందగుడినపుడును, అంటుగుణము ఉండియుండవచ్చును. పొక్కులు పోయినపిమ్మట మూడువారముల వరకును యీ రోగిని విడిగా నుంచుటయే మంచిది. ఇతరవిడ్డలను దగ్గరకు రానియ్యకుండుట వలన యీ వ్యాధి యొక్కవ వ్యాప్తత నందకుండ నిలుపు చేయవచ్చును.

బ ట్ట ల ల.

1. వండుకలు ఊడిపోవుట.

శరీరవ్యక్తియొక్క దుర్బలతను గాని జ్వరములవచ్చుటగాని కడుచుపారల యందు వండుకలు పోవలసి వచ్చును. స్త్రీలో ఎక్కువలగును. ఇవి నెక్కువకు బాధ నొందినచో

యందును, వెండుకలు ఊడిపోవుట తటస్థించును. మొదటగా అన్ని వండుకలకును విడదీసి దుర్బలమైన పొట్టివండుకలను పూర్తి తొమ్మిదిగవలకును గ త్తిరించుచుండ వలయును. పూర్తిఉదయమునను పోకచెక్కినీళ్లతో తలను గడిసి, ముతుక నావానతో కల నేడియెక్కు నట్లును రుద్దవలయును. బ్రష్తో తరుచుగ దువ్వుచుండవలయును. ఈ వైద్యకరిణము జప యోగింపకపోయిన యెడల, యీ క్రింది బౌద్ధయోగముల నుపయోగింపవగును. అలివ్ అయిల్ రెండుబౌన్సులు, పాటాష్ ట్రైక ర్బనేట్ రెండు ట్రాములు, అమ్మోనియా సాల్యూషన్ రెండు ద్రాములు, టింబర్ కంఠారిడీస్ రెండు ద్రాములు—పీటి నన్నిటిని బాగుగా కలిపి, చప్పిళ్లతో గడిగిన పిమ్మటను, వండుకలయొక్క నుదుళ్ళలోదీసినిబాగుగా రుద్దవలయును. రెండుబౌన్సుల యూడి కిలోన్ రెండుద్రాముల టింబర్ కంఠారిడీస్, పదిమినిముల కోక్ మెరీనా అయిల్ పదిమినిముల లవండర్ అయిల్—పీటినన్నిటిని గలిపియ వైవిధముననే ఉపయోగింపవగును.

2. బట్ట పుట.

శరీరప్రకృతివలన గాని, యితరకారణముల వలన గాని బట్టల యెక్కువ చుండుట తటస్థించువపుడు, మందులు యెక్కువగ బనిచేయబాలవు. అయినను, వండుకల యొక్క నుదుళ్ళయందు చురుకును బుట్టించి, వండుకలను మరల మొలపింపజేయు శక్తి కొన్నిబౌద్ధ ధములందు గలవు. అట్టివి, క్లొరల్ హైడ్రేట్ గాని, రిసార్సిన్ గాని, కలిసియున్న లోపస్థ అయియున్నవి. ఈలోపస్థను యీ క్రింది ప్రకారముగ జేయవలయును.

- (1) క్లొరల్ హైడ్రేట్ రెండుద్రాములు, రక్తి ఫయిడ్ స్పిరిట్ నాలుగు ద్రాములు గ్లిసెరిన్ ఒకటిన్నర ద్రాము, జలము ఆరుబౌన్సులు.
- (2) చిట్టాకుదము ఒకద్రాము, టింబర్ క్లిస్టా నాలుగుద్రాములు, రిసార్సిన్ ఒక ద్రాము, స్పిరిట్ రోక్ మెరీనా నాలుగుద్రాములు, జలము ఆరుబౌన్సులు.
- (3) బీటా నాఫ్తాలి అయిదు గ్రాములు, ఆల్ మండ్ అయిల్ (బాదంనూనె) ఒక బౌన్సు.

ఈబౌద్ధధములను అస్వస్థత భాగములయందు మాత్రమే ఉపయోగించిన బాలును.

బేబు కు లు.

స్నాయువులయొక్క గాని, స్నాయుబంధముల యొక్క గాని, నరముల యొక్క గాని, ఉద్వర్తనమును నివరించు సందుటవలన బేబుకులు కలుగుచున్నవి. ఈబేబుకులు సామాన్యముగ మణికట్టు, మోకాలు మొదలగునట్టి కీళ్లయందు గలుగుచుండును. దీనియొక్క లక్షణములు, ఉద్వర్తనమునాధ, తరుచుగ నిస్క్రిణ, వాపుదల, వివర్ణము—అయి యున్నవి. అస్వస్థతభాగమునకు విశ్రాంతి నియ్యక పోయినను, ఆహారము అమితమైయున్నను, రక్తము ముక్కువలనగా లేక పోయినను, మోకాలు గాని నుతియొక పెద్దకణిగాని అస్వస్థత నంది

యన్నపుడు, వాపుదలయును జ్వరమునును జగవచ్చును. విటిని నిర్లక్ష్యమా చేసినయెడల, ఇంకను సెక్కువ దుష్ఫలితము కలుగ వచ్చును.

చికిత్స.

అన్నిటికంటె ప్రధానమైనది, అస్వస్థతా భాగమునకు పరిపూర్ణమైన విశ్రాంతినిచ్చుట యొయున్నది. బెణుకు ఉడుతసిటిని వహించియుండినయెడల, అస్వస్థతా భాగమునకు కొయ్య బద్దవేసి కట్టవలసియుండును. మణికట్టనకు బెణుకుబట్టిన యెడల, దానిని ఒడిసెలలో మోప వలసియుండును. మడమ అయియున్నయెడల కాలును మంచముపైనగాని బల్లపైనగాని పెట్టి రోగి పరుండిగాని కూర్చుండిగాని యుండవలయును. చల్లని లోవనులను రాయుటకంటె వేడి కాపడములవలన యొక్కువ ఉపకారతి కలుగగలదు. అయినను, యీవిషయమున రోగి యొక్క మనసును కనుగొన వలసి యుండును. పెద్దకీలు అస్వస్థత నందియుండిన యెడల, మలిన రక్తమును దీసివేయుటకు గాను బలగలను పట్టించవలసి యుండును. జ్వరము దగ్గించుటకుగాను అగుమోతాదులలో సెట్రిట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియాను యిచ్చునగును. పిమ్మట సోప్ లినిమెంటుతో తోమనగును. కొంతకాలము పిమ్మట, అనగా నుమాను పడునెడు దినముల పిమ్మట, అస్వస్థతాభాగమును మెల్లగా గుఱుపుటవలనను, సామాన్యమగు పనులకు ఉపయోగించుట వలనను, బ్యాండేజియొక్క అసరావలనను కఠినముగా నయిముకాగలదు. కొద్దిబెణుకులకు హాజరీక్ తో తోమనగును.

బొబ్బలు.

(బిళ్లసంకటము)

గజ్జలయందలి గ్రంథులయొక్క వాపుదలసిటికి బిళ్లసంకటమందురు. ఇది, తరుచుగా సుఖసంబంధ బ్యాధియొక్క ఫలితముగ జేబును. ఇతర కారణముల వలనను, అనగా పాదముమీదనుగాని, అలిమీదనుగాని, కురుపువేయుటవలనను, గుఱుపునవారీ చేయుట, మొదలగు పనులయందు ఆభాగములకు ఒత్తిడి కలుగుటవలనను, గజ్జలలో బిళ్లలు కట్టవచ్చును. ఎట్లు కలిగినను, యీ బిళ్లలవలన వేడివుట్టి, అస్వస్థతా భాగము వాపుదలనొంది, మిగుల పొట్టుపొడుచుచు, ఆభాగమున నొమ్మిటవలన గాని, నడుచుటకు యత్నించుట వలనగాని, బాధ అతిశయ విగుఱుండును. తరుచుగా, బిళ్లలయందు మాలిన్య మేర్పడును; ఒకానొకప్పుడు, యొక్కువ బాధకలిగి వాపునందిన పిమ్మట, దానంతట అదియే అంతరించి పోవును. ఈవ్యాధియందు పరుండి యుండి, అస్వస్థతాభాగమునకు గదలిక కలుగనియ్యికుండ నుంచుట, మిగులముఖ్యము. అస్వస్థతా భాగముపైన చల్లపైన లోవనులోముంచిన గుడ్డనువేసి, అందు మీద తరుచుగా నీలోచింపను బోయుచుండుట వలన, కొంతపరికర మాలిన్య మేర్పడకుండ జేయవచ్చును. పొటాష్ సైట్రేట్ ఆరబొన్ను హైడ్రోక్లోరేట్ ఆఫ్ అమ్మోనియా అరబొన్ను, సామాన్య అణుము అరబొన్ను, జలము పండిండు బొన్నలు, వీటినివీటిని గలిపి నవో, చల్లనయివు లోవను రేర్పడగలదు. శరీరావస్థను యుష్ణజీకవృద్ధుల చేసికొనవలయును.

ప్రారంభ గతియందు, వాపుదలపయిన "ఫ్లేక్సబిల్" కణాడియంను రాయుటవలన నుపయోగముండగలదు. వాపుదలయును పచ్చిదలయును అధికమయి, బాధ యొక్కవ పొటునో గూడియుండినయెడల, వేడి కాపడములనుగాని, వ్రణములకగు జీడినను జీయవలయును. ఇట్టి వాటికి కట్టుటయందు రి ఆంక ఆడ్డముగా నుండరితని కట్టు కట్టవలయును.

బొబ్బిలోగము.

(బూబానిక్ ప్లేగ్)

బొబ్బిలోగము క్రిస్తుకమునకు కొన్ని శతాబ్దములు పూర్వమే బరోపాఖండమునకు తూర్పుదేశమునుండి గొంపోబడి యుండినటుల వినుచున్నాము. 1664-65 సంవత్సరముల లో యీవ్యాధివలన లండను పట్నముందలి 4,60,000 జనమునందును 70 000 జనులు మడిసియుండిరి. ఇంగ్లాండుదేశమునుండి యీవ్యాధి 1679 వ సంవత్సరమునందు అంతరించి పోయెను. బరోపా ఖండమునందు ఆఖరుగా తురుష్కస్థానములో మాత్రము 1841 వ సంవత్సరమున దీవ్యాధి కనుపడియుండెను. అప్పటి నుండియు బరోపాయం దీవ్యాధి కనుపడియుండలేదు. 1899 వ సంవత్సరము వరకును అమెరికా ఖండమున దీవ్యాధి అగుపడియుండలేదు. ఇటీవల కొంతకాలము వరకును యీవ్యాధి, ఆరేబియా, పర్షియా, చీనా, ఇండియా దేశములందు మాత్రమే వ్యాపించి యుండెను.

ఈ వ్యాధివలన బొంబాయిపట్నము నందును ఆరాజధానియం దనేక యితర ప్రదేశములందును, యొక్కవజననాశనము కలిగియుండెను. కలకత్తా, పాట్నా, మొదలగు పట్నములందును యీవ్యాధి వ్యాప్తత నందియుండెను. గాని, గంగానదీ ప్రాంతములయందు దీవ్యాధికి బొంబాయిరాజధాని యందువలె అనుభవయోగ్యమైన యున్నట్లు కనుపడి యుండలేదు. చెన్నపురి రాజధానియందు, బళ్ళారి, అనంతపురం మొదలగు జిల్లాలయందును, మైసూరు సంస్థానమునందు కొన్ని ప్రదేశములయందును యీవ్యాధి వ్యాపించియున్నది. 1894వ సంవత్సరమునందు చీనాదేశమునందలి హాంకాంగ్ పట్నమునందు గలిగిన యీవ్యాధివలనందు కలకత్తాలోయును యెర్సిక్ ఆసుపారివలన నీవ్యాధి యొకవిధముగ పురుగువలన గలుగుచుండెనని కనుగొనబడెను.

ఈవ్యాధియందు మరణములు 100 కి 60 మొదలు 95 వరకును ఉండియున్నవి. వ్యాధియొక్క ప్రారంభమునందును, ఉన్నతదశయందును, మరణము లేకుండా నుండును.

లక్షణములు.

ఈవ్యాధి సంబంధముగ పురుగు శరీరమునందు బ్రతికొనిన రెండు మొదలు యొని మిది దివ్యములలోపల, వ్యాధి కష్టమనకు వచ్చును. అనినస్ట్రా, అధిక తలకొట్టి, మత్తు, తలతిక్కుట, వాంతియగుట, జ్వరము — యీ లక్షణములతో వ్యాధి ప్రారంభమగును.

ముఖపైఖరి శవాకారముగ నుండును. కండ్లు లోతునకుబోయి యుండును, రోగి నడచుటకు యిట్నించినయెడల తూలిపడును. శరీరకడిమి 103 లేక 104 డిగ్రీలకు హెచ్చి, ముఖము ఉబ్బువలనంది, నేత్రములు యెర్రనయి, చెవుడు యేర్పడును. నాలుక వాపువలనంది, పొరగిప్పు త్వరలో నారుదలగలిగి నొరువెంబడి మాల్సిన్య మేర్పడి, దాహము ఆతిశయమయి రోగియొక్క కుంగుదలస్థితి సంపూర్ణమగును. సంధిగుణము త్వరలో జనించును. కారణమును ప్రేమాయను వాపువలనందును. మూత్రము పీనమగును. ధాతుస్వభావము ఒకప్పుడు కలిగినను కలుగవచ్చు. మొదట నిండుగా నుండునట్టియు ఉబ్బుకుచుండునట్టియు నాడి నీరసతనంది దడదడ కొట్టుకొనుచుండును. ఈస్థితియందు, నిస్త్రాణ వలనగాని, మూర్ఛ వలనగాని, త్వరిత గతిలో ఔషధశనంది, రోగి మరణము నందవచ్చును. రోగి నేత్రపుడై యుండినయెడల విశేషగుణలలో చెండవ దినమునకు ఆయిదవదినమునకు మధ్యనున్న కొద్ది విషయములలో యెనిమిదవ దినమునగాని లేక తొమ్మిదవ దినమునగాని యున్న బిళ్లలు (గడ్డలు) బాలుజేరును. ఈబిళ్లలు 100 కి 70 విషయములలో గడ్డలలోనున్న 20 విషయములలో చెండలలోనున్న 10 విషయములలో దవుడల క్రిందనున్న గలుగు చుండును. ఆవృద్ధస్వభావ ఆరంభమనండియు యాబిళ్లలు ఉండి యుండవచ్చును. ఈబిళ్లలు పరిమాణమునందు ఆనేకవిధములుగ నుండవచ్చును. అనుకూల విషయములలో బిళ్లగనపడగానే మిక్కిలి టమగు చెవట ప్రారంభమయి, శీఘ్రగతితో జ్వరము తగ్గిపోయి, తక్కిన లక్షణములును తేలుపడును. బిళ్ల మాత్రము వృద్ధి నందుచు, తుదకు మెత్తడి, పగిలి, చీమును, దుర్వాసనతో గూడిన యితర మలినములను వెలువడును. కొన్ని విషయములలో చీము పట్టుట కొన్ని వారములకు నిలుపుకా బడవచ్చును. లేక చీముపట్టుకుండగానే బిళ్ల కరిగిపోవచ్చును. స్వస్థావస్థ సామాన్యముగ నారు పది దినమునకు మర్యగా నేర్పడును.

గర్భిణులగు స్త్రీలలో పిండమునందు గూడ వ్యాధిసూచనలు కనుపడుచు, గర్భప్రాసము సామాన్యముగ గలుగుచుండును. కొన్ని విషయములయందు న్యూమోనియా, రక్తముగ్రక్కుకొనుట, యితర విధములగు రక్తస్రావములు — పీటితో గూడి యుండును. ఈవ్యాధియందు మరణము సాధారణముగ మూడు అయిదు దినములకుమధ్యగా దటస్థించును. ఈవ్యాధియందలి కొన్ని ఉద్గ్రీత విషయములయందు మరణము యిరువది నాలుగు గంటల లోపుగను ఒకప్పుడు పండ్రెండు గంటల లోపుగను, దటస్థించుచుండును.

చి కి తన్.

ఎక్కువ జాగ్రత్తతో రోగికి సంరక్షణ చేయుటయు, ఆహారము నిచ్చుటయు, చురుకుబట్టించు పదార్థముల నిచ్చుటయు — యీవ్యాధియొక్క చికిత్సయందలి ప్రధానాంశములయి యున్నవి. ఆరంభమునందు మలబంధ ముండినయెడల వాంటిని నిలుపుచేయుట యందు క్యాలాపెల్ (రవభస్మము) యొక్క నిండుమోతాదు మిగులయవయోగముగ నుండినట్లు తెలియుచున్నది. ఆయాసము, సంధిగుణము, నిద్రరామి — యీగుణములకు వ్యాధియొక్క ఆరంభగతియందు మార్ఫీన్ ను హైపోడెర్మిక్ పిచికారితో యింజెక్టుచేయుట బహు ఉపయోగమని లోసన్ అనునాయన చెప్పుచున్నాడు; కాని, దీనిని యితరస్థితిగుణల గమనించి మరయు పరిశోధన వలయును. గుండె కాయ దుర్బలత నందియుండిన యెడల బ్యాండ్,

స్ప్రిక్ సిస్, ఈతర్, తైకర్ అమ్మోనియా — యిది ఈ వయోగములను ఆవస్థమునను
అయియున్నవి. అతిశయేనములు విడుదలముగా నున్నయెడల నాలోత్ 10 గ్రాయినుల
మోతాదులను దరుమగ నిచ్చుటవలన గుణముగ నుండగలను. జ్వరము తగ్గించు మందులను
యోగించగూడదు. హాటివలన అసాయము కలుగగలదు. శరీరమును దడిగొడ్డతో దుడుచుట
వలనను, తలకు మంచుగడ్డనుగాని, యితరమును చల్లని లేపనములను గాని వ్రయోగించుట
వలనను, జ్వరపీచిత తగ్గగలదు. గిన్నెనును యాభ్యాసము చేలతో వాను గలిపి నిశ్చలపై
గాయవలయును. అంతరము హస్తమును తగ్గించుచేసి నీటిగుండుండికయెట్లు శస్త్రము చేసి
అయిదో ఫాంతో డ్రైన్ చేయవలయును.

ఈ వ్యాధి తగులకుండుటకుగాని, యెర్నిస్ అనునాయనయును, హాఫ్ కిస్ అనునా
యనయును, టీకాలు చేయుటకు రసమును గనిగొనియున్నాడు.

మందుజాగ్రత్తలు.

ఈ వ్యాధియందు, అశోగ్యోగ్యులకై ఏర్పడినవాని, నివాసప్రదేశములను దూర
ముగా నీ వ్యాధిగ్రస్తులను దగుచేతికై యేర్పాటులను జేయవలయును. వ్యాధి వ్యాపించి
యున్న స్థలములలోని ప్రదోహము, ఇండ్లము, మనుష్యులను, పరిశుభ్రముగ నుండవల
యును. ప్రతిదినమును ప్రతియిల్లును తనిఖీచేయుచు. శోమము అనుచిత్రము గొంటావల
యును. వ్యాధితగిలియున్న ప్రతియిల్లును గాబ్బాన్ అనెడ వర్షకాల చేతుధోమకు వల
యును. కొంత కాలము చదు ఆట్టి యిల్లును మూసియుంచుట మంచి. గొడ్డిపెటగల యిం
డ్లను దగ్గుచేట్టవచ్చును.

ఎలకలను బోనులమూలమునగాని, విశుప్రయోగ మూలమునగాని చుపి వాటిని
దహనము చేయవలయును. ఈ ఎలకల మూలముననే యీ వ్యాధి యెక్కువ వ్యాప్త
నంది, మనుష్యులకు జీరుచున్నది. కాబట్టి, యిది బహు ముఖ్యమయిన అంశమయియున్నది.
వ్యాధిగ్రస్తులయొక్క సుబంధ వైదవాటి నన్నిటిని అన్ని సందర్భము చేయవలయును.
ఎక్కువ జరుగుపని యుండిననేగాని స్టేజ్ తగిలియున్న యింటికి గాని, అనుచిత్రముగాని,
పోగూడదు. అప్పటి పరిచారకులు బహు జాగ్రత్తతో నుండవలయును.

బాల్లి.

(ల్యాకోడెర్యా)

చర్మమువలన చెల్లనిపోషణ యేర్పడుట బాల్లి యనబడును. చర్మపదార్థము తక్కు
వగుటవలన నిది కలుగును. ఈ వ్యాధి పురుషులకుండు స్త్రీలకు యెక్కువ తగుచుగ గలుగు
చుండును. పది సంవత్సరములకును, ముప్పది సంవత్సరములకును మధ్య వయస్సునందు
గలుగుచుండును. దీని కుద్రోగముక్రింద పాఠబాటు పడగూడదు. ఇది అంటురోగము
కాదు. ఈ వ్యాధికి సరియగు మందును కనిపెట్టయిండలేదు. బాల్సు గర్భస్థున్నా, పీలి
యండ్లకొకాద్దెన్ని పయిన గాయపగును.

మద్యపాన సంధి.

తాగిగుబోతులయం దొక విధమగు సంధిగుణము జనించును. మత్తుపదార్థము లధికముగా దాగిగుటవలనను, ఒకప్పుడు ఒక సారిమాత్రమే తాగినను యెక్కువగా దాగిగుటవలనను, ఈవ్యాధి జనించుచున్నది. తాగిగుబోతులకు యేదయిన చెబ్బు తగిలినప్పుడుగాని, యేదయిన వ్యాధి సంభవించినప్పుడుగాని, ఈ అస్వస్థత కలుగుచున్నది. ఇట్టి వారలందరియూ అస్వస్థత మొదడునకు వ్యాపించుచున్నది. ఈ సంబంధమగు సంధిగుణమందు తలనొప్పి యుండును. ఇతరవిధమైన దైనచో తలనొప్పి యుండును. అననుమాలగులలో సంధిగుణము వెంబడి స్ఫుటితమిషిపోయి చేతులును కాళ్ళును యిడుచుకొని, మలము వెలువడుటయందు స్వాధీనముతప్పి, మూర్ఛలుకలిగి, రోగి మరణముచుండును.

చి కే త్న.

రోగికి నిద్రను గలిగించుట మిగుల ముఖ్యమయి యున్నది. ఇందులకు 30 గ్రాయి నుల పొటాసియం బొర్రమైదానును 10 గ్రాయినుల క్లారక్ హైడ్రేస్ నున్నూ గలిపి, రోగికి నిద్రనుచ్చునంతవరకును, నాలుగుగంటల కొకపర్యాయము యియ్యవలయును. అజీర్ణతలకు ముండ్లమొడల ఆరంభమునందే 4 వ పౌషధయోగమును విశేషకారిగ నియ్యవలయును. తేలికయిన ఆహారము నిచ్చుచుండవలయును. ఆహారము దీర్ఘత సందుచుండిన యెడల పాణిభయములేదు. ఆహారమునకు దోడుగా కొంచెము బాగ్రిందీ నిచ్చుచుండవలయును. బాగ్రిందీని పూర్ణముగా నిలిపివేయగూడదు.

మద్యపానసితి (దీర్ఘవ్యాపకమగు.)

మత్తుపదార్థములను దాగిగుట మిక్కుటముగ అలవాటుయిన వారలందు ఒకప్పుడు యొకవిధమగు సితి సంభవించును. ఈ సితియందు—అయాసము, నిద్రారామి, సిగబుద్ధితక పోవుట, మనశ్శక్తి నశించుట, యీలక్షణములు కనబడవు. శేత్రములు యెర్రైన నీళ్లు కారును. చేతులు పడుట ఆరంభించును. జీర్ణాస్వస్థతగూడ యేర్పడ, ఆహారమునం దసవ్యాముఖ్య కడుపుతిప్పట కలుగును. నాలుకపై పొరగిమ్మి నోటియందు దుర్వాసనపుట్టి విశేషచురుప్త మేర్పడును. ఈతాగిగుట అలవాటును దప్పించనియెడల, కారణము యొక్కగాని, జీర్ణశయముయొక్కగాని అస్వస్థత యేర్పడును. తాగిగుటను నిలిపివేయుటవలన నీవ్యాధిని మాన్పవచ్చునుగాని, తాగివలెనను అభిలాష ఉండుటవలన, వీరు యిట్టి వాగ్దత్తము తెన్ను వెక్కిరిసి తాగిగుటను మానరు. ద్వివపదార్థముల నాహారముగ నియ్యవలయును. చికిత్సయందు దలి ముఖ్యాంశములు తాగిగుటను నిఘోషించెయిటయును, మంచి ఆహారము నిచ్చుటయును, అయియున్నవి. సంత్రాక్షకయిన విశ్రాంతియు, ఆహారముయొందున్నది. ఉదయమున గలిగెడి కడుపు తిప్పనను పోడావాటగును పాలును ధమానభాగములుగ గలిపి పుచ్చుకొనవలయును. ఒకచుక్క పైనం ఇసికాకును నీళ్ళతోగలిపి ప్రతిరెండు గంటలకును యిచ్చుచుండ

వలయును. త్రాగుటయందుండెడి అభిలాషను మాన్పుటకు టింక్చర్ కాపిక్కునుగాని టింక్చర్ జింజరునుగాని 30 మినిముల మోతాదులలో ప్రతిమాడు గంటలకును యియ్యవలయును. ఈ క్రింది బొప్పియోగము నన్ని విషయములందును వాడవచ్చును.

పొటానియం బొప్పిసెడ్ ఒక్కదాము, టింక్చర్ కాపిక్కు ఒకటిన్నర దాము, స్పిరిట్టు ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ అరుదాముగా, జలము ఆరుబౌన్సులు, పీటిస్మిటిని గలిపి దినమునకు మూడుపర్యాయములు ఒక బౌన్సుమోతాదు చొప్పున బుచ్చుకోవలయును.

మలబంధము.

మలబంధము అనేకులకు స్వాభావిక మయియుండి, ముఖ్యముగా బడుచు శ్రీల గుండు గలుగుచుండును. ఇది అనేక కారణములవలన గలుగవచ్చును. గాని ఇందు ముఖ్యమయినవి కారిజాస్వస్థతయు, చిన్న పేగులయొక్క గాని పెద్ద పేగులయొక్క గాని పని లోపమును అయియున్నవి.

పరిధిమమును అధిమత్వము ఒక్కమాటైనను కరేగినమా కావలయును. ఇందులకు భేదించినయెడల ఆసౌఖ్యముగ నుండును. ఇట్టివారిని తగు శరీర సాధకమును బుచ్చుకొనుచు ఫలములను మాత్రమే ఆహారముగ గ్రహింపవలెనని, స్వస్థత కలుగగలదు.

కారిజాస్వస్థత వలన మలబంధ మేగ్గుడినయెడల, కారిజాస్వస్థత క్రింద జీకెక్కును కేయవలయును.

చిన్న పేగులయొక్క అస్వస్థత వలన మలబంధ మేగ్గుడిన యెడల, విశేషన కం మాణము మితమై మిగుల పొడిగానుండి వర్ణమునందు సాధారణముగ లేక యైనదిగ నుడ దును. కారిజమన దు మాండ్లకగూడ బహుశః కలిసియుండును. తలకు పెనుకపై పున బండ్ల నొప్పి యేర్పడి, నాలుకయొక్క కొనయందును అంచులయందును యెర్రగానుండును. నోరు జిట నారచుండును. ఉత్సాహము తగ్గిపోయి, ఆకలిమందగించి, కడుపునందు ఉబ్బిరమేగ్గుడి, అప్పుడప్పుడు శూలనొప్పి కలుగుచుండును. అనారోగ్యమును మన్యవిచేతము లందు యీ విధమగు మలబంధము సాధారణముగ గల్గుచుండును. ఇట్టివిందుములలో విశేషనకారు లభింపవచ్చును. చిన్న పేగులయందు యొక్కన ద్రవపదార్థముయొక్క అవ సరము మాత్రమే సూచింపబడు చున్నది. నిద్రలేవగానే యేడేమిది బౌన్సుల ఛన్సిస్సు గాని వేడినీళ్ళుగాని త్రాగవలయును. ఇది ఉపయోగించిన యెడల, 2 దాముల సోడా సల్ఫేటును 2 గ్రాయినుల క్విన్సను, ఒక పైంటు జలములో గలిపి ఉడయముననే బుచ్చు కొన వలయును.

పెద్ద పేగులు అస్వస్థతయందుండినయెడల, నాలుకపై పొరగమ్మ, ఊపిరిగాలి దుర్వాసవో గూడి, ముఖము పసుపువర్ణమును వహించి, ఒకప్పుడు పచ్చకామాల ప్రక శించవచ్చును. అప్పుడప్పుడు శూలనొప్పి కలిగి, విశేషము నల్లవారి విశేషముయొక్క మొదటి భాగము మిగుల గట్టిగానుండి, పిమ్మట మృదువుగను లేక ద్రవముగను ఉండవచ్చును.

అనవసరమునకు సమీపమున, నల్లని ఉండలుగా బిడచగట్టి నిలవయుండిన మలపదార్థము నలన కలుగు మలబాధము యిట్టిదై యున్నది. ఈ విధమగు మలబాధమునకు చిట్టాముదముగాని, సల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడాను గలిగియున్న 5 వ బౌష్ధయోగమును గాని, ఉపయోగముగ నుండును. పిత్తద్రవము లేకపోవుటవలన గలిగిన అస్వస్థత అయినయెడల, ఒక గ్రేయిను పల్వీస్ ఇషి కాక్ ను ఉడయమున నుపయోగింపవలయు. విరేచనకారుల దరుచుగా నిచ్చుటకంటె అప్పుడప్పుడు యెనీమాను ఉపయోగించుట శ్రేష్ఠమయి యున్నది. పెద్దపేగులకు యెక్కువ పనిని గలుగజేయుకండ, ఆహారముయొక్క జీర్ణత యెక్కువగా నమలుటవలన గానియ్య వలయును. ఆహారమునందు మార్పు అవసరమయిన యెడల మార్చవలయును. బౌష్ధములు అవసరమైనయెడల, పెంటినే తగు బౌష్ధముల నుపయోగింప వలయును. బలమైనట్టియు, సామాన్యముగ నాలోగ్యమునందుండు సల్ఫీయు, వారలకు, యక్ష్మాస్థి కాలాసింత్ కో 5 గ్రేయినులును, పిట్టాల్లా హైడ్రార్ జరై 5 గ్రేయినులును. గలిపి రెండు మాత్రులుగా జేసి, అప్పుడప్పుడు ఒకమాత్రున ఉపయోగింప వలయును. మూలశంక ఉండినయెడల 8 వ విరేచనకారిని వాడవలయును. ఈ స్థితియందు యక్ష్మాస్థి ఆఫ్ కాస్కారా సాగ్రిడా లిక్విడ్ 30 మినిముల మోతాదులలో రూడ నుపయోగింపవలయును. ప్లాముల్ల్యుమగు కారణ మేమియు గనబడకుండ, ముఖ్యముగా స్త్రీలయందు గలుగు మలబాధమునకు, యక్ష్మాస్థి ఆఫ్ ఆలోజ్ ఆరెడ్రాము, యక్ష్మాస్థి ఆఫ్ నకునవామికా ఆరు గ్రేయినులు యక్ష్మాస్థి ఆఫ్ హయోసామస్ యిరువది గ్రేయినులు, పల్వీస్ ఇషికాక్ ఒక గ్రేయిను - వీటినిన్నిటిని గలిపి 20 మాత్రులుగాజేసి, పరిధారిత్రీయును ఒకమాత్రును నేవించ వలయును.

మరూది.

మరూదియొక్క పుట్టుకకాలము తెలియరాకున్నది. దీనియొక్క జన్మస్థానము చీనా, ఇండియా, మధ్య ఆఫ్రికా, పర్షియామతై యున్నట్లు తెలియుచున్నది. క్రీస్తుశకము 570వ సంవత్సరమున, ఫ్రాన్సుని, స్విట్జర్లందు, ఇటలీదేశములం దుండి యున్నట్లు, చరిత్రవలన తెలియుచున్నది. ఇంగ్లాండుదేశమునం దీవ్యాధి 900 సం॥ ప్లాంతముల కనుపడియున్నట్లు వినుచున్నాము. క్రీస్తుశకము యొనెనిది పదునైదవ శతాబ్దములకు మధ్యకాలములో, పర్షియానం దీవ్యాధివలన కొట్టుకొలిది జనులుచచ్చుచుండిరి. జెన్నరువలన గనుగొనబడిన టీకాలువేయుట వాడుకలోనికి దెచ్చిన పిమ్మట, యీవ్యాధి చాలవరకు అంతరించిపోయెను. 1890వ సంవత్సరమునం దింగ్లాండులో నీ వ్యాధివలన నితకు డెబ్బదిరెట్లు జనము చనిపోవుచుండెడి వారు.

టీకాలు వేయబడని, 5 సంవత్సరములలోపు వయసుబిడ్డలయందును, 30 సంవత్సరములపై వయసుగల పెద్దవారలయందును, యీవ్యాధి ఉద్యుతస్థితిని వహించి యుండును. పొక్కులు కకసిపోయినస్థితియందు 100 కి 50 మంది మరణము నందుదురు. ఆత్మచక్రతా వస్థలయందు అందరును మడియుదురు. టీకాలు వేయబడని వారియందు 100 కి 50 మరణములును, టీకాలు బాగుగా వేయబడని వారియందు 100 కి 26 మరణములును, టీకాలు బాగుగా వేయబడినవారియందు 100 కి 2 మరణములు మాత్రమును, గంతుచుండుటవలన, టీకాలు వేయుటవలన ఉపయోగమును గూర్చి పేగుగ విశేషించి చెప్పునక్కర్లేదు.

ఆంటు సంబంధమైనట్టియు, పొక్కులు లేచినట్టియు, జీవితమునందు సామాన్యముగ నొకపర్యాయము మాత్రమే గలుగనట్టియు జ్వరము — శుశూచి అనబడుచున్నది. పొరంభ లక్షణములు కనుగొనినది మొదలు పదివారములవరకును యీ వ్యాధి యుండలి అన్యథా తిండి యున్నను, మాలిన్య మేర్పడుట ఆరంభించినది. మొదలు చర్మమునూడి పక్కలు పరిపూర్ణముగ వదలిపోవువరకును, యీ వ్యాధి విశేషముంటు గుణమును వహించి యుండును. ముఖ్యముగా గుడ్డలమూలమునను, యితరవస్తువుల మూలమునను, యీ వ్యాధి వ్యాప్తమగుచున్నది. ఈ వ్యాధిసంబంధమగు పురుగు శరీరమునం దావహించినది మొదలు సామాన్యముగ బండ్రండు దినములలో పక్కమునకువచ్చును. వణకుట, మధ్యమస్య వేడికలుగుట, మత్తు, వాంతివచ్చునట్లుండుట, తరుచుగ వాంతికలుగుట, తలనొప్పి, వెన్నునడుము నెరుగునొప్పి, అప్పుడప్పుడు పచ్చిగొంతు—యీ లక్షణములు ఆరంభమునందు గన్పట్టును. పిమ్మట, జ్వరము ప్రారంభమయి, నాడి చురుకుబారి, చర్మము వేడియొక్క శరీరవేడియి బహుశః 104 లేక 105 డిగ్రీల వరకు పెంచును. రెండు, లేక, బహుశః మూడుదినములపిమ్మట, యే త్రియినవరిని చూపులు ముఖముపైయును నుడుదుపైయును గనబడును. ఈ స్థితియందు కొంచెము కాలమువరకు జ్వరము 101 మొదలు 102 డిగ్రీలవరకు తగ్గిపోవును. పొక్కులు లేచుకాలము అధికమయిన కొలదియును, వ్యాధియొక్క ఉద్యోగి తగ్గిపోవును. మూడు నాలుగు దినములందు పొక్కులు శరీరమునకు గూడ వ్యాపించును. అయిదవ దినమున పగిలి పొక్కుయొను నీరుపట్టి, అడుగు భాగమునందు గుండ్రపై, మధ్య భాగమునందు సొట్టపడి, చుట్టు భాగములు యెర్రపై యుండును. మధ్యభాగము నందలి సొట్ట యీ వ్యాధియొక్క సూచనలక్షణమై అటలమృతకును యీ వ్యాధిని భేదింపట యిదియే గుర్తుయై యున్నది. తరువాత మూడు దినములలో పొక్కులయందలి మాలిన్యమేర్పడి, అవి మిగుల యెత్తుగ నుండును. మాలిన్య మేర్పడిన పిమ్మట, శుశూచి యందలి వాసన స్పష్టముగ గనబడుచుండును. వ్యాధి ఉద్యోగి గతిని వహించి యుండినయెడల, ముఖము వాపుదలనంది, వాపుదల తలన నేత్రములు మూసికొనిపోవును. తదన దిన పొగింతముల, మొదలుగా ముఖముపైవని యును, పిమ్మట కాళ్ళుచేతుల పైనవియును, పొక్కులు యెండుట కారించి, కడు నాలుగవ దినపొగింతములకు పక్కలుకట్టును. ఇరువది ఇరువదిమూడవ దినములకు మధ్యగా ఈ పక్కలు ఊడిపోయి, ఒడలంతయు యెరువు గోధను గలిసిన వర్ణమును గలిగియుండును. ఈపొక్కులు మానుదల నందినపిమ్మట, తరుచుగా మచ్చలుగాని గుంటలుగాని యేర్పడియుండును. పొక్కులు వృద్ధినందుచున్నప్పుడు, సామాన్యముగ రెండుమూడు దినములవరకు జ్వరము మిగుల యెక్కువయి, మరల 104 లేక 105 డిగ్రీలకు పెంచును. శుశూచియందు రెండవమారు గలుగు యీజ్వరము సామాన్యముగ తదుకొండవ దినప్రాంతముల గలుగును. ఉద్యోగితరులయందు, శోషణమువలన బ్రాచీనాయుము కలుగు సమయ మిదియే అయియున్నది. నాలుకపై పొరగమిక్కి, పొడుగునను తెల్లగానుండి, ఒకప్పుడు వాపుదల నందియుండును. పిల్లవారలందు పొడుగునను సామాన్యముగ మలబంధ మేర్పడి యుండును. బిడ్డలయందు దారంభమున దడుముగ అభివృద్ధిచనము లుండియుండును.

అత్యుద్యోతగతియందు పాక్షులు మిగుల దళముగానుండి, దాదాపుగాగని పూర్ణముగాగని కలిసిపోవును. అట్టి విషయములలో జ్వరము అతితయ్యనీతి యందుండిసంధిజనించి స్మృతితప్పిపోయి, రోగి మరణము నందవచ్చును. ఉద్రుత విషయములలో, నాసికారంధ్రములయందును, నేత్రములలోను, నాలుక పైనయును, నోటి యందును, గొంతుక యందును, పాక్షులేర్పడి, నోటినుండి విశేషద్రవము వెలువడుచు, హస్తములును పాదములును మిగుల వాపుదల నందును. బిడ్డలకు పండ్లు వచ్చుచుండిన యెడల, పాక్షులు కలుగుట కారంధ్రమున మూర్ఛలు కలుగవచ్చును. ఈవ్యాధియొక్క తదనంతరము, నేత్రములయందుగాని, కర్ణములయందుగాని, కీళ్లయందుగాని, అస్పృశ్యతరుచుగ నేర్పడుట గలదు.

చి కి త్త.

రోగిని సాధ్యమయినంతవరకు విడిగానుంచి, పిల్లెనచో పృత్యేకగృహమునం దుంచవలయును. గదిలోనికి పరిశుభ్రమగు గాలి, వచ్చుచుండవలయును గాని, అతిచల్లగామాత్రముండుకూడదు. 1 కి 40 పాళ్ళు నీళ్లు కలిసిన కార్బాలిక్ లోషన్ ను పరిచారకుల యొక్క చేతులు కడుగుకొనుటకును, రోగి సంబంధమగు గుడ్డలను, యితరవస్తువులను, గడుగుటకును విరివిగ నుపయోగింప వలయును. రోగి యొక్క ఊపిరి గాలిని బీలువనుండ పరిచారకులు జాగ్రత్త గనుడవలయును. విశేషము సాధువుగ నగుచుండునట్లుల బౌషధముల నియ్యవలయును. కాళ్ళను చేతులను ఉడకునీళ్లతో ప్రతిదినమును స్పృశింపవలయును. నేత్రములను పృతిదినమును ఆనేళమారలు, వేడిపాలతోడను, వేడినీళ్లతోడను, గడుగుటను అద్దుటను జేయవలయును. నేత్రములు అస్పృశ్యత నందియుండినయెడల, వేడి పటిక సాల్ఫ్యూరిక్ తో నేత్రములను దడుపవలయును. ప్రతి తడుపుట పిమ్మటయును వాసలిన్ ను కనరెప్పల యంచులకు రాయవలయును. అవరోముగా, పాలు, జావ, మొదలగు ద్రవపదార్థముల నియ్యవలయును. నాడి నీరసత వహించి బలము తప్పిపోయి నపుడు, బ్రాందీ మొదలగు జారుకుపుట్టించు బౌషధముల వాడవలయును. పక్షులు యెండిపోవు సమయమున బిట్టలను దరుచుగా మార్చుచు, రోగి అతి బలహీనతయం దుండకపోయిన యెడల, అను దినమును వేడినీళ్లతో స్నానము జేయింపవచ్చును. వ్యస్తావస్థయందు క్విన్స్ ఉపయోగముగ నుండును.

ఈవ్యాధియందు గుంటలును మచ్చలును పడకుండ ననేక పరిశోధనలు చేయబడెను. స్పృశ్యమును మెల్లగ న్నుంజితో దుడిచివేయచు, ఒడలును సాధ్యమయినంతవరకు పరిశుభ్రముగా నుంచవలయును. వరిపిండిని, ముఖముపైనయును శరీరమంతటను విరివిగ జల్లుటవలెన దురదకు ఉపకాంతిని గలుగజేయ వచ్చును. ఒక భాగము కార్బాలిక్ అసిడ్ యును పదిభాగములు ఆలివ్ ఆయిల్ యును గలిపి, శరీరమునందలి సగము భాగమున కొకదినము చొప్పున రాయవలయును. కార్బాలిక్ అసిడ్, దుర్వాసననుదగ్గించి, చీముపట్టుటయందలి ఉద్యోతను సాధుపరచును. పాక్షులు చిదిగినపుడు కలుగు దురదను అణచివేయుటగాను వయొలెట్ పుడుచునుగాని జింక్ ఆక్సైడ్ ను గాని, యూరెంటిని గలిపినదాని గాని, చల్లవలయును. రోగి గోకటండునట్లు చేయవలయును. బిడ్డలయినచో చేతులకు గుడ్డలను గట్టవలయును.

ఆటాలమ్మ.

ఈవ్యాధికి చిన్నమ్మ వారనియు, తట్టమ్మ వారనియు, నూకలమ్మ అనియు, వివిధములగు కేర్లుకలువు. ఇది పాక్కులతో గూడిన అంటు సంబంధమగు జ్వరమయి యున్నది. సామాన్యముగ విడలయందు గలుగుచుండును. మహాచియందలి కొద్దిపాటుగా నిది కొందరిచే భావింపబడుచున్నది. ఈవ్యాధి సంబంధమగు పురుగు శరీరమునం దావహించిన పిమ్మట పది పదునారు దినములకు మధ్యగా పక్షమునందును. ఇరువదిసాలుగు గంటల కాలములో కొంచెము జ్వరము కలిగి మొదటగా విపుమీదను, పిమ్మట ముఖము శరీరము యొక్క యితర భాగములమీదను, యెర్రగిని పాక్కులు లేచి కొంచెము దుగడతో గూడి యుండును. ఈపాక్కులు ఒక తెరగానే రావచ్చును. లేక మూడుసాలుగు దినములవరకు అనుదినమును క్రొత్త పాక్కులుకలుగుచు, జ్వరముకూడనధికమగుచు, పాక్కులుకలుపడినపిమ్మట జ్వరముతగ్గిపోవును. మూడవదినమునపాక్కులయందుద్రవమేర్పడును. నాలుగవదినమునపాక్కులుపగిలిపోయి పక్కులుకట్టి, యీ పక్కులు ఆరవదినమున ఊడిపోవును. మహాచియందలి పాక్కులవలె, యీ పాక్కులయందు చిము ఉండును. సిక్రేట్ ఆఫ్ మెగ్నీసియాను విశేషన కారక నుపయోగించి ఒక్క గదిలోనే ఉండుటకంటె వేరు చికిత్స అవసరములేదు. పాక్కులు అరంభమయిన మూడువారముల పిమ్మట నీ వ్యాధియొక్క అంటుగుణము ఉండనేరదు. ఇండియా జ్వరమనందు, యీ వ్యాధి చలికాలములో వ్యాపించియుండును.

మూత్రసంబంధమగు వ్యాధి (యురేమియా).

మూత్ర గ్రంథులనుండి మూత్రము ప్రవించుటయందుగాని, మూత్రోత్సము నుండి మూత్రము వెలువడుటయందుగాని, ఏదైన అటంకము కలిగినయెడల, మూత్రసంబంధమగు వదార్థములు రక్తమునందు గలియుటవలన, గలిగెడి వ్యాధికి యురేమియా యందురు. మూత్ర గ్రంథులయొక్క క్షీణదశయందు గలుగు భాత్యవస్థయొక్కయు, అతిమూత్రము యొక్కయు, అనంతర గతులయందు యీ స్థితి సంభవించును. రక్తప్రచారమునందు మూత్రమును దలి వివపదార్థములు మెదడునకు న్యాపించుటవలన అంగవికృతియొగము (పుట 107) యేర్పడును. మూత్రము పుకొరించుటకును, చెమట పుట్టుటకును, నాగు కనులను కేరళవలయును. నడుముపయిన వేడి కాపడములను గాచవలయును. రోగి మింగగలిగినయెడల దయ్యారి తిక్కులలో 1 వ కౌండియోగమును ఉపయోగించవలయును. విశేష సాధకములను గూడ కేయవలయును.

మూర్ఛ.

అజీర్ణత, కోసగుణములేక ఉద్యోగత, తలనొప్పి, మలబంధము-యీ లక్షణములు ముందుగా గనపడవచ్చును. తలత్రిప్పట, వాంతివచ్చునట్లుండుట, చెవిలోధ్వనులు, చేతి యందుగాని పాదములందుగాని లాగుట పొర్రుబొరిచి, పైకి యెత్తుచున్నట్లుండుట-యీ

లక్షణములును పిమ్మట కనబడవచ్చును. ఈ విధమగు లక్షణముల పిమ్మట రోగి స్మృతి తప్పి పోయి, శరీరబలము నశించి, నిల్చుబియున్నయెడల క్రిందపడును. మూర్ఛకలుగుటకు ముందుగా తరుచుగ పెద్దకేక వెల్లువవచ్చును. కాళ్ళను, చేతులును, ఉదరమును, కొట్టుకొనుచు ముఖముయొక్కయు శేత్రములయొక్కయు స్నాయువులయందు యీడ్చుకలుగుచు, ముఖము వికారముగ నుండును. కనుబొమలు నుడివేయబడి కనుపాపలు స్థిరతనందిగాని, కనుపాపలు కనురెప్పల క్రిందికి బోవుటవలన కండ్లలోని తెలుపులుమాత్రమే గనబడుచుగాని, ఉండును. కనుగుడ్లు గుండ్రముగా దిరుగుచు, కనుపాపలు విస్తరింపునందుట వలన దృష్టిక క్రితప్పిపోవుచుండును. కాని, తెరయొక్క అంతిమగతియందు యీస్థితి క్రమితనందును. ముఖము మొదట గా పాలిగోయి తరువాతి యైర్వరసగును. ఒడలు చల్లగాను, జగటగాను ఉండును. హస్తములు పట్టుపట్టి బాహువులు కొట్టుకొనును. పండ్లు బిగిసిగినిపోయి, నాలుక కరచు కొనుటవలన రక్తిమతోగూడి, నోటినుండి నురుగు వెడలును. మూర్ఛలో ఒకటి మొదలు రెండు, అయిదు, పది, నిమిషములవరకు ఒకప్పుడు కొన్ని గంటలవరకును, రోగి కదలకుండ స్మృతి తప్పియుండును. ఒకప్పుడు యీస్థితినుండి గాఢనిద్రలోనికి మరలవచ్చును. ఇట్టిస్థితి ప్రతిదినమును గాని, ఒకప్పుడు కొన్ని నెలలకును కొన్నిసంవత్సరములకును, మరల రావచ్చును.

కారణములు.

ఈ వ్యాధి వంశపారంపర్యముగ రావచ్చును. కేగులయందుండెడి పురుగుచే గలిగిడి లేగుదలవలనను, ఆధిక శరీర సంబంధమైనట్టిగాని మనస్సంబంధమైనట్టిగాని ఉద్రేకతవలనను, బిడ్డలకు పండ్లవచ్చునపుడను, మెడడుయొక్క వ్యాధివలనను యీ అస్వస్థత కలుగవచ్చును. మూర్ఛలకు లోనైనవారియందు నీరసత్వము, దుష్ప్రవర్తనము, భయము, కోపము, పురుగులు, రక్తవృద్ధి, అజీర్ణత, స్త్రీలయందు ఋతుస్రావ సంబంధమగు నిలుపుదల-యీ కారణము లన్నియు ఉద్యుక్తతను బుట్టించును.

చి కి త్తి.

మూర్ఛకలుగు లక్షణములు కనుపడగనే జీర్ణాశయము నిండుగ నుండినయెడల మందరవాంతికార నిచ్చుటవలన మూర్ఛ నిలిచిపోవచ్చును. జీర్ణాశయము నిండుస్థితి యందుండినచో చచ్చిళ్ళను చాహముగా నియ్యవలయును. మూర్ఛయందు రోగిని వీపుపయి బరుండ బెట్టి, కోపమును కొద్దిగా నెత్తి యించవలయును. పరిశుభ్రమగు గాలి వచ్చునట్లు జేయుచు, ముఖముపయిన వినరుచు చచ్చిళ్ళతో ముఖమును దడుపు చుండవలయును. ఈ చచ్చిళ్ళచే గలుగునంత మేలు యిక జేసివలనను గలుగనేరదు. మెడవైపులగాని, యెదురోమ్ము వైపులగాని, మరయెచ్చుటగాని, బిగువయిన గుట్టలు ఉండియుండియుండినయెడల, వీటివన్నిటిని వదులు చేయవలయును. చేతులతో రోగి తనిటు అపానుచును గలుగ జేసికొనకుండునట్లు చేతులను గట్టిగ బట్టుకొని, ఎదురోమ్ము పయిన ఒత్తిడి కలుగకుండ చేయవలయును. తెరసమయముల రోగి నాలుక కరచు కొనకుండనటులు చెమిచాకాడను పండ్లనందున బెట్టవలయును. అప్పుడు త్రాగుటకేమియు నియ్యగూడదు. తెరపిమ్మట రోగిని నిద్రబోనియ్యవలయును. నిద్ర

రాకపోయినయెడల, వేడిపాలలోగాని, విడిగాగాని, ఒకడ్రామం పొటానియం బ్రొమైడును యిచ్చునలయును. మత్తుప దార్ధముల నేమియు నియ్యగూడదు.

మార్పులను మధ్యకాలమునందు, మలబాధము, పురుగులు, ఉండియుండిన యెడల, చికిత్స చేయవలసియుండును. ఋతుసౌఖ్య సంబంధమును అస్వస్థత ఉండి యుండినయెడల అందులకగు చికిత్సను జేయవలయును. 1 వ అల్టరేటివునందలి పొటానియం బ్రొమైడును ఆను దినమును దీనికొనవలయును. రోగి బలహీనుముగ నుండినయెడల బలవర్ధకౌషధముల నియ్యవలయును. విరోచనము క్రిమముగా నగుచుండునట్లుల జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనవలయును. కాక పదార్థముల నెక్కువగా బుచ్చుకొనవలయును. మాంసపదార్థములను ద్వజించుట మంచిది. ఈ క్రింది బౌధయోగమువలన గుణము కనుపడువదిగను, మార్పులకు మధ్యకాలమున వాడవగును. ఒకడ్రామం పొటానియం ఆయోడైడ్, ఒకడ్రామం పొటానియంబ్రొమైడు, ఆరడ్రామం ఆమ్మోనియం హైపైడ్, నలుబదిగ్రేయినుల ఆమోనియా కార్బొనేట్, ఎనిమిది ఔన్సుల జలము--వీటినిస్థితిగలిపి, భోజన పూర్వము ఆరబొన్న చొప్పునను, నిద్ర పోవుముందర ఒకబొన్ను చొప్పునను, అనుదినమును బుచ్చుకొనుమండవలయును.



మెదడు మృదువగుట.

మెదడు పదార్థమునకు వలయు పోషణము క్రిమముగా జరుగక పోవుటవలనగాని మెదడునకు రక్తమును గొంపోవు రక్తనాళములయొక్క అస్వస్థతవలనగాని, మెదడు మృదువగుట యేర్పడవచ్చును. మత్తుపదార్థముల నెక్కువగా దాగిగుటవలనను యీ స్థితి యేర్పడవచ్చును. అతి మనోవిచారము, అధికచింతన లేక విద్యాభ్యాసము వలనను, యావ్యాధికలుగవచ్చును. ఉత్సాహము తగ్గిపోవుట, తలనొప్పి, తలతిగిప్పు, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట, భావములయొక్క అస్వస్థత, తుడకు బుద్ధిమౌఢ్యము, పక్షవాయువు-- యీ లక్షణములతో గూడియుండును. ముఖ్యముగా మెదడునకు బోవుతుద్ధ రక్తనాళము అస్వస్థత నందియుండిన యెడల, చికిత్స యేమియు ప్రియోజన ముండజాలదు. విశ్రాంతి, బలవర్ధకౌషధములు, చల్లదనముండు ప్రదేశములకు బోవుట-- వీటివలన నుపయోగ ముండగలదు. కొలుకు సంబంధముగ అస్వస్థత ఉండినయెడల, పొటానియం ఆయోడైడ్ తో నెక్కువ కాలము చికిత్స జేయవలసి యుండును.

మెనింజైటిస్.

మెదడుయొక్క వివిధములగు పొరభాగములు వాపుదల నందుటవలన గలుగు వ్యాధి మెనింజైటిస్ అనబడును. జ్వరము, తలనొప్పి, సంధిగుణము, మూర్ఛలు, పక్షవాయువు-- యీ లక్షణములు కలుగుచుండును.

చికిత్స.

ఈవ్యాధి కలుగుటకు కారణము -- గాయము, ఎముకయొక్క అస్వస్థత, కొలుకు రోగము -- వీటితో నేర్చిన యుండినయెడల, అందులకగు చికిత్స జేయవలయును. చిము

పట్టుట తటస్థించినయెడల శస్త్రముచేసి చికిత్స జేయవలసియుండును. రోగికి పరిపూర్ణమైన విశ్రాంతి నిశ్చయవలయును. సాధ్యమగు నంతవరకు జరుకును బుట్టించు పదార్థములను, గుండె సంబంధమగు బలవర్ధకావధములను, ఉపయోగించ గూడదు. విరేచనము కృతముగా నగునటుల జాగ్రత్తను బుచ్చుకోవలయును. వాంతియుగు చుండినయెడల, విస్మత్ సబ్ నైట్రస్ ను యిచ్చుటవలన సుపయోగ ముండగలదు.

మూత్రకృచ్ఛము. (Gravel)

మూత్రకృచ్ఛము, మూత్రమునందు యేర్పడిన మట్టును సూచించును. మూత్రకృచ్ఛము ఎరువు వర్ణముకలదియు, తెలుపువర్ణము కలదియు, అయి చెందువిధములగా నున్నది.

ఎరువు మూత్రకృచ్ఛము, యూరిక్ ఆమ్లము లేక యూరేట్ సంబంధమగు లవణ పదార్థములు మూత్రమునందలి వర్ణపదార్థములతో గూడి యుండుటవలన కలుగు చున్నది. ఇట్టి మూత్రమువలన యెర్రని గని తేలుచుండును. ఈ మూత్రము అస్పహితమయి నల్లని బంగారు వర్ణముతోగూడి ఆరోగ్యతయందలి మూత్రమును కొంచెము నిలువయుండిన పిమ్మట యెర్రని గని తేలును. ఇట్టి విషయములందు మూత్రగ్రంథులయందు శిలయేర్పడ బోవునని తెలియవలయును.

తెల్లని లేక కొంచెము పసుపువర్ణము కలిగిన మూత్రకృచ్ఛము, నున్నము సంబంధమగు పదార్థములయొక్క కూడికవలన గలుగుచుండును. ఇట్టి మూత్రము మడ్డిగా నుండును దీనిని గాచినను శుభ్రపడదు.

ఎరువు మూత్రకృచ్ఛమునందు, గుండెమంట, అజీర్ణత, కాయాస్వస్థత -- యీ లక్షణములతో గూడియుండును. తీవ్రదశయందు వాతరొగముతో గూడియుండును. ఈవ్యాధి యందొకానొకప్పుడు సమయమునకు బండనొప్పి ప్రారంభమయి మూత్రము విడుచుట కవసరము తరుచుగ గలుగవచ్చును.

పురుషులయందు వృషణములు పయికి లాగవచ్చును. వాంతియు కలుగ వచ్చును. కొంచెము జ్వరముకలిగి వెన్నవెపులను సడుమువైపులను అధికమగు పోటుపుటును. ఉద్యోత స్థితియందు మూత్రము తీవ్రవర్ణమును వహించి రక్తమువలెనుండును. ఇట్టిస్థితిలో కత్తిపోటు తగిలినట్లుండి, నొప్పి తగ్గిపోవును. ఈ సమయమున మూత్రగ్రంథినుండి ఒక చిన్నవైసరాయి మూత్రాశయములోనికి జొచ్చినదని తెలియ వలయును. ఈరాయి మూత్రాశయమునందు నిలువయుండి క్రమముగా పుట్టియగు చుండును. చిన్నదయినయెడల మూత్రద్వారమున బయటికి వెడలి పోవును.

చి కి త్స.

మూత్రకృచ్ఛ సంబంధమగు తెర కలిగినపుడు బాధ తుపకాంతిని గలుగ జేయవలయును. రోగిని వేడినీళ్లతోబాటు గూర్చుండబెట్టి 25 గ్రాముల క్లోరల్ హైడ్రేట్ ను యియ్యవలయును. బాధ తగ్గనియెడల, 8 గంటలకు మరల నియ్యవలయును. సడుముపైన వేడి కావడములను గాచవలయును. మలబంధ ముండినయెడల 1 వ బేష సయోగమును విరేచన కారిగ నియ్యవలయును. బాల్మిల్లను ని శేషముగ ద్రాగవలయును.

ఎరుపు మూత్రకృచ్ఛముండినయెడల, కాక సంబాధమగు ఆహారములను మాత్రమే భుజింపవలయును. 10 గ్రాయిసుల పొటాష్ ట్రైకార్బోనేటును ఒక బౌన్సు జలములో గలుపుచు, దినమునకు మూడుపర్యాయములు పుచ్చుకొనవలయును. 3వ బౌన్సు యోగమును విరేచనకారిగ నప్పుడప్పుడు ఉపయోగించు చుండవలయును. పుషపజీన ఆను బౌన్సు మిగుల ఉపయోగము. దీనియొక్క మోతాదు 4 గ్రాయిసులవరకు అయియున్నది.

తెలుపు మూత్రకృచ్ఛము నందు, డైల్యూట్ (నీటితోగలిపిన) నైట్రిక్ ఆసిడ్ 20 మినిములను నాలుగు బౌన్సుల జలములో గలిపి యియ్యవలయును. క్విన్సీను బలవర్ధకానధముగ నియ్యవగును.

మూత్రకృచ్ఛము యొక్క అన్ని తరగతులయందును చుంచినట్లు పెక్కువగ దాగి వలయును. ఒక టుగ్గురు ఉడుకునీళ్ళను, ఉదయమునను, మధ్యాహ్నమునను సాయంకాలమునను, ద్రాగుచుండవలయును. భోజనమునకు దగ్గరితముగ నేయవలసి యుండును. విస్తారము నేపు పరండియుండవూడదు. ఆట్లు చేసినయెడల, మూత్రకృచ్ఛ మేర్పడుట కనువు యొక్కవగను. వేడిస్నానములు, మొరటు తువ్వార్చితో పెక్కువగ నుడుచుకొనుట, ఫ్లావోడుస్తులు, నిస్త్రానిను గలుగజేయు శరీరసాధకము, ఆవసరములయి యున్నవి.

మూలశంక.

మూలశంక వ్యాధిని గ్రహించుటకు ముందుగా, రక్తము గుండెకాయనుండి శుద్ధరక్తనాళములద్వారా శరీరమునందలి యన్నిభాగములకును గొంపోబడుచున్న దనియు, మరల నవరిశుద్ధ రక్తనాళములచే గుండెకాయకు నేరుచున్న దనియు— యీ సంగతులను గమనించి యుండవలయును. ఆసనమయొద్ద స్నాయువుల యొక్క వదులైన అల్లికలు విశేష పరిమాణముగ నావరించియుండి, యింకను అనేక శుద్ధ రక్తనాళములును అవరిశుద్ధ రక్తనాళములును జేరియుండును. ఈస్థలమందు, రక్తము భూమియొక్క ఆకర్షణశక్తి కడుచుగ బైకిపోవలయును. కాబట్టి, మలబంధము వలనగాని, కారణాస్వస్థత వలనగాని, యేయితర కారణముల వలనగాని, యే అటంకము కలిగినను రక్తము ప్రవహించుటకు నివట నిలిచిపోవును.

మూలశంక, 'వెలుపలి' లోని అన్ని రెండువిధములై యున్నది. వెలుపలి మూలశంక యందు, మొదటగా నొక అవరిశుద్ధ రక్తనాళము భుసతనంది, ఆసనద్వారాంత్యమున ఒక గింజవలె వాపువల నందియుండును. కొద్ది కాలములో నీ ఉబ్బుదల అంతరించి, చర్మము, శేగుతో గలియుచోట దళముగ మాత్రముండును. ఈ 'వెలుపలి' మూల శంకయందు, మిగుల పచ్చిగానుండి, యెక్కువకాదతో గూడి, ముఖ్యముగా విరేఖన మగునప్పుడు ఆసనము సమీపమున మంటయును పోటును బుట్టుచుండును. ఇందు రక్తము కారుట అగతయ్యుండును.

'లోని' మూలశంకయందు, మూలశయము ననుసరించియుండు అవభాగము నందలి భుసతనందిన అవశుద్ధ రక్తనాళము, శేగుయొక్క పొరను బైకి నెట్టుటవలన దరుచుగ

నీ అస్వస్థతభాగము చేరిపండు ఆకారమును వహించి యుండును. ఈ విధమగు మూలశంక యందు, ఒకా నొకప్పుడు రక్తముకారుట మూలమున మాత్రమే మనమి వ్యాధిని గూర్చి తెలియజగియుండును. మూలశంకవ్యాధి అధికమయిన కొలదియు, పేగుయొద్ద మంటబుట్టి, విరేచనకాలమున ముక్కుట యేగ్గుడి, మాత్రవిస్ఫర్జనేచ్చ అధికమై, ఒకప్పుడు మాత్రమాను విస్ఫర్జించుటకు శక్తితగ్గి, నడుమునందును డోయపులక్రిందను బాధకలిగి, స్త్రీలయందు కుసువ్యాధిని బుట్టించవచ్చును. ఇది కురుపుగా దేలుటవలన విరేచనమందు చిము, రక్తము, వచ్చును. ఈవిధమగు మూలశంక ఒకప్పుడు బయటికి దేలి, యెక్కువబాధ గలిగించవచ్చును. ఈవిధమందు కొద్దియో గొప్పయో రక్తము కారుచు ఒకప్పుడు విశేషముగ రక్తము ప్రవించును. తరుచుగా విరేచనము పిమ్మట రక్తము ప్రవించుచుండును. ఆత్మ్యదుత గతులయందు, విరేచనసంబంధము లేకుండగనే, రోగి అకస్మాత్తుగా నిల్చుండుటవలన గాని, కనుపడని యేయి తర కారణమువలనగాని, రక్తస్రావము కలుగవచ్చును. రక్తస్రావ మధికముగ లేనపుడు అంతయెక్కువ తొందర లేకపోవచ్చును గాని, రక్తస్రావ మధిక మగుచు, అనుదినమును గలుగు రక్తనష్టమువలన, శరీరమునందు నీరసత యేర్పడును.

ఒకప్పుడు రెండు విధములగు మూలశంకయును ఒకసారియే గలుగవచ్చును. పీడి యందు యెల్లపుడును రక్తస్రావమును, వాపుడలయు, లేక పోయినను తరుచుగ నసౌఖ్యతకు గారణమగుచుండును గాన సమయోచితమగు జికిత్స జేయుట మంచిది.

మలబంధములమున విరేచనమగునపుడు ముక్కుటమూలమునను, యెక్కువగా గూర్చుండి పగులజేయు అలవాటువలనను, అధికముగ గుట్టపుసవారి చేయుటవలనను, కడుపుగల బండ్లలో ప్రయాణము చేయుటవలనను, బలమగు విరేచనకారుల నధికముగ సుపయోగించుట వలనను, యీవ్యాధి కలుగవచ్చును.

చి కి తన్.

వెలుపలి మూలశంకయందు దుబ్బుడల గనబడినపుడు, వేడి కాషడములను గానుచు, పిండికటును గట్టవలయును. 1వ ఔషధయోగమునుగాని, చిట్లాముదము గాని వాడుటవలన విరేచనమగునట్లు చేయవలయును. రోగి ఎక్కువగాని దీక్షితుడును పరుండియే యుండవలయును. అస్వస్థతభాగముల చల్లని నీళ్లతోగాని, చల్లని పటిక నీళ్లతోగాని, దడుపవలయును మలబంధ మేర్పడినపిమ్మట సాధువిరేచన కారుల సుపయోగించ వలయును. తరుచుగా గొంచెము శస్త్ర మవసరమయి యుండును. ఈవిధమగు మూలశంకయందు, ఒకటి చుక్కల కార్బి లిక్ అసిడ్ను వాపుడల భాగముగోనిక యింజక్టు చేయుటవలన వెచ్చుది యుండవచ్చును. దీనివలన బాధయేమియు కలుగదు.

వాపుడల నందిన “లోని” మూలశంకయందు, పెంటనే చిట్లాముదమునీచ్చి వేడినీళ్లను లోనకు యింజక్టు చేయవలయును. ఈవ్యాధియందు దేనందర్భమునను మత్తుపదార్థముల నిత్యు రాదు. విరేచనానంతరము, లోని మూలశంక బయటకు వచ్చిన యెడల, దానిని చల్లనినీళ్లతో నష్టవలయును. ఇది తిరిగి లోనికి పోనియెడల రోగిగొంతకాలము పడుండి యుండుట

వలన, పేగులయొక్క వ్యాపారము మూలమున దానంతట ఆదియే లోనకు బోవును, శ్లో యెడల, మెల్లగా దానిని లోనికి దోగిసి జేయవలయును. అధికరక్తస్రావమును చల్లనినీళ్ళను గాని, హాజిలీడును సహనభాగములుగ గలిపిగాని, యింజిప్టు చేయుటవలన, రక్తస్రావ ముగి పోవచ్చును.

ఈవ్యాధియందు, మందులకంటె ఆహారమును గగ్గిమపరచుట యందును ఆరోగ్యకా పద్ధతుల నవలంబించుట యందును, జీకత్స్ యిమిడియున్నది. కాకపదార్థముల నెక్కువగ భుజించుచు, మాంస పదార్థములను పిండివంటలను మత్తుపదార్థములను ద్యజించ వలయును. 1వ బౌషధయోగము సుపయోగించుటవలన విరేచనము క్రమముగ నగుచుండునటుల జూడ వలయును. ప్రతివిరేచనము పిత్తరూపులను ఆసన భాగమును చస్పిర్లతో బాగుగా దడుప వలయును. హాజిల్ ఆనుబౌషధమును అనుదినమును మూడు నాలుగు వర్షాయములు వ్ర యోగించుటవలన, సుపయోగముండ గలదు. మధ్యకాలమందు గుడ్డనుగాని గాటకానుగాని దీనిలోనుంచి కట్టియొంచ వలయును.

రాచపుండు.

రాచపుండు అనునది కురుపు సంబంధమైనదై యున్నది, అయితే పరిమాణమునం దిది పెద్దదిగా నుండును. రాచపుండు, సామాన్యముగ, మెడమీదను, వెన్నుమీదను, పిరుదుల మీదను, లేచుచుండును. మిగుల అపాయకరమైన గతి యందు ఒకప్పుడు ముఖముపైన గూడ లేచును. మూత్రగ్రంథి వ్యాధివలనగాని, అతిమూత్రీ వ్యాధివలనగాని, బాధనందు వారి యందు, ముఖ్యముగా నలంబియైదు సంవత్సరములు చాటి నీరసస్థితి యందున్నయెడలసాధారణ ముగ రాచపుండ్లు కనుపడుచుండును. రక్తము మాలిన్యముతోగూడి నీరసస్థితి యందుండిన పుడు, ఆకస్మికముగ నేదయిన గాయము తగిలినమెడల, రాచపుండు రేర్పడవచ్చును. ఈ రాచపుండ్లు పరిమాణమునందు మిగుల మారుచుండును. ఒకప్పుడు నారించువండంత పరిమాణమును గూడ గలిగియుండును. ఇవి మెడటగా, మిగుల గట్టిగానుండి, యెక్కువబాధతో గూడి, పైచర్మము వల్లనైన యెరుపువర్ణమును వహించి, యీవర్ణమును క్రమముగా నొడలు యొక్క వర్ణముతో గలిసిపోవును. రాచపుండు రేర్పడినకొలదియు, ఆనేక చిన్న నైవద్యాల ములనుండి మాలిన్యమును పక్కలును వెడలివచ్చుచుండును. వ్యాధి మెల్లగా నభివృద్ధిండు చు కొంతకాలము పిమ్మట, ఆనగా రెండుమూడు వారముల తరవాత, అస్వస్థభాగముల నుండి మాలిన్యము వెడలిపోయి, లోతైనట్టియ, క్రమముగా లేనట్టియు, రంధ్ర మేర్పడి, యీరంధ్రము చుట్టుపట్ల చర్మముక్రింద నావరించి యుండును. రాచపుండ్లయందు, సాధారణముగ జ్వరము, చెమట, నీరసత, కూడియుండును. బలవగు ఆహారపదార్థములను, పొర్లు వైనును, క్విన్స్ ను, విరస్ (లోహము)ను, అతి మూత్రీకుండు నల్లనందును, యిచ్చుచుండ వలయును. వేడికావడ ములను గాచుచు, మాలిన్యము బయటపడలునట్లు చేయుటకు గాను, క్రమకాలమున అస్వస్థభాగమును గోయవలసియుండును. మాలిన్యము నడలుట ఆగి పోవునపుడు సాధారణ పుండవ కను జీకత్సు జేయవలయును. + గురుగలకోతను సాధ్యమయినంత త్వరలో గోసి ఒక భాగము కార్బాలిక్ ఆసిడ్ తో అయిదు భాగముల గ్లిసేరును గలిపి పుండుయొక్క రంధ్రమునందలి లోపలిభాగమును తడుపవలయును.

రాత్రి చమటలు.

తయచ్యుతవలన, రాత్రి చెమటలు కలుగుచుండును. ఈగతి శరీరముయొక్క నీర పనికిని జలయజేయును.

క్లారట్ హైడ్రేట్ రెండు దామలు, బ్రాందీ మూడుబౌన్సులు, జలము మూడు బౌన్సులు—వీటిని కలిపి ఒకటియొక్క ఉపరిభాగమును స్పంజ చేయవలయును.

క్వీనీన్ సల్ఫేట్ అయిదు గ్రయినులు, జలము ఒకపైంటు—యీరెంటిని కలిపి స్పంజచేసినను చేయవచ్చును.

రి కె ట్టు.

పూసంబుగమరు లవణములు తక్కువగుటచే ఎముకలు సుపూర్ణాభివృద్ధి నందక పోవుటవలన, మెత్తనయిపట్టియు నంగుదలనందినట్టియు స్థితియందుండిన ఆస్పస్థత రికెట్టు అవును. ఈ వ్యాధి పసికనమునందు గలుగుచు, ఒకప్పుడు బిడ్డ నడుచు నీతిలోనికివచ్చు నంతవరకును, యీ వ్యాధిని గమగోసుటకు వీలులేకపోవచ్చును. ఈ వ్యాధి సామాన్యముగ నారుమాసముల వయస్సునుండి, పండ్లు అన్నియు వచ్చు నంతవరకును, వ్యాపించియుండును. ఒకప్పుడు పుట్టుకనుండియు యుండవచ్చును. జీర్ణాశయ ఆస్పస్థతల దీర్ఘ కాలము వ్యాపించి యుండుటవలన, శరీరపోషణము సరిగా నుండకపోవుటచే నీ వ్యాధి కలుగుచుండును. అనా నాగ్యశిశులు యీ వ్యాధి కష్టమగు ఉద్యమములను గలగ జేయును. సరైన ఆకలి లేకపోవుట, విరేచనక్రియలు తిప్పట, నీరపురంగుగల విరేచనములు, దళమయిన మూత్రము, చిక్కిపోవుట, చిఱచిఱలాడు గుణముకలుగుట, శిశువుపైన రాత్రులందు చెమటపోయుట, కొంచెము జ్వరము, మచికల్లు చీలమండ మోకాళ్ళు పచ్చిదనమును వహించి, వాపుదలతోగూడి చుట్టుకొనియుండుట, కాళ్ళు ముందుకు వెనుకకు వంగియుండుట, ఒకప్పుడు పెన్నెత్తాన వంగిపోవుట, శిరము విస్తరింపునందుట, గుండెయొక్క ఆస్పస్థత నందుట—యీలక్షణములతో గూడియుండును.

చి కి ట్టు.

1 వ బొంబయోగమును బలవర్ధకౌషధముగ నియ్యగలుగును. లెంవాటరు. (నున్న పుస్తకము)ను పాలను కలిపి యియ్యవలయును. పరిశుభ్రముగు గాలి, చెమ్మలేకుండుట, వెచ్చని దుస్తులు, అనస్తరములై యున్నవి. ఉష్ణసౌఖ్యో స్పంజచేయుట ఉపయోగముగనుండును. బిడ్డను యెక్కువ కాలము కూర్చుండనియ్యరాదు. సాధ్యమైన పాస్పలపయిన బరండెట్టవలయును. ఎముకలకు సత్తువ వచ్చువరకును బిడ్డను నడువనియ్యరాదు. కాడిలివర్ అయిలును 3 వ బలవర్ధకౌషధమును వాడవచ్చును. పేరులయొక్క ఆస్పస్థత ఉండినయెడల పిగ్మెంటరీయి అయొడ్డెడ్ ను తగు మోతాదులలో నుపయోగింపగలుగును.

వాత రోగము.

(కీళ్లనొప్పలు.)

వాతరోగమును, ఉష్ణతృప్తియు, దీర్ఘవ్యాపకస్థితియు అని రెండుగురుల సనుసరించి యుండును.

1. ఉద్రుత వాతరోగము.

మాత్రముగనుండ వెలువడేడి యూరిక్ ఆమ్లము అధికముగ బ్రకాశించుట వలన, పడుచువారలయందు యెక్కువ తగుచుగ నీ వ్యాధి కలుగుచుండును. చలిగాలి సోపాన పలనగాని, చెమ్మ తగులుటవలన గాని, యీ వ్యాధి తగుచుగ వారంభం నగుచుండును. జ్వరము, నిండుయెన్నటియు చురుకు బాధగల నాడి, పొంగిపూర్త నాలుగు, యుగ్మిని గని కేలునట్టి మూత్రప్రసృత—యీ లక్షణములతో గూడియుండును. పుష్కలలో నొకదాని యందు బాధ ప్రారంభమయి, ఆ భాగము నాపుచున్నది యుగ్మిని కదల్చుట పిలువని నిది. నొండు, మట్టుకొనుట గూడ భయమును గలుగజేయును. ఈ వాపునకు అనేక కీళ్లుగాని అన్ని కీళ్లుగాని, గలవు. పులుపువాసనతోగూడిన చెమటలు పుట్టి, చిన్నపొమ్మలు యుండుచున్నవి. ఈ పొమ్మలవలన అపాయమేమియు లేదు. ఈవ్యాధి రండువారములు లేక మూడు వారములు వ్యాపించిపిమ్మట, సంపూర్ణ స్వస్థత కలిగినను కలుగవచ్చును. లేక, కీళ్లయందు బిగువులా, నొప్పియును, అటులనే యుండినను ఉండవచ్చును. శరీరవేడిమి 105 డిగ్రీలకు సూచించినయెడల, గుండెఆస్వస్థతను సూచించు అపాయకరమగు లక్షణము గా నెంచవలయును. ఎడమవయిపుల ఉద్రుతమగు బాధయేర్పడి, దీర్ఘమగు ఊపిరిని తీసి కొనుటవలన బాధ అధికమగును, కొద్ది దగ్గుకూడ కలుగును, ఊపిరియందు కొద్దియో గొప్పయో ఆయాపము కూడియుండును. గుండె అదరుకూడ అప్పుడప్పుడు కలిగి, నాడి క్రిమము తప్పి, సన్ననై యుండును. కీళ్లనొప్పి సంబంధమగు జ్వరమునందు గుండె ఆస్వస్థత యేర్పడుట కనువు గలుగును. గాన, యీ జ్వరమునుగూర్చి ఆశ్చర్య జేయరాదు. గుండె ఆస్వస్థత వలన కొంతకాలమునకు సంజావ్యాధి ప్రవేశించి యిందు వలన త్వరగనో అలస్యముగనో మరణము కలుగవచ్చును.

చికిత్స.

సామాన్యవిషయములలో రోగి ఫ్లానల్ దుస్తులను ధరించవలయును. వ్యాధి కాల ముందంతటను రోగి విశ్రాంతిగ నుండవలయును. రెండు మైట్ల ఉష్ణజలము నందు ఆరపాను సోడా కార్బనేటును గలిపి, యీ లోషనులో గుడ్డను దడిపి ఆస్వస్థత భాగములవయి జల్చువలయును. జలమునందు ముందుగా రెండుపానుల సోడా కార్బనేటును గలిపిన 98 ఫారన్ హీట్ డిగ్రీల వేడిమిగల, అనగా స్వాభావిక శరీరవేడిమికి సమీపముగనున్న, జలము నందు తొలై సాక్షియను జేయవలయును. విశేషము క్రమముగా గాకపోయిన యెడల, 1 వ ఔషధయోగము నుపయోగించవలయును. 3 ద్రాముల సోడా సేలిన్లను 12 ఔన్సుల జలముతో గలిపి, ప్రతి మూడుగంటలకును ఒక ఔన్సు చొప్పున నివ్యుతలయును. బాధ

మిక్కుటమ గానుండి క్లిష్టవాపుయను అధికముగా నుండినయెడల నేలీసైనిక్ ఆసిడ్ 40 గ్రాములను హైడ్రోక్లోరేటు ఆఫ్ మార్ఫియా 1 గ్రామును, గలిపి 8 మాత్రలుగాజేసి నాలుగుంటల కొక మాత్రచొప్పున నియ్యవలయును. సోడా నేలీసైనిస్ ను గాని, ఆసిడ్ గాని, యెక్కువగ నుపయోగించుటవలన మూత్రమునందు శ్వేతధాతువు (అల్బుమిన్) కను దడగలదు. దీనిని గనుగొనుటకయి మూత్రమును 249 వ పుటయందు జెప్పబడిన ప్రకారము దిసమునకు రెండుసారులు బరితీరిచి శ్వేతధాతువు కనుపడినయెడల యీ మందును నిలిపివేసి 2 వ డయూరిటిక్స్ బోషధమును వాడవలయును. బాధవలన రాత్రులందు నిద్రపట్టక పోయినయెడల పల్వో ఇపికాక్ కోను పదిలేక పడునైదు గ్రాముల హెతాదులను పెద్ద వారిలకు యియ్యవచ్చును. జ్వర తీవ్రతవలన, వ్యాధిగుండెకు వ్యాపించుటక్షణములు నూచించినయెడల, రోగిని మాట్లాడనియ్యక- పల్వోఇపికాక్ కో ను రాత్రియందు దిచ్చుచునే యుండి 1వ డయూరిటిక్స్ యాషధమును మూడుంటలకొకసారి ఇవ్వవలయును. తేలికయి స ఆహారమును నిచ్చుచు మత్తుపదార్థముల ద్యజించవలయును.

2. దీర్ఘ వ్యాధిక వాతరోగము.

పైడ వానలకు దడియనట్టియు, క్రమమయిన ఆహారము లేనట్టియు, వారములకొక ముఖ్యముగా నీ వ్యాధి వయసు చెల్లినవారియందు వ్యాప్తత నందియుండును. కీళ్లయందలి యెముకలుగాని స్నాయువులుగాని యీ సంబంధముగ అస్వస్థత నందును. పెద్దపెద్ద కీళ్లయందు బాధకరగి వాపుతో గూడియుండును. కాని, కీళ్లయొక్క కణుపులు యెల్లప్పుడును యీ బాధనుండి తప్పించుకొనజాలవు. ఈ వ్యాధియందు జ్వరమును చెవటయును ఉండువు. ఒకప్పుడు కాపడములవలన దగ్గవచ్చును. ఇంకొకప్పుడు హెచ్చవచ్చును. ఈ వ్యాధిని గాపాడెడి కారణముల దప్పించుట ముఖ్యాంశమయి యున్నది. చెప్పుతో గూడిన ఇండ్లు, గోడలు, చాలని దుస్తులు, ప్లాసులును ధరించకుండుట, నీరసమైన ఆహారము—ఇవి ముఖ్య కారణములై యున్నవి. ఈ లోపములను దొలగించుచు అప్పుడప్పుడు రాత్రులందు పల్వో ఇపికాక్ కోను బుచ్చుకొనుచు, అస్వస్థత భాగములపైన రెమన్ గ్రాస్ ఆయిల్ ను రుద్దవలయును. కీళ్లనొప్పులకై లోనికిచ్చుటగును. వైద్యుడుటకును మందులకై బోషధయోగముగ భాగములకై వాడవగును.

వాంతులు.

వాంతియగుట వ్యాధి లక్షణమై యున్నది. జీర్ణాశయము నందలి పదార్థము వెలువడుట యేగ్గుడి నిస్త్రాణికు గూడ గారణమగును. రోగ హితముగు పదార్థము బుచ్చుకొనుట వలనగాని, ఆహారమునంద మితత్వమును వహించుట వలనగాని యిట్లు గలుగవచ్చును. ఇట్టిది సాయాన్యముగ జీర్ణాశయము యొక్కయు పేగులయొక్కయు అస్వస్థతను నూచించుచుగాని, బిడ్డలయందు ముఖ్యముగా దరుచుగ కడుపునొప్పి, మూత్ర

కృష్ణము, కాలరా—యివాగ్ధుల యందును గనబడును. తరుచుగా జ్వరములకు ఆరంభ మునందు, వాంతులు కలుగుచుండును. గురకదగ్గ యొక్క ఉష్ణితమునందు గలుగుచుండును. ఆర్కెక్ ఆంటిమెని సుంబంధముగ వివర్యయోగముల వలనను వాంతులు కలుగును. సముద్ర ప్రయాణమునందును గర్భవత్సవయమునను దరుచుగా బాధకరముగ నుండును. పేగుల యందు ఆడుపడినయెడల మలపదార్థము కూడ వాంతియగును. పిత్తము వాలి అయినయెడల చేదుగను అపహితముగను ఉండి, పనుపువర్ణము కలిగియుండును. కొన్నివిధములగు ఆజీర్ణల యందు, నీళ్ళవలె నుండునట్టియు పుల్లగా నుండునట్టియు ద్రవపదార్థము లొనవడును. జీర్ణాస్పష్టత యందు నిస్పృహ స్వేదకృత్ బహు ఉపయోగముగ నుండును. తక్కిన విషయము అలా అలా వ్యాధిలక్షణములను దగు జాత్యము చేయవలయును.

విరేచనములు (చీము నెత్తురులతో గూడిన)

(ఆకు విరేచనములు)

ఆమవిరేచనవ్యాధి ఇండియాదేశమునందును. యితర ఉష్ణప్రదేశములందును, మిక్కుటముగ వ్యాపించియున్నది. వాయువు నందలి ఆకుగ్నప్తత వ్యాధి యెడల నద్యుక్తతను గలుగజేసి, ఋతువు మారగానే యీ వ్యాధి అంకురణ నుండును. ఈ వ్యాధి అనేక కారణముల వలన గలుగవచ్చును. పెద్ద పేగులయం దెల్లప్పుడు ఉండెడి యొకవిధమగు పురుగులయొక్క ఫీక్షణతవలన నీ వ్యాధి కలుగుచుండును. చలిజ్వర వ్యాధికి లోనగుటవలన ఆమవిరేచనములు కలుగునని కొందఱుకు నన్యుకము కలదు. ఇండియాదేశము నందలి గొప్ప శ్రీమం తరుచుగ నీ వ్యాధికి లోనగుటవలన గర్భప్రాసము కలుగుచున్నది.

బాడ్డు సమీపమున పెలిపేయనట్టి కొన్ని యేర్పడి తరుచుగ తీర్పుటతో కూడ గూడియుండు లక్షణములు ముందుగా గనబడును. నిదించునప్పుడు గాని, యితర కాలముల యందుగాని, ఉపరభాగమునకు జలిగాలి త్రాగుటవలన నీ కొన్ని యేర్పడుట కలుగును. ఏమృతండు లేక మూడు దినములవరకు తరుచుగా పల్లవి విరేచనము అగుచుండును. అంతట పొత్తికడుపుయొద్ద కొన్ని ఆధికమయి, ఆసనము యొద్ద మంట కలుగుచు, పచ్చిగా నుండి తరుచుగా ముక్కుటతో గలిసియుండును. ఈ సమయమునందు నెలువడు మలపదార్థము, ద్రవపహితమై చీమురక్తములతో గూడియుండును వ్యాధి ప్రులినకొలదియు మలపదార్థము తగ్గిపోయి, పచ్చిమాంసపు ముక్కులను బోలిన పీలికలుగాగాని పెద్దలుగాగానినెలువడుచు, దుర్వాసనతో మయియుండును. ఇట్టియందు విరేచనబాధ తొంద్రతో గూడి యుండును. కొన్ని విషయములలో విరేచనమును బహు విశేషముగా నగుచుండును. మరి కొన్ని విషయములలో నిరవధిసాలుగు గంటలకాలముగాను, పది మొదలు యిరువది వరకు విరేచనము లగుచుండును. మూత్రవిద్యుతేచ్ఛ అధికమగును. కొన్ని విషయములలో ఇసుక కన్నులతో పోవచ్చును. మరికొన్ని విషయములలో, ముఖము యొగ్గిబాధ, ఒకలు పొడిగా నుండి, నాడి చురుకు బారి నాలుకపై పొరగిమ్మియుండును. పేగుల్లపై నొత్తివయెడల బాధ

గానుండును. తాదా తేక, పేగులయొక్క పచ్చినము తేక, వలపదార్థము లేకుండ నీమ సత్తులు మాత్రము వెలువడు చుండినయెడల, పేగులయొక్క అంతిమభాగము మాత్రమే అస్వస్థతయందుండినదని తెలియ వలయును. మృతక తేబరముయొక్క వాసన, ముఖవైఖరి యందు వ్యాకులత, నీరసమైన నాడి, వెక్కిరి, స్వాధీనము తప్పిన విరేచనములు—యివి యన్నియు దుగ్గతూములై యున్నవి. ఈ వ్యాధియందు పదార్థస్రావ మెక్కువగ లేక పోయినను, తరుచుగ మలవిసర్జనమునకు బోవుటకు యిచ్చుండును.

ప్రతి ఆమ విరేచన విషయమునందును, కారణము అస్వస్థతనందు అపాయము కలుగ వచ్చును. ఇట్టిది పరిహరించినయెడల చెంటనే దగని శిశువును శయనమునకు యుండును.

చికిత్స.

ఈవ్యాధిని చికిత్స చేయుటయందు, పరుండియుండి విశ్రాంతి దీసికొనుటయు, ఆహార పదార్థములయందు తాగ్ర త్రన వహించియుండుటయు, పరిధానాంశములై యున్నవి. ఆహారము కొద్ది పరిమాణములుగ నియ్యవలయును. ఇది తేలికగ జీర్ణమగునట్టిదిగ నుండవలయును. పాలు, బాణ్లేసీస్, మంచి ఆహారములైయున్నవి. వీటిని కొద్ది పరిమాణములగా నిచ్చుచు, గోరువెచ్చన గలిగి యుండవలయును. సాధు గతులయందు 5 గ్రేయసుల ఫర్నీస్ యిసికాకో కో ను దినమునకు నూడు పర్యాయములు యియ్యవలయును. దీనివలన వాంతికలుగుట కుద్యుక్తత యేర్పడునుగాని, పరుండి యుండుటవలన సాధ్యమయినంతవరకు వాంతి కాకుండునట్లు జాగ్రత్తను యిచ్చుకొన వలయును. కొన్ని విషయములలో నిది మంచిగుణము నిచ్చును. విరేచనము కల్పనై మెరయునట్టి పసుపుపర్లము కలుగుట యేర్పడగనే యీబోషధము పనిచేయు చున్నట్లు తెలియవలయును.

ఇంకొక విధముగ చికిత్స ప్రతి ఆరగంటకును ద్రావణ మోతాదులోగాని, ప్రతిగంట కును రెండు ద్రావణముల మోతాదులోగాని, సోడా సల్ఫేటును జలములో గలిపి యిచ్చుచు కల్పనైట్టియు మడ్డియొగట్టియు విరేచన మగువరకును యీ మందును యిచ్చుచుండ వలయును. బిడ్డలకు వయసు ననుసరించి మోతాదును దగ్గించవలయును. (ప్రతిదినమును రెండు లేక మూడు కల్పనైన పెద్దవిరేచనము లగునట్లు కొన్ని దినములవరకు యీ మందును ప్రతి దినమును సేవించవలగును.) ఈ చికిత్సవలన విరేచనములయందు నీమము రక్తమును పడుట మాని, విరేచనము మడ్డిగా నేర్పడిన తొడనే, బిళ్ళతో నేలినైలిన ఒక ద్రావణము, తైలర్ మార్షియా హైడ్రోక్లోరై అరబ్బాము, కొంచెము తుమ్మజీరు, 6 బౌన్సుల జలము — వీటినిగలిపి గలిపి నాలుగు గంటల కొక బౌన్సు చొప్పున విరేచనము గట్టిపడునంత వరకు యియ్యవలయును. ఉదరముపైన వేడికాపడములను గామలువలనను ఆపరొగముండగలదు.

ఈవ్యాధి దీర్ఘ వ్యాపితమయి యున్నయెడల ఆహారమును బహు జాగ్రత్తతో నిచ్చుచు, అనేకవిధములగు మందుల వాడి చూడవలసి యుండును. శేవలము పాలును మాత్రమే ఆహారముగ నిచ్చుపద్ధతి యొకటైయున్నది, ఫలములయొక్క రసములును, కొక పదార్థము

లను మిగుల ఉపయోగములుగ నుండును. చిట్టాముదము చిన్న సోపాదులు, పట్టియిపికాకో కో చిన్న మోతాదులు, రసనాస్థును ఒక గ్రామును నలభయందు ఒక గ్రామును, కలిపిచేసిన మాత్ర; 20 మక్కల మోతాదు ఒత్తవలెకొనును. యిది అన్నియు ఉపయోగములుగ నుండును. సమస్తవిధయోజనము తగునగు విధముగా ఉపయోగముగ నుండును. దుష్టులు యొప్పుడును వెచ్చనను గలుగ గలయు నట్లుంటే వలయును. ముష్టిపదార్థముల నెప్పుడును యియ్యగూడదు.

పీర్ల వస్త్రము.

జననోదయ భాగములనుండి రానుండు ఇంద్రియవృద్ధిని కలుగుట, వీర్యవృద్ధి మనబడును. ఇట్టిసాధనము అష్టాదశ్యదు కలుగుట విశేషముగ నొనరవలెకొనును. ఉద్యోగ గతులయందు, యిట్టిసాధనములు పగటిసమయమున గూడ గలుగుచుండును. తరుచుగా స్పృహవస్త్ర కొన్ని దురలవాటులచే గలుగుచుండును; ఆస్తి దురలవాటులను మానుటవలన నీవ్యాధి అంతరించగలదు. ఇట్టి సాధనములతో అక్షిగలుగుములు మాడియుండి నాగి తరుచుగ ననా రోగ్యత యుండుండును, మనోహానము తగ్గియుండును, మూలశంక, నులబంధము, ఉండి యుండినయెడల ఉండుకగు జీర్ణము జేయవలయును; అజీర్ణలక్షణము యుండినయెడల తగు జీర్ణ సలుపవలయును, మనస్సునం దేమయిన విచారముండినయెడల స్థలమునుగూర్చి వ్యాపరియందు మార్పునందవలయును. అలస్యగాత్రి భోజనములనుచూచి, ముష్టిపదార్థములు నున్నూ, శ్మశించవలయును. రోగి గట్టిపాస్సులపై బడుండును, వెలికిలి కుండురాదు. విశేషము కృమముగా నగుచుండినయెడల, 3 వ బలవర్ణకౌషధము నుపయోగించ నగును. యక్షాస్త్రి దామియానా (సాలిడ్) ను మాత్రముగాజేసి పుచ్చుకొనిన గుణము కనుపడ గలదు.

వెక్కిలి.

ఆకస్మికవైషణ్యము, కొద్దికాలమే వ్యాధిచేయునట్టియు, ఈదప్పుడు గలుగజేయు నట్టియు, ఉచ్చాస్యములతో గూడి, స్వరపేటికయం దొకవిధముగ ధ్వని పుట్టి, ఉపబాహు యొక్క మూతతోగూడి, వెంటనే నీక్వాసము కలుగుచుండునట్టి వెక్కిలి అనబడును. ఈ దుష్టో గూడినట్టి ఉచ్చాస్యములు తెరలుగా గలుగుచు, కొద్దిసేనుల వ్యవస్థతో ఒకదాని తరువాత నొకటి కలుగుచుండును. ఈ తెర ఒకప్పుడు కొద్ది మినిటులవరకు మాత్రమే వ్యాపించుటయు, యింకొకప్పుడు కొన్ని గంటలును, దినములును గూడ వ్యాపించుటయు గలదు. బాలవిషయములతో అజీర్ణవృద్ధి గాని అహారమును ఆతిథిందరతో మింగుట వల్లనుగాని కలుగవచ్చును. కారణ జ్యేష్ఠాశయ వ్యాధులయొక్క అభివృద్ధియందు తద్వ్యాధులయొక్క లక్షణముగ నిది కనుపడ వచ్చును. కాలగావ్యాధి పిమ్మటను, యితరవ్యాధుల యుండలి మరణోపశ్చయందును, వెక్కిలి కలుగవచ్చును. అజీర్ణవృద్ధిత మయినయెడల, కొద్ది గ్రాములను సోడాస్త్రి కాళ్ళ నేటును, కొంచెము టింక్చర్ జింజరును, జలములో గలిపి పుచ్చు కొనుటవలన వెమ్మది కలుగవచ్చును. జీర్ణతనొందని అహారము జీర్ణాశయమునం దొకప్పు

దుండియందును వలస నిట్లు కలిగినయెడల, మున్నగునాంతికారి నియ్యనగును. స్పీరిట్సు ఆఫ్ క్యాలఫర్, క్లొరోడీన్, స్పీరిట్సు ఆఫ్ మ్యూరియా ఆగ్నోమేటిక్, యివియును మంచి బోషధములై యున్నవి. నొడ్డితర అయినపుడు దీర్ఘమగు ఉచ్చాస్యము (బ్రూడోపిరి) ను దీసికొని ఊపిరిని సాధ్యముగనుతేవరకు నిశిపి యుండుటవలన, కాలిత కలుగగలదు. పాతికడుపుపై న ఒత్తిడి కలుగునట్లు పటకాను బెట్టుటవలన నొకప్పుడు వెక్కిరిని కట్టుబాటు చేయవచ్చును.

వెట్రి.

మనమునను గలగు ఆయావస్తువులన మెదడునకు దస్యస్థయేర్పడి, వెట్రి కలుగవచ్చును. వ్యాపారమునందు నష్టమునందు సంభవించుట, అత్యధికమగు నివ్యావశ్యము, మిక్కుటమగు శరీరకష్టము, విరుగుదలతో గూడిన మనముని వ్యామలతతో గూడినబుద్ధి — యీ కారణములు వెట్రి కలుగట కుద్యుక్తములు బుట్టించును. వలపు సంబంధముగ ఆకాభంగమువలనను, ద్రవసంబంధముగ అతిచింతన వలనను, కామవ్యాపారములయందు దధికలోలతవలనను, యీవ్యాధి సంభవించవచ్చును. ఈ అన్ని కారణములయందును మెదడునందు దోషవిధముగ అస్పృశ్యత యేర్పడుచుండును. మనమున కేవిధమగుచింత కలిగినను మెదడున కెక్కువపరిశ్రమ కలుగుచు, మెదడుతో సంబంధించిన విద్యుచ్ఛక్తి సంబంధముగ నస్తువలని విశేషముగా వ్యామలతయేడలను అధిక చింతనయెడలను వెచ్చబెట్టబడుట మూలమున, గుండెకాయ, కారణము, క్వాసకోశములు, మూత్రగ్రంథులు మొదలగు అవయవములకు గావలసిన పిద్యుచ్ఛక్తి సంబంధముగ శక్తులను అందిచ్చుటయందు లోపముకలిగి, మరల నా అవయవములును తిస్థితి నీరసత్వమువలన మెదడునకు వలయు పోషణమును దగ్గించుటచే, మెదడు స్వస్థావస్థను దల్పుచుండును. ఈస్థితియందు నున్నిత స్వభావముతో గూడిన శరీరప్రకృతి గలిగిన మనుజుడు ప్రపంచమునందు నున్నట్లుడుగా బెలును. బలశాలియగు మానవుడు యెట్టియో యొక ఉదుక్తమైనట్టిగాని దీర్ఘవ్యాపకమైనట్టిగాని వ్యాధికి లోనగును.

అనుక్రమశీకయందు సూచించబడిన బోషధములు యెల్లప్పుడును ఉపకరిని గలగ కేయజాలవు. వెట్రివానియొక్క మనోవికలతను బోగొట్టుటకు అవసరమగు బుజ్జగింపు మాటలను జెప్పవలయును. ఫలమార్పువలనను ఉపయోగ మాండగలదు. ఇట్టివారలయొక్క మనస్సునకు ఆయావస్తువుల గలగజేయనట్టి వ్యాపారములు గలిపింపవలయును. విడిగా నిట్టి ఏర్పాటుల జేయుట మిగులకష్టముగాన, మనరాజధానియందు దిట్టివారలకు చెన్నపట్టణమునందును, విశాఖపట్టణమునందునుయేర్పరుపబడి యున్న ఆసుపత్రియందు స్వస్థ నందుటయేమంచిది

వెట్రి మక్క కాటు.

(హైడ్రోఫోబియా)

పిచ్చిమక్క కరచుటవలన నొకవ్యాధి కలుగవచ్చును. దీనికి హైడ్రోఫోబియా అందురు. జిల్లులు, తోడోస్పి, గుంటనక్కలు, కరచుటవలనను యిట్టివ్యాధి కలుగును, మక్కకంటే, తోడోస్, పిల్లి, కరచుటవలన వెక్కిరిన అపాయకరమై యున్నట్లు తెక్కలవలన బెలియుచున్నది.

అక్షణములు.

వ్యాధి పక్ష్యమునకు వెచ్చు కాలమును రోగియున్న సాధారణ ఆహార్యత క్రమముగానే కనబడును. అప్పుడును, గాయమునందు లేనదల యేర్పడి ఉన్నత అక్షణములు వ్యాపించినకొలదియై, నాపుడలయు గోలునవచ్చును. మున్నే గాయముట, కలతవలన నిద్ర, దగ్ధప బాధలను మ్రింగుట కత క్తి, చురుకుట, హఠ, తొందరతో గుడిన ఉదాహరణకావచ్చును, మనోద్రోకత, మధ్యమయు, మునియందు దీర్ఘమున ఉచ్చి యేర్పడుట, యీ లక్షణములతో గూడియుండును. క్వాస సంబంధ స్పష్టము, ఉదర హలంధ మయినట్లయి, స్నాయువులయొక్క ఈర్ష్యులు గలవలన, మూర్ఛ తటస్థించి రోగి మరణము నందవచ్చును, సాధారణముగ అలపువలనను రోగి మరణము నందను.

చి క్తి త్న.

చేతిమీదను గాని కాలుమీదను గాని కదలియున్న గుడుట, కాలమును మేగా లిగువైన కట్టును గట్టవలయును, అంటట పొటాన వర్షాంగ నీటి పాల్వమును (జ్వర) జలమానండు 6 గ్రేయినుల చొప్పున గలెను)తో పుండునుగడిగి, స్క్విక్ ట్రైకోను పొక్కుచుండుగా నుపయోగించ వలయును. మనోద్రోకతను దగ్గించుటకు, ప్రతి ఆరు గంటలకును 10 గ్రేయినులు పొటానీయం బ్రామిమెను రండు దినములవరకును నియ్యవలయును. రోగి, భయ మందకుండ ఉత్సాహమును గలిగి యుండునట్లు చేయవలయును.

ఈ పైచికిత్సలవలన నెప్పుడు యెక్కువ ఆశల నుంచుకొనగూడదు. 1885 వ సంవత్సరమున లూయీ పాస్ట్యూర్ ఆననాక ఫ్రెంచి ప్రద్యోత్సాహము, పిచ్చిబక్కలయొక్క విషపర్యాయమువలన జంతువులకు కుండకొరకు వన్ను పాములనుండి దీయబడిన రసముతో టీకాలను పేయుటవలన, నీవ్యాధిని పొందేయట కొక మార్గమును కనుగొనెను. దీనివలన యీర్ష్యాధియందు 100 క సామాన్యముగ గలుగు 15 మరణములు, 1 కంటే తక్కువగ గూడ జేయబడెను. ఈ సంబంధమున బికిత్సను జేయుటకు యిదివరకా ఇండియా దేశము నందు పంజాబురాజధానిలా సిమ్లా పాఠశాల కళాశాల పట్టణము నందును, నీలిగిరి పాఠశాల ముల కూనూరు పట్టణమునందును, ఆనుప్రతాప నిర్మింపబడి యున్నవి. ఇప్పుడు జిల్లా రాజధానుల యందును యీయేర్పాటు చేయబడియున్నది.

క్వాసకోశములనుండి రక్తము గ్రహింపుట.

క్వాసకోశమునుండి వెలువడర క్రమ యెర్రగై నురుగుగా నుండును, సాధుగతుల యందు బికిత్స అవసరములేదు. రక్తసాగరము అధికముగ నున్న యెడల రోగికి పూర్వమయిన విశ్రాంతి నిత్యవలయును. రోగి, బెటగుకొని చనుండి, తలయెత్తుకొని యుండునట్లు దిండ్ర పై ఆని యుండవలయును. గడియందు చల్లగా నుండునట్లు చేసి, దుస్తులను దీలికగా నుండునట్లు చేసి, కాళ్లను చేతులను వడినట్లతో నింపుడిన సిపాలతో గావవలయును. చల్లని స్నానము దాగిగుట నిత్యవలయును. మంచుగడ్డ పొరకన యెడల, దీనిని పాలతో గలిపి

యియ్యవలయును. ఉదాత్త గతులయందు ఎడవొమ్మ భాగములకు మంచును పోయొగింప వచ్చును. ఇతర భాగములయందు, అనగా, జననోద్ధియ భాగములు మొదలగు స్థలములందు మంచును పోయొగించుట ములమున నువయోగముగ గమనొనబడెను.

క్యాలామేల్ (రసభస్మము)ను యిచ్చుటవలన పేగులయందు దుపశాంతి గలుగజేయుటయేగాక, కర్తప్రచారిమునం దుద్రోకతను గొంతవలన దృఢింపజేయును. కర్తప్రచారిమునం దధిక ఉద్రోకత ఉండినయెడల, ముంధ్యతను గలుగజేయుట కవసరమగు మందల నియ్యవలయును. ఈ విషయమున టెంక్చర్ ఆర్నెట్ బాగుగా బహిచేయును. నొప్పియందు శాంతిని గలుగజేయుటకు ఫైకర్ మార్షియా హైడ్రోక్సైడ్ నుపయోగింపవలెను. ఆత్యధికమగు రక్తస్రావములయందు వచ్చు తక్కిన విషయములలో దీనిని విరివిగ నియ్యవచ్చును. దీనికి వోడుగా టెంక్చర్ డిజిటాలిస్ ను గలిపి యిచ్చినయెడల మంత్రమువలె పనిచేయును. మార్షియా (నల్లమందు) యందుగల మలబంధ గుణమునకు ప్రతిహతముగ క్యాలామేల్ ను గొద్ది పరిమాణములుగ నుపయోగింపవలెను. అహారపదార్థములు నుభవపుగ జీర్ణమగునవిగ నుండవలయును. మున్నెవదార్థముల పరిపూర్ణముగ దృఢింప వలయును.

ఈ సందర్భమున జీర్ణాశయమునుండి రక్తమును గ్రహింపజేయుటను గురించి ఆలోచించవలసి యుండును.

జీర్ణాశయమునుండి రక్తమును గ్రహింపజేయుట.

జీర్ణాశయమునుండి వచ్చు రక్తమును నల్లగనుండును. జీర్ణాశయమునందలి కరువు వలన రక్తసాలము తెగుటయేర్పడి, యీ రక్తస్రావము కలుగును. ఒకప్పుడు కారణము స్త్రీవా ఆస్వస్థత నందుటవలనను యిట్లు తలపింప వచ్చును. జీర్ణాశయ ఆస్వస్థతయందు రక్తము అధికముగానుండి, క్వానకోశాస్వస్థత యందువలె నురుగుతోగూడి యుండక ఆహారముతోగూడ గలిసియుండి, రేచనముతోగూడ రక్తముడడుట కలుగును. ఈ వ్యాధియందు శరీరమునకును, జీర్ణాశయమునకును, విశ్రాంతి నియ్యవలయును. రోగి, పరుండబెట్టబడి, గదియందు చల్లగానుండునట్లు చేసి, స్నేహితులు మొదలగువారు నచ్చి చూచుటవలన ఉద్రోకత గలుగకుండ జేయవలయును. మోటిద్వారా ఆహారమనిచ్చుడ నిలిపివేయ వలయును. దాహము నణచివేయుటకు మంచుగడ్డ నుపయోగించ వచ్చును. మత్తుపదార్థముల సేవయు నోటిద్వారా యియ్యగూడదు. నోటిద్వారా ఆహారపదార్థముల నిచ్చుట నాపుజేయుట వలననే రక్తస్రావము నిలుపుకావచ్చును. కాని, టానిక్ ఆసిడ్ నుగాని, గ్యాలిక్ ఆసిడ్ ను గాని, 2 మినిముల 5 గ్రెయిసుల వరకును, లేక లెడ్ ఆసిడ్ ను 1 గ్రెయిస్ మోలాదులలోను, మాత్రముగాజేసి ప్రతిచందు లేక మూడు గంటలవరకును, నోటివెంటిడి యిచ్చుటవలన గుణముగ నుండగలదు. నిద్రపట్టుక అధికాయాసముగ నుండినయెడల 2 మినిముల ఫైకర్ మార్షియాను హైపోబైట్రిక్ పిసికాటితో రక్తస్రావమునందు యింబిట్ట చేయుటవలన గాని, 16 గ్రెయిసుల క్లరల్ హైడ్రోఫనున్న 30 గ్రెయిసుల పోటాషియం బ్రొమైడునున్న 4 ససముద్వారా పిసికాటి చేయుటవలన గాని, ఉపయోగముగ నుండగలదు.

శ్వాసకృచ్ఛము

అహారము తప్పమార్గమున బోవుటవలనగాని, మరియుతగ కారణమువలన గాని, స్వరపేటికగాని లేక శ్వాసనాళముగాని అడ్డగించు నందినపుడు, రక్తమునందు అంగార త్వర వాయుభాగము అధికమగుచు, ప్రాణివాాయు భాగము తక్కువగు చుండును. ఈ అడుకాటును దొలగించుటకు ఉద్యోతమగు ఊపిరివిడుచు ప్రియత్నములు జరుగుచు, దగ్గుకూడ యేర్పడును. ఈగతియందు రక్తమెక్కువగా నవరిత్యుత్తమగుచు రక్తము నీగత్రినుండి దప్పించుటకుగాను బలమగు ఉచ్ఛ్వాసన నిశ్వాసములు యేర్పడును. ఈస్థితియే శ్వాసకృచ్ఛమున బడును. ఈవ్యాధి కగు కారణమునుదొలగింప యత్నించుచు అనుక్రమణికలో నీవ్యాధికింద సూచింపబడిన ఔషధములను జాగ్రత్తతో సుపయోగింప వలయును.

సోరియేసిన్.

ఇది ఒకవిధమగు చర్మవ్యాధియే యున్నది. ఇది మూడువిధములుగ గలుగు చుండును. మొదటి విధమందు గుండ్రవైనట్టియు, దురదతోగూడిన మచ్చలుగలిగి యిందుపైన తెల్లని పొట్టుగా నేర్పడి పొట్టు రాలిపోయినట్టియు చర్మము పచ్చిగాను యేర్పిగాను ఉండును. ఈమచ్చలు యెదుగుచు గుండ్రముగానే యుండి ఆనేక అంగుళముల క్రవారము వరకు వ్యాపించి, అంతట పగిలి కళ్ళులతోగూడిన గుబురులుగా నుండును. రెండవ విధమగు నీవ్యాధియందు ప్రారంభము నందండెడి గుండని మచ్చలులేకుండ పొర సంబంధమగు పక్కలతోగూడి వంకరిలుగా నుండును. ఈరెండు విధములగు వ్యాధియును, చుంకయుండును, గజ్జలయుండును, ఆరచేతులమీదను, గోళ్లమీదను, గలుగుచుండును. దీనియందు దురద ఉండదు. మొదటి రెండు విధములగు వ్యాధియును జీర్ణాస్పత్తిలో వలన గలుగు చుండును.

చికిత్స.

మలబంధ ముండినయెడల అందులకగు జీర్ణము లేయవలయును. పొటాష్ ప్రకార్యునట్టి ఒక ద్రావణము అయిన బోస్సుల జలములో గలిపి, యీ లోషనును, పైన రాయుచుండ వలయును. అరబ్బెస్సు స్పిరిట్సు అఫ్ వైనను అరబ్బెస్సు టింక్చరు ఓపియను మద్రొందు బోస్సుల జలములో గలిపి, లోషనుగాజేసి రాయుటవలన దురద తగ్గగలదు. టార్ ఆయంట్ మెంటునున్ను రాయవచ్చును. అంగ్యుయెంటం హైడ్రోజెన్ సెలెనియం సింగిల్ ఆయంటు మెంటునున్ను సునాన భాగములుగ గలిపి రాసినను రావచ్చును.

ప్రొక్టోల

ఈవ్యాధి తరీరముయొక్క నీరసస్థితిని తెలియజేయును. ఈవ్యాధి రెండుతరగతులుగ నుండును. యీ రెండు తరగతులను గూడ, భయవ్యాధి సూచనలుగా నెఱుఁపవలయును. ఒక

తరగతియందు, మందమైన నల్లని వెండ్రుకలు, దళమైన పై పెదవి, పెదల్పయిన నాసికా రంధ్రములు, వికారమైన ముఖస్థిభి, వికారములయిన హస్తములు, గీతలతో గూడినట్టి మొద్దయిన గోరులు, సౌష్ఠవములేని శరీరావయవములును — యీ లక్షణము లుండును. బుద్ధియందు మాంద్యత, మెడయొద్ద గ్రంథులయొక్క వాపుదల, చెవులలోనుండి స్త్రావము కండ్లకలక, కంటిలో పువ్వులు, ఏనుగుగజ్జి, మొదలగు చర్మవ్యాధులు, కీళ్ళవ్యాధులు, రికెట్సు—యీ గుణములును గనబడు చుండును. ఇట్టిబిడ్డ యెదిగినపుడు పాలిపోయి యుండ వచ్చును.

రెండవ విధముగు నీవ్యాధియంగు, కొందరిలో చిక్కదనముగా నెంచుగుణము లుండును. పల్లనయిన చర్మము, స్వచ్ఛమయిన శరీరభావ, గులాబివర్ణముగల చెక్కిన పేద పులు, నీలమైనట్టియు నిగనిగలాడు నట్టియు నేత్రములు, విస్తరింపు నందిన కనుపాపలు, దీర్ఘమయిన కమబొమ్మలు, మృదువైన వెండ్రుకలు, గుండ్రనిముఖము నుకుమారవగు ముఖ లక్షణములు, చిన్న ఎముకలు, చర్మముగుండ స్పష్టముగ గనబడునట్టి అపరిమిత రక్తనాళములు, వికాసతనందిన బుద్ధిమాత్మత, —యీ లక్షణములతో గూడియుండును. ఇట్టి బిడ్డలు, రొమ్మపడినను తయ మొదలగు వ్యాధుల కెక్కువగా లోనగుదురు. ఈవ్యాధి వంశపారంపర్యముగ శరీర పరీక్షణి వలన గలుగుచుండును. కాని, ఆహారలోపము వలనను, చెమ్మ పుర్రేకములలో నివసించుటవలనను, తాగిన మోతులనము కొలుకవ్యాధి యొక్క కల్మషములు పైకారణములకు సహాయ మొనర్చుట వలనను, యీవ్యాధి కలుగవచ్చును. పరిశుభ్రముగు గాలి, మంచి ఆహారము, కాజీబీదరు చమురు, శరీర సాధకము— యీవ్యాధి కల్మషమును బోగొట్టుటయందు గాని, ఉద్యోతావస్థ గల్పించు కుండుటయందు గాని, సహాయ మొనర్చును.

స్తనములయొక్క వాపుదల.

స్తనములయొక్క వాపుదల యొక్కవ తరుచుగ పాలనిచ్చుచున్న స్త్రీలయందు గలుగుచుండును; కాని యితర స్త్రీలయందును ఈవ్యాధి తటస్థింపవచ్చును. దెబ్బవలనను, జలుబువలనను, బిడ్డను ఆకస్మాత్తుగ పాలుత్రాగి అలవాటునుండి దప్పించుటవలనను, శుభ్రపాక్షణము చేయుటయందు తీరికపూర్ణవలనస్తనముల నధికముగ విస్తరింపునందుట కడమిచ్చుట వలనను, బిడ్డయొక్క మరణము వలనను, యీవ్యాధి సంభవించు చుండును.

చి కి ల్ప.

నేడి కాపడములను గాచవలయును. తరుచుగా గాకుండ ఆపుడవ్వకుడు, బిడ్డవలన గాని, బ్రెస్టు పంపేను ఉపయోగించుట వలన గాని, పాలను దీసివేయ వలయును. రోగియొక్క చిత్తవృత్తుల ననుసరించి పాలుయొక్కవగ నున్న పుడు మాత్రమే, తీసివేయ వలయును. అధికముగా దీసివేయుటవలన, వాపుదల యొక్కవగును గాన యీపనిని జాగ్రత్తతో చేయవలసియుండును. నేడి కాపడములయొక్క మధ్యకాలములో వాపుదల స్థలమందు సోక

లినిమెంటును రాయచు, చుట్టుపైపులనుండి స్ననాగ్రముల పైపులను నెమ్మదిగా రాయవలయును. ఎక్కువగా దున్నటవలన కురుపుయేర్పడుట కనువగును గాన దానిని అధికముగ దగులకుండ జూడవలయును. స్ననమునకు కదిలిక లేవకుండుటను గాను నోగి వరుడిమీ యుండవలయును. విరేచన మగుటకుగాను చిట్టాముదము నియ్యవలయును. ౩ గ్రాయినుల క్లీసిక్ను పృతి ఆహారములకును యిచ్చుచుండ వలయును స్ననాగ్రములకు నుట్టును రెండు లేక మూడు అంగుళముల వరకును లినిమెంటు బెడదో నాను రాయవగును, బెడదో నా లినిమెంటును రాయుట వలన పాలు యేర్పడుట తగ్గిపోవును. స్ననము మిక్కిలి గట్టిపడి పొరయును అధిక బాధగా నున్నచోడల పృతిరెండు లేక మూడు గంటలమీద నిలిపి లేక రెండు దినముల చుట్టు, రాయటవలన, తరువాత తగ్గి వుండును యేర్పడుటవలన వలయును. ఈతొవధము విరేచనబంధ మునుండి గాన, యీముందు రాయబడి గుంపినపుడు బిగ్గును బాణు త్రావనియ్యరాదు. వేత్తగిట్టుయందు మనగ యేర్పడి, గొలసునందు బాణుల నిలిపిన పంటనీ, దీనియొక్క ఉపయోగమును నిలుపుచేయ వలయును.

పైచికిత్సలవలన ప్రియోజనము లేనపుడుగాని, వ్యాధిని గురించి అక్కర్లేదేని యుండునపుడుగాని, కురుపుయేర్పడుట తటస్థమగును. జ్వరము, పోట్లపొడుచుట, చలి కగులుట, స్ననముయొక్క ఒకభాగమునందు వాపుదల కలుగుట, చర్మము యెరిగిపడుట— యీలక్షణములతో గూడియుండును. ఈవాపుదల భాగమును లాస్సెటుతో బెరచుటవలన, రాబోవు ఉన్నతవాధను దగ్గింపవచ్చును. గాయమును పెరచినపిమ్మట పిండి కట్టును కట్టిగాని, వేడినీళ్లలో ముంచిని గుడ్డతోదుడిచి కాని, మాల్సిగ్గుము నంతయు దొలగించిన పిమ్మట, వట్టిని వేయుటవలన మాన్పును గలంగ జేయవచ్చును. ఇట్టి వ్యాధివలన బాధనొందు స్త్రీలు బలహీనులుగ నుండును. గాన 1 వ బలవర్ధకాద్యము నిచ్చును, గలమునిచ్చు, ఆహారముల నియ్యవలయును. రోగి పొలిపోయి యుండినచోల, లాహము కలిగియున్న ౩ వ బలవర్ధకాద్యమును వాడవగును.

పైజెప్పబడిన విధమున వుండుకాక క్యాన్సర్ ఆఫ్ బడు మాయొక విధమగువుండు, కొండరి స్త్రీలయందు తిర సంవత్సరములు దాటిన పిమ్మట గలుగుచుండును. దీన్నికలెయి న్ని మందులు నియోగింపబడినను, శస్త్రము మిగుల యవసరమయి యున్నది. ఇది ఒకసారి కలిగినపిమ్మట మరలమరల కలుగుట కుద్యుక్తత శరీరమునందు బ్రశంబించి యుండును.



స్కర్వి.

స్కర్వి అనబడు వ్యాధి ఇండియా దేశమునందు విశేషముగ వ్యాప్తమనది యుండునలయును. ఈ వ్యాధిలో రక్తమునందును, యావచ్చరీరము యొక్క అల్లికల యందును, మాంసములుగను, ఇండియాదేశములో గొన్ని ప్రదేశముల యందు, సజీవముగ కాకప వార్ధ

ములు దొంగకపోవుటచే, నీవ్యాధి జనించుట కుద్యుక్తము గలుగజేయుచున్నది. కాకపదార్థములు ఆహారముగ నున్నవారియందు నీ వ్యాధి కలుగనేరదు. ఈవ్యాధి అంతర్గతముగ నుండుటయు గలదు. ఈ దేశములందు కొన్ని ప్రదేశములలో నీవ్యాధి అంతర్గత స్థితియందు మాత్రమే, మిక్కిలియుగ వ్యాపించి యున్నది. పండ్లచిగుళ్లయొక్క పచ్చినము, నిస్త్రాణ, ఉత్పాహము తగ్గియుండుట, ఆవయవములలో బండ్లపోట్లు, గుండె ఆదరు, హృస్పనిశ్వాసములు, పాలిపోయిన నాలుక, ముఖమున శరీరకాంతి, నీలవర్ణమును వహించిన పేదపులు, పండ్లచిగుళ్ళు వాచుటవలన జగురుగానుండి రక్తముకారుట, యీలక్షణములతో గూడి యుండును. ప్రతిమానీయ జబ్బుతగిలినను గాయముగానేర్పడి, కీళ్ళు వాపుదలనంది పట్టుపట్టి, మిగుల శుష్కించినంతయేర్పడి, అతిపీడనములు గాని ఆయ విరేచనములు గానిపుట్టి పండ్లచిగుళ్ళు పంబియు, ముక్కుపంబియు, పేగుల పంబియు రక్తము వెలువడుచు, నిస్త్రాణచే కొగి మరణము నందును.

చికిత్స.

వ్యాధి లక్షణములు కనుపడినపుడు గాని, వ్యాధి యేర్పడినపుడు గాని, నవీనమగు కాకపదార్థములు, ముఖ్యముగా బుగ్గారొండుపలు, ఉపయోగింపవలెను. భోజనమునందు విశేషముగ నుప్పును వాడవలయును. పాలను విరివిగ బుచ్చుకొన నగును. కొబ్బరికాయలలోని నీళ్ళు మిగుల ఉపయోగముగా నుండగలదు. ప్రతిదినమును రెండు లేక మూడు బౌన్సులు నిమ్మరసమును దాగినగును. ఇది అందు బాటుకాని విషయములలో, 10 గ్రెయినుల మేరాదలలో పొటాష్ సిట్రిస్ ను దినమున రెండుసార్లు బుచ్చుకొన నగును. వాణిజ ఫలములు, నిమ్మకాయలు, దాక్షిణ్యములు, క్యాబేజీ, నీరల్లి వీటినిరూడ ఉపయోగింపవలెను. పండ్ల చిగుళ్ళవాపుదలకు పటిక గంధూషము నుపయోగింపవలెను. అతి విరేచనములుండిన యెడల, పాలనుమాత్రమే ఆహారముగ నుపయోగించుచు, చీల్డ్ థాప్ (మగ్గేడు వరబుక్తు) ను బౌషధముగ నుపయోగింప వలయును. పరిశుభ్రత, గాలియు వెలుతురును జక్కగా జూచుచు గృహములు, చెమ్మలేకుండుట— ముఖ్యములగు ఆంశములై యున్నవి.

స్కార్లెట్ జ్వరము.

స్కార్లెట్ జ్వరమునది ఇండియాదేశమునందు వ్యాప్తతనంది యుండలేదు. ఈవ్యాధి సామాన్యముగ పొంగును బోలియుండును. ఈవ్యాధియందును ఒడలుపై పొక్కులు లేవు నుగాని, పొంగునడువలె పొక్కులు యెత్తుగానుండవు, ఈవ్యాధియందు గొంతు అస్వస్థత యేర్పడియుండును. పొంగునందు ఎదురోమ్ము అస్వస్థత కలుగుట కుద్యుక్త డుండును. స్కార్లెట్ జ్వరము అంటుగుణమును వహించి, యుండును. గొంతునందు ఆవిరపట్టరలయును 2 దాముల బోరిక్ ఆసిడ్ ను 1 బౌన్సు గ్లిసరీన్ తో గలిపి దీనిని గొంతునకు రాయవలయును. వేడినీళ్ళున్నవమును తేనినీళ్ళుటగాని, వేడినీళ్ళతో స్పృశించిన పిత్తుటగాని, 30 గ్రెయినుల కార్బానిక్ ఆసిడ్ ను 10 గ్రెయినుల లైమోన్ ను, 1 ద్రాము వానరీస్ ను, 1

జౌన్సు సింసిల్ ఆయింట్ మెంటును -- పిటివన్నిటిని గలిపి చేసిన ఆయింట్ మెంటును పొక్కులకు రాయవలయును. విశేషవల్గముగా నుండినయెడల 4 వ విశేషనకారిని వాడవలయును.

-- (†) --

ప్రసవ సంబంధముగు రక్తస్రావము.

గర్భిణికాలమందు గలుగు రక్తస్రావమునందు పరిపూర్ణముగు వికారిణి మిగుల అపసరమైయున్నది. యీస్థితియందు రోగి పరిపండితుండు గదిలో పరిశుభ్రమగు గారి వచ్చుచుండవలయును. రహస్యభాగములయందు చల్లని ప్రయోగముల జేయవలసి యుండును.

ప్రసవమైన పిమ్మట గలుగు రక్తస్రావము అధికముగ నుండినయెడల క్వాంటి మొదలగు మత్తుపదార్థముల నియ్యగూడదు. రోగిని లేవదీసినయెడల మూర్ఛ కలుగ వచ్చునుగాన, అట్టి పనిని జేయగూడదు. లిక్విడ్ యెస్ట్రాస్ట్రో ఆఫ్ యెస్ట్రాజెన్ మూడుగంటల కొకదానిము వొప్పున ఒక జౌన్సు జలములో గలిపి యియ్యవలయును.

-- (...) --

హైపో కాండ్రీయా

సదా రోగభీతితో నుండెడి సిరికి ఆంగ్లేయ భాషయందు హైపో కాండ్రీయా అందురు. స్త్రీలయందు గలుగు హిస్టీయా వ్యాధికి అనుగుణ్యముగానుండి పురుషులయందు డి వ్యాధి కలుగుచుండును. భోజనము బలమై, శరీరపరిశ్రమ లేకుండి, మనస్సునకు యేవిధమగు వ్యాధకమును లేకుండినపుడు, యీ వ్యాధి కలుగవచ్చును. అధిక మనో చరికమవలన గాని, క్రిములవలనకాని, యీ వ్యాధి గలిగినను కలుగ వచ్చును. ఈస్థితియందు కారీహస్యస్థతయు, అజీర్ణతయు, ప్రవీళించవచ్చును. సాధు విశేషన కారులును, శరీరసాధకమును, యీ ఆస్వస్థతను బోగొట్టును. మంటతోగూడిన తలకొప్పి ఉండవచ్చును. నిర్వాస్థపారముగనున్న యీ రోగికి వ్యాపారమును గలిగింప వలయును. స్థలమును మార్చుటవలెను, అలవాటును స్వస్థత కలుగగలదు. కొందరుకు స్వస్థాన బెంగవలన నీ వ్యాధి కలుగవచ్చును. అట్టి స్థితి యందు, యితర ప్రదేశములయందుండినయెడల స్వస్థులమునకు పోవుటవలన కుదిరిక నొవ గలను. ఈ వ్యాధియందు మందులు యెక్కువ ఉపయోగములు కావు.

క్షయ వ్యాధి.

క్షయవ్యాధి, ఇండియాదేశములో బంగాళా గాజధానియందు మిక్కుటముగ వ్యాపించియున్నది. క్వాసకోశములయందు ఒక విధమగు పురుగు ప్రవేశించుటవలన క్షీణితయొక్కది, యీ వ్యాధి కలుగుచున్నది. రోగియొక్క ఉమ్మియందును, ఊపిరి యందును, యీ పురుగు వ్యాపించియుండును. ఈ వ్యాధియందు ప్రారంభ లక్షణముగ, ఉదయపు పూటలందు

మిగుల శాధకగమగు పొడిదగ్గు ప్రవేశించును. పనిచేయుటయుండు, యీ రోగి త్వరలో ఆయాసమునంది మెట్లుపై నెక్కుటయుండు కష్టముగ గనుగొనును. అంతట తెమడ వేడలుట అరంభమయి, నువగుతో గూడిన యెర్రనిర క్షము యీతెమడతో గలిసియుండుట తటస్థించును. నాడి చురుకుబారి, సాయంకాల సమయములందు శరీర వేడిమి హెచ్చును. ఈస్థితి కొన్ని వారములు కొన్ని మాసములు, ఒకప్పుడు కొన్ని సంవత్సరములు గూడ, వ్యాపించును. వ్యాధి ముదురక మునుపే అతిశీతల ప్రదేశములు కానట్టియు, ఆరోగ్యముగ నుండు నట్టియు, నీలగిరి పర్వత ప్రాంతములందలి, తూనూరు, రోటగిరి, అనబడుస్థలములకు వోయి నివసించుటవలన మిగుల ఉపయోగముగ నుండగలదు. సముద్ర ప్రయాణములును ఉపయోగ కరములై యున్నవి.

ఈవ్యాధియొక్క రెండవగతియుండు, దగ్గు అధికమయి, తెమడ కూడ హెచ్చునొంది పనుపువర్ణమును వహించి, రక్తపుగీగలతో గూడి, నీటియందు చేలును. రాత్రులయందు జ్వరముకలిగి, మిక్కుటమగు రాత్రిచెయటలు కలుగును. ఆకలి క్రిమముగా నుండినను, రోగి కుప్పించి బలహీనత నందుచుండును. ఎదురొమ్మనందు చున్నకైన పోటుపుట్టి, రోగియొక్క కంఠస్థని శంకించి, అతి విరేచనములు పుట్టి, వ్యాధి గొంతులోనికి పేగులలోనికి వ్యాపించినట్లు నూచించును. తుదకు రోగిజామువలనగాని, శ్వాసకోశములందు పెద్ద రక్తవాళము విచ్చేద ముండుటచే అధిక పరిమాణములగు యెర్రని రక్తము నోటివెంబడి గొట్టుటచేత గాని, రోగి మరణమునందును. ఒకప్పుడు, మరణము గలుగకుండగనే, రక్తస్రావము మాత్రము ఆనేక సారులు కలిగినను కలుగవచ్చును. ఈవ్యాధియందలి చిత్రిము, రోగి మరణము నందు ముందుగూడ, తన అంత్యావస్థను తెలిసికొనలేక కుదిరిననుగుర్చి బహు ఆశతోనుండును. చివర కుకూడ రోగియొక్క మనశ్శక్తిలు యేదిగదామగు ఆస్వస్థతను అందనేరవు. ఈవ్యాధి గ్రస్తులు వివాహము చేసికొన గూడదు. అందువలన నితరులకును, యీవ్యాధిని వ్యాపింపజేయు వారలగుచున్నారు.

చి కి ర్ని.

ఈవ్యాధిగ్రస్తులు పరీకుభ్రమగుగారి వచ్చు గడలలో నిద్రించవలయును. రాత్రులందు దెక్కువసేపు మెల్లొక్కనగూడదు అమిత భోజనము జేయనూడదు. వ్యాధి స్థిరపడినపుడు కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ను సేవించవలసి యుండును. 'ఫెల్లోజ్' కాంపవుండు సిరిస్ ఆఫ్ హై పోఫాస్ ఫయిల్సు వలనను మిగుల ఉపయోగ ముండగలదు. అతి విరేచనములు అరంభమయి నయెడల కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ను నిలుపవలసి యుండును; ఈఆయిల్ ఆనేకరకములగు నుండును. డిజానాన్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ అన్నిటిలోను శ్రేష్ఠమైనదై యున్నది. క్రియ సోట్ అను ఔషధము యీ వ్యాధియందు యిటీవల యొక్కవ వాడుకను కలిగియున్నది. దీనిని పాలతో కేసి పుచ్చుకొనుట బాగుగానుండును. ప్లీరంభమునందు 1 మినిముచోళ్ళున దినమునకు మూడు పర్యాయములు పుచ్చుకొనవలయును. పిమ్మట దీని మోతాదును 2 మినిములకు హెచ్చించి, క్రిమము 10 లేక 15 మినిములవరకు హెచ్చింప వలయును. ఈ మందు భోజనానంతరము పుచ్చుకొనవలయును. దీనివలన ఆకలి అభివృద్ధి నందగలదు.

క్రియసోట్లో ఒక భాగమైనట్టి గ్వయిమల్ యును, గ్వయిమల్ కార్బనేటును గూడ, ఈవ్యాధి యందింకను యిటీవల సుపయోగింప బడుచున్నది. మొదటిది క్రియసోట్ మోతాదులలోనే యియ్యవలెను; రెండవది 5 మొదలు 15 గ్రముల వరకు మోతాదులలో నియ్యవలయును. ఇవి క్రియసోట్ కంటే పెక్కువ విలువ గలవియును, నోటికి రుచి కరముగను ఉండును; గుణమునందు ధృవము ఉండినట్లు కనుపడును.

వెలు ద్వికూడ క్రియసోట్ వలెనే పనిచేయునట్లు తలచుచున్నది; దీని వాసనకు కొందరు భరింపలేకుండురు. ఇక తీయాలి మంచి ఫలితముల నిచ్చినట్లు కొందరు వైద్యకాశ్రుజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు కాని, దీనియొక్క అసహ్యమును రుచియు, వాసనయు, దీనివాడు కను దగ్గించి యున్నది. ఇది పేగులలోనికి బోవు వరకును గరగవలెనట్లు గట్టికర్షణతో మూయబడిన మాత్రముగా వాడవలెను. దినమునకు 20 గ్రములను మొదలు 60 గ్రములవరకు నియ్యవచ్చును.

రొమ్ముపడిన మండిన యెడల క్వాసకోశముల పైస, లినిమెంట్ క్వాసఫర్ ఆమ్మ నియేటను గాని, లినిమెంట్ లైబ్విత్ ఆసిటికెను గాని, రాయవలెను.

ఆనారము, తేలికయినదియు, బాగుగ పనిచేయునదియు, బలము నిచ్చునదియు, యియుండ వలయును. ఇతర ఆనారము కొద్దియై యున్నపుడు, పాలనుగూడ ద్రాగవచ్చును. పై చెప్పబడిన కాంక్షపుండు నిశ్చల ఆఫ్ సోపొఫోస్ ఫస్టును సేవించుట వలనయే ఆశ్చర్యత సర్దుకొనగలదు. పరిశుభ్రముగా గాలిలో దిరుగుటవలన, ఆకలి బహు ఆశ్చర్యముగ వృద్ధిపండును. ఊరగాయలను చిరితిండి మొదలగు పదార్థములను, ద్యంపవలయును. కాగ్రిత్రితో నూడిన భోజన మివ్యాధియందు మిగుల ముఖ్యమైయున్నది. భృంశు విడువవలసివచ్చిన సువార్తమును విశ్రాంతి అవసరమై యున్నది. సాయంకాలము అందు ఒక డిగ్రీతో త్రపే శరీర వేడిని హెచ్చుచుండినపుడు, మిగుల కాగ్రిత్రితో శరీరసాధకమును బుచ్చుకొనవలయును. ఈవ్యాధియందు నడచుట మంచిసాధకముగ నిర్ణయింపబడినది.

దుస్తుల విషయములో, ఫ్లూనల్ దుస్తులను ధరించుట మిగుల మంచిది. ఇవి మిక్కిలి బరువులేకుండ నుండవలయును.

రోగి నివసించియుండు గదిలో శరీరభ్రమనుగాలి వచ్చుచుండుట యంతయు ముఖ్యమయి యున్నది.

దగ్ధ విషయములో, నిద్రను గలుగజేయు మందులనుగాని, కఫహరులనుగాని ఉపయోగించుటకు. మెంతో, క్రియసోట్, స్పిరిట్సు ఆఫ్ క్లొరాఫారం -- యీ ముద్రును 100 కి 20 వరకున ఆల్కహోలులో కలుపబడిన సోల్యూషనును వాసన జూచుటవలన సుపయోగముగ నుండగలదు. ఒక స్టేటు ఉష్ణజలములో ఒక డ్రాము క్రియసోట్ పంజాయిను కొనుగదిపె దానిని వాసనజూచుట వలనను ఉపయోగింప నుండగలదు. దగ్ధవిషయము, గొంతుకయందు అడువడునట్టిగాని, పోటుపాడుచునట్టి గాని అనుభవ ముండినయెడల, గొంతుకపై వేడిపండికట్టును గట్టుటవలన ఉపయోగింప కలగగలదు.

దగ్గయుక్క తొలతో వాంతి కలుగును, యిది భోజనము పెంట నే కలుగు చుండిన యెడల, లైకర్ పొటాష్ 5 మినిములు, ఆలం (పటిక) 5 గ్రాయినులు, కలిపి, భోజనము నకు కొద్దికాలమునకు పూర్వమే యిచ్చుచుండినయెడల, దగ్గయును వాంతియును గట్టిపోవును కొన్ని విషయములలో, టింక్చర్ ఓసియంగాని, క్లోరోడిస్కగాని, టింక్చర్ నక్స్ వామికాగాని, కొద్దిమక్కులను భోజనమునుండర నిచ్చుట వలన నుపయోగముగ నుండగలదు.

నాలుక పొరగిమ్మి, మలబంధ ముండినయెడల, క్యాలామేల్ (రసభ స్రవమును) యి య్యనగును. ఇతర విషయములలో కార్మినేటివ్ మిక్చర్ ను ఉపయోగింప నగును.

రాత్రిచేమటలకు జీకెత్సగా, రోగియొక్క దుస్తులను, రోగి వరుండియుండు గదిలోనికి గాలివచ్చుటను, సరిచేయ వలయును. ఉదయమున గలుగు చెమటను గోరువెచ్చని నీళ్ళతో దుడువవలయును. రాత్రిచేమటలను నిలుపుచేయుటకు 5 గ్రాయినుల జింక్ ఆక్ సైడ్ ను ఆర గ్రాయిను యక్ట్యూట్ల ఆఫ్ థెలడోనాతో గలిపి మూత్రోగాజేసి యియ్యనగును. లైకర్ స్పైక్ సీస్ హైడ్రోక్లోర్ ను 5 మినిముల మోతాదులలో నిచ్చుటవలనగాని, క్యాలంఫాక్ ట్రినైడ్ ను 15 గ్రాయినుల మోతాదులలో నిచ్చుట వలనగాని, గుణము నియ్యవచ్చును.

సప్తదిన జ్వరము (Seven-day Fever)

ఇండియా దేశమునందును బర్మా దేశమునందును సమద్రోతీర పట్టణములందు ఆచ్చటచ్చ డ ఈజ్వరము కలుగుచున్నది. కలకత్తా, మద్రాసు, బొంబాయి, రంగూన్ పట్టణములందు ఈ జ్వరము సామాన్యముగ గలుగుచున్నది. ఈవ్యాధియందు శరీరవేడిని ఆకస్మాత్తుగ అభి వృద్ధిపంది. హెచ్చుదలతో బ్రాంభమగును, పిమ్మట తగ్గుదలనందుచు, యీశిథిలమారగ నేనుదినములవరకు వ్యాపించి, వేడిమికి దగిలట్లుగ నాడితీవ్రత నందక, ఉద్యుతమగు కలనా ప్పి పెన్నుపోటులతో గూడియుండును. రక్తమునందు స్వేతకణములు తగ్గుదల నందును. ఈ వ్యాధి ఇండియనులయందు కంటే నైరోసియనులయందు బహువ సామాన్యమై యున్నది. రేవు పట్టణములయందు పనిచేయువారలలో నీవ్యాధి ప్రారంభమై జనవ్యాప్తి నందుచున్నది. ఇతర స్థలములనుండి వచ్చువారలం యీవ్యాధి కలకువ శీఘ్రముగ లోనగుదురు.

లక్షణములు.

ఈవ్యాధి, విశేష విషయములలో వణకుదలతో గూడి, ఆకస్మాత్తుగ బార్యంభ మ గను. ముఖము యెర్రోబారి, కలయందు నుదురుపైపుల వెప్పియును, వెన్ను పోటునుండి, ముఖవైఖరియందు నిర్లక్ష్యభావమును మాంద్యతయును గనిపించును. నాలుక పైన పొరగిమ్మ యుండి, కొనలు చూత్రము యెర్రోగనుండును. వాంతి పచ్చునట్లుండుట గాని, వాంతి కలుగుట గాని, కలుగజేరదు. ఒడలుపైన శ్లేషిభమగు పొక్కులును గనిపించవు. కారిజముగాని, క్షీర గాని ఆభివృద్ధినందవు. ఉదర భాగము విస్తరింపునంది, ఒకానొకప్పుడు స్పర్శకు నుడువవుగ నుండును.

రెండవ దినమున శరీరవేడిమి సామాన్య శీఘ్రగతిని 102 లేక 103 డిగ్రీలకు అభివృద్ధిపంది, పిమ్మట 100 డిగ్రీలకు తగ్గి, కొద్దిదినములు 100 డిగ్రీల సమీపస్థాంతముల నుంచు లించుచు అయిదవ లేక ఆరవదినమున 103 డిగ్రీలకు పాచ్చుల కనుగుణ్యముగ నాడియొక్క తీవ్రత కనుపించదు. నాడి నిమిషమునకు 100 చుట్టుల కంటే నెక్కుడును సామాన్యముగ హెచ్చదు. శరీరవేడిమి 100 మొదలు 103 డిగ్రీలవరకు నున్నతగ్గితో నాడియొక్క సంఖ్య సామాన్యముగ 60 మొదలు 70 వరకు నుండును. శరీరవేడిమి సామాన్యస్థితికి దిగినపిమ్మట రోగి శీఘ్రముగనే కుదిరిక నడకలడు. ఈవ్యాధి తరుగఁజేయుట అరుదుయొన్నది తక్కిన కొన్ని అంటు వ్యాధులవలెగాక దీనియొక్క వ్యాప్తత నెత్తుదీర్చి గూడియుండును ఈవ్యాధియందు జీర్ణకోశాస్వస్థతలు కలుగవు. క్లినిక్ పుచ్చుకొని నందువలన వ్యాధియొక్క నడకయు దేవిధముగ మారును కలుగనేరదు.

చి కి త్న.

జ్వరముయొక్క ప్రారంభ గతియందు రోగి పడుండుట వారంభించి, శరీరవేడిమి సామాన్యస్థితికి దిగునంతవరకును పరుండియే యుండి, పాతను ఆవరముగ బుచ్చుకొన వలయును. జ్వరగతియందంతటను సామాన్యమున జ్వరమును తగ్గించుమందును దేనినైనను యియ్యవగును. శరీరవేడిమి 104 డిగ్రీలకు మించినయెడల నల్లని సిల్వర్ గాని గోరువెచ్చని నీళ్లలోగాని స్పృశని మంచి శరీరమును దుడువవలయును. శరీరవేడిమి 105 డిగ్రీలకు మించియొప్పుడు చల్లని నీళ్లలో స్నానమును జేయుట వలనగాని, తడిగుడ్డలను శరీరమునకు జాటుట వలనగాని, శరీరవేడిమిని తగ్గించవలయును.

కాలా అజార్ Kala Azar

ఈవ్యాధి ఇండియా దేశమునందును, సింహళమునందును, బర్మాయందును యశేక భాగములలో వ్యాప్తమంది యున్నది. కలకత్తాయందును, చెన్నపట్టణము నందును, యిసట్రాములకు సమీపమునందును, యీవావ్యాధిని గనుగొనవగును. శరీరమునందలి ప్లేహ, కారిజము, మేదస్సు సంబంధముగ గ్రంధులు, రక్తనాళములు, రక్తము---పీటిలో శ్లేష్మసమయీ సంబంధముగ జీవాణువులచే నంటుదల నందుటచే నీవ్యాధి ప్రవేశించుచున్నది. ప్లేహాయు కారిజమును అభివృద్ధిపందుట, కర్మమువదప్పి ఆపవడప్పుడు జ్వరమువచ్చుచుండుట, ఇ లిపోవుట, ముఖమునందలి వర్ణస్సు తగ్గి నల్లబడుట, రాత్రిచెడుటలు, ఆమ విశేషములు లేక అతి విశేషములు కలుగుట--- యీ లక్షణములతో గూడియుండును. పూర్వంభమునందు యీవ్యాధి చిలిజ్వర లక్షణములతో వహించి యుండునుగాని రక్తమునందు మాత్రముచిలిజ్వర సంబంధముగ జీవాణువు లుండనేరవు.

ఈవ్యాధిని శరీరమునందు బ్రవేశపెట్టుటకు మాగ్గము, మంచములను పదుపులను ఆశ్రయించియుండు నల్లలవలన గలుగుచున్నదని కొందరి వైద్యశాస్త్రజ్ఞుల అభిప్రాయమైయున్నది. ఈ విధముగ దోమలవలనగూడ గలుగుచున్నదని యిటీవల కొందరు అభిప్రాయ పడుచున్నారు.

ఈ వ్యాధి ఒకరినుండి మరియొకరికి వ్యాప్తత నందుటయందు గొంత కాలము పట్టును. ఒక్కొక్కప్పుడు తులంబమునం దంతటను వ్యాపించును. బీదవారలయందును పరిశుభ్రతను గమనించని వారియందును విశేష వ్యాప్తత నందును. ఋతువు ననుసరించి యుండును. ఈ వ్యాధి ఆనుసరించియున్న గృహము నుండి దగ్గర గృహములకు వ్యాధి వ్యాప్తతనందును.

ఈ సంబంధమగు పురుగు శరీరమునం దావహించినది మొదలు వ్యాధి పక్షమునందు వరకు మూడు వారములు మొదలు కొన్ని మాసముల వరకు పట్టును.

ఈ వ్యాధియందు మరణములు 100 కి 98 చొప్పున నున్నవి. అన్ని వయస్సుల యందును అన్ని జాతులయందును స్త్రీపురుషులకు వివక్షత లేకుండ గలుగుచుండును.

లక్షణములు.

ముఖ్యలక్షణములు, జ్వరమును, స్త్రీహయొక్కయును కారిజము యొక్కయును అభివృద్ధియును, అయియున్నవి. కృమకృమముగ స్త్రీహ ఉదరభాగమునందు సగము వరకుగాని అంతకెక్కుడుగ గాని ఆవరించుచుండును. జ్వరము సామాన్యముగ కృమతదప్పి వచ్చుచుండును. కాని యొక్కప్పుడు అనుచితమును రావచ్చును; లేక కొంతకాలముగ వచ్చినను రావచ్చును. మరియొక్కప్పుడు కొన్ని వారములవరకును గూడ జ్వరము రాకుండగనే యుండువచ్చును. ఇంకొక్కప్పుడు చలితో ప్రారంభమయి చలిజ్వరమును బోలి వచ్చి పిమ్మట చెడుటయను గలగవచ్చును. ఈ జ్వరమునందు క్విప్పి ఉపయోగింప జాలదు. వ్యాధియందంతటను కృమతతప్పిన జ్వరము వచ్చుచునే యుండును. శరీరవేడిమి 101 మొదలు 103 లేక 104 డిగ్రీలవరకు నుండును. వ్యాధి అతిశయిత నందినపుడు అతివిరేచనములుగాని అను విరేచనములుగాని కలుగ వచ్చును. విరేచనమునందు రక్తమును చీమును ఉండును.

రక్తము చెడిపోయి రోగి పాలిపోవుట అధికమైన కొలదియు ముక్కువెంటి రక్తముతారుట ప్రారంభమగును; పాదములకు నంజ కనబడును. శ్వాసయందు అయాసము కలుగును. ముఖము నల్లపడును; శరీరమంతయు కుష్మించును. రోగి మంచము నంటియుండి కృమముగా క్షీణించి మరణము నందును. వ్యాధి కొన్ని మాసములవరకు గాని, ఒకప్పుడు ఒకసంవత్సరము వరకు మించి గాని, వ్యాపించి యుండును. వ్యాధిని స్పష్టముగ గుర్తించుటకు మార్గము రక్తమును సూక్ష్మదర్శిని యంత్రము క్రింద బరిక్షించుట వలనయే యున్నది.

ఈ వ్యాధికిని, చలిజ్వరమునకును భేదమండియున్నను యొక్కక్కప్పుడు యీరెండు యొకేసారిగ దటస్కింప వచ్చును.

చిహ్ను స్థితులు.

వ్యాధియొక్క గతియందు అనేక చిహ్ను స్థితులు సంభవింప వచ్చును. రక్తము గ్రక్కుట, ప్రేగులనుండి రక్తస్రావము, ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట, అతివిరేచనములు, అను విరేచనములు, రొమ్మువడిసెము, న్యూమోనియా—యివి యన్నియు చిహ్ను స్థితులుగా నెన్నవగును.

రక్తముయొక్క స్వభావమంతయు మారిపోవును. రక్తమునందలి స్వేదకరణములు తగ్గిపోవును. రక్తమునందలి యెర్రనికణములు గూడ తగ్గదల నందును.

చికిత్స.

ఆరంభమునందు బలమునిచ్చు ద్రావహార పదార్థము లివ్వవలయును. పిమ్మట మాములు ఆహారముతోగూడ విశేషముగ పాలు నియ్యవలయును. స్త్రీహయము కారణమున ఆభివృద్ధి నందినపుడు కొంత కాలమువరకు అవణ సంబంధమును విరేచన కాయల నియ్యవలయును. వ్యాధియందంతటను బలవర్ధకౌషధముల నియ్యవలయును. కాని ఆయా సందర్భముల యందలి లక్షణముల ననుసరించి చికిత్స జేయవలసి యుండును.

బంతవరసను దినము ఒక్కంటికి 60 ముదలు 90 గ్రయినులువరకు క్లిస్టను యిచ్చటవలన మంచి ఫలితముల నందినట్లు తెలియుచున్నది. తగ్గినచో బాగుగ తగ్గదల నందు వరకును యీప్రకార మియ్యవలయును. పిమ్మట ప్రతి ఊడయమునను 20 గ్రయినుల నియ్యవలయును. ఈ చికిత్సాపద్ధతివలన యీ వ్యాధియందలి మరణములు 100 : 98 నుండి 70 వరకును తగ్గినట్లు వినుచున్నాము. ఆర్సెనిక్ (పామణము) నిచ్చటవలన గూడ వ్యాధి యొక్క కీర్ణతని తగ్గింపవచ్చునని తెలియుచున్నది.

నల్లల వలనయును దోమల వలనయును యీవ్యాధి వ్యాప్తత నందుచున్నటుల చెలియుచున్నది. గనుక నల్లలను జంపుటకు వీలుగనుండునట్లు ముక్కలగ నూడదీయుట కనుపగు మంచముల నుపయోగింప వలయును. దోమలనుండి కాపాడుకొనుటకు దోమ తెరల నుపయోగింప వలయును. ఈవ్యాధి వ్యాప్తనందియున్న ప్రదేశములయం దీవ్యాధినుండి కాపాడుకొనుటకు యీపద్ధతుల నవలంబించుటవలన బాలవరకు ప్రయోజన కారిగ నుండగలదు.

హర్పిస్ Herpes. (చెల్లి)

చెల్లిలో వివిధము లున్నవి. చర్మముపైన పొక్కులవలె లేచును, జ్వరవ్యాధుల యందుగాని, సామాన్యముగ జలబువ్వాధి ఆనంతరము గాని, పెదవులపైన చిన్న పొక్కులు లేచును. ఈపొక్కులు ఒకటి రెండు దినములనుండి పక్కలుగట్టి ఊడిపోవును. పక్కలు ఊడినపిమ్మట కొంచెము దురద కలుగవచ్చును.

ఇదియే విధమైన పక్కలు పది లేక పందొండు నుడుటిపైన నొకప్పుడు కలుగ వచ్చును. ఇవి యొక్కవ పొటుతో గూడియుండును. ఒకబొన్న రెడ్డిఫయిడ్ స్పిరిట్ను, 5 గ్రయినుల హారతి కర్పూరమును, 5 గ్రయినులు కాపిలపొడి (కమల)ని, గలిపి పైనరాసినయెడల పక్కలుగట్టి త్వరలో మానుదల నందునని బాల్ఫూరుగారు చెప్పుచున్నారు.

మాడటి విధమైనది, ఉదరమునకు క్రింది భాగమున ఒకవైపున మాత్రమే కలుగు చుండును. ప్రారంభలక్షణము పొటుతో గూడియుండును. ఉద్రోతముగ విషయములతో మాత్రమే జ్వరలక్షణముతో గూడియుండును. రెండు లేక మూడు దినముల పిమ్మట గుబురులుగా పొక్కులు యేర్పడును. ఈ పొక్కులు మొదటగా మోయుచుండి క్రమముగా తెల్ల

బడి, పిమ్మట చీముపట్టి, అనంతరము పక్కులుగట్టి ఊడిపోవును. సామాన్యముగా యీ పాక్కులు రెండువైపులను కలుగవు కాని, ఒకవైపునకు మించి యీ పాక్కులు కలిగిన విషయములను గ్రంథస్థములై యున్నవి. ఈ పాక్కులు శీఘ్రముగ పగులనేరవు. వాటంతట అవియే యెండి పదిదినములలో పక్కులు ఊడిపోవును. ఒకప్పుడు పగులుట తటస్థించినయెడల పుంఘపడి మానుగల సందిన పిమ్మట మచ్చలు పడును. ఈవ్యాధివలన బాధ ఉద్యోతముగా నుండును. నరముల సంబంధముగ పోటు పొడుచుచుండును ఈపోటువలన బాధను సహించజాలక ఒక రోగి ఆత్మహత్యను గావించి యుండెనని గవర్న అనునాయన చెప్పుచున్నాడు.

చికిత్స.

మొదటి రెండు విధములకును జీతృ అసందర్భముననే శిష్టబడి యుండెను. మూడవ విషయములో పక్కులు పగులకొండునట్లు బాగ్రత్తను బుచ్చుకొన వలయును. ఆరంభమునం దైనయెడల ఫ్లెక్సిబిల్ కలాడియం (Flexible Collodium) గూఢియ్యగలదు. చికిత్స సీర్సు (1 వ గంఢావయ) సైర రాయవచ్చును. చీమ పట్టినయెడల నేలిసైలిక్ ఆసిడ్ ను అద్దవలయును. బాధ ఉద్యోతముగా నుండిన యెడల యెల్కెటిక్స్ బ్యాటరీ దినమునకు రెండుసార్లు ప్రయోగించుట వలన గుణముగా నుండగలదు. విశేషము క్రమముగా నగు నేలుల జూడవలయును. తేలికగా జీర్ణముగు ఆహారపదార్థములను యియ్యవలయును.

తెల్లని బొబ్బలు (Contagious Impetigo)

చర్మముపైన గుండ్రనైనట్టియు, ఉబ్బుదలనందు నట్టియు, చీముతోగూడి యుండు నట్టియు, లోతుగ లేకుండ పైపైన మాత్రమే అస్పృశతతో గూడినట్టియు, బొబ్బలు లేచును ఇది శీఘ్రముగనే అరుదలనంది పగులువర్ణమును వహించిన పల్లవి పక్కులుగట్టును. ఇది సామాన్యముగ ముఖముపైనయును, చేతుల పైనయును లేచుచు, పేదవారల బిడ్డలకు యీవ్యాధి ముఖ్యముగ గలుగుచుండును. ఈబొబ్బలు పావుల నైశానగాని అంతకు పెద్దవిగయే గాని యుండును. వీటిలో గొన్ని కలిసిపోవుటచే నొకే అట్టగా గట్టవచ్చును. కొన్ని దినముల వరకును కొత్త బొబ్బలు కనపడుచు చిట్టచివరకు వాటంతట అవియే పక్కులుగట్టి ఊడిపోవును. పక్కులు ఊడిపోయిన పిమ్మట చర్మము కొంచెము యెంగిగానుండి యీ యెరుపు దానంతట అదియే అంతరించి పోవును. ఈవ్యాధియందు సామాన్యముగ జ్వరము కలుగదు దురద యొకప్పుడు ఉండినను, వుండును. లేదా లేక పోవచ్చును.

ఈవ్యాధి మిగుల అంటుదలతో గూడియుండును. ఒక పాక్కులోని చీమ మరియొక పోటున దగులుటవలన వ్యాధి వ్యాప్తతనందును. ఒకప్పుడు ఒకయింటిలోని బిడ్డలకు ఒకరి నుండి మరియొకరికి వ్యాప్తత నందగలదు.

పరిశుభ్రతను గవనించు విషయములలో కొద్దివారములలో నీవ్యాధి దానంతట అది

యే సమసిపోవును. దురదతో గూడిన విషయములలో మాత్రము మానుటకు యత్నపదినములు పట్టును.

చి కి త్న.

ఆస్వస్థత భాగములనున్నిటిని సబ్బు నుపయోగించుచు వేడినీళ్ళతో గడుగవలయును. 15 గ్రేయినుల ఆమ్మోనియే టెడ్ మెర్క్యురీని 1 బౌన్సు లానోలిన్ లో గాని వాస్లీన్ లో గాని కలిపి యీ ఆయింట్ మెంటును ఆస్వస్థత భాగములపైన రాయవలయును. పరిశుభ్రతను విశేషముగ గమనింప వలయును.

నల్లని మచ్చలు (Pitriasis Nigra)

ఇండియా దేశమునందు సామాన్యముగ నన్ని భాగములందును ఇండియనులలో పెద్దవారలయందు యీవ్యాధి వ్యాప్తతనందును, పెద్ద పునయును, వీపుపైనయును, చంకలలోను, గుండ్రవైనట్టియు నల్లవైనట్టియు మచ్చలు చేర్చుదును. ఈ పులకులయందు దురద ఉండదు గాని, చూచుట కస్వామ్యముగ నుండుచు; చికిత్స చేయుక లోయినయెడల కొన్ని మాసముల పరకును ఒక పూడు కొన్ని సంవత్సరముల పరకును, వ్యాపించి యుండును. ఈ మచ్చలు ముఖముపైన బహు ఆరదుగా గలుగును. ఈ మచ్చలు ఒక సుబంధముగ నుట్టుకొక్కటాతి క్రిమికాలములవలన గలుగుచుండును. ఈ పులకుల నంటి కన్నని దారములవలె నుండును; ఈ దారములవలె నుండు కొనలయందు నల్లని వర్ణముండును.

ఈకింది ఔషధయోగమును దినమానకు రెండు సార్లు రాయునగును.

ఇకోలియాల్	10 గ్రా॥
గంధకము	10 గ్రా॥
లానోలిన్ లేక వాస్లీన్	అర బౌన్సు.

ఒళ్లు పట్టుట - Massage. (మెసాజ్)

భాగత దేశమునందు ఒళ్లు పట్టుట యొక విధముగ చికిత్సాపద్ధతిగ చిర కాలమునుండి యుంచబడు చున్నది. ఈ వైద్య సుబంధముగ కనరత్తులు అనాదిగ హిందువులలోను చీనా దేశీయులలోను మాత్రమే గాక గ్రీకులలోను రోమనులలోను గూడ వాడుకయందుండియున్నవి. 1723 సం॥ సాంకేయమున యీ వైద్యపద్ధతి ఇంగ్లాడునందును పరిపరిచి యెను గాని 19 వ శతాబ్ద ప్రారంభమునగాని డెస్కార్క్ దేశములో కీళ్ళనొప్పి, నాడీవ్యాధి, తుటినొప్పి, మొదలగు వ్యాధులకు యీ చికిత్సాపద్ధతి అనుచరియందుండుండలేదు. ఈ “మెసాజ్” పద్ధతిలో శరీర సాధకమును రోగి తనంతట తాను చేయుటకు బహుముగా మరియొకరు తన శరీరముపై బనిచేయుట కలగ్గించుచున్నది. బెరుకులు, కీళ్ళవాపులు, కీళ్ళు విగునుకొని పో

పుట, సరముల సంబంధమగునట్టియు అజీర్ణ సంబంధమగునట్టియు ఆస్వస్థతల యందును, మలబద్ధము నందును, వెన్నెముక వంకరతిరిగిన సందర్భములందును, యీ చికిత్సా పద్ధతులు పయోగించు చున్నవి.

ఈ ఒక్క పట్టుటయొక్క యుద్దేశము — (1) శరీర మంతిటియొక్క గాని లేక శరీరముయొక్క యే ప్రత్యేక భాగముయొక్కగాని పోషణమును బలపరచుటయును, (2) వ్యాధివలన శరీరముయొక్క యే ప్రత్యేకస్థానమునందైనను కలిగిన వాపులను, ఫలితములను, తొలగించెడి కార్యక్రమములం దధికోద్యోగతను గలిగించుటయూ—అయియున్నది. ఇదిగాక యిందుమూలమున స్నాయువులయొక్క ముడుచుకొను శక్తి అదివరకు నశించియుండినయెడల మరల స్వస్థతలచ బడును.

శరీరముపైన రుద్దినగాలి మెల్లగా చేతితో దుక్కుగని రక్తప్రచారమునందు పెంటనే మార్చు గనిపించుచున్నది. చేతివేళ్ళు చక్కమువైన కొంతబలముతో నొత్తిపెట్టి మెల్లగా నడిపినచో రక్తసాళములయం దుండెడి రక్తము ముందువపోయి మరల నాయొత్తిడిని తీసివేయగనే రక్తము తొందరగ వెనుకకుతిరిగి ప్రవహించుచున్నది. ఈ చురుకుదనమే రక్తప్రచారమునకు సహాయ మొనర్చుచున్నది. ఈ ఒడలు పట్టుటలో నెప్పుడును చేతుల నుండి గాని కాళ్ళనుండిగాని రక్తప్రవాహము గుండెవైపునకు బోవుటకు పహాయమును నొనర్చువలయును గాని యిందుల కడుగునైపుగా నీ చేతులతో బనిచేయరాదు. ఇటుల క్రిమ మార్గమున నొత్తుటమూలమున వైవిధ్యముగ రక్తప్రచార మధికమగుచున్నది. ఇందు మూలమున మేదోనాళములయందలి వ్యర్థపదార్థములు గూడ వెలువరింప బడుచున్నవి. చర్మమును బాటన వెలుగుతున్న చూపుడు ప్రేలునకును మధ్య గట్టిగా బట్టుకొని మెలివేసినయెడల నీ రక్తప్రచార మధికమగుచున్నది. చేతితోగాని వేళ్ళతోగాని చరచినయెడల రక్తప్రచారము యొక్క చురుకుదన మధికమై ఆస్థాన మెర్రబడును.

గుర్తింపవలసిన సంతగా లాభముండనేరదు. ఈయెడలు పట్టు పనిలో నేర్పరియగు వాడు ఎచ్చట వాపుదల లున్నదియు తాకుటవలని బెరిసికొనగలడు. ఇందు — దువ్వుట, తోముట, పిసుకుచు నొక్కుట, గిల్లుట, ఒత్తుట, పిండుట, చిందరవందరగా గొట్టుట — యిన్ని విధములగు పద్ధతులు గలవు. ఈపద్ధతులన్నియు శరీరమధ్య మనకు సంబంధించియే యున్నవి. అంతరా వయవములయొక్క అల్లికలపై బనిచేయ వలయునన్న యొక్కవ బలము నుపయోగించ వలసియుండును; పాదముల యొద్దనుండి ప్రారంభించి క్రిమముగా కాళ్ళవైపునకు రాయవలయును. పిక్కలయొద్ద రెండుచేతుల నుపయోగించవలసి యుండును.

శరీరమునందలి ప్రతిభాగమునకును ఈపద్ధతి నుపయోగింప వచ్చును, పొత్తికడుపు పట్టుటలో మొదట చర్మమును గిల్లుచు, పిమ్మట స్నాయు పాకారమును చేతులతో గుండ్రముగ దిద్దిచ్చుచు, పొత్తికడు వంతయు గదలానట్లుగ చేతులను త్వరితగతి పేగులవైపులకు దీసికొని పోవలయును. ఈ కార్యక్రమమునం దెప్పుడును రోగి కే విధమగు బాధయును కలుగ గూడదు. జీర్ణాశయును, కార్షము, పేగులు పీచయొక్క ఆస్వస్థతలయందును, అతిమాత్రమునందును, స్నాయువులయొక్క పక్షవాత స్థితియందును, యీ చికిత్సాపద్ధతి యుపయోగించునట్లు కనబడుచున్నది.

కాలుయొక్కగాని చెయ్యియొక్కగాని యెముక తొలగినప్పుడుగాని, విరిగినప్పుడుగాని, కొయ్యబద్దలతో గట్టి కొంతకాల ముంచి మరల బయటికి తీసినప్పుడు యీ "మెసాజ్" పద్ధతి నుపయోగింప వలసియుండును. ఇందుమా లమున నా అవయవము త్వరలో స్వాభీనమునకు రాగలదు. ఈచికిత్స పద్ధతి వైద్యాధులయందు చిన్నవయస్సువారి కెక్కువ యుపకరించును. ఈ చికిత్స మార్గమున రక్తప్రచారమేగాక నరములయొక్క స్వస్థతకూడ సరిచేయబడును. ఆంధ్రదేశమునందలి ఓడ్రుంగులివారిలో చికిత్స పద్ధతిని గొంతవరకు దరిసి నట్లు గనబడుచున్నది. మళయాళ దేశమునందు యీ చికిత్స పద్ధతి యెక్కువ వాడుకలో నున్నది. ఈపని చేయునప్పుడు చేతులు పట్టునకు వీలుగా నుండును.



ఆంగ్లేయ వైద్య చింతామణి

ఔషధ మిశ్రిత పద్ధతులు-ఔషధ యోగములు.

కంపౌండింగ్ Compounding.

ఈ సందర్భమున నౌషధములను మిశ్రితమును చేయు విషయమై కొంచెముగా చెప్పి దగియున్నది. దీనికి ఆంగ్లేయ భాషయందు కంపౌండింగు అందురు. ఈపనిని బహుజాగ్రత్త తోడను జేయుటయేగాక, తునికయందు గాని, కొలతయందుగాని, కొంచెమైనను హెచ్చు తగ్గులు లేకుండగ నౌషధముల నేకరించుటయు ముఖ్యమై యున్నది. ఈపనిని జేయునప్పుడు పర్యవ్యాసము లేకుండగ బహు శ్రద్ధాభక్తులను వహించియుండవలయును. ఏలనన, నొకవస్తువు నుపయోగించుటకు బహులుగ నింకొక వస్తువు నుపయోగించిన యెడల పాక్షికాయము దటస్థించుటయు గలుగును.

తూ ని క.

ఔషధములను దూచుటయందు బహు ఖచితముగా నుండవలయును. ఒక ఔషధము నకంటె పెక్కువగ దూచుట యెన్నడును సామాన్యముగ దటస్థించదు. కొన్ని విషయముల లో దాగియులవరకు మాత్రము దూచుటయును, హఠితొన్ని విషయములలో గ్రయినులవరకు మాత్రమే దూచుటయును, దటస్థించుచున్నది. ఈతూనికకొఱకై మధ్య స్తంభమును గలిగి యుండి యొకవైపున గాజుపల్లెము గలిగియుండిన త్రాగును సుపాదించియుండుటనుంచి.

ఈ గాజుపల్లెయు యొక్క ముఖ్యతయేమనగా పులుసుపదార్థముల దుఃఖిను మా లిన్య మేర్పడజాలదు. మందులను వేయుటకు గాజుపల్లెరమును, తునికరాళ్ళను వేయుటకు రెండవవైన యిత్తడి పల్లెమును ఉపయోగింప నగును. పత్తి తడవయును తునిక ఆయిన పిచ్చుట రెండవపల్లెములను కుప్పముగా గుడ్డతో తుడిచివేయుట మిగుల మంచిది. ఇందు వలన త్రాగునందు హెచ్చుతగ్గు తునికలు రాకుండగ జాగ్రత్తగ జేయుటకు బహుగనుండును.

రెండు గ్రయినులకు లోపుగ దూచనగు ఆఫిని (Morphine) విషముష్టి (Strychnine) మొదలగు బలియమగు ఔషధముల దూచుటకు బహు సున్నితమైన వేరుత్రాగు నుపయోగించుచు, దాగియులను దూచుట కుపయోగించు త్రాగునే యీయందుల కుపయో గించకుండ నుండవలయును.

కొ ల త.

ఔషధములను గొలుచుట తేలికయే గాని, తక్కిన వాటియందువలె దీనియందును జాగ్రత్తియు నలవాటును నుండవలయును. ఈకొలతలు గుర్తు పెట్టబడిన వివిధాకారములు

గల గాజుకొలతలు అమ్మబడును. ఈకొలత గుర్తులను నూచించు గీతలు రెండు వైపులను అనగా ముందు వెనుక వైపులను వేయబడి యుండవలయును. కొలగ్లాసును యెడమచేతియొక్క బొటన వ్రేలునకును పిమ్మట రెండువ్రేళ్ళకును మధ్యగా బట్టుకొని, కంటితో సమానమైన యెత్తునకు దీసికొని రావలయును. చేనినుండియైతే మందును బోయవలయునో ఆబుడ్డిని కుడి చేతితో బట్టుకొని, దానియొక్క మూతను యెడమచేతి చిన్నివ్రేలితో బట్టుకొని యుండవలయును. ఈమూతను (కాల్కు) ఈ ప్రకారము బట్టుకొనుటకై కొంతవరకు ఆలవాటు కావలయును. గాన ఆట్లు చేయుటలో జారబడిచి దానిని బగులగొట్టు అపాయమునుండి తొలగుటకు గాను, కొలుచునప్పుడు దానిని విడిగా నుగచుటయే యుత్తమము.

కొలతను సరిగా గుర్తించుటకు గాను ముందు వెనుకవైపుల గుర్తులకు రెండు వైపులను లోని ద్రవపదార్థము సమానపు ఎత్తుగ నుండునటుల జూచుకొనవలయును. ద్రాములను గొల్చుటకు పెద్దదైన బొన్న కొలగ్లాసు ఉండును. మినిములను గొల్చుటకు చిన్నదైన ద్రాము కొలగ్లాసు ఉండును. బొన్న కొలగ్లాసులూ మినిములను గొల్చుట కుపయోగింపగలదు. ఇట్లు చేయుటలో ఖచితమైన కొలతకు భంగము కలుగుట తలపించును.

మిశ్రితౌషధములు Mixtures.

మిశ్రితౌషధములను జేయుటయందు నియోగింపబడిన ఔషధములను కొలల ప్రకారము ఒక పెద్దబుడ్డిలో గలుపుటయే అయియున్నది. కాని దీనిని పద్ధతి ప్రకారమును, బహు మెలకువతోడను జేయవలసియుండును. విశేషమైన యనుభవ ముండిన డాక్టర్లు, నియోగింపబడిన ఔషధముల బుద్ధసన్నియు నొకచోట బెట్టుకొని క్రిమప్రకార ముక్కొకదాని నుండియే వలసినదానిని గైకొనిన పిమ్మట యే మందు బుడ్డి దానిని స్థానమందుంచవలయును.

మిశ్రితౌషధములను చేయుటయందు క్రమము యేమనగా:— టింక్చర్లను గాని యితర ద్రవపదార్థములనుగాని ముందుగా కొలచి, మందును బోయుటకు యేర్పడిన సీసాలూ బోయవలయును. నీటిని ముందుగా గలిపి షరబత్ (syrup) వగైరాల నేరుయినను కలుపుట ఆవసరమున్నచో పిమ్మట గలిపి, చివరగా నవసరమగు నీటినిగాని కషాయమును (Infusion) గాని కలువవలయును. ఎక్కువ నీటిలో విడిచిగా నీయౌషధములను గలుపుటకంటె ప్రెవర్థి ప్రకారము చేయుట మంచిది. ఒకయౌషధయోగము (Prescription) నందు, 8 బొన్నల మిశ్రితౌషధమునకు రెండు బొన్నల టింక్చరలును, ఒక బొన్నజిగురు (Mucilage)ను 5 బొన్నల జలమును, నియోగింపబడి నయెడల, టింక్చర్లకు ముందుగా నీ జిగురును గలిపియెడల సంతయు ముద్దయగును; అట్లు గాకుండునటుల నీటిని గలిపిన పిమ్మట నీ జిగురును చివరగా గలువవలయును. లేదా, యిజగురును ఆవసరమగు నీటిలో గలిపియుంచుకొని, అట్టి నీటిని యీ టింక్చర్లను గలువవలయును. ఇట్లేయగు నితర బాధక మాలేమయినను, దటస్థించినచో సామాన్యజ్ఞానము వలనను అనుభవము వలనను గ్రహించి ఔషధకాటు చేసికొనవచ్చును. ఒక్కవిషయము మాత్రము, బహుజనులు ఆశ్చర్యచేసిడిదైనను జాగ్రత్తను వహించవలసిన యంశమై యున్నది. మిగుల విషపదార్థమైన దానిని, అనగా నాళి

(Aconite) పాపాణము, (Arsenic) విషముస్త్రి (Strychnine), త్రాసిక్ ఆసిడ్ (Prussic Acid) మొదలగునవి బోషధ యోగమునందు నియోగించ బడినయెడల వీటిని జీవరగా జేర్చుటను ముఖ్యసూత్రముగా బెట్టుకొనవలయును. ఇట్లు జేయుటవలన నీయాష ధములను పారబాటుగా నైనను రెండుసారలు జేర్చుట తప్పిపోవును. ఇట్టిది ఒకటికి రెండు సార్లు వేసినయెడల పాక్షికపాతము తటస్థించును. అన్ని మిశ్రితౌషధములును జీవరకు బాగుగ గలపబడుట మంచిది.

బిస్మత్ సబ్ నైట్రేట్ (Bismuth Subnitrates) మొదలగు కొన్ని వస్తువులు నీటి లో గలువవు. అట్టివాటిని పీటితోచేర్చి, జిగురుతో గలిసిన నీళ్ళను బోసి మార్బల్ (రాతి రోలు) లో గలియబెట్టినయెడల గలిసిపోవును.

జ ల ము.

మిశ్రితౌషధములయందు మపయోగించబడు జలము, ఆవిరి చల్లార్చబడి చేయబడిన దైన యెడల శ్రేష్ఠము. అట్టిది వీలుకానియెడల సామాన్యముగ ద్రాగడినీటిని మసలగాచి చల్లార్చి ఉపయోగింపవచ్చును. ఇట్లు మసలగాచుటవలన నందలి జంతు బాలము లన్నియు నశింపు నందును.

మో తా దు.

ఈ గ్రంథమునందలి మోతాదు ఇంగ్లాండు దేశమునందు స్వీజరులకు ప్రమాణ గ్రంథమగు “బ్రిటిష్ ఫార్మకోపియా” ననుసరించి వ్రాయబడినది. ఈ ఫార్మకోపియాతో సంబంధించని కొద్దిపాటి యితర బోషధములకు నితర ప్రమాణ గ్రంథములను బట్టి మోతాదులు యేర్పరచబడినవి. ఇందలి మోతాదులు సామాన్యగతులయందు, వయస్కుల కేర్పరచబడి యున్నవి. శరీరతక్తమును, ఇతర పందర్బములను అనుసరించి మోతాదులందు నిరదేశన యంత మగు కొద్దిమార్పులను జేసికొనినను జేసికొన వచ్చును. పటిమ తక్కువ వాడిని, దుర్బలల కును, పసివారలకును మోతాదులు తగ్గించవలసి యుండును. సుఖమాయలగు స్త్రీలకును ఆదేశకారము మోతాదును తగ్గించవలసి యుండును.

డాక్టరు యంగ్ గారియొక్క పద్ధతినిబట్టి నిర్దిష్ఠమైన మోతాదును

రోగియొక్క వయస్సు

రోగియొక్క వయస్సు + 12

చే గలిగిన భిన్నము ప్రకారము అసలు మోతాదునందు భాగము నేర్పరచి యియ్యవలయునని స్థిరపరచి యున్నారు. ఎట్లనగా వయస్సునకు 1 గ్రాయిను మోతాదుగ నేర్పరచబడిన బోషధము, యీక్రింది ప్రకారము వయస్సుబట్టి మోతాదును స్థిరపరచ వచ్చును.

1. సంవత్సరము వయసుగల పుట్టకు	...	$\frac{1}{1+12} = \frac{1}{13}$	1 గ్రేయిసు
2. సం॥ 1	"	$\frac{2}{2+12} = \frac{1}{7}$	"
3. సం॥ 2	"	$\frac{3}{3+12} = \frac{1}{5}$	"
8. సం॥ 1	"	$\frac{8}{8+12} = \frac{2}{5}$	"
12. సం॥ -	"	$\frac{12}{12+12} = \frac{1}{2}$	"

ఇందు ఈక్రింది మాచనాక్షరములను గమనింపవలెను. ద్రా = ద్రాము, గ్ర = గ్రేయిసు, మి = మినిము, మొ = మొదలు, సాలిడ్ అనగా ఘనపదార్థము లిక్విడ్ అనగా ద్రవపదార్థము.

ఘనపదార్థముల తూనిక.

20 గ్రేయిసులు	1 స్క్విపులు
3 స్క్విపులు	1 ద్రాము
8 ద్రాములు	1 ఔన్సు
12 ఔన్సులు	1 పౌను

ద్రవ పదార్థముల కొలత

60 మినిములు	1 ద్రాము
8 ద్రాములు	1 ఔన్సు
20 ఔన్సులు	1 పైంటు
5 పైంటు	1 గాలను

ఘన పదార్థములకు, త్రాసును తూనికరాళ్ళును ఉపయోగించవలసి యుండును. ద్రవ పదార్థములయందు, గ్రేయిసులకు బదులుగా మినిములు వాడవలసి యుండును. 5 మినిములకు లోతుగా నన్నయెడల చుక్కలుగా వాడవలసి యుండును.

ఆంగ్లేయ వైద్య చింతామణి

ప్రసిద్ధ ఆంగ్లేయాపథ యోగములు.

గర్భస్రావము (Abortion)		సమ ఆముదము	$\frac{1}{2}$ దా॥
		అల్కహాల్	1 బా॥
క్లిస్ సల్ఫేట్	10 గ్రా॥	జలము	1 బా॥
యెస్ట్రానిప్ట యెర్గాట్ లిక్విడ్	1 దా॥		
ఆసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్	30 మి.		
టింక్చర్ డిజటాలిన్	20 మి.		
జలము	3 బా॥		

ఒక బొన్న మోతాదులో దినమునకు
మాడుసారు లియ్యవలయును.

బట్టల (Alopecia)

1. సల్ఫర్ ఆయింట్ మెంట్	4. దా॥
క్రొయిసార్పయిన్	1 దా॥
ఆలివు ఆయిల్	$1\frac{1}{2}$ బా॥

(లేక)

జలోదరము (Ascites)

1. చల్క్ డిజటాలిన్	1 గ్రా॥
పల్వీస్ సిల్లే	1 గ్రా॥
రసభస్మము	1 గ్రా॥

యెస్ట్రానిప్ట జస్టన్ మాత్రయగుటకవ
సర మగునంత. ఒక్కొక్కమాత్రా చొ॥ దినము
నకు రెండు సార్లు.

(లేక)

2. పొటాష్ అసిటెస్	45 గ్రా॥
కేఫ్ డిటర్మిన్	6 గ్రా॥
ఒక బొన్న చొ॥ దినమునకు ఖాదు సారులు.	

చుండు (Dandruff)

క్లోరల్ హైడ్రేట్	1 దా॥
టార్టారిక్ ఆసిడ్	1 దా॥

2. స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా	
ఆహ్ మేటిక్	1 బా॥
స్పిరిట్ రోజ్ పేరీ	1 బా॥
గ్లిసెరిన్	1 ,,
టింక్చర్ కంథారిడీస్	4 దా॥
పన్నీరు	$4\frac{1}{2}$ బా॥

వీటిని బాగుగా గలిపి పెండుకల యొక్క
కుదుర్చులో బాగుగా రుద్దవలయును.

ముతుస్రావము యొక్క క్షీణత

లేక నియమము [Amenorrhoea]

1. పొటాష్ ఫస్ఫేట్	1 గ్రా॥
-------------------	---------

కయొలిన్ - మాత్రా గా జేయుటకు, వీ
లగునంత దినమునకు రెండు సార్లు.

(లేక)

2. డియూప్లె విరన్	36 గ్రా
ఫెర్రీయి ఆరెనెస్	1½ గ్రా
యెస్ట్రాక్టు ఆఫ్ నక్సు	
వామికా	3 గ్రా
క్లిస్టిన్ సఫ్ఫేట్	12 గ్రా

పిని నన్నింటిని గలిపి 13 మాత్రాలుగా జేయవలయును. ఆరమాత్రముండి పొర్రంబి. చి క్రమముగా నొక మాత్రకు హెచ్చింపుచు దినమునకు మూడు సార్లులు భోజనానంతరమయ్యవలయును. ఈ మాత్రల నుపయోగించుట క్రమముగా మానవలయును గాని ఆకస్మికముగా నావవలదు, ఆరెనెస్ (పామజము) కొండరి జీర్ణతత్వమునకు సరిపడక పోవచ్చును. అట్టి విషయములలో దానిని మాత్రలనుండి పూర్ణముగా త్రవ్వవచ్చును.

—

ఉబ్బసము - Asthma

(ఉద్రుత గతియందు)

పొటాష్ ఆయోడైడ్	9 గ్రా
టింక్చర్ బెలడోనా	15 మి
టింక్చర్ లాబేలియా	
యీతర్	30 మి
పిరిట్స్ ఆమ్మోనియా	
ఆరోపేటిక్	1 డ్రా
పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	30 మి
జలము	3 డ్రా

ఒక్కొక్క ఔషధము చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లులు.

కురుపులు, వ్రణములు
రాచకురుపులు.

Boils, Abscesses, Carbuncles.

1. భాగము కార్బులిక్ ఆసిడ్ను 10 భాగములు స్లిసరీక్తో గలిపి వైన రాయవలయును.
2. కేడి కావడములును. పిండికట్టును.
3. హోమోపతి వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు టింక్చర్ ఆర్మికో ఒక చుక్కను, ఒక ఔన్ను జలములలో గలిపి మూడు గంటల కొక సారి లాని కియ్యనగునని సూచించిరి.

—

పాండురోగము (Anaemia)

ఫెర్రీయి యెట్ ఆమ్మోనియా

సిట్టె 10 గ్రా||

యెస్ట్రాక్టు నక్సు వామికా

ద్రవము 2 మి||

లెకర్ ఆరెనెకాలిస్

4 మి||

స్లిసరీక్

20 మి||

జలము

2 డ్రా||

1 ఔ. చొ॥ దినమునకు రెండుసార్లుభోజనానంతరము

కురుపులు (Boils)

1. కార్బియం సల్ఫురైడ్ 10 గ్రా||

మాత్ర లగటకు ఆవశ్యమైనంత య
కాస్టిక్ జస్ట్ తో గలిపి 100 మాత్రలుగా
జేయవలయును. దినమునకు మూడు మాత్రల
నుపయోగింప వలయును.

2. బోరిక్ ఆయిడ్ పెంట్ 2 దా||
ఇక్రియాల్ 1/2 దా||
ఫ్లెక్సిబిల్ కళాడియం 1 దా||
పీని సన్నటిని గలిపి కురుపులకు పైన
రాయ వలయును.

6 సం||ల వయస్సుగల బిడ్డలకు

ఉబ్బసము.

పొటాష్ ఆయోడైడ్ 6 గ్రా||
అమోనియా కార్బనస్ 3 గ్రా||
వైసం ఇపికాక్ 15 మి||
సిరప్ టోలు 10 మి||
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం 10 మి||
జలము 3 ఔ||

ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ|| దినమునకు మూ

డుసారులు.

కనులేవుల ఉబ్బడల

Blepharitis

బోరిక్ ఆసిడ్ 5 గ్రా||
లానాలిన్ 1 దా||
కనులేవుల అంచలకు రాయవలయును.

గొంతు బొంగు పోవుట
(హిస్టేరియా సంబంధముగు)

Aphonia

జింక్ పెరియోడేట్స్ 1 గ్రా||
కెయోలిన మాత్రయగుటకు ఆవశ్య మగు
సంత. ఒక్కొక్కమాత్ర చొ|| దినమునకు రెం
డుసారులు.

కాలినగాయము (Burns)

1. అవిసిమూనె (లేక కొబ్బరినూనె) సున్నపు
నీళ్ళను సమాన భాగములుగ కల్పములో
వేసి మర్దించి దీనిని గాయములపైనరా
యవలయును. దీని కేవలసేవే మందురు.

2. బోరిక్ ఆసిడ్ 15 గ్రా||
గ్లిసెరిన్ 1 దా||
ఆలివ్ ఆయిల్ 1 ఔ||
పీని సన్నటిని గలిపి పైన రాయవల
యును.

కొమ్ముపడిసెము (Bronchitis)

పొటాష్ సిట్రిస్ 1 దా||
లైకర్ అమోనియా సిట్రిసు 6 దా||
వైసం ఇపికాక్ 30 మి||
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం 5 మి||
జలము 3 ఔ||

ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ|| దినమునకు మూ
డుసారులు రియ్యవలయును.

రొమ్ముపడి సెము.

- (1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు తీవ్రస్థితి యందు)
- చాటూసు సిట్రిసు 5 గ్రా॥
 లైకర్ ఆమ్మోనియా సిట్రిసు 1 చా॥
 వైసం ఇక్చికాక్ 10 మి॥
 సిరప్ టోలు 30 మి॥
 ఆక్వాస్టోరొఫారం 5 డ్రా॥
 3 గంటల కొక బోన్సు చొ॥ యియ్యవ
 లయును.

రొమ్ముపడి సెమునకు లోనకు
 వాసన చూచుట

- టింక్చర్ బెంజాయిన్ కో 3 చా॥
 యూకలిప్టస్ ఆయిల్ 1 చా॥
 క్రియోసోట్ 1/2 చా॥
 ఈమిశ్రితావధమునుండి ఒక చా॥ము
 ను ఉడుకునీటిలో వేసి వాసన జూడవలెను.

- బాధతో గూడిన పుండు (Cancer)
- బాధను తగ్గించుటకు గాను 1/2 చా॥ము
 సిటిక్ ఆసిడ్ ను 4 డ్రాస్సుల జలములో గలి
 పి - లింబును యిందులో వదిలి పుండుపైన
 వేయవలయును.

ధాతునష్టము,
 (మాతృ గర్భిణి యొక్క క్షీణదశ)
 (Bright's Disease)

1. ఫెర్రయి యెట్ ఆమ్మోనియా
 సిట్రిసు 15 గ్రా॥

- లైకర్ ప్రిప్రిక్ 6 మి॥
 గ్లిసెరిక్ 45 మి॥
 ప్రిలింబుస్ క్లొరోఫారం 20 మి॥
 జలము 3 డ్రా

ఒక్కొక్క బోన్సు చొ॥ దినమునకు మూడు సార్లు.

2. తియోసిక్ సోడా ఆసిలేట్ 15 గ్రా॥
 రఫీన్ సిట్రిసు 9 గ్రా॥
 టింక్చర్ డిజిటాలిస్ 15 మి॥
 జలము 3 డ్రా॥

ఒక్కొక్క బోన్సు చొ॥ దినమునకు మూడు సార్లు.

తేనెటీగ కాటు.

- చాల్చిన ఆరళు (Cinnamon Oil)
 ను పైన రాక్షావలయును.

నల్లులు (Bed bugs)

1. పెట్రోలియం 3 డ్రాస్సులను 100 డ్రాస్సుల జలములో గలిపి నల్లులందు స్నానములలో బోసిన నవి నశించగలవు.
 2. గంధకపు పొగవలన గూడ నల్లులు నశించి పోవును.

తిమిరువాయువు (Beri beri)

1. టింక్చర్ నక్సువామికా 15 మి॥
 టింక్చర్ స్ట్రాఫాంతసు 15 మి॥
 ప్రిలింబుస్ క్లొరోఫారం 30 మి॥

జలము

ఒక్కొక్క బొన్న చొ॥ దినమున
మాడుసారు లియ్యవలయును.

2. 'ఫెర్రియ యెట్' క్విరీస్

సిట్రిసు

10 గ్రా॥

లైకరు ఆర్సెనికాలిసు

4 మి॥

గ్లిసరీక్

20 మి॥

సిరిట్స్ క్లొరోఫారం

20 మి॥

జలము

2 బౌ॥

ఒక్కొక్క అవున్న చొ॥ రెండు సా
రులు భోజనానంతరము యియ్యవలయును.

.....

దగ్గు (Cough)

1. టింక్చరు క్యాంఫరు కో

3 ద్రా॥

సిరిట్స్ ఆమ్మోనియా

1 ద్రా॥

ఆరోమేటిక్

8 బౌ॥

జలము

జలము

దీర్ఘ వ్యాపితము కన్వీన సుబుధము
లగు దగులయందు పొరి రెండు లేక మూడు
గంటలకు ఒక బొన్న చొ॥ యియ్యవలయును

1. టింక్చరు క్యాంఫరు కో

3 ద్రా॥

పైసం ఇసికాక్

1 ద్రా॥

సిరిట్స్ ఈతరు సైట్రసు

3 ద్రా॥

జలము

8 బౌ॥

జలుబుకలన గలుగు దగ్గుయందును,
యితర విధములగు దగ్గులందును, కఫము వెలు
గడగ జోలెడగ జొడలగ, ముగ్గురుచు

గ్రిమీమాడు లేక నాలుగు గంటల కొక బౌ
న్న చొ॥ యియ్యవలయును, ఇతరు మించిన
కృత్రి ఫలవత్సరము వయస్సునకును మోతాడు
న సువత్సరమున కొక ద్రాము చొ॥ పా
ర్షింప వలయును.

3. హెరాయిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ $\frac{1}{2}$ గ్రా॥

జలము

10 బౌ॥

ఒక్కొక్క బొ॥ చొ॥ దినమునకు
మాడు సారులు.

రోమ్ముపడి సము

(తీవ్ర)ముగను గుచ్చాగంభసిత

యందు)

ంటిమొనీ టార్టరేట్ 1 గ్రా॥

హటాను సైట్రసు 2 ద్రా॥

చేంప్రు క్యాంఫరు కో 4 ద్రా॥

జలము 12 బౌ॥

అరబొన్న చొ॥కి గంటల కొక సారి
యియ్యవలయును.

శీతకాలపు గజ్జి (Chilblains)

1. కార్బలిక్ ఆసిడ్ 1 ద్రా॥

టింక్చర్ ఆయెడిస్ 2 ద్రా॥

ట్యూనిక్ ఆసిడ్ 2 ద్రా॥

ఆముదము 4 బౌ॥

పిలి వన్నిటిని గలిపి పైన వాయవ

2. ఆమ్మోనియం క్లొరైడ్
విగర్
జలము

4 డ్రా||
2 టౌ||
6 టౌ||

2. పుండ్లు కడుటకు మందు యెర్రీగానున్న
విషములందు ల్యూకొలేషను బాగుగా
య్యదనముడల పుండ్లు యేప్పడ కుండును.

.....

వీని నన్నిటిని గలిపి పైన రాయవల
యును.

3. గుడ్డను పెప్పుర్మింట్ ఆయిలులా దడిపి
పైని వేయనగును.

బ్రాంకో స్యూమోనియా

(Bronchopneumonia)

(1 సా) పయసుగల విడ్డలయందువచ్చు
స్యూమోనియావలె నుండునట్టి జ్వరము. పొంగు
మొలగు వ్యాధుల పిమ్మట వచ్చును. "
ఆమ్మోనియా కార్బోనస్ 1 గ్రా||
లైకర్ ఆమ్మోనియా ఆస్టిటిసు 40 మి||
టింక్చర్ బెలడోనా 4 మి||
టింక్చరు సిల్వా 2 మి||
గెర్బ్ టోలు 20 మి||
ఇకాఫ్యూజన్ సెనెగా 4 డ్రా||
నాల్లవ చుంకు చొ|| 3 గంటల కొక
సారి యియ్యవలయును.

.....

కారిజముయొక్క క్షీణత
(సామాన్యముగ త్రాగుబోతు
లలో గలుగును).

(Cirrhosis of the Liver)

మలబంధము. (Constipation)

పల్మసు ఇపికాక్ 1 గ్రా||
యక్వాన్త్రా కాస్టరా సాగ్రీడా 3 "||
" బెలడోనా 1 "||
" నక్సువామికా 1 "||

మాత్ర యగుటకు వీలైనంత యక్వాన్త్రా
క్తు జన్షన్సు గలుపవలయును. వీని నన్నిటిని
గలిపి 6 మాత్రలుగా కేసి దీర్ఘ వ్యాపితమున
మలబంధ విషయములందు రాత్రి నిద్రించు
ముందు 1 లేక 2 మాత్రలను నేమించ వల
యును.

అధిక కాలము మంచము పట్టుట

వలన గలుగు పుండ్లు

(Bed sores)

1. పటిక
టింక్చర్ క్యంఫర్ కో 1 టౌ||
ఒక కోడిగుడ్డు తెలుపుతో బాగుగ గలిపి
పుండ్లకు రాయనగును.

ఆమ్మోనియం క్లొరైడ్ 10 గ్రా||
టింక్చరు జన్షన్ కో 20 మి||
ఇకాఫ్యూజన్ సెనెగా 1 టౌ||

ఒక టౌన్ను చొ|| దినమునకు రెండు||
సారు వియ్యవలయును.

పురుగు కాటు.

(నల్లులు, దోమలు, ఈగలు మొదలగు పురుగుల వలన)

చిట్టాముదమును గాని వంట ఆముదమును గాని రుద్దవగును.

.....

శూలనొప్పి (Colic)

మెన్నిసియం కార్బరసు 1 1/2 దాగ్||
అమ్మోనియం కార్బరసు 1 1/2 దాగ్||
టింక్చర్ లావండ్యూలా కొ 2 దాగ్||
పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ 2 మి||
జలము 6 ఔ||

నొప్పి తగ్గు వరకును రెండు గంటల కొకసారి ఆరబొన్ను చొ|| యియ్య వలయును.

.....

మూత్రాశయ సంబంధముగు

శూలనొప్పి (Renal Colic)

టింక్చరు బెల్డోహ 10 మి||
ఆక్వా క్లొరోఫారం 1 ఔ||
మాడుగంటల కొకసారి ఒక బొన్ను చొ|| యియ్యవలయును.

.....

కొలుకు పుండు (Chancre)

ఆరిస్టార్ 1 దాగ్||
బోరిక్ 1 దాగ్||

ఈ రెండును గలిపిన పొడిని పుండు పైన జల్లవలయును.

.....

కాలరా (Cholera)

1. టింక్చరు కాప్సికం 5 దాగ్||
స్పిరిట్ క్యాంఫరు 4 దాగ్||
టింక్చరు గ్వయికం 3 దాగ్||

వీని నన్నిటిని గలిపి రెండు లేక మూడు గంటలకు ఒకసారి ఒక దాగ్|| ము కొలస ప్రకారము తేడినీళ్ళలో వేసి యియ్యవలయును.

2. టింక్చరు కాప్సికం 2 దాగ్||
టింక్చర్ పీపీయం 2 దా||
టింక్చరు రీయె కొ 2 ,,
పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ 2 ,,
స్పిరిట్ క్యాంఫరు 2 ,,
15 మొదలు 30 చుక్కల వరకును ప్రతి

గంటకు యియ్యవలయును.

3. రసభస్మము. 1 గ్రా||
సోడా ట్రైకార్బనేట్ 3 గ్రా||
దీనిని 4 భాగములుగా తేసి గంటకొక

పాల్లము నియ్యవలయును.

4. లెకరు ప్రిక్సిన్ 15 మి||
టింక్చరు డిజెటాలిను 40 మి||
ఆక్వా క్లొరోఫారం 6 ఔ||

కాళ్ళును చేతులును చలువలు గ్రమ్ము

ట కారంబించినప్పుడు మాడు గంటల కొకసారి ఒక బొన్ను చొ|| యియ్య వలయును.

పసిబిడ్డల చుండు కాచారా

Cholera Infantum

1. టింక్చర్ ఆగ్నోసేన్ 4 మి
జలము 4 ఔ

అది ఔన్ను చొ॥ చివడు గంటలు కొల

సారి యియ్యవలయును.

2. ప్రొడాన్టీలైకం క్రిటా 1 గ్రా॥
మూడు గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

కాళ్లు చేతులు స్వాధీనము నుండి
తప్పి గంతులు వేయుట (Chorea)
(ప్రారంభ గతియందు)

1. సోడా సాలినైట్ 1 ట్రా॥
పిరిట్స్ ఆమ్మోనియా
అరోమేటిక్ 1½ ట్రా॥
ఆక్సా క్లొరోఫారం 6 ఔ॥
ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడు సార్లు

2. (అనంతర గతులయందు)
లైకర్ ఆర్సెనికాలిను 3 మి॥
ఆక్సా క్లొరోఫార్ 1 ఔ॥

ఒక ఔన్ను చొ॥ దినమునకు రెండు సార్లు భోజనా నంతలము యియ్యవలయును.

కృమముగా లైకర్ ఆర్సెనికాలిను మోతాదును దినమునకు 15 మినియలకు పెంచుట వలయును.

- సోరత్ ప్రొడాన్టీ 2 గ్రా॥
సోటాను బ్రొడాన్టీ 8 ,,
టింక్చర్ హయసామి 10 మి॥
నక్కార - (కొంచెముగా) 1 ఔ॥
లము

వంశక, అధికముగా నుండినట్లైతే ఈ మందులు యి యివ్వవలయును.

బీర్జకారి (Carminative Mixture)

- పిరిట్స్ ఆమ్మోనియా 8 ట్రా॥
అరోమేటిక్ 90 గ్రా॥
సోడా లైకార్సెను 6 ట్రా॥
టింక్చర్ కార్బం కో 3 ట్రా॥
పిరిట్స్ క్లొరోఫారం 10½ ట్రా॥
లము

బాగుగా కలపవలెను. మూడు గంటల కొక ఔన్ను చొ॥ దీయవచ్చును.

అజీ రిక్తి ఉపయోగమగును. బలమన గోజనము పిమ్మట ఒక మోతాదు వుచ్చుకొన గును. 4 లేక 5 చుక్కలు పెర్పర్మింట్ ఆయిల్ కలుపవగును.

తాగిగుడునందు అభిలాషను మాన్పుటకు (Drunkenness)

- 3 క్యూ నక్కునామి కా 20 మి॥
క్యూ జుక్ కో 2 ట్రా॥
క్లియ కలంబా 2 ,,
లము 4 ఔ॥

1. ఔస్మ్య చొ॥ భోజన భూక్తియు అక్కడ బుట్టించుటకు గాను యియ్యనగును.

జలములో నలిపి దివమునకు రెండు సార్లు పుచ్చు కొనవలయును.

త్రాగుబోతునకు గలుగు సంధిగులుము.

3. ఆసిడ్ ఫాస్ఫారిక్

డిల్యూట్ 15 మి॥

దీనిని ఒక ఔ॥ జలములో నలిపినామా మనదాకు నిచ్చుకొన వలయును.

(Delirium Tremens)

సోడా బ్రైమైడ్ 45 గ్రా॥
క్లారల్ హైమర్ను 45 గ్రా॥
టింక్చరు మాయెసామను 45 మి॥
నాటింజ రసము 4 మి॥
ఆక్సాక్టోఫారం 3 ఔ॥
ఔస్మ్య చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు యియ్యనగును.

మధు పదార్థము లేకుండ వెలువడు అతిమూత్రము.

(Diabetes Insipidus)

జింక్ పెలిరియెనసు 4 గ్రా॥
పై మోతాదు పరీకారం మాత్రముగా జేసి దినమునకు మూడు మాత్రల నియ్యవలయును.

అతిమూత్రము - మధురపదార్థముతో గూడినది.

అతిచిరేచనములు (Ciarshoes)

(Diabetes Mellitus)

1. ఆసిడ్ ఆల్నియెను 1/50 గ్రా॥
నోడీనా ఫాస్ఫసు 1/4 ,,
అల్యూమ్ 1/2 ,,
క్రిక్టీక్ ఫాస్ఫక్ 1/50 ,,

1. విస్కత్ సబ్స్టెంటును 30 గ్రా॥
సూల్ 15 ,,
సోడా బైకార్బోనసు 15 ,,

వి భాగములు గాజేసి మోతాదున కొక్కొక పాట్లము చొప్పున దినమునకు మూడుసార్లు నియ్యవలయును.

ఈపాళ్ళ పరీకారం ఒక్కొక్క మాత్రము నుండునట్లు యత్నాత్మక జన్మకతో గలిపి మాత్రముగా జేసి భోజనానంతరము ఒక్కొక్క మాత్ర చొ॥ దినమునకు రెండు మాత్రలను నేవించి వలయును.

2. పల్వసు ఇసికాక్ కొ 15 గ్రా॥
విస్కత్ సాలిసైలసు 15 ,,

మూడు భాగమునుగాజేసి మోతాదున కొక్కొక పాట్లము చొ॥ దినమునకు మూడు సార్లు నియ్యవలయును.

2. యక్ట్రెక్ట బాంబిక్ రిక్విడ్

1 డ్రా॥

1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు అతివిచేచనబింకర్ జింజబ్రీను	8 మి॥
ములు.	
పల్వీసు కేర్రటా ఆరోమేటిక్	6 గ్రా॥
బిస్మిత్ సాలిసైలెసు	6 ,,
ఆరు పొట్టుములుగా చేసి 3 గంటల	
కొక పొట్టుము నియ్యవలయును.	

ఆక్వా అనీతి 4 ద్రా॥
ఒక ద్రాము మోతాదు చొ॥ నివము
చదురెండు పాచు నియ్యవలయును.

1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు పచ్చరంగు విరేచనములు
(Green Diarrhoea)

ఒక బొ॥ జలమల 20 మినిముల
ల్యూట్టిక్ అసిడ్ను గలిపి మూడేసి గంటల
కొకసారి ఒక దాము చొప్పున నియ్యవల
యును.

చిన్న బిడ్డగుణము (Convulsions)
(1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు)

పొటాసు బోరేట్	4 గ్రా॥
బింకర్ డైల్యూట్	4 మి॥
క్లారల్ ప్లాడ్రీను	2 గ్రా॥
ఆక్వా క్లొరోఫారం	4 ద్రా॥

ఒక ద్రాము చొ॥ మూడు గంటలకొక
సారి నియ్యవలయును. చక్కెర కొంచెము
గా చేర్చుడు.

2 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు అతి
విరేచనములు.

పొటా	3 గ్రా॥
బిస్మిత్ కార్బనసు	12 ,,
పల్వీసు కేర్రటా ఆరోమేటిక్	12 ,,

విరేచన కారులు.

1. చిల్లముదము 2 లేక 3 దాములు తే
మకరమును విరేచనకారిగ నేరింపగును. ఒక
దాసునకు లోపల నివ్వరొనరును దాని ఆము
వమును బాసి ఆటు పిమ్మట నీయాముదము
య దాగుట వలన నీసువానచే నందలి అస
హ్యమును అరుచియును తగ్గును.

మలబంధము.

(సంవత్సరములోపు వయసుగల బిడ్డలకు)

మెగ్నీషియం కార్బనసు	4 గ్రా॥
మెగ్నీషియం సల్ఫేట్	16 ,,
సోడా బై కార్బనసు	4 ,,
పల్వీసు రీయే	4 ,,
బిస్మిత్ కార్బనసు	20 మి॥

2. చాటారిక్ అసిడ్	1 దా॥
సోడా కార్బనసు	1 దా॥
క్రీం ఆఫ్ టార్టార్	1 ద్రా॥
మెగ్నీషియం సిట్రికు	1 ద్రా॥

మెక్కిసియం సల్ఫేటు
చక్కెర (మెత్తపాడి)

1 ద్రా.
1 "

4. సోడా సల్ఫేటు
టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్
జలము

4 ద్రా.
20 మి
2 ఔ

ఒక టీ స్పూను కొత్తగాని కొంచె
మెక్కినగా గాని నీటిలో కలిపి పుచ్చుకొన
వలయును. ఇది "ఈమెజ్" పుట్టిన
వలె సాధు విరేచన కారిక బనిచేయును.

సామాన్యముగ విరేచనమగుటకు దీనిని ఉ
పయోగింపవచ్చును. శరీర తత్వమును బట్టి సో
డా సల్ఫేటు అధికముగ దోచిన యెడల ఒక
టి రెండు ద్రాములు తగ్గింపవచ్చును.

.....

3. హైడ్రాజ్జరెకంక్టేటా }
(గే) పొడవు }
సోడా కార్బనేటు

1 గ్రా.
2 మొదలు
2 గ్రా.
6 "

5. సోడా సల్ఫేటు
టింక్చర్ పింకోనా
సల్ఫేటు ఆఫ్ విరన్
జలము

4 ద్రా.
4 "
15 గ్రా.
8 ఔ

బాగుగ కలిపి నాలుగు గంటల కొక
సారి ఒక టెస్సు పుచ్చుకొన వలయును. స్త్రీ
హ వ్యాధులయందును ఋతు స్రావము యొ
క్క నెలలదల యందును. సులిత్రులకులకును
ఉపయోగింప నగును.

.....

కడులకు నీళ్ళ విరేచనము లగుచు విరే
చనము తేల్లగా కుదపలుగా నుండి, పాలు ఆ
జీర్ణిలో వెలువడు చుండిన యెడల యీ
మందు వెంటనే పనిచేయును. ఉదయమున
ఒకపాట్లమును సాయంత్ర మొకపాట్లమును
యియ్యవగును. 1 మొదలు 6 నెలలు వయ
సుగల బిడ్డకు ఆరగియనుగే పొడవు, 6
గ్రా. సోడా, 6 మొదలు 12 నెలల వయ
1 గ్రా. గ్రే పొడవును 6 గ్రా సోడా, 1 నం||
మొదలు 3 నం|| ల వరకును 1½ గ్రా గే పొ
డవు 6 గ్రా. సోడా; 4 మొ|| 8 నం|| ల వ
యస్సు వరకును 3 గ్రా గ్రే పొడవును 6 గ్రా
సోడాయును, యీ మోతాదుల పరీకారము
యియ్యవలయును.

6. మెక్కిసియా ట్రైకార్బనెటు
సోడా ట్రైకార్బనెటు
మిస్టూరా సెన్నాకొ

10 గ్రా.
8 గ్రా.
1 ఔ

బాగుగా కలుపవలెను. అజీర్తికి కా
ంజ వ్యాధులకును ఉపయోగింప నగును.

.....

7. రస భస్మము
మెక్కిను చాలిప్ కొ

5 గ్రా.
1 ద్రా||

బాగుగా కలిపి పుచ్చుకొన చేయవల
యును. బలమగు విరేచనకారి. మలము

నీటితో గూడి యుండునట్లు చేయును. నంబు
వ్యాధుల యందు ఉపయోగింప నగును;

.....

3. పోడాపైలం కజిక 1½ గ్రా॥

యక్షాన్తిష్ఠ కాలాసింత్

కా 30 గ్రా॥

పల్విసు ఇపికావ

4 గ్రా॥

కొంచెము జీగురతో బాగుగా కలిపి

12 మాత్రలుగా జేయ వలయును. మోతా
దు—రెండు దినముల కొకమాత్రా చూచి కా
జ వ్యాధులకును, విరేచన బద్ధమునకును ఉప
యోగింప నగును.

.....

జలుబు (Coryza)

(ప్రారంభ స్థితియందు)

టింక్చర్ ఆకాసెట్ 4 మి॥

టింక్చర్ బెలడోనా 8 మి॥

స్పిరిట్స్ క్యాంథర్ 8 మి॥

ఆక్వా క్లొరోఫాం 2 బై॥

అర బొన్ను చూచి మూడు గంటలకొక
సారి యియ్యవలయును.

.....

2 సా॥ ల వయసుగల బిడ్డకు అతి

విరేచనములు

ఫలోర్ 3 గ్రా॥

బిస్మత్ కార్బనసు 12 గ్రా॥

పల్విసు క్లెటా ఆరొమాటిక 12 గ్రా॥

అరు మోతాదులుగా జేసి మూడేసిగం
టల కొక మోతాదు నియ్యవలయును.

.....

ఋతుస్రావమునం దధికముగ
నగుట, లేక తఱచుగనగుట,
లేక అధిక కాలము వరకు నగుట
(Menorrhagia)

1 యక్షాన్తిష్ఠ యుక్తోడ లిక్విడ్ ఆర ద్రావము
ముదలు ఒడిద్రావము నంతును జలమలో
గాని పరబతులొగాని కలిపి మూడు గంట
ల కొకసారి యియ్యవలయును.

2 టింక్చర్ హమామిలిసు 5 చుక్కలను మూ
డు లేక నాలుగు గంటల కొకసారి జల
మలో గలిపి యియ్యవలయును.

3. ఋతుస్రావము అధికముగ నగు విషయ
ములో ఒకటి లేక రెండు నిమ్మ కాయల
రసమును నోటితో బీల్చుటవలెన మిగుల
గుణముగా నుండునని యొక ఆమెరికా
వైద్యోక్త్రుజ్ఞుడు చెప్పుచున్నాడు.

.....

అజీర్ణ వ్యాధి, (Dyspepsia)

1 బిస్మత్ కార్బనసు 30 గ్రా॥

పెప్సా జెక్ 1½ ద్రా॥

టింక్చర్ నక్సువామికా 24 మి॥

పల్విసు ట్రాగ కాంత్ 12 గ్రా॥

అక్వా మెంతా పిప్ 3 బొ
బొన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసారులు
య్యవలయును.

2. సోడా క్రైకార్బనసు 45 గ్రా॥
పల్వసు రీయె 15 ,,
మెగ్నీషియం కార్బనసు 15 ,,
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం 20 మి॥
టింక్చరు నక్సువామికా 15 మి॥
అక్వా మెంతాపిప్ 3 బొ॥

3. ట్రెకర్ బిస్మత్ యెట్ పెప్పిను 2 బొ॥
కో (హూలిట్) 1 ,,
అక్వా అనీలి 3 బొ॥
జలము

1 అవున్సు మోతాదులో దినమునకు మూడుసారులు లియ్యవలయును.

ముత్రస్రావమునందు నొప్పి కలుగుట
(Dysmenorrhoea)

ట్రెకర్ కాలాఫైట్ యెట్ -
వత్ నెట్టిల్లు 40 మి॥

ట్రెకర్ సెడెస్స (పెర్లేడెవిసు

కంపెనీ) తోట మి॥

అల్టిరిను కార్బనసు 45 గ్రా॥

అక్వా క్లోరోఫారం 20 మి॥

ఒక బొన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసారులు లియ్యవలయును.

చెవిపోటు (Earache)

టింక్చర్ ఓపియం 1 బొ॥
స్కరీన్ 1 1/2 ,,
కార్బాలిక్ ఆసిడ్ 24 మి॥
కార్బాలిమాన్ 1 బొ॥
ఈ మిక్చిత్రావధమును నెచ్చచేసి 1 లేక 2 చుక్కలను చెవిలో వేయవలయును.

మూగగజ్జ (Eczema)

వాలిసైలిక్ ఆసిడ్ 15 గ్రా॥
కింకు ఆల్బెనో 40 గ్రా॥
వాసలిన్ 1 బొ॥
ఈ అయింటు మెరుగు పైస రాయనగును.

మర్వాయు పులను కి)మి జాలము
లను నశింపజేయు మందులు
(Disinfectants)

1. కార్బాలిక్ ఆసిడ్ 1 బొ॥
జలము 1 పెంటు
కురుపులు, పుండ్లు గాయములు -- కడుగుట నుపయోగించును.

2. బోరిక్ ఆసిడ్ 4 గ్రా॥
అమల 1 1/2 బొ॥
నైత్రములకు, మూత్ర (జలములకు) భగవంతుని వరములు వ్రాసి యోగించును.

నీటితో గూడి యుండునట్లు చేయును. నందు
వ్యాసలు యందు ఉపయోగింప నగును;

.....

8. పోడాపెలం రెజెక్ 1 1/2 గ్రా||
యెక్స్ట్రాక్టు కాలాసింతో

కొ 30 గ్రా||

పల్వీసు ఇసికాసు 4 గ్రా||

కొంచెము జీగురుతో బాగుగా కలిపి
12 మాత్రీలుగా జేయ వలయును. మోతా
దు—రెండు దినముల కొకమాత్రీ చొప్పున కాల్
జ వ్యాధులకును, విరేచన బుద్ధిమనకును ఉప
యోగింప నగును.

.....

జలుబు (Coryza)

(ప్రారంభ స్థితియందు)

టింక్చర్ ఆకాసెట్ 4 మి||

టింక్చర్ బెలడోనా 8 మి||

స్పిరిట్స్ క్యంఫర్ 8 మి||

ఆ క్వ క్లోరోఫాం 2 మి||

అర బొన్ను చొప్పున మూడు గంటలకొక
సారి యియ్యవలయును.

.....

2 నం|| ల వసుమలల చిక్షు అతి
విరేచనములు

ఫలోర్ 3 గ్రా||

చిస్మత్ కార్బనసు 12 గ్రా||

పల్వీసు క్లొరా ఆకాసెట్ 12 గ్రా||

అరు మోతాదులుగా బిసి మూడేసిగ
టల కొక మోతాదు నియ్యవలయును.

.....

ఋతుస్రావమునం దధికముగ
నగుట, లేక తటదుగనగుట,
లేక అధిక కాలము వరకు నగుట
(Menorrhagia)

1 యెక్స్ట్రాక్టు యుల్మో టెక్స్టో ఆర ద్రావము
ముదలు బడి ద్రావము వరియిను జలమలో
గాని పరిబళులోగాని కలిసి మూడు గంట
ల కొకసారి యియ్యవలయును.

2 టింక్చర్ హమామిలిసు 5 మి||
దు లేక నాలుగు గంటల కొకసారి జల
మలో గలిపి యియ్యవలయును.

3 ఋతుస్రావము అధికముగ నగు విషయ
ములో బిటి లేక రెండు నిమ్మకాయల
రసమును నోటితో చీల్చుటవలె మిగుల
గుణముగా నుండునని యుక ఆమెరికా
వైద్యోక్త్రుజ్ఞుడు చెప్పిచున్నాడు.

.....

అపేర్ష వ్యాధి. (Dyspepsia)

1 చిస్మత్ కార్బనసు 30 గ్రా||

పెప్సెక్ డైక్ 1 1/2 గ్రా||

టింక్చర్ నమనవామికా 24 మి||

పల్వీసు బ్యూగ కాంత్ 12 గ్రా||

ఆక్వా మెంథా పిప్ 3 జా||
బొన్న చొ|| దినమునకు మూడుసారులు 1
య్యవలయును.

2. సోడా బైకార్బొనసు 45 గ్రా||
పల్వసు రీయె 15 ,,
మెగ్నీసియం కార్బొనసు 15 ,,
స్పిరిట్ క్లోరోఫారం 50 మి||
టిక్చరు నక్సువామికా 15 మి||
ఆక్వా మెంథాపిప్ జా||

3. ట్రికర్ బిస్మత్ యెత్ పెప్పరు 15 గ్రా||
కో (హూలేట్) 2 దా||
ఆక్వా అనీరి 1 ,,
జలము 3 జా||

1 అవున్సు మోతాదులలో దినమునకు మూడుసారులు లియ్యవలయును.

ముతుసా)వమునందు నొప్పి కలుగుట
(Dysmenorrhoea)

ట్రెకర్ కాలాఫ్లో యెత్ -
పల్వెనెట్టియో

ట్రెకర్ సెడెస్సి (పెర్లేడెవసు 30 మి||
కంపెసి) 10 మి||
నెటెట్రియో కార్బొనసు 15 గ్రా||
ఆక్వా క్లోరోఫారం 50 మి||

ఒక బొన్న చొ|| దినమునకు మూడుసారులు లియ్యవలయును.

చెవిపోటు (Earache)

టింక్చర్ పీపియం 1 దా||
స్ట్రోనిన్ 1 1/2 ,,
కార్బొలిక ఆసిడ్ 24 మి||
కొబ్బరినూనె 1 జా||

ఈ మిక్చర్ తామరమున పెచ్చచేసి 1 లేక 2 చుక్కలను చెవిలో వేయవలయును.

మూగగజ్జి (Eczema)

సాలిసైలిక్ ఆసిడ్ 15 గ్రా||
కింకు ఆక్సెజ్ 40 గ్రా||
వానలిక్ 1 జా||

ఈ ఆయిటు మెటును పైన రాయనగును.

.....

మర్వాయు పులను కి)మి జాలము
లకు నశింపజేయు మందులు
(Disinfectants)

1. కార్బొలిక ఆసిడ్ 1 దా||
జలము 1 మెంటు
కురుపులు, పుండ్లు గాయములు -- కడుగుట వలయుగిందురు.

బొంబు ఆసిడ్ 4 గ్రా||
అమం 1 1/2 దా||

నెత్తములకు, మూత్రకోశమునకు, భగవంతులకు, రుద్ధిమునకు, నోటికి ఈ మిక్చర్ వేయవలయును.

3. క్రియసోప్

ఒక పుంటు ఉడునునీళ్ళలో ఒక దాని ము క్రియసోప్ ను వేసి వానన జూచినయెడల క్షయవ్యాధియందు దగ్గును తెవవకు తగ్గించును. 1 మొదలు 3 చుక్కలవరకును క్రియసోప్ ను కాన్ లివరు ఆయిక్ మోతాదులో గలిపి పుచ్చుకొనిన యెడల క్షయవ్యాధియందు గుణముగ నుండును.

4. పొటాసు పర్మాంగనేట్ దీనిని నీటిలో గలిపిన యెడల యెక్కువగా యోగ్యము. ఒక ఆవును జలములో రెండు గ్రెయిసుల పొటాసు పర్మాంగనేట్ ను గలిపి దుర్వాసనగల కురువులను గడిగిన యెడల వాదుర్వాసన నశించును.

ఋతుస్రావము నిలచిన కషయములో 2 లేక, 3 గ్రెయిసులు మాత్రంగావేసి దినమునకు 3 లేక 4 సార్లు లిచ్చిన యెడల గుణమియ్యగలదు.

5. పర్క్లొరైడ్ ఆఫ్ మెర్క్యురీ

ఇది క్రిమిజాలముల నశింప జేయుటయందు మిగుల బుచ్చినది. 10 అల్రన్నుల జలములో 1 గ్రెయిసును గలిపి అకటు వ్యాధిశబ్దాధనోందు రోగిని నుట్టుకొనిన పిమ్మట 2 నుంచి 3 వరకు గుళానుబంధముగా పనగును.

6. యూకలిప్టసు ఆయిల్

ఇది క్షయ వ్యాధి కుండును, దుర్వాసనలో గూడిన కఫము పగువడు దగ్గు విషయములందును, మూత్రాశయము రోగుల నందిన స్త్రీతులయందును, 1 ముదలు 5 చుక్కల వరకును పరబతులో గలిపి యిచ్చిన యెడల గుణమిచ్చునని యెంచబడుచున్నది.

7. త్రెమాల్ (హమిల్టన్)

చర్మవ్యాధులకు త్రెమాల్ తో జేయబడిన సబ్బు తెచ్చుకొనినను. 6 గ్రెయిసుల త్రెమాల్ ను ఉడుకు నీళ్ళలో వేసి వానన జూచిన యెడల జలుముని కుండుముగించును. చర్మవ్యాధులకు 6 ముదలు 10 గ్రెయిసులవరకు 1 అల్రన్ను వానలితో గలిపి అయింటు మంటుగా జేరి ఉపయోగించి వచ్చును.

8 మెంతాల్ (కన్స్టెంటిను ప్రెప్రు)

మెంతాల్ 3 భాగములు, క్లోరోఫాస్ 4 భాగములు, ఆలివ్ ఆయిల్ 16 భాగములు... మొదలైనవి... మెంతాల్ తో జేయబడిన సబ్బు తెచ్చుకొనినను. 6 గ్రెయిసుల త్రెమాల్ ను ఉడుకు నీళ్ళలో వేసి వానన జూచిన యెడల జలుముని కుండుముగించును. చర్మవ్యాధులకు 6 ముదలు 10 గ్రెయిసులవరకు 1 అల్రన్ను వానలితో గలిపి అయింటు మంటుగా జేరి ఉపయోగించి వచ్చును.

ఋతుస్యావము తెలపువర్ణముగా

సుండుట[కునుమవ్యాధి]

(Leucorrhoea)

1. గోరువెచ్చనిదీర్చు బొప్పివల 2 గ్రాము

జింకో సత్ఫలమును గలిపి పిచ్చికారీచేయుటవలన
సుపయోగముగనందును.

2. స్వావమువలన వంటగా నుండివయెడల
ఒకపెంటజలములొక బొప్పిసోడా కార్బోనేట్
టును గలిపి పిచ్చికారీచేయుటవలన మిగుల శ
మనము గా నుండగలదు.

3. షెర్రీయి యెటు క్వింక్ సిట్రస్ 40 గ్రాము
జలము 8 అం

బాగుగా గలిపి మూడు లేక నాలుగు
గంటలకు ఒక ఆవున్ను చొ॥ పుచ్చుకొన వల
వలయును. ఈ మందు పుచ్చుకొనిన పిచ్చుట
నోరు కడుగుకొన వలయును. లాహ సంబంధ
మగు ఆవువధమా లన్నియు విరేచనమునకు న
లుపురంగున పుట్టించును.

4. ఆమ్మోనియం క్లొరైడ్
లైకర్ సింకోనా హైడ్రో
బోం

టింక్చరు నత్సవమికా
లైకరు ఆర్చనికాలిను
ఇన్ ఫ్యూజిన్ ఇన్ క్లొ

10 గ్రా॥

10 మి॥

10 మి॥

4 మి॥

2 అం

ఒక ఆవున్ను చొ॥ భోజనా సంతరము
నినమునకు రెండు సారు లియ్యవలయును.

.....

జిగుట విరేచనములు

(Dysentery).

1. పెక్సిసియం సస్పెంట్ 4 గ్రా॥

ఆసిక్ హైడ్రోక్లోరిక్ 40 మి॥

డియూట్ 40 మి॥

ఆక్సా మెంథా 25 4 అం

ఒక్కొక్క ఆవున్ను చొ॥ జిగుటలేకుం
డగ సాఫైన విరేచనమును వరకును లియ్యవల
యును.

2. పర్వీసు ఇసికాకు 1 ద్రా॥

ట్యూరికు ఆసిక్ 1/2 గ్రా॥

15 మాత్రలుగా కేసి గంట కొకమా
త్రా చొ॥ లియ్యవలయును.

ముఖ పార్శ్వము వంకరపోవుట

(క్షయతా సంబంధము)

(Facial Paralysis).

సోడా సాలినెలసు 30 గ్రా॥

లైకర్ ఆమ్మోనియా ఆసిక్ టెట్రెసు 6 ద్రా॥

స్పిరిట్ యాకర్ నైట్రెసు 45 మి॥

ఆక్సా క్యంఫర్ 3 ద్రా॥

ఒక్కొక్క బొప్పి మోతాదు చొ॥

దివమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

.....

పిత్తాశయ సంబంధమగు రాళ్ళు (Gall Stones)

(కడుపునొప్పి తన సమయములూ
వేగించుటకు)

1. పోడియం గ్లూటాలేటు 5 గ్రా||
గ్లోజనానంకరము ద్విమనస్వ మూడు
సారు నియ్యవలయును.
2. యక్ష స్ఫాక్ట బెలడోనా 1 గ్రా||
పొడాఫయిలం రెజెక్ 1 ,,
నాలుగు మాత్రలుగా వేసి దినచక్షు
మూడు మాత్రల నియ్యవలయును.

.....

సన్నిపాత జ్వరమునందు పేగులలో
నుండి రక్త స్రావమగుట.

(Intestinal Haemorrhage
in Enteric)

- | | |
|------------------------|---------|
| ట్యూనిక ఆసిడ్ | 40 గ్రా |
| రైకర్ మర్ఫియా క్షేద్రా | |
| కర్బుర తైలము | 40 మి |
| గం ఆరేనియా | 20 మి |
| టింక్చర్ క్లార్ ఫాం ౩ | 1 ట్సా |
| అక్వా సెంతా ౨వ | 40 మి |
| | 4 ట్సా |

నాలుగు భాగములుగా వేసి 4 గంటల
కొకసారి నియ్యవలయును.

సన్నిపాత జ్వరము.
(Typhoid Fever)

- | | |
|---------------------------|--------|
| రైకర్ ఆక్సోనియా సిక్రేటన్ | 6 గ్రా |
|---------------------------|--------|

- | | |
|----------------|---------|
| సోడా క్లార్దు | 15 గ్రా |
| టింక్చర్ ఆరంజీ | 1 ,, |
| అక్వా ఆసి | 3 ట్సా |

2 క్లొక్కు బొంబు చొ|| దినమున
గు మూడుసారు నియ్యవలయును.

సన్నిపాత జ్వరమునందు ఉదరము
వాయుపూరిత మగుట

(Tympanites in Enteric)

- | | |
|------------------------|---------|
| రసభస్మము | 1 గ్రా |
| సోడా బైకార్బనము | 30 గ్రా |
| ఎరివిడి భాగములుగా వేసి | 2 గంటల |

కొక పాట్లము నియ్యవలయును.

మూర్ఛ (Epilepsy)

- | | |
|---------------------|---------|
| పొటానియం బ్రొమైడ్ | 30 గ్రా |
| పోడియం బ్రొమైడ్ | 30 గ్రా |
| అక్సోనియా బ్రొమైడ్ | 10 ,, |
| రైకర్ ఆర్సెనికాలిను | 4 మి |
| అక్వా వోలార్టారిం | 2 ట్సా |

1 బొంబు చొ|| దినమునకు రెండుసా
రు నియ్యవలెను.

సెగవ్యాధి (Gonorrhoea)

1. (ప్రథమ గతియందు)
పొటాను బైకార్బనము 1 గ్రా||
పొటాను ఆసిటు 1 గ్రా||
టింక్చర్ ఆక్సోనియా 6 మి||

టింక్చరు హయోసామి
ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు

2 ట్రా
6 ట్రా

ఒక ట్రాన్సు చొ॥ మూడు గంటలకొక
సారి వియ్యవలయును.

2. (ద్వితీయ గతియందు)

హీనియం కాంటాల్ స్పేసి

(చండినీ నూనె)

30 మి

ఓలియం క్యూబెబ్

15 మి॥

బాల్నం కొఫేరా

30 ,,

లెకర్ పొటాసు

30 ,,

స్పిరిట్ యితర్ స్ట్రెస్

1 ట్రా॥

టింక్చర్ హయోసామి

45 మి॥

ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు

3 ట్రా

ఒక ఆవున్ను చొ॥ దినమునకు మూడు
సారు వియ్యవలయును.

(లేక)

బాల్నం కొఫేరా

30 మి॥

పొటాసు స్ట్రెస్

15 గ్రా॥

గం ఆశేనీ నూ (అవసర మైనంత)

ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు

3 ట్రా

ఒక ఆవున్ను చొ॥ దినమునకు మూడు
సారు వియ్యవలయును.

3. (తృతీయ గతియందు)

కాల్సిట్రాట్

15 గ్రా॥

మూడు భాగములుగా చేసి దినమున
కు మూడుసారు వియ్యవలయును.

(లేక)

కొఫేరా, క్యూబెబ్, కాంటాల్ మా
త్రాలు (పెర్సిడేవ్ ఆండ్ కంపెనీ వారి
వలన తయార్ చేయబడినవి.)

నాలుగు గంటల కొక మాత్రా చొ॥
వియ్యవలయును.

4. దీర్ఘ సగవ్యాధికి పిచికారి చేయుటకు జం

కు పర్యాంగనెటు

1/2 గ్రా॥

జలము

1 ట్రా॥

గౌట్ అనువాతరోగము (Gout)

అమ్మోనియా ఫాస్ఫేట్

20 గ్రా॥

అమ్మోనియా ఆయోసైడు

4 గ్రా॥

క్రీసం కాల్షిరం

10 మి॥

ఆక్సాల్లోఫోరం

2 ట్రా॥

ఒక ట్రాన్సు చొ॥ దినమునకు రెండు
సారు వియ్యవలయును.

క్షయవ్యాధియందు శ్వాసకోశముల

నుండి రక్తము వెలువడుట.

(Haemoptysis)

1. మెగ్నీషియం సల్ఫేట్

2 ట్రా॥

క్యాల్షియం ఆసిడ్

15 గ్రా॥

సిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ డిల్యూటు

45 మి॥

టింక్చర్ కార్బం కో

2 ట్రా॥

ఆక్సాల్లోఫోరం

3 ట్రా॥

ఒక ఆవున్ను చొ॥ నాలుగు గంటల వ్యాసారీ యియ్యవలయును.

.....

2. పిల్వాలా ప్లంబికం ఓపియం 1 గ్రా॥

ఒక గ్రా॥ మాత్రా చొ॥ రోగమునకు రోగుసారు లియ్యవలయును.

.....

తలనొప్పి (Headache)

1. ఫెనాసిట్ 5 గ్రా॥
కఫీన్ సిట్రస్ 8 ,,

ఈ రెంటిని గలిపి ఒక మోతాదుగా నియ్యవలయును. తలనొప్పి నెమ్మది లేనియెడల నాలుగు గంటల పిమ్మట మరెయ్యక మోతాదు నియ్యవలయును.

2. టాటాసియం బ్రామైడ్ 15 గ్రా॥
టింక్చర్ శెల్లిమియం 5 మి॥
కఫీన్ సిట్రస్ 2 గ్రా॥
సిరిక్ ఆరంటీ 40 మి॥
ఆక్సాల్లోసాఫరం 1 గ్రా॥

ఇది యంతయు నొక మోతాదుగా నియ్యవలెను. తలనొప్పి నెమ్మది లేనియెడల నాలుగు గంటల పిమ్మట మరెయ్యక మోతాదు నియ్యవలయును.

.....

వెక్కిలి (Hiccough)

సాధుగలిగియుండు వానికి కొన్ని దీర్ఘవ్యాధి నమునకు రెండు మాత్రలు చొ॥ వీరంబును వీరిని, సాధ్య మగునంతవలయును.

నొక వ్యాసము నలిపి యుంచట వలన, నెమ్మదించి పోవును.

2. చల్లని నీటిని దాగ్రిగుట వలన నలిచిపోవచ్చును.

3. ఒక దాము పిరిటియ్య ఆక్సాల్సిమా ఆరోమేటికును ఒక ఆవున్ను జలమునా వేసి పుచ్చు కొనన నయముగా వచ్చును.

4. రుది గ్రెయియల విన్సెట్ సబ్ సెట్రిసును జలమునా గలిపి పుచ్చుకొనిన యొకప్పుడు నయము కావచ్చును.

5. దీర్ఘవ్యాధితమగు నీ వ్యాధియందు ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలను నాలుగు ఆవుయ్యల చు సలగాచిన నీళ్ళలా ఇనువది నిమిషముల కాలముంచి పిమ్మట వడచాసి త్రాగిన చొ॥ వెంటనే వ్యాధి రహితమైనట్లుల తెలియునున్నది.

—

హిస్టేరియా (Hysteria)

1. కెరేయి బ్రామైడ్ 1 గ్రా॥
జెంతు బ్రామైడ్ 1 గ్రా॥
క్లిస్టెల్ బ్రామైడ్ 2 గ్రా॥
పిల్వాలా ఆరోమైడ్ 4 గ్రా॥
ఆసాఫోడా 4 గ్రా॥

వీరి నన్నిటిని రెండు మాత్రలుగావేసి

2. టింక్చర్ వెరియంక్
ఆమ్మోనియేటా
స్పిరిట్ యాల్కొహో
టింక్చర్ ఆసాఫటిడా
ఆక్వా క్యంఫర్

1¹/₂ ద్రా||
1¹/₂ ,,
45 మి||
3 డౌ||

ఒక బొమ్మ మోతాదులో దినమునకు
మూడుసారు లియ్యవలయును.

.....

మూత్రవిసర్జనము స్వాధీనము
తప్పట.

(Incontinence of Urine)

ఇది సామాన్యముగా బిడ్డలలో గలుగు
చుండును. నాలుగు చుక్కల టింక్చర్ బె
డోనాను జలములలో గలిపి సాయం కాలము 4
గంటలకు యియ్యవలయును. బిడ్డ పరుండవోవు
నపుడు చుక్కల నెడే ప్రకారము యియ్యవల
యును. ప్రతిదినమును మోతాదును ఒకచుక్క
చొ॥ పది చుక్కల వరకును హెచ్చించ వల
యును. కొద్ది మోతాదు వలననే ఉపయోగ
ముగ నుండియెడల మోతాదును హెచ్చించి
సవస్థము లేదు.

చలిజ్వరము (లేక) వచ్చుకామాలు
(Jaundice)

ఆమ్మోనియం క్లోరైడ్
టింక్చర్ హైడ్రోఫలిక్
ఆమ్మోనియం

45 గ్రా||
15 మి||

ఇక స్యూజికా జస్సును కొ
ఒక బొమ్మ మోతాదు చొ॥ దినమున
కు మూడుసారు లియ్యవలయును.

.....

చలిజ్వరము (Malaria)

1. క్వింకా సల్ఫేట్ 15 గ్రా||
మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ 3 ద్రా||
ఆమ్మోనియం క్లోరైడ్ 30 గ్రా||
ఆసిడ్ సైట్రో ప్లాడోన్
క్లోర్ డిక్ 80 మి||
ఆక్వా మెంతా పిప్ 3 డౌ||

2. క్వీన్స్ సల్ఫేట్ 15 గ్రా||
ఫెర్రీయ సల్ఫేట్ 3 ,,
మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ 3 ,,
ఆసిడ్ సల్ఫూరిక్
డిబ్యూట్ 30 మి||
ఆక్వా మెంతా పిప్ 3 డౌ||

ఒక బొమ్మ మోతాదులో దినమునకు
మూడుసారు లియ్యవలయును.

.....

చలిజ్వర ఫలితముగ బల్లపెరుగుట

(Enlargment of Spleen)

ఆర్సెనిక్ ఆయోడైడ్ 1 గ్రా||
క్యూరీక్ హైడ్రోక్లోర్ 45 ,,
యెక్స్ట్రాక్టు నెక్సనామికా 8 గ్రా||
సాగ్నాడా 16 ,,

యెక్స్ట్రాక్టు జస్సున (మాత్రీయగుటకు)

32 మాత్రముగా జేసి ఒక్కొక్క మూత్రమును దీనిలో దిశమనకు మూడు సార్లులు పోసి నానంతర ముపయోగింప నగును.

.....

జ్వర ఫలితముగు బల్లకు పైన రాయుటకు వుండు.

1. ఆంగ్యుయంటం హైడ్రాల్ రై ఆయిడెడ్ రూబ్రి ఆంగ్యుయంటం బుడోనా పీహము పైన రాయవలయును.

(తీసి)

2. క్రియోసోట్ లిగమింట్ ఆయిడిస్ పీహము పైన ఒకచతురపు ఆంగ్యుయంటం రాయవలయును,

.....

మెన్జైటిస్ ఇన్ అడ్వల్డ్ (వయస్కులలో)

Meningitis (In Adults)

1. హిస్టోయంట్ బాక్టీరియా హిస్టోయంట్ ఆయిడెడ్ బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడెడ్ ఆక్సాల్ ఫోస్ఫేట్

ఒక టేబుల్ స్పూన్ మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు తియ్యవలయును.

2. హైడ్రాల్ రై ఆయిడెడ్ రూబ్రి ఆంగ్యుయంటం బుడోనా పీహము పైన ఒకచతురపు ఆంగ్యుయంటం రాయవలయును,

కలిపి మూత్రముగా తీసి మూడు రుద్దవలయును.

.....

మూత్రాశ్లేషము వుండు రక్తము గూని, మూత్రాశ్లేషములు నిందించు, ధాతునష్టము కలుగుచు, తీవ్రస్థితి వహించుట

Acute Nephritis (Bright's Disease)

- | | |
|----------------------------|---------|
| హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 45 గ్రా |
| బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 6 గ్రా |
| బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 45 మి |
| బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 45 మి |
| ఆక్సాల్ ఫోస్ఫేట్ | 3 టే |

1 ఆవురన్న మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు.

నెర్వుల సంబంధముగు బలహీనత (Nervous Debility)

- | | |
|----------------------------|---------|
| హిస్టోయంట్ బాక్టీరియా | 45 గ్రా |
| బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 6 గ్రా |
| బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 45 మి |
| బిస్మత్ హిస్టోయంట్ ఆయిడిస్ | 45 మి |
| ఆక్సాల్ ఫోస్ఫేట్ | 3 టే |

ఒక ఆవురన్న మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు తియ్యవలయును.

తీయ న్యాధియందు రాత్రి

చేమటలు

Night Sweats of Phthisis

జింక్ ఆక్సైడ్ 8 గ్రా||
యెస్ట్రాక్ట్ బెలడోనా 1 గ్రా||

నాలుగు మాత్రలుగ జేసి రాత్రిపయం
దుముందు ఒకమాత్ర చొ॥ నేమించ వలయును.

.....

గుండె అదరు (Palpitation)

పొటానియం బ్రొమైడ్ 45 గ్రా||
టింక్చర్ డిజిటాలిస్ 15 మి||
టింక్చర్ కనవలేరియా మజలిస్ 30 మి||
ఆక్వా అసిది 3 డ్రా||

ఒక అవున్సు మోతాదులో దినమనకు
చూడు సాచులు.

.....

పేలు (తలలో) (Lice)

మర్క్యరీ పెర్క్లోరైడ్ ఒక గ్రామును
పది అనువుల వినిగ్లో గలిపి కలకు రాయ
వలయును.

.....

గుండెనంబి (Pericarditis)

1. నొప్పి అధికముగా నుండిన విషయము
లలో గుండెపైన బెలడోనా వలూక్రీని స
న్నని చర్మముపైన యేర్పరచి పట్టువేయుట
చాగుండును.

2. పొటాస్ అసిటను 45 గ్రా||
పొటాస్ అయోడైడ్ 9 గ్రా||
టింక్చర్ డిజిటాలిస్ 15 మి||
ఆక్వా క్లోరోఫారం 3 డ్రా||

ఒక అవున్సు మోతాదులో 3 గంటల
కోసాని యియ్యవలయును.

.....

బిడ్డలయందు యెముకలలో
వట్టు లేకుండుట (Rickets)

1. మాల్టీక్ ఆండ్ కాడ్లివరు ఆయిల్
2. కనవలేరియా
ఈ మందులు నేమించ విధము ఆయా
మందుల సీసాలపై నుండును.

.....

కోరింత దగ్గు

Whooping Cough

(2 సం॥ వయస్సుగల బిడ్డకు)

1. అమ్మోనియం బ్రొమైడ్ 6 గ్రా||
టింక్చర్ బెలడోనా 3 మి||
వైసం ఇసికాక్ 9 మి||
జలము 6 డ్రా||

రెండు ద్రాముల మోతాదులో దిన
మనకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

—

2. ఒకటి లేక రెండు చుక్కలు యూజోలిప్టస్
ఆయిల్ ను రెండు ద్రాముల గోరువెచ్చని
జలములో వేసి బాగుగా కలిపి పెంటనే
యిచ్చవలయును.

3 ఒక సరి|| వయసుగల బిడ్డకు

అయ్యుజిక స్వచ్ఛమైనది

పొటానియం అయ్యుజైడ్

జలము

1 గ్రా||

15 ,,

2 బా||

ఒకదానిని మోతాదులో దినమునకు

మూడుసారు లియ్యవలయును.

దీనిని 24 భాగములుగా చేసి ఒక్కొక్క భాగమును దినమునకు మూడు సారులియ్యవలయును. ఇది బాగుగా పనిచేయుగలదు.

న్యూమోనియా (Pneumonia)

(ప్రథమగతి యందు)

1 అమ్మోనియా కార్బనము 12 గ్రా||

లైకర్ అమ్మోనియా

4 1/2 గ్రా||

సింపురిన్

15 మి||

టింపుర్ డిజిటాలిస్

అక్వా క్లొరోఫారం

3 బా||

ఒక అవున్సు మోతాదులో 4 గం

టల కొకసారి యియ్యవలయును.

(రెండవ)

2 టింపుర్ అమ్మోనియా 4 మి||

లైకం అంటిమోనియాలిస్

16 మి||

సింపురిన్ అమ్మోనియా

అరోమేటిక్ 1 1/2 దా||

ఇట్రోఫ్యూజన్ డిజిటాలిస్

4 దా||

అక్వా క్లొరోఫారం

4 అ||

ఒక అవున్సు మోతాదులో మూడుగం

టల కొకసారి యియ్యవలయును.

4 దిగువయొక్క తెలివైన ముగా నుండినయెడల

సోడియం బ్రామైడ్

6 గ్రా||

క్లోరైడ్ మైడ్రస్

3 ,,

సిరస్

30 మి||

జలము

6 దా||

రెండవ ద్రాముల మోతాదులో దినము

నకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

.....

తయ్యవాధి (Consumption)

1 గ్ల్యుకోజల్ కార్బనము 6 గ్రా||

లియ్యోకాల్

6 ,,

క్రియోసోల్

1 1/2 ,,

క్రిస్టిక్ మ్యూరియను

1 1/2 ,,

మూడు మాత్రలుగా చేసి దినమునకు

మూడు మాత్రలు చొ|| సేవింపవలయును.

(ద్వితీయగతి యందు)

దగ్గు లగ్ని కిఫము అంతరించుచున్న నకు

యములో:-

2 క్రిం ఆఫ్ మోల్ అందు కాల్షియం ఆయిల్

సోడా అయ్యుజైడ్ 6 గ్రా||

ఇట్ క్రియోసోల్ అందు మైట్రోఫారం

అమ్మోనియా కార్బనము 12 ,,

క్రెట్టు (అనెక్ మైట్రో అందు 30)

లైకం యిసికాక్ 30 మి||

టింక్చర్ సింకోనా 30 మి||
స్పిరిట్టు క్లొరోఫానిం 45 మి||
ఇక ఫ్యూజిక పెనిగా 3 డ్రా||
ఒక అవున్సు మోతాదులో నాలుగు
గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

.....

[న్యూమోనియా యొక్క సందిగ్ధ
స్థితియందు)

During Crisis

లైకర్ స్క్విక్ సిక్ కోర్ హైడ్రో 15 మి||
టింక్చర్ కార్బను కో 1 1/2 డ్రా||
స్పిరిట్టు క్లొరో ఫారం 30 మి||
ఆక్సా ఆసిడి 3 డ్రా||
ఒక డ్రాము మోతాదులో 4 గంటల
కొకసారి యియ్యవలయును.

కీళ్ళనొప్పి.

Acute Rheumatism

(తీవ్రస్థితియందు)

1 ఆమ్మోనియా ఫాస్ఫస్ 30 గ్రా||
ఆమ్మోనియా సాలిసైన్ 30 ,,
ఆక్సా క్లొరోఫారం 3 డ్రా||

అవున్సు మోతాదులో దినమునకు మూడు
సార్లు లియ్యవలయును.

2 సోడా సాలిసైలిన్ 30 గ్రా||
పొటాసు బైకార్బరేట్ 30 ,,
స్పిరిట్టు ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ 45 గ్రా||
ఆక్సా క్యాలఫర్ 3 డ్రా||

అవున్సు మోతాదులో దినమునకు మూడు
సార్లు లియ్యవలయును.

(వైస రాయటుకు)

1 లినిమెంటు బెల్డోనా 1 1/2 డ్రా||
లినిమెంటు ఓసియం 1 1/2 ,,
లినిమెంటు మెంతాల్ 1 1/2 ,,
లినిమెంటు క్లొరోఫారం 1 1/2 ,,
ఓలియం సిస్టేను 1 డ్రా||

వీని వన్నిటిని మిశ్రతము చేసి అప్పటికే
భాగమునకు వైస రాయవలయును.

2 ఆసిడ్ సాలిసైలిక్ 1 డ్రా||
టర్పెన్టీన్ 1 ,,
లానోలిన్ 3 ,,
పార్ఫీన్ ఆయింటు మెంటు 5 ,,
ఈ మందువైనను వైసరాయటు కు
యోగించ వచ్చును.

దీర్ఘ వ్యాపిత మగు కీళ్ళనొప్పి

Chronic Rheumatism

పొటాసియం అయోడైడ్ 15 గ్రా||
టింక్చర్ గ్యుయకై ఆమ్మోనియా 45 మి||
ఇక ఫ్యూజిక సారా 3 డ్రా||
ఒక అవున్సు మోతాదులో దినమునకు
మూడుసార్లు లియ్యవలయును.

గొంతునొప్పి (Sore Throat)

పొటాసు క్లోరను 1 గ్రా||

గ్లాస్ మెలైడ్ 1 ద్రా||
అక్వా క్లొరోఫాం 3 ఔ||
ఒక అవున్సు మోతాదు 3 సం||
టల కొక సారి యియ్యవలయును.

.....

1 సం|| వయసుగల బిడ్డకు పండ్లు
వచ్చునపుడు గలుగు కలత

Restless during teething
for 1 year old Child

పొటాసియం బ్రొమైడ్ 6 గ్రా||
టింక్చర్ హయెసామి 20 గ్రా||
స్పిరిట్ నిగ్ట్రోసాం 4 మి||
అక్వా అసి 4 ద్రా||

ఒక ద్రాము మోతాదులో 3 గంటల
కొకసారి యియ్యవలయును.

చిడుము లేక కజ్జి (Itches)

1 సల్ఫర్ సల్ఫిమేటం 1 ద్రా||
బాలెం పెరూవియాని 1 1/2 "||
లానోలిన్ 1 ఔ||
వీని సర్మిటిని గలిపి గజ్జిపై రాయ
వగును.

2. బీటా సాఫ్టర్ 40 గ్రా||
సల్ఫర్ అయింట్ మెంట్ 1 1/2 ద్రా||
కానీక్ 1 ఔ||

వీనిని గలిపి కూడ గజ్జిపై రాయటం వ
చేయవలయును.

గొంతు నొప్పికి గండుగూషము.
Gargle for Sorethroat

ఆలం (పల్లె) 10 గ్రా||
బొరాక్సు (వేలిగారము) 10 "||
పొటాసు క్లొరైడు 10 "||
టింక్చర్ మిర్ 15 మి||
జలము 1 ఔ||

గొంతు బొంగు పోవుట

అతిమధురము వేళ్ళయొక్క పొడి 4 ద్రా||
బాలెం కొనేబా 3 "||
గీనెమినము (తెల్లనిది) 2 ద్రా||

3 గ్రాముల మూత్రలుగా తేసి దిన
మునకు రెండు లేక మూడు మాత్ర లువయ్యె
సించ వలయును.

మశూచి (Small Pox)

రెండు ద్రాముల ఔగర్ ను, జుమ్మతో
గలిపి గాని, కలుపకుండగ గాని, ఉదయమును
సాయంత్రమును పుచ్చుకొను మండిత యెడల,
మశూచి వ్యాపించిన స్థలములందు అవ్యాధి క
గుగకుండ తేయవచ్చునని తెలియచేస్తుంది.

అభ్యాసించుటకు లవణములు.

అమ్మోనియా కాన్స్టెంట్ 1 ఔ||
లెకర్ అమ్మోనియా ఫార్ట్ 15 మి||

బెర్లిమాట్ అయిల్
యూసికాలోక్

10 మి||

30 మి||

వీని నన్నిటిని గలవి గాఢ మూతగలయును.
బుడిలో వేసి నిలువ యుంచవలెను.

.....

కొలుకు వ్యాధి Syphilis

(ప్రథమ గతియందు)

మెర్క్యూరియల్ కలరీ
(గో పుడుడు)

1 గ్రా||

ఒక గ్రాయిను మోతాదులో దినమునకు
కు రెండుసారు లియ్యవలయును.

(లేక)

లైకర్ హైడ్రాక్సైడ్ పెర్ క్లోర్
అక్వా క్లొరోఫారం

1½ డ్రా||

1½ డ్రా||

అర జౌన్ను మోతాదులో దినమునకు
మాడుసారు లియ్యవలయును.

(ద్వితీయ గతియందు)

గో పుడుడు

4 గ్రా||

పర్మిసు ఇసి కాక్ కో

4 గ్రా||

యెక్స్ట్రాక్టు జిప్సమ్ (వలసినంత)

నాలుగు మాత్రలుగా వేసి దినమునకు
4 మాత్రల చొ|| నేనించవలయును.

(తృతీయ గతియందు)

పొటాసు అయోడైడ్

20 మి||

డెవెల్స్ సాల్ఫ్యూరిక్

10 గ్రా||

వికస్ ట్రిపోలియ కో

ప్రెసిడెన్సు కంపెనీ

జలము

}

1 డ్రా||

2 డ్రా||

ఒక జౌన్ను మోతాదులో దినమునకు
రెండు సారులు భోజనానంతర మియ్య వల

ఎలుకలు (Rats)

ఎలుకలబాధ విశేషముగా నున్నచో
ట పిప్పర్మింట్ ఫువ్వయొక్క పలుకులను ఎలు
కలు వంచరించు సానములందు వల్లనయొడలు
వని పారిపోవును.

.....

తలవెండుకల వృద్ధికి

Hair Restorer

టింక్చర్ కెంథారిడిస్ 4 డ్రా||
లైకర్ అమ్మోనియా ఫార్ట్ 2 డ్రా||
గ్లిసెరిక్ 4 ,,
జలము 6 డ్రా||

తలవెండ్రుకల కుదుళ్ళలో రుద్దుట కుప
యోగింప వలయును.

గర్భిణియందు వాంతులు

Vomitting of Pregnancy

1 ఇక్టెక్స్టివిక్ 5 గ్రాయినుల మోతాదులో
దినమునకు మాడుసారు లియ్యవలయును.

2 వైసం ఇసి కాక్ 5 మి||
జలము 10 డ్రా||

రెండు డ్రాయిముల మోతాదులో రెండు
2 డ్రా|| గంటల కొకసారి లియ్యవలయును.

3 టింక్చరు ఆయోడిన్
జలము

4 మి||
1 టౌ||

గొంతుయొక్క
గొంతులో

లేగుదలయొండ
నొయ్యటను

రెండు ద్రామల మోతాదులలో 3
గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

(Throat Paint)

ట్యూబ్ ఆసిడ్	30 గ్రా
పొటాష్ క్లోరైడ్	10 గ్రా
గ్లిసరిన్	1 టౌ

ఒడలు దురదలు (Itching)

1 సోడియం హైపోసల్ఫైట్
యిట్

4 ద్రా||

గ్లిసరిన్
జలము

2 ద్రా||

4 ద్రా||

ఒడలన కంతకును రాసి ఒక ఆరగంట
తరువాత శుభ్రముగా స్నానము చేయ వల
యును.

2 సుమారు 30 గాలనుల కేడిసిర్యలో 1 టౌ
నున్న కలిగారపు పొడియను ఒక టౌను
సోడా లైకార్బోనేటును గలిపి స్నానము
చేయవలయును.

3 కార్బలిక్ ఆసిడ్
గ్లిసరిన్
పబ్లియ

2 ద్రా||

1 ,,

8 టౌ

స్పంజి యిందులో ముంచి ఒడలుగ
కద్దవలయును.

శరీరమునం దచ్చటచ్చటగాని లేక

గొంతు భాగమునందు గాని

కంతు లేర్పడుట (Scrofula)

1 నీరపు థైరాయి ఆయోడైడ్ ఒకద్రామ
మోతాదును ఒక టౌన్ను జలములో గలిపి
ఫోస్ఫోరస్ ఆమ్లము దీనిమునకు రెండుసార్లు
లియ్యవలయును.

2 పైమండలో పొటు మాట్ చేరిన కాడ్
లివరు ఆయిల్ ను సూడ పై ప్రకారము
యియ్యవలయును.

వండ్ల పొడి Tooth Powder

బోరిక్ ఆసిడ్	40 గ్రా
పొటాసు క్లోరైడ్	30 ,,
రబిన్ గ్లూకోజ్	20 ,,
నీరునున్న పొడి	1 ద్రా
మెగ్నీసియం కార్బోనటు	5 1/2 ద్రా

పంటి నొప్పి Toothache

యాలకు ఆరిఖును లింబులో ముంచి

పంటి రంధ్రములో నుంచవలయును.

దీని నన్నిటిని గలిపి బాగుగా నూరవల
యును.

జ్వరమునకు మందు

Fever Mixture

ఫాటాన్ సిట్రస్	1 దా
స్పిరిట్ యూథర్ నైట్రస్	5 ,,
నిమ్మ పిరబరు	5 ,,
లైకర్ ఆమ్మోయా ఆసిటిసిసు	2 ఔ

ఒకదానిము మోతాదులో మూడు సంవత్సరముల వయసుగల శిశువు రెండు గంటల కొకసారి యియ్యవలయును. పెద్దవారికి సంవత్సరమునకు 10 చుక్కలు చొప్పున మోతాదు హెచ్చించ వలయును. వయస్కులకు 5 ద్రాముల మోతాదులో నియ్యవగును.

గుండెవ్యాధి (Heart Disease)

(మూడే ముఖ్య సూత్రములు)

1. అలసట కలుగకుండ శరీర పరిశ్రమ చేయవలయును.
2. ఉద్రేకమును బుట్టించకుండ బలమునుగలుగజేయు పదార్థముల భుజింప వలయును.
3. కాంతతతో గూడిన ఉల్లాసమును వహించవలయును.

తాపర (Ringworm)

1. తామరభాగమును గుబ్బితో గడిగి యీ క్రిందిమిశ్రితావధమును పైపరాయవలయును.

అయోడిన్	10 గ్రా
కర్పూర కైలము	1 ఔ

2. సోడియం హైపొసల్ ఫైట్ మును 1 ఔన్సు జలములో గలిపి లేపనము చేయవలయును.

3. క్రైసోసోనిక్ ఆసిడ్ 1 దా
వాస్లీన్ 10 ,,
దీనిపైన రాసిన నుపయోగించ గలదు.

4. రసభస్మము 1 దా
టింక్చర్ అయోడిన్ 1 ఔ
దీనిని అస్వస్థ భాగమున బ్రిష్తో రాయవలయును.

5. జోర్క్ ఆసిడ్ 1 దా
జలము 8 ఔ
దీనిని విరివిగా రాయవచ్చును.

మూలశంక (Piles)

1. యక్షాన్త్ర హమామలిను 2 ఔ
యెక్షాన్త్ర హైద్రాస్తిను
కనాడెస్సిను 2 ఔ
టింక్చర్ బెంజాయిక్ ఆ 2 ,,
టింక్చర్ బెలడోనా 4 ద్రా
ఆలివు ఆయిల్ 4 ఔ
కార్బాలిను ఆసిడ్ 1 ద్రా
ఆనన స్థానమున రాయవలయును.

2. బెలడోనా ఆయిల్ మోరట్ 2 ఔ
హారతి కర్పూరము 1 దా

టింగ్స్ క్యాంఫర్ 3 1 ద్రా||
విశేష మాధతో గూడిన మూలకంక వ్యాధి
యం దిది ఉపయోగముగ నుండ గలదు. (పె
న రాయటకు మాత్రమే)

3 ఈవ్యాధిచే బాధనొందువారు సాధు విశే
షన కారుల నుపయోగించుచు మలబద్ధము లే
కుండ జేసికొన వలయును.

నలిపురుగులు

Thread Worms

నిడ్డలకు 1 మొదలు 3 గ్రాముల వర
కు కాంట్రాసినును కొంచెము చక్కెరతో గలిపి
రాత్రి పడుడలోపు వేళయిచ్చి ఉదయమున
ఒక మోతాదు చిట్టాముదమునియ్యవలయును.

పెద్దవారలకు యిదేరికి రెట్టింపు మో
తాదులో నియ్యవలయును.

.....

సీటిక పాములు.

Round Worms

(నిడ్డలకు)

కాంట్రాసిను 1 గ్రాము 3 గ్రాముల వరకు
1 గ్రాము మొ|| 1 గ్రాము వలసినంత చ
క్కెర.

వీని నన్నిటిని గలిపి రాత్రి పడుడలోపు
ముంపర సేవించి ఉదయముననే ఒక మోతాదు
చిట్టాముదము నియ్యవలయును.

పెద్దవారలకు దీనికి రెట్టింపు మోతాదు
యిదేరికారము నియ్యవలయును.

పొంగువచ్చు ద్రవపదార్థములు (Effervescent Mixtures)

1. 20 గ్రాముల పొటాసు ట్రైకార్బోనేటును రెండు బౌన్సుల జలమునందు
గలిపి, లోనకు పుచ్చుకొను మందు 14 గ్రాముల నిట్టిక అసిడ్ను కలుప వలయును.
(కడుపు ఉబ్బరమునకు).

2. 17 గ్రాముల సోడా ట్రైకార్బోనేటును రెండు బౌన్సుల జలమునందు గలిపి
పిచ్చుట 10 గ్రాముల నిట్టిక అసిడ్ను గలిపి పుచ్చుకొన వలయును. (కడుపు ఉబ్బర
మునకు.)

3. 2 ద్రాముల సోడా ట్రైకార్బోనేటును 8 బౌన్సుల జలములో గలిపి ఒకబుడ్డి
లో నుంచవలయును. 1 ద్రాము టార్టారిక్ అసిడ్ను 4 బౌన్సుల జలములో గలిపి వేరు
బుడ్డి నుంచవలయును. 4 ద్రాముల సోడా మిక్స్చరును 2 ద్రాముల అసిడ్ మిక్స్చరుతో
గలిపి పుచ్చుకొన వలయును. స్వరమునకును, గర్భవతిలకు వాడరాదునపుడును, యియ్యవలయును.

లైంవాటరు (Lime Water)

కుభ్రామైన రెండు పైంటు చల్లని నీళ్ళలో ఒక అరబౌన్సు కాల్షి యార్బిన సున్నము నుగలిపి మూడు గంటల కాలము దానిని నిలువచేయ వలయును. అనెను గాలి చొరకుండునట్లు మూతను జాగ్రత్తగా నుంచవలయును. దీనిని ప్రికరెండు దినములకును కొత్తగా చేసికొనుట మంచిది. మోతాదు ఒకబౌన్సు మొదలుకొని మూడు అవున్సుల వరకును యీ యనగును. పిల్లలకు పండ్లు వచ్చునపుడును, విరేచనము అగునపుడును, ఆజీర్తికిని, కాలరాకును ఉపయోగింప నగును.

ఆల్టరేటివులు (Alteratives)

రక్తము యొక్క స్థితిని మార్పునట్టిగాని, శరీరమునందు కొన్ని ద్రవముల ప్రసరింపజేయు, మూత్ర గ్రంథుల యొక్క, కారిజము యొక్క, ప్రేగులయొక్క, గతులను మార్పునట్టిగాని, మందులకు ఆల్టరేటివులని పేరు.

పొటాసియం బ్రొమైడ్

1 ద్రా||

జలము

6 డ్రా||

బాగుగా కలిపిన పిమ్మట దినమునకు 3 పర్యాయములు ఒక్కొక్క అవున్సు చొ|| నీయవలయును. నరములు, మొదలతో సంబంధించిన వ్యాధుల కీయనగును.

2. పొటాసియం బ్రొమైడ్

30 గ్రా||

స్పిరిట్ ఈథర్ సైట్రస్

30 మి||

తెల్లని చక్కెర

1 ద్రా||

జలము

1½ డ్రా||

బాగుగా కలిపి ఒకటి రెండు సంవత్సరముల వయసుగల బిడ్డకు రెండు గంటల కొకసారి ఒకద్రాము చొప్పున నీయవలయును. రెండు సంవత్సరముల పిమ్మట రెండు ద్రాములు యీయవచ్చును. పసిపిల్లలకు జ్వరముపైన వగత గలిగినప్పుడు కీయవలయును. దీనికి చంటిబిడ్డగూడ మని వాడుక గలదు.

3. పొటాసియం అయోడైడ్

1 ద్రా||

జలము

8 డ్రా||

బాగుగా కలిపిన పిమ్మట, దినమునకు మూడుసార్లు ఒక్కొక్క అవున్సు చొప్పున నీయవలయును. కొడుకువ్యాధి కుపయోగింప నగును.

4. పొటాసియం థైయోసల్ఫేటు

15 గ్రా||

అయిల్ ఆఫ్ అనిసీడ్

2 మి||

జలము

1½ డ్రా||

ఆరు మాసములు మొదలు ఒక సంవత్సరము వరకు వయసుగల బిడ్డకు, కడుపు ఉబ్బరముగా నుండినపుడు ఒకదానిని యియ్య వలయును. ఆరు మాసముల లోపు వయసుగల బిడ్డకు ఆరద్రాము యియ్యవలయును.

అస్ట్రింగెంట్లు (Astringents)

దేహమందలి నానా భాగములయందు పనిచేయుట వలన వివిధ అవయవములనుండి వెలువడు ద్రావపదార్థ పరిమాణములను తగ్గించు ఆవునదగములు అస్ట్రింగెంట్లు అనవడును. రక్తము స్రవించునపుడు ఆయాస్థానములయందు వివిధ పదార్థాగింపబడిన యెడల చిన్న రక్తనాళములయొక్క మూతులు మూడుచుకొన జేయుట రక్తస్రావము నిలుపుచేయు చదును.

1. ఆలం (వటిక) పొడి

జలము

1 చా॥
8 టా॥

నాలుగు గంటల కొక జొన్న చొప్పున నీయవలయును. గర్భస్రావమునకు, అతి స్రావమునకు, దీర్ఘవిరేచన వ్యాధికి, ఉపయోగించ నగును. కురుపులు కలిగినపుడును ఉపయోగించ నగును.

2. నీటితో గలిపిన సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్ (డైల్యూట్)

టింక్చర్ ఆఫ్ జింకర్

జలము

2 చా॥
1 డ్రా॥
8 టా॥

నాలుగు గంటల కొక ఆవున్ను చొప్పున నీయవలయును. గర్భస్రావమునకును క్వాత కొకములనుండి రక్తము వచ్చుటకును, అజీర్తిని యియ్యనగును. ఈమందు పుచ్చకాసన పిచ్చుట నీటితో తుక్కిలించి తిమ్మి వెయ్యవలయును.

3. అసిటుట్ ఆఫ్ రెడ్

టింక్చర్ ఆఫ్ క్రిమియం

జలము

3 గ్రా॥
5 మి॥
1½ టా॥

వ్రతి మూడు గంటలకుగాని నాలుగు గంటలకుగాని పుచ్చకొన వలయును. క్వాత కొకముల నుండిగాని, పేగుల నుండిగాని, రక్తము స్రవించుట జేయనగును.

4. నీటితో గలిపిన సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్ (డైల్యూట్)

టింక్చర్ ఆఫ్ క్రిమియం

జలము

20 టా॥
8 మి॥
1½ టా॥

దీక్షమునకు మూడు పర్యాయము లీయవలయును, క్వాతకొక మూలనుండియు, అన్ని కొకములనుండియు రక్తము వచ్చునపుడు జేయవలయును. అజీర్తి విరేచనములకును కాలరాంతుండును చనికెచ్చును. ఆరుమాసముల బిడ్డకు అగద్రాము యియ్యవలయును. క్వాతకొక మూలము

నుండునందు సుమారు ఒకచుక్క ట్రిక్లార్ ఓసియం ఉండును. బిడ్డయొక్క వయస్సునుబట్టి సంవత్సరమున కొకచాచిము చొ॥ యీ మందును యియ్యవచ్చును. ఓసియం కలిసియున్న పృథిమందును బిడ్డకు బహుభాగ్య త్రతో నీయవలసి యుండును. నాలుగు గంటలకంటె నెక్కువ తేలిచుగ నీమందును యియ్యగూడదు.

5. గాలిక్ ఆసిడ్

5 గ్రా॥

జలము

2 అ॥

దినమునకు మూడుసార్లు లీయవలయును. క్యానకోశముల నుండిగాని అన్నకోశము నుండిగాని రక్తము వచ్చుటయందును, స్క్విర్లయందును, అజీర్తియందును, అజీర్తి విరేచనముల యందును, అతి విరేచనములయందును, యీమందు నీయవచ్చును.

6. అసిటేట్ ఆఫ్ లెడ్

3 గ్రా॥

యష్టాన్నిప్త ఆఫ్ ఓసియం

2 గ్రా॥

బాగుగా కలిపి మాత్రగా జేయవలయును. ఒక్కొక్క మాత్రా చొప్పున దినము నకు మూడుసార్లు పుచ్చుకొన వలయును. రక్తస్రావమును కుపయోగించును. అజీర్తి విరేచనములయందును, అతివిరేచనములయందును ఉపయోగించును.

7. పల్విన క్రిటా ఆరోమేటికు కం ఓసియం

5 గ్రా॥

సోడా బైకార్బనను

1 ,,

ఆలం (పటిక) పొడి

1 ,,

పవుడరుగా చేయవలయును. విరేచనములయందు పృథిరాత్రియును, ఆవస్థ మయితే ఉదయమునను రాత్రియుగూడ, ఒక పవుడరు పుచ్చుకొన వలయును. అతి విరేచనముల యందును, బిడ్డలకు అజీర్తి విరేచనముల యందును ఉపయోగింప వచ్చును.

2½ పం॥ మొదలు 2 పం॥ వరకును వయసుగలిగిన బిడ్డకు 5 గ్రాముల పల్విన క్రిటా ఆరోమేటికు కం ఓసియం యియ్య వచ్చును. ఇందులో ఓసియం 1/8 గ్రామును ఉండును. ఒక సంవత్సరము వయసునం దిందులో సగము యియ్యవలయును. ఆరుమాసముల వయసునం దిందులో నాలుగవంతు యియ్యవచ్చును.

డయూరిటిక్సు - డయఫారిటిక్సు - (Diuretics Diaphoretics)

మాత్రా గ్రంథుల వైసయును, మాత్రకోశముల వైసయును పనిచేయుటవలన మాత్రమును వృద్ధిపరచుకొని మందుకు డయూరిటిక్సు అనిపేరు. ఈ మందులలోనే విశేషము మర్మభాగములయందు పనిచేసి చెనుటను అధిక పరమ గణమును గలిగియుండుటచే డయఫారిటిక్సు అనియు పిలువబడును.

1. పొటాసు వైట్రిసు
స్పిరిట్ ఈతర్ వైట్రిసు
జలము

1 ద్రా||
3 ద్రా||
8 ఆ||

పాలుగు గంటల కొకసారి ఒక్కొక్క అవున్ను చొప్పున నీయవలయును. జ్వరము నందును, మాత్రమును వృద్ధి పరచుటకును, యియ్యనగును.

2. పొటాసు వైట్రిసు
స్పిరిట్ ఈతర్ వైట్రిసు
వైట్ ఆఫ్ కార్బిక్
జలము

40 గ్రా||
2 ద్రా||
3 ద్రా||
8 ఆ||

దినమునకు మూడు పర్యాయములు ఒక్కొక్క అవున్ను చొప్పున నీయవలయును. కీళ్లనొప్పిలయందు నీయనగును.

3. పొటాసు వైట్రిసు
స్పిరిట్ ఈతర్ వైట్రిసు
టింక్చర్ ఆఫ్ కెంఠారిజీన్
జలము

40 గ్రా||
2 ,,
2 ద్రా||
8 జూ||

కాలరాయందు మాత్రము బంధించినప్పుడు మూడు గంటల కొక అవున్ను చొప్పున నీయనగును.

కఫహారులు - (Expectorants)

క్వాసకోశములకు బోవు వాయుమార్గముల యందును, కొంతవరకు దేహముంతటను బురిచేయుటవలన దగ్గు, ఉబ్బిసము మొదలగు క్వాసవ్యాధులలో క్వాసకోశముల యందును, క్వాసకోశములకు సంబంధించిన తిత్తులయందును స్థవించు ద్రవపదార్థములను విరిచివచ్చుటకు ఉపయోగించు వందులు యొకపెద్దగంటలు (కఫహారులు) అనబడును.

1. స్పిరిట్ ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్
స్పిరిట్ ఈతర్ వైట్రిస్
టింక్చర్ బెంజినిస్
జలము

2 ద్రా||
4 ,,
1 ,,
6 జూ||

రెండు గంటలు లేక మూడుగంటల కొకపర్యాయము ఒక్కొక్క అవున్ను చొప్పున నీయవలయును. ఉబ్బిసపుదగ్గు యొక్క ఉచిత స్థితియందు దీక్షనగును.

- 2 క్వాంథర్
ఇవికాక్ పుడు

1 గ్రా||
3 ,,

కొంచెము జగురుతో కలిపి మాత్రగా నీయవలయును. ఉబ్బిసమునందు రెండు గంటల కొకమాత్ర పుచ్చుకొన వచ్చును.

3. మెగ్నీసియా కార్బనెట్

25 గ్రా॥

పెపర్ మింట్ ఆయిల్

2 మి॥

జలము

1 జా॥

ఒకటి రెండు సంవత్సరముల వయసుగల బిడ్డకు కోరినంత దగ్గునందు దినమునకు మూడు లేక నాలుగు పర్యాయములు ఒకదానిని చొప్పున నీయవచ్చును. మందు పాడుటకు ముందుగా బుడ్డివి కడలించ వలయును.

బలవర్ధకావధములు (Tonics)

శరీరము లోపించజేయు వ్యాధులచే బీడింపబడిన పిమ్మట స్వస్థావస్థయందు బలము నందుట కీయవగిన అవుషధములకు బలవర్ధక కావధములు (Tonics) అనిపేరు. ఇవి శరీరము నందు ఉద్రోకమును బుట్టించుక నెమ్మదిగా బనిచేయును. లోహసంబంధముగల బలవర్ధకావధములు రక్తమునందలి లోహము సంబంధముగల లోహమును బూర్తిచేయును.

1. క్వినీన్ సల్ఫేటు

20 గ్రా॥

పెర్రీవైన్

2 జా॥

జలము

8 జా॥

బాగుగ కలిపి, ఒక అవున్సు చొప్పున దినమునకు మూడుసార్లు తీయవలయును.

2. క్వినీన్ సల్ఫేటు

24 గ్రా॥

నిమ్మరసము (నిమ్మకాయలనుండి అప్పడు తీసివది)

2 దా॥

జలము

8 జా॥

బాగుగ కలిపి, ఒక అవున్సు చొప్పున దినమునకు మూడుసార్లు తీయవలయును.

3. ఫెర్రీయ యెట్ క్వినీన్ సిట్రేసు

40 గ్రా॥

జలము

8 జా॥

బాగుగా కలిపి, మూడు లేక నాలుగు గంటలకు ఒక అవున్సు చొప్పున పుచ్చుకొన వలయును. ఈమందు పుచ్చుకొనిన పిమ్మట నూరు కడుగుకొన వలయును. లోహసంబంధముగల అవుషధము లన్నియు విశేషమునకు నలవురంగును పుట్టించును.

4. టెంక్వర్ ఫెర్రీయ పెర్రీవైన్

2 దా॥

జలము

8 జా॥

ఒకొక అవున్సు చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు పుచ్చుకొన వలయును. పొందురోగము నందును, నీరసవ్యాధి యందును, యీయవగను. మందు పుచ్చుకొనిన పిమ్మట నోరు కడుగుకొన వలయును.

5. క్వినీన్ సల్ఫేట్

24 గ్రా॥

ఫెర్రీయ సల్ఫేట్

24 ,,

సగిషును సల్పేట

జలము సున్నానాకీ అనిపి (సీతాలో గలిపిన)

జలము

1 జా
2 కా
12 జా

మోతాదుకు ఒక అవున్సు చొప్పున దినమునకు మూడుసార్లు యీ యవలయును.

6. సల్ఫో ఆఫ్ ఐరన్

క్రిస్టల్ సల్ఫో

జలము సున్నానాకీ అనిపి

సల్ఫో ఆఫ్ సోడా

తెల్లని చక్కెర

జలము

9 జా
12 ,,
1 ,,
1 జా
2 కా
12 జా

ఒక అవున్సు చొప్పున దినమునకు రెండు లేక మూడుసార్లు పువ్వుకొవ వలయును. విరేచన బలముతో గూడినట్టియు నొప్పితో గూడినట్టియు బుచ్చుప్రావము యీ యవలయును. కారణజ్ఞేహ వ్యాధులయందు బలవర్ధకౌషధముగ నీయవచ్చును.

కుష్ఠవ్యాధి (Leprosy)

చాలా ముగ్ధులు ఆయిల్ ను వ్యాధి ఆవరించిన స్థలమునందు దినమునకు 20 నిమిషముల కాలము రద్దవలయును; ఈ మందుకే పీలియం గ్రూనోక్రాడ్టీ అను నేరుగూడ కలదు. దీనిని 10 మినిముల మోతాదులలో పాలలో గలిపి, దినమునకు మూడుసార్లు లోపగీయ వలయును. మోతాదును రెండుద్రాముల వరకు క్రమముగా పెంచువలయును. ఈవిధికి 6 లేక 7 సంవత్సరములవరకు చేయ వలసి యుండును.

గవదలు (Mumps)

సాధు విరేచనకారిగ పనిచేయుటకు మొదటగా చిట్టాను దము నియ్యవలయును. పిమ్మట యీ క్రింది మందు నియ్యవలయును.

పొటాషియం బ్రొమైడ్

సోడాపిటిస్

కఫీన్ పిట్రీసు

20 గ్రా
8 గ్రా
2 ,,

దీని నన్నిటిని గలిపి 4 మోతాదులుగ నీయవలయును. 8 లేక 10 సంవత్సరముల వయసుగల బిడ్డకు, మొదటి మోతాదును యిచ్చిన పిమ్మట, రెండవ మోతాదును 4 గంటల తరువాతయును, మూడవ మోతాదును 6 గంటల అనంతరమును నియ్యవలయును. పిమ్మట పొటాషియం బ్రొమైడ్ అరగంబు కొక మోతాదు చొప్పున 4 మోతాదుల నియ్యవలయును. పిమ్మట పొటాషియం బ్రొమైడ్ అరగంబు కొక మోతాదు నియ్యవలయును.

వాపుదల భాగముల వేడి కాపడములను గాచవలయును. వ్యాధికాలమందు తేలికగ జీర్ణమగు పదార్థములను మాత్రమే పుచ్చుకొన వలయును. పాలను, రొట్టెను పుచ్చుకొన వచ్చును. వాపుదల పోవువరకును నమలుటను మానివేయ వలయును.

గోరుచుట్టు - (Whitlow)

పార్శ్వభ్రమునందు బలమగు విరేచనకారి నియ్యవలయును. ఆస్వస్థత భాగమునకు రెండు గంటల కొకసారి వేడి కాపడముల నిచ్చి, చేతిని యెత్తిపెట్టు సితిలానుచ వలయును. చీము మొదలగు చెడు పదార్థములను వెలిపుచ్చుటకుగాను సామాన్యముగ శస్త్రము అవసరమగును. ఇందును గురించి ఆశ్రద్ధజేసిన యెడల, ఒకప్పుడు వేలునకును, మరి యొకప్పుడు ప్రాణమునకుగూడ, అపాయము కలుగవచ్చును. రోగికి క్రమమైన ఆహారము నిచ్చుచు అవసరమైన యెడల బలవర్ధకాషణముల గూడ నియ్యవగును.

మూత్రకృచ్ఛము (Stone in the Bladder)

మూత్రకృచ్ఛ సంబంధమగు తెర కలిగినపుడు బాధ కుపకాంతిని గలుగజేయ వలయును. రోగిని వేడినీళ్ల రొట్టెలో గుచ్చుండజెట్టి, 25 గ్రాయినుల క్లారల్ హైడ్రేస్ ను నియ్యవలయును. బాధ తగ్గనియెడల 8 గంటలకు మరల నియ్యవలయును. నడుముపై వేడి కాపడములను గాచవలయును. మలబంధ ముండినయెడల, విరేచనకారి నియ్యవలయును. బాల్డ్ సీల్ఫును విశేషముగ ద్రాగవలయును.

ఎరుపు మూత్రకృచ్ఛ ముండినయెడల, కొకసంబంధమగు ఆహారములను మాత్రమే భుజింపవలయును. 10 గ్రాయినుల బొటాస్ ట్రైకార్బనైట్ ను ఒకబైన్ను జలములో గలపుచు, దినమునకు మూడుపర్యాయములు పుచ్చుకొనవలయును. విరేచనకారి నప్పుడప్పుడు ఉపయోగించు చుండవలయును. పైపరజీక్ (Piperazine) అను ఔషధము మిగుల ఉపయోగము. దీనియొక్క మోతాదు 4 గ్రాయినులు మొదలు 10 గ్రాయినుల వరకు అయియున్నది.

తెలుపు మూత్రకృచ్ఛమునందు, డెల్టాట్ (నీటిలో గలవిక) ట్రైట్రిక్ ఆసిడ్ 20 మినిములను నాలుగు ఆవున్నులజలములో గలిపి నియ్యవలయును. క్విన్సను బలవర్ధకావధముగ నియ్యవగును.

మూత్రకృచ్ఛముయొక్క ఆగ్నితరగతులయందును మంచినీళ్లు సెక్కువగ ద్రాగవలయును. ఒక టంబ్లరు ఉడకబడినీళ్లును, ఉడయచునను, మధ్యాహ్నమునను, సాయంత్రమునను, ద్రాగి చుండవలయును. భోజనమును ద్వ్యధిరముగ జేయవలసి యుండును; విస్తారము నేపు పడుడి ముండ కూడదు. అట్లు చేసినయెడల, మూత్రకృచ్ఛ మేర్పడుట కవుపు ఎక్కువగును. వేడిస్నానములు, మొరటు తువ్వారీలో సెక్కువగ దుడుచుకొనుట, ప్లెవర్ డుస్టులు, నిస్సాగిను గలుగజేయని శరీర సాధకము, అవసరములయి యున్నవి.

వాంతులు (జీర్ణకోశ సంబంధమగు - (Vomitting-Gastric)

లిస్థోత్ సజ్ నైట్రస్ గాని, లిస్థోత్ కార్బోనస్ గాని, 10 గ్రాముల మోతాదులో 4 గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

వాంతులతో గూడ, తలనొప్పి, జ్వరత, ఒడలంతయు నొప్పి, యుండి యుండిన యెడల ఒక్కొక్క మోతాదునందు 5 గ్రాముల డోవర్స్ పౌడరును గూడ గలిపిన యెడల మంత్రమువలె పనిచేయును.

డోవర్స్ పౌడరులో నల్లమందు ఉండును. గనుక, విషజీవనము కొందరి వయస్కులకునుగూడ, యీ పౌడరు శరీరతత్వమునకు సరిపడక పోవచ్చునుగాన, దీనిని మునిగిసి ఒక్కొక్క మోతాదునందు పెన్సిసియం కార్బోనస్ 10 గ్రాములను గలపవలయును.

అతిసార విరేచనములు (దీర్ఘవ్యాపితమగు) - (Diarrhoea Chronic)

యక్ష్మాన్త్రే కేలి లిక్విడ్

4 ట్రా||

స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం

20 మి

జలము

4 లి

6 గంటల కొక అవున్సు చొ|| యియ్యవలెను.

వీర్యనష్టము (Spermatorrhea) ✓

1 యక్ష్మాన్త్రే డామియానా లిక్విడ్

1½ ట్రా||

టింక్చర్ జింజిబెరిను

20 మి

కొంచెము చక్కెర

జలము

3 లి

ఒక్కొక్క అవున్సు మోతాదుగా దినమునకు మూడుసార్లు లియ్యవలయును.

2. యక్ష్మాన్త్రే డామియానా సాలిడి ను 2 గ్రాముల మొత్తమున దినమునకు రెండుసార్లు చొ|| సేవించవలయును.

3. రోగి సంతోషముగ నుండువలయును. గట్టిపొన్నులపై బానించుకొనవలయును. కఠినమునకు రాదు. చల్లని నీటితో శరీరస్నానము చేయవలయును.

పాముకాటు - (Snake Bite)

పాముకాటునకు వెంటనే చికిత్స చేయవలయును. లేనిచో లాభముండదు. కాటునకు సమీపమైన, అనగా కాటునకు కొంచెముగా పైయెత్తున, గట్టిగా కట్టును కట్టి పడునైన చిన్న కత్తిని దీపముపైనగాచి, యీకత్తితో కాటుస్థానమున ... గర్భరూపమున గీరవలయును. ఇట్లు గీరుట మూలమున వచ్చిన రక్తమును పీలెనంతవరకు పిండివేసి, అగాయమునందు కొంచెము పొటాను పర్మాంగనేట్ పొడిని చొప్పించి దానిని బాగుగా గాయములోనికి రుద్దవలయును.

రోగికి మగత గలుగుచుండిన యెడల 10 చుక్కల లిక్కర్ ఆమ్మోనియాను ఒక టేస్పూ జలములో వేసి యియ్యవలయును. అవసరమని తోచినయెడల యీమందును మరల యిచ్చుచుండ వలయును.

తేలుకాటు (Scorpion Sting)

విసిగర్ను కాటుపైన గట్టిగా రుద్దవలయును.

నొప్పి నయము కానియెడల, పటికను కొవ్వువృత్తి దీపముపైన కరిగించి దానిని వెంటనే కుట్టిన స్థానమున అద్దవలయును.

కుట్టిన వెంటనే చల్లని జలమును త్రాగిన యెడల బాధ వ్యాపింపకుండ నుండున చెప్పుదురు.

పులిపిరి కాయలు - (Warts)

స్వచ్ఛమైన నైట్రిక్ ఆసిడ్ను నూక్కుముగా పులిపిరికాయలపై నద్దవలయును

అనుక్రమణిక 2

ఏ బౌద్ధధర్మోగము సంక్షేపము జలము 4 అవునులు అని ప్రాచీనయుద్ధిం యెడల మిశ్రితౌషధ వంతయు 4 అవునులు అగువరకును జలమును గలుపవలయునని తెలిసికొనవలయును. ఇటులనే యిట్టి ప్రతివిషయమునందును గ్రహింపవలయును.

ఇక పూర్వజ్ఞ సార్వా అనగా సుగంధపాల కషాయము.

ఇక పూర్వజ్ఞ డిజిటాలిను అనగా డిజిటాలిను ఆమలతో జీసిన కషాయము దీనికి బదులుగా టింక్చరు డిజిటాలినును మోతాదు ఒకటికి 5 మినిముల వాగ్గలిపి తక్కిన భాగమును జలమును గలుపుకొనవచ్చును.

ఇక పూర్వజ్ఞ బక్కు, ఇక పూర్వజ్ఞ సెరిగా, ఇక పూర్వజ్ఞ సెన్నా. ఇక పూర్వజ్ఞ జన్జీ-పీటియన్నిటి విషయములలోను ఆయా కషాయములు పండ్ల పడనపుడు ఆయా టింక్చర్లను మోతాదు సనుసరించి సూక్ష్మముగా గలిపి, తక్కిన భాగమునకు జలమును గలుపవలయును. మోతాదు ఒకటికి టింక్చర్ల కొన్ని మినిములలో మాత్రమే ఉండునని గ్రహింపవలయును.

అక్వాక్లోరోఫారమునకు బదులుగా ప్రతిఅవున్న మిశ్రితౌషధమును 10 మి. స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారమును గలుపుకొని తక్కినది జలమును గలుపుకొనవలయును.

స్పిరిట్సుక్యాంఫరు, తూరిక ప్రకారము 1 చాచీము అల్కహాలును, 1 చాచీము హారతిరూపరమును గలిపిన యెడల స్పిరిట్స్ క్యాంఫరు అగును.

అక్వా క్యాంఫరు కావలసినవచ్చినపుడు ప్రతిఅవున్న మిశ్రితౌషధమును 2 లేక 3 మినిముల స్పిరిట్స్ క్యాంఫరును గలుపుకొని తక్కినది జలమును గలుపుకొనవలయును.

అక్వా ఆనీరి కావలసి వచ్చినపుడు యిందు సంబంధమును చూచును, అనగా ఓలియం అనీరిని మిశ్రితౌషధమున కంతవను 1 లేక 2 చుక్కలను గలిపినచాలును.

మిస్టూరా సెన్నాతో సుదర్భ పడనపుడు శండప పక్షముగా టింక్చరు సెన్నా కొను ఉపయోగింపవచ్చును. కాని టింక్చరులొక్క మోతాదు $\frac{1}{2}$ చాచీము మొదలు 1 చాచీమువరకు మాత్రమే అయియున్న సంగతిని గమనింపవలయును.

అక్వా మెంథా పీప్సు ఉపయోగింపవలసి వచ్చినపుడు మిశ్రితౌషధమునకు వంతను 3 లేక 4 చుక్కలు పెప్పర్మింట్లు ఆయిల్ ను ఉపయోగింపవచ్చును.

పింప్ ఆరంటి సుదర్భ పడనపుడు మోతాదు ఒకటికి 5 మి. చొప్పున టింక్చరు ఆరంటిని గలిపి, కొంచెము చక్కరమునూడ మిశ్రితముచేసి, తక్కినది జలభాగమును గలుపువలయును.

అసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ డైల్యూట్ను చేయుటగాను 4 ద్రాముల సల్ఫ్యూరిక్ అసిడ్ను 40 ద్రాముల జలములో నెమ్మదిగా గలుపుచు, చల్లదన పిమ్మట మరి 8½ ద్రాముల జలమును మరిల గలుపవలయును.

అసిడ్ సైట్రిక్ హైడ్రోక్లోరు డైల్యూట్ను తయారు చేయుటగాను, 3 భాగములు సైట్రిక్ అసిడ్ 4 భాగములు హైడ్రోక్లోరిక్ అసిడ్, జలము 25 భాగములు వీని నన్నిటిని గలిపి నిలువ యంచుకొనవలయును.

తైకరు ఆమ్లనియా అసిటేటిను [డైల్యూట్]ను యీక్రింది ప్రకారము తయారు చేయవలయును.

1 అవున్సు ఆమ్లనియా కార్బనసును 10 అవున్సుల జలములో గలిపి షేర్డ్, ఫిల్టరు కాగితమును దీనిలో ముంచినయెడల బ్లూ, కాకుండునంతవరకును, బ్లూ ఫిల్టరు కాగితమును దీనిలో ముంచినయెడల యెరువు కాకుండు నంతవరకును, దీని యందు అసిటేటు అసిడ్ను గలిపి, పిమ్మట నిదియొక పైంటు అగునంత వరకును జల మును గలిపి, ఆకుపచ్చసీసాలో నిలువ చేయవలయును. అసిటిక్ అసిడ్ను ఆదానర మైన దానికంటె నెక్కువ గలుపకుండ జాగ్రత్తను బుచ్చుకొనవలయును. దీనియొక్క మోతాదు 2 ద్రాములు మొదలు 6 ద్రాముల వరకు ఆయియున్నది.

అసిడ్ సైట్రిక్ డైల్యూటు అనగా 10 ద్రాముల జలములో 1 ద్రాము సైట్రిక్ అసిడ్ గలిపి నట్టిది. దీనియొక్క మోతాదు 10 మి. మొదలు 30 మి. వరకును ఆయియున్నది.

అనుక్రమణిక 3

ఈ గ్రంథమునందు తెలుగున వ్రాయబడిన ఆంగ్లేయోద్యమములయొక్క పేర్లు చదువరులకు ఉపయోగమునకై ఆంగ్లభాషయందు దీక్షింప వివరింపబడినవి.

అ

అలి వుధురము (Lipuo rice)

అమ్మోనియా అయోడైడ్ (Ammonia)

Iodide)

అమ్మోనియా కార్బనసు (Ammonia)

Carbonas)

అమ్మోనియా క్లోరైడ్ (Ammonium)

Chloride)

అమ్మోనియా ఫాస్ఫసు (Ammonia)

Phosphas)

అమ్మోనియం బ్రోమైడ్ (Ammonium)

Bromide)

అమ్మోనియా సాలిసైలసు (Ammonia)

Salicylas)

అయోడిన్ (Iodine)

అలాయిన్ (Aloin)

అనిసీ నూనె (Linseed Oil)

అక్వా అనీతి (Aqua Anethi)

అక్వా క్యాంఫర్ (Aqua Camphor)

అక్వా క్లోరోఫారం (Aqua Chloro form)

అక్వా మెంథా పిప్ (Aqua Ment. Pip)

అయిల్ ఆఫ్ అనిసీడ్ (Oil of Aniseed)

అరిస్టోల్ (Aristol)

ఆరసైక్ అయోడైడ్ (Arsenic Iodide)

అలం (పటిక) (Alum)

అలివ్ ఆయిల్ (Olive Oil)

అలెత్రిస్ కార్డియల్ (Aletris Cordial)

అల్కహాల్ (Alcohol)

అసిటేట్ ఆఫ్ లెడ్ (Acetate of Lead)

అసిడ్ ఆర్సెనియసు (Acid Arsenious)

అసిడ్ నైట్రో హైడ్రోక్లోర్ డిల్ (Acid Nitro Hydrochlor Dil)

అసిడ్ ఫాస్ఫారిక్ డైల్యూట్ (Acid Phosphoric Dil)

అసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ (Acid Sulphuric)

అసిడ్ సాలిసైలిక్ (Acid Salicylic)

అసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ డైల్యూట్ (Acid Hydrochlor Dil)

అంగ్యుయెంటం బెల్లాడొనా (Ung. Belladonna)

అంగ్యుయెంటం హైడ్రోజెన్ అయోడైడ్ రుబ్రి (Ung Hydr Iodide Rubri)

అంటిమోనీ టార్టరేట్ (Antimony-Tartarate)

ఇంగ్లూవిన్ (Ingluvin)

ఇన్ఫ్యూజియన్ జెన్టియానా (Inf. Gentian Co.)	క్లోరల్ హైడ్రేట్ (Chloral Hydras)
„ బుక్కు „ Buchu)	✕
„ సార్సా „ Sarsa)	గం ఆకేసియా (Gum Acacia)
„ సెనా „ Senna)	గ్యాలిక్ ఆసిడ్ (Gallic Acid)
„ సెనెగా „ Senega)	గ్వాయివల్ కార్బోనస్ (Guaiacol Carbo- nas)
ఇక్తీయల్ [Ichthyol]	
ఓ	గ్లిసెరిన్ (Glycerine)
ఓలియం క్యుబెబ్ (Oleum Cubeb)	గ్రే పౌడర్ (Grey Powder)
„ గైనోకార్డి „ (Gynocarde)	గ్లైకోథైమోలైన్ (Glycothymoline)
„ శాంటల్ ఫ్లేవి (Santal Flavi)	జె
„ సినిసిపి „ (Sinapis)	
క్రైసారోబిన్ (Chrysarobine)	జింక్ ఆక్సైడ్ (Zinc Oxide)
కార్బోలిక్ ఆసిడ్ (Carbolic Acid)	„ పర్మాంగనేట్ „ Permanganate
కాల్షియం సల్ఫైడ్ (Calcium-Sulphide)	„ బ్రోమైడ్ „ Bromide
	„ వాలెరియన్ „ Valerianus
	„ సల్ఫేట్ „ Sulphate
క్రియోసోట్ (Creasote)	ఓ
క్రైసోఫోనిక్ ఆసిడ్ (Chrysophonic Acid)	
క్రీం ఆఫ్ టార్టార్ (Cream of Tartar)	టర్పెంటైన్ (Turpentine)
క్రీం ఆఫ్ మూర్ట్ అండ్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ విత్ క్రియోసోట్ అండ్ హైపోఫాస్ఫైట్స్ (Cream of Malt and Cod liver Oil with Creasote and Hypo-phosphites	టార్టారిక్ ఆసిడ్ (Tartaric Acid)
	టాన్నిక్ ఆసిడ్ (Tannic Acid)
	టింక్చర్ ఆయోడిన్ (Tincture Iodine)
	„ ఆసాఫెటిడా „ Asafetida)
	„ ఆకొనైట్ „ Aconite)
	„ ఆరంటి „ Aurantii)
	„ ఆర్నికా „ Arnico)
	„ ఓపియం „ Opium)
	„ కన్వలెరియా మజాలిస్ Convall majalis)
క్వినిన్ బ్రోమైడ్ (Quinine Bromide)	
„ సల్ఫేట్ „ Sulphate)	
మ్యూరియస్ „ Murias)	
„ హైడ్రోక్లోర్ „ Hydrochlor)	
కాఫీన్ సిట్రస్ (Caffine Citras)	
కెయిలిన్ (Kaolin)	„ కలంబా „ Calumba)
కోడినా ఫాస్ఫేట్ (Codeina Phosphas)	„ కాప్సికం „ Capsicum)

,, కార్దమం కో ,, Cardamom Co.)	
,, క్యాంఫర్ కో ,, Camphor Co)	జనవలన్సో య్యవము (Donovan's SolutiOn)
,, కంఠారిడిన్ Tincture Cantharidis	కోవర్సు పొడదు Dover's Powder or]
,, క్లోరోఫారం కో ,, Chloro- form Co.	తీక (పల్వీస్ ఇపికాకో కో [Pulv- Ipecac Co.)
,, గ్వాయై అమ్మోనియేటా ,, Gvaiaei Ammon)	త్ర
,, గ్వాయైం ,, Guaiaci)	త్రయోకార్ [Theoccol]
,, జెన్షిన్ కో ,, Gentian Co)	త్రయోనికా సోడా అసిటేట్ Theoccin Soda Acetate)
,, జింజిబ్రెన్ ,, Zingibras)	థైమోల్ [Thymol]
,, జెల్సిమియం ,, (elsimium)	ద
,, డిజిటాలిస్ ,, Digitalis)	ద
,, నక్సు వామికా ,, Nux Vomica)	నాల్టిరి ఆయిల్ [Cinnamon Oil]
,, పొడోఫోరిన్ అమ్మోనియేటా ,, Podoph Ammon)	న
,, బెల్లాడోనా ,, Belladonna)	నైట్రిక్ ఆసిడ్ [Nitric Acid]
,, బెంజాయిన్ కో ,, Benzoin Co)	వ
,, మిర్ ,, Myrrh)	వ
,, రైస్ కో ,, Rhei Co)	వ
,, లావెండ్యూలా కో Lavandu- lae Co)	రోజ్ వాటర్ [Rose Water]
,, లోబెలియా యీతర్ ,, Lobel- Ether)	పల్వీస్ ఇపికాకో [Pulv Ipecac]
,, వెలరియా అమ్మోనియేటా ,, Valer Ammon).	,, క్రోటా ఆయిల్ కోట్స్ ,, Crota arom)
,, స్కెల్లా ,, Scillae	,, కంబీయం ,, (Cum- Opium)
,, సింకోనా ,, Cinchona)	,, జ్యూలప్ కో ,, Julap Co)
,, స్ట్రోఫాంతస్ ,, Strophanthus	,, ట్రాగెకాంథ్ ,, Tragacanth)
,, హామమెలిస్ ,, Hamamelis	,, డిజిటాలిస్ ,, Digitalis)
,, హాస్కోయిన్ ,, Haoscyami]	,, రైస్ ,, Rhoii)
	,, స్కెల్లా ,, Scillae)
	కోర్ మెర్క్యురీ ఆఫ్ హాస్కోయిన్ (Porchl of Mercury

పారఫిన్ ఆయింట్ మెంట్ (Paraffin Ointment)

పిల్లాల ఆలోస్ } Pil Aloes et
యెట్ అసాఫెటిడా } Asafetidae

పిల్లాల ప్లంబి కంటేషియం Pil.

Plumbi cum Opium

పెట్రోలియం (Petroleum)

పెప్సిన వైన్ (Pepsin wine)

ఫెనాసిటిన్ (Phenacetin)

పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ (Pepperm Oil)

ఫెర్రి ఆర్సెనసు (Ferri Arsenas)

,, యెట్ అమోనియా సిట్రసు

(Ferri et Ammon Citras)

,, యెట్ క్వినీన్ సిట్రసు ,, Quin-

Citras)

,, బ్రోమైడ్ ,, Bromide)

,, సల్ఫేట్ ,, Sulphate)

ఫ్లెక్సిబిల్ కలాయిడియం (Flex Collodium)

పొటాసు ఆయో డైడ్ (Potass Iodide)

,, ఆసిటసు ,, Acetas)

క్లోరసు ,, Chloras)

,, నైట్రసు ,, Nitras)

,, పర్మాంగనసు ,, (Permanganas)

,, బైకార్బనసు ,, Bicarbonas)

,, బ్రోమైడ్ ,, Bromide

,, సిట్రసు ,, Citras)

పొడోఫైలం రెజిన్ (Podoph Resin)

20

బాల్సంకొపేబా (Balsam Copaiba)

,, పెరువియాని ,, (Peruviani)

బిస్మత్ కార్బనసు (Bismuth Carbonas)

,, సబ్ నైట్రసు ,, Subnitras)

సాలిసైలసు ,, (Salicylas)

బీటా నాఫ్తల్ ,, (Beta Naphthal)

బెర్గమోట్ ఆయిల్ (Bergamot Oil)

బెల్లాడొనా ఆయింట్ మెంట్ (Bella

donna Ointment)

బొరాక్సు (వెలిగారసు) (Borax)

బోరిక్ ఆయింట్ మెంట్ (Boric Oint-

ment)

,, ఆసిడ్ (Boric Acid)

మ

మాలిటీన్ అండ్ కాడ్ లివరు ఆయిల్

(Maltine Cod liver Oil)

మిస్టూరా సెన్నాకో (Mistura Senna Co)

మెగ్నీసియా కార్బనసు (Mag- Carbonas)

,, బైకార్బనసు ,, (Bicarbonas)

,, సల్ఫేట్ ,, Sulphate)

,, సిట్రసు ,, Citras)

మెంథోల్ (Menthol)

య

యెక్స్ట్రాక్ట్ ఓపియం (Extr Opium)

,, కలొసింత్ కో ,, Colocynth-

Co.)

,, కాస్కారా సాగ్రాడా (Cascara

Sagrada)

జెన్షిన్ ,, (Gentian)

జాంబులిక్ లిక్విడ్ ,, Jambulino Liq)

డామియానా లిక్విడ్ ,, Damiana Liq)

,, సాలిడ్ ,, Solid)

యత్స్నిప్త వక్రసామికా (Extr-
Nux Vomica)
,, బెలడోనా ,, Belladonna)
,, బేలె లిక్విడ్ ,, Belae Liq)
యెర్గాట్ లిక్విడ్ ,, Ergot Liq)
,, హమామలిసు ,, Hamamelis)
,, హైడాస్పిసు కనాడెన్సిసు (Extr.
Hydr Canadensis)

యూకలిప్టసు ఆయిల్ (Eucalyptus Oil)

౪

రసభస్మము (Calomel)
రిమ్యూస్టెడ్ ఐరన్ (Reduced Iron)
రజిన్ గ్యుయాక్ (Resin-Guiae)

ల

లానోలిన్ (Lanoline)
లాక్టిక్ ఆసిడ్ (Lactic Acid)
లినిమెంట్ ఆయోడిన్ (Liniment-
Iodine)

,, ఓపియం ,, (Opium)
,, క్లోరోఫారం (Chloroform)
,, బెలడోనా ,, (Belladonna)
,, మెంథాల్ ,, (Menthol)
లైకర్ అమ్మోనియా అసిటేట్ Liq-
Amm. Acetatis)
,, ఫార్ట్ ,, (Fort)
,, ఆర్సెని కాలిసు ,, Arsenicalis)
,, అమ్మోనియా సిట్రసు ,,

లైకర్ కాలోఫైల్ యెట్ పల్సటిల్లా
(Liq Caulophyl et pulsatilla)
,, పొటాష్ ,, Potass)

,, బిస్ముత్ యెట్ పెప్సిన్ కో,
(Bismuth et Pepsin Co Hewlett)

లైకర్ మార్ఫియా హైడ్రోక్లోర్ (Liq.
Morphia Hydrochlor)

,, సింకోనా హైడ్రోబ్రమ్ ,,
Cinchona Hydrobrom)

,, సెడ్రోబ్రమ్ (Liq Sedrobrom)

,, స్ట్రీక్నిన్ హైడ్రోక్లోర్
(Liq Strychnino Hydrochlor)

,, హైడ్రోపెర్ క్లోర్ (Liq
Hydr. perchlor)
లైమ్ వాటర్ (Lime water)

వ

వాసలిన్ (Vaseline)

వినిగర్ (Vinegar)

వైనం అంటి మోనియాలిస్ (Vinum)
(Antimonialis)

,, ఇపెకాక్ ,, (Ipecac)
,, కాలిచం :: Colohicum]

శ

శనటోజెన్ (Sanatogen)

శాంటోనిన్ (Santonine)

ష

షల్ మొగ్రా ఆయిల్ (Chaulmogra
Oil)

షెర్రీ వైన్ (Sherry wine)

స

సలాల్ (Salol)

సల్ఫర్ ఆయింట్ మెంట్ (Sulphur
Ointment)

,, సబ్లిమేటం :: Sublimatum)

సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఇరన్ (Sulphate of iron)	,, కార్బోనసు ,, Carbonas)
సాలిసైలిక్ ఆసిడ్ (Salicylic Acid)	,, సల్ఫేట్ ,, Sulphate)
సిట్రిక్ ,, (Citric ,,)	సోడా క్లోరసు (Soda Chlorus)
సిరప్ ఆరంటీ [Syrup Aurantii)	,, బై కార్బోనసు ,, (Bicarbonas)
,, ట్రిప్లియెంట్ (Syrup Tripl Co	,, బ్రొమైడ్ ,, Bromibe)
,, టోలు ,, Tolu	,, సాలిసైలసు ,, Salicylss)
,, ఫెర్రయి ఆయోడైడ్ Syrup	సోడియం గ్లైకోకొలేట్ (Sodium Glycocholate)
Ferri Iodide)	,, హైపో సల్ఫైట్ ,, Hypo-Sulphite)
స్పిరిట్స్ ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక (Sp. Amm. Arom)	
,, ఈథర్ కో ,, (Etheris co)	హ
,, ఈథర్ నైట్రస్ ,, (Ether Nitras)	హెరాయిన్ హైడ్రో క్లోర్ (Heroin Hydrochlor)
,, క్యాంఫర్ ,, Camphor)	
,, క్లోరోఫారం ,, Chloroform	హెల్మిటాల్ (Helmitol)
రోజ్ మేరీ ,, Rosemari)	హైడ్రాక్సైడ్ ఆఫ్ ఫ్లేవి (Hydr-Oxide Flavi)
స్ట్రిక్చిన్ ఫాస్ఫసు Strych- Phosphas)	కం క్రేటా ,, Cum Creta)
సీమ ఆముద్దము (Castor Oil)	గ్రే పౌడర్ (Grey- Powder)
సున్నపు నీళ్లు (Lime Water)	
సోడా ఆయోడైడ్ (Soda Iodide)	

అనుక్రమణిక 4

విషవిరుగుడులు

విషప్రయోగమునందు జాలవాటిలో ముందుగ జీర్ణాశయమునందలి వదాగములను వెలిబుచ్చుటకు వలయు ప్రయత్నములను జేయవలయును. ఇందుకు వాంతికాయల నుపయోగింపవగును.

వాంతికారులు.

మస్తద్ద పాడరు— ఒకటంబురు ఉడుకునీళ్ళలో పెద్దచెమిచాకొలతగల దీనిని వేసిపుచ్చుకొనవలయును.

సామాన్యపు ఉష్ణ— ఒకటంబురు ఉడుకునీళ్ళలో రెండు పెద్ద చెమిచాల కొలతగల దీనిని వేసి పుచ్చుకొనవలయును.

జింకు సల్ఫేట్— 30 గ్రాములు (అరటంబురు ఉష్ణజలములో)

అమ్మోనియం కార్బనేట్— 30 గ్రాములు ,,

పర్మిను యిపికాటు— 20 గ్రాములు ,,

కాపర్ సల్ఫేటు— 5 గ్రాములు 10 గ్రాములు ,,

విషములు

విరుగుడులు

(1) అసిడ్ వాడోక్లోరిక్

,, నైట్రిక్

,, సల్ఫ్యూరిక్

,, ఫాసు ఫారిక్

(2) ఆక్సైటు (వాచి)

(3) ఆల్కహాల్ (బ్రాండ్ మొదలగునవి)

(4) పొటాష్, సోడా, అమ్మోనియా, స్పిరిట్ సాల్టు మొదలగు ఆల్కలీలు

[1] లైం వాటరు

మెగ్నీషియం కార్బనేటు

సోప్ వాటరు

పాలు

అలిష్ ఆయిల్

(2) బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థములు, కలివితమైన క్వాసకృత్యము జరిగకుండా యుండుట.

(3) అమ్మోనియా కార్బనను లైకరు అమ్మోనియాను వాసన జూచుట; వేడికాఫీ

(4) అసిటిక్ అసిడు లేక వినిగరు, నిమ్మరసము; టార్టారిక్ అసిడు

- | | |
|--|---|
| (5) అంటిపెరిక్
అంటిఫిబ్రిన్
ఫెనాసిటిక్
రిసార్సిక్ | (5) బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థములు
ప్రిక్సిక్
కల్చరమైన క్యాసకృత్యము; ఒలుగు
కొనియుండుట; వాంతికారము |
| (6) ఆర్సెనిక్ (పామణము) | (6) టెక్సర్ ఫెర్రిస్ పెర్ క్లొరున్నా
సోడియం కార్బోనేట్ సాల్ఫ్యూర
సున్నా
డయలైజ్డ్ బిరసున్నా, విమ్యుటసిల్
లోగలిపిన సామాన్య ఉష్ణన్నా |
| (7) బెలిడోనా
ఆట్రోపీక్ | (7) ట్యూకో ఆసిడ్
మర్శిన్
కాఫీ
క్లొరల్ హైడ్రేటు |
| (8) కేఫీన్ | (8) నైట్రో గ్లిసేరిక్ |
| (9) కెంతారిడిను | (9) కావ
బ్రాండ్ వగైరా
క్యాంఫరున్నా ఓపియమున్నా,
చురుదలు గాని కొవ్వనంబంధ మయి
నదిగాని కూడవు. |
| (10) కార్బులిక్ ఆసిడ్ | (10) సోడా సల్ఫేటు
మెగ్నీషియం సల్ఫేటు
ఆలివ్ ఆయిల్
కాఫీ |
| (11) కార్బునిక్ ఆసిడ్ గ్యాస్ (ఆం
గార తొరవాయువు) | (11) పరిశుభ్రమగు గాలి
ఆమ్లనిరూ వానస్పజువులు |
| (12) క్లొరల్
క్లొరోఫారం | (12) పరిశుభ్రమగు గాలి
శిరముపై చున్నిశుభ్ర ధారగాబోయుట,
పొంగువచ్చు దవపదార్థముల ద్రాగ
నిచ్చుట
వేడిమి, ఒడలుపైదోముట; వేడికాఫీ.
బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థముల
నిచ్చుట.
ఒలుగుకొని యుండుట, ఆమ్లిట్ నైట్రై
టును వానన జూనుట |

- (13) ఖోలేజ్ - (13) బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థములు
స్క్రిక్ సిక్ -
కల్పితమైన క్వాసకృత్తము
ఆయిల్ స్ట్రెస్ రైటు
పాటానియం బ్రావైడు
- (14) ఖోనియం - (14) వాంతి కారులు
బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థములు
కల్పితమైన క్వాసకృత్తము
- (15) ఖాపర్ సంబంధమగు అవణములు (15) గుడ్లలోని తెలుపును నీళ్ళలో గలిపి
యిచ్చుటయు, పాలు గొఱుకుపిండిని
నీళ్ళలో గలిపి యిచ్చుటయు
- (16) క్రియోసోటు (16) గుడ్లలోని క్షేతపదార్థము నీళ్ళలో
గలిపి యిచ్చుట
- (17) డిజిటాలిస్ (17) ట్యూనిక్ అసిడ్
బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థము
లు, ఒలిగుగోని కూర్చొందుట.
- (18) ఈసరీక్ (18) బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థములు,
కల్పితమైన క్వాసకృత్తము క్లిరల్
హైడ్రేట్
స్క్రిక్ సిక్
- (19) ఈకర్ (19) ఆమ్మోనియాను వాసనబాచుట
తెకర్ ఆమ్మోనియా ఆసిలేటిను
- (20) జెల్మియం (20) వాంతి కారులు
బ్రాండ్ మొదలగు మత్తుపదార్థములు
మాడ్చియు
- (21) ఆయోడిక్ సంబంధములు (21) పలుచని పరిపిండి పేర్లు
సోడా సోపోనల్ఫేటు
లెడ్ ఆసిలేటు
- (22) ఇసికా (22) ట్యూనిక్ అసిడ్
- (23) లెడ్ సంబంధములు (23) మెగ్నీసియం సల్ఫేటు
సోడా సల్ఫేటు
పాలు
విరేచనకారులు

(24) మెర్క్యురీ సంబంధములు

(25) హైట్రో స్లిసరీన్

(26) ఓపియం సంబంధములు

(27) ఫోస్ ఫరస్ సంబంధములు, నిప్పు
పుల్లలు

(28) పొటాసియం సయ్ నేడ్, పూసిక్
ఆసిడ్

(28) సాంటానీన్

(30) సిల్వరు సంబంధములు

(31) ప్రిక్వినీన్
నక్కువామికా

(24) గుడ్డలోని శ్వేతపదార్థము
పాలు

వరిపిండి పేస్తు
వాంతికారులు

(25) యుర్గాట్
ప్రిక్వినీన్
టెలిడోవా
శిరమునకు చల్లని లేపనములు

(26) శిరమునకు చల్లని లేపనములు
విశేషణ కారులు
జీడి కాఫీ
పొటాసు పర్మాంగ్ నేట్
నిద్ర లేపవలయును
ప్రిక్వినీన్
బ్రాండి వగైరాలు
కల్పితమైన క్వానకృత్యము
ఆమిల్ నైట్ గెట్

(27) టెలిబీన్
కాపర్ సల్ఫేట్
మెగ్నీసియం సల్ఫేట్
చమరులు, ఆల్ కహోల్ ను
యియ్యరాదు
మార్చీసు

(28) అమ్మోనియా
శిరముపై చల్లని నీళ్లను ధారగా
పోయటం

(29) విశేషణ కారులు
క్లారత్ మోడ్రేట్

(30) సామాన్య లవణము
గుడ్డలోని శ్వేతపదార్థము

(31) ట్యూనిక్ ఆసిడ్
ఓపియం చిన్న మోతాదులు
పొటాసియం బ్రొమైడ్
క్లారత్ మోడ్రేసు

(32) ట్యాబ్లర్ యెమిటిక్

(33) టిన్ లవణములు

(34) జింక్ లవణములు

(32) ఆమిల్ నైట్ రేట్
ట్యాబ్లెట్ ఆసిడ్
పాలు
గుగ్గిలూని శ్వేతపదార్థము

(33) సోడా ప్రకార్బనేట్
ట్యాబ్లెట్ ఆసిడ్
పాలు

(34) గుగ్గిలూని శ్వేతపదార్థము
పాలు
సోడా ప్రకార్బనేట్
ట్యాబ్లెట్ ఆసిడ్
టింక్చర్ ఓషియం
ఉదరముపై అమిసి పిండికట్టు

అనుకృమణిక 5

ఈ దిగువ ఆయా వ్యాధుల పేర్ల క్రింద నుదహరింపబడిన మనుషులు ఆయావ్యాధుల కుపయోగింప నగును. ఆయా మందులు, ఆనుభవమునుబట్టి జాగ్రత్తతో గూడిన వివేచనతో వాడుక చేయవలయును. వివరదార్థముల యందు మోతాదులను బహు మెలకువతో గమనించవలయును. మందులను గూర్చిన వివరములక గ్రంథమందు జాడవలయును.

అజీర్ణవ్యాధి — Dyspepsia.

కార్యాల్పము అసిడు; దిష్టుత్ సంబంధములు, కోకా, కాస్సికం సంబంధములు; హైడ్రాస్టిస్; మాల్టు; పాంక్రియసు సంబంధములు; పెప్సిక్; పాడాఫ్యులిక్; క్విసిన్; సాలిసిక్; సోడా బైకార్బనేట్; పొటాసు బైకార్బనేట్; సోడియై నైట్రిసు; ఆసిడ్ నైట్రిక్ డిల్యూట్; ఆసిడు హైడ్రోక్లోర్ డిల్యూట్; ప్యాపేన్.

అతిమూత్రము — Diabetes.

కోడిన్; క్రియసోట్; గ్వయిమిన్; జాబరాండి; తెమోల్; జాంబూలు; లిలియా పాటర్; యురేని నైట్రిసు; మార్ఫీన్; ఫాసుఫస్; సాకరిన్; సల్ఫానల్.

అతిసారము, అతి విరేచనములు — Diarrhoea.

అసిడు కార్యాల్పము; అసిడు ల్యూకుటిక్; బేల్; బిస్మత్ సాలిసైలెసు; కెసేబిన్; క్లోరోడిన్; యూకలిప్టుసు; వల్విసు ఇశికాకు కో; మార్ఫీన్; నాఫ్తాల్; పాడాఫైలిన్; ఓలియం రిసారిన్; ఆకేసియా గం.

అతుష్టాలత — Obesity.

కాస్టికు సోడా; కాస్టికు పొటాష్; పొటాసు కార్యాల్పము; పొటాసు బైకార్బనేట్; పొటాసు అసిటుసు; పొటాసు సిట్రిక్; ఆమ్మోనియా మెగ్నీసియా సంబంధములు.

హిస్టేరియా — Hysteria.

కెఫీన్ వెలిరియేనిసు; కెసేబిన్; బ్రోమైడులు; ట్రోహ సంబంధమును లవణములు; ఫాసుఫస్; క్విసిన్; ప్రికమినీన్; వెలిరియన్ సంబంధములు; జింకు లవణములు.

ఈడుపు వాయువు లేక ధనుర్వాయువు — Tetanus.

క్లోరిల్; కెసేబిన్; కెల్ సీమియం; మార్ఫీన్; స్ట్రాఫ్నేన్ తను.

ఉబ్బునము—Asthma.

ఆమిల్ సైటిస్; అర్మివికల్ (పాపాణ సంబంధము) చుట్టలు; కఫ్; కశ్; క్షారత్; క్షారోపారం; కోకా; కొకేన్; కొడీనా; గ్లిండ్లెయా; జాబరాండి; సైట్రోగ్లిస్ రీన్; సాడె సైటిస్; ప్రొమోనియం, కార్బికం.

ఉమ్మి డోరుట—Salivation.

ఆట్రోసీస్; అలం (పటిక); బెలదోనా; కోటో; క్లారేట్; క్రియసోట్ ఆమి.

ముక్తుప్రావ సంబంధముగ వ్యాధులు—Menstrual Disorders.

ముక్తుప్రావముయొక్క క్షీణత లేక నిలుపుదల (అమెనోరియా)

అల్బెటిన్; యెర్గాట్; హైడ్రాస్టిక్; ఐరన్ లవణములు; హేంగనీస్ లవణ

ములు; పొటాష్ పర్మాంగనేట్; సాంటానీన్.

2. ముక్తు ప్రావమునందు నొప్పిగలుగుట (డిస్ మెనోరియా.)

అల్బెటిన్; కేసేబిన్; హైడ్రాస్టిక్; సాలిక్స్ నైగ్రా; జింబర్నెం; పెరియ శేట్సు.

3. ముక్తుప్రావము నందు—అధిక స్క్రీవముగలు గాని, తరుచుగ నగుట గాని లేక అధిక కాలము వరకు అగుట గాని, (మెనోరేజియా)

బ్రోమైడ్; కేసేబిన్; యెర్గాట్; హమామిలిస్; హైడ్రాస్టిక్; ఐరన్; తైరాయిడ్;

4. ముక్తుస్క్రీవము తెలుపు వర్ణముగ నుండుట (లెకోరియా)

(పై కాంతులు) ఆసిడ్ బోరిక్ లోపన్; హైడ్రాస్టిక్; పొటాసు పర్మాంగనేట్.

(లోని కిచ్చుటకు) ఐరన్ లవణములు; మెసరల్ ఆసిడ్, కాక సంబంధముగ బలవర్ధకావధములు (Vegetable Tonics.)

ఎండబెట్టు—Sunstroke.

ఆట్రోపీక్; మార్ఫిన్ (నూదిద్యారా రక్తములోనికి యింజెప్ట్ చేయుట) ఫ్విగ్నీస్, విరేచన ముగలుగు యెనీమా నిచ్చుట.

ముడురోమ్మ నొప్పి—Angina Pectoris.

ఆమిల్ సైటిస్; అర్మివికల్ (పాపాణము); కాంఫారిన్ ఆసిడ్, మార్ఫిన్ (నూది ద్యారా యింజెప్ట్ చేయుట), సైట్రోగ్లిస్; సాడియో సైట్రిక్.

చీమగు గజ్జ—Eczema.

ఆసిడ్ బోరిక్, ఆసిడ్ స్కాలినిక్; ఇమిలియల్, రిసార్సిన్, తైమల్ జింకు ఆక్సైడ్ సంబంధములు; అయింట్ మెంట్ ఆసిడ్ గ్లూకాడ్; క్రిసోరొజిన్.

పీడలో గలుగు కడుపు త్రిష్ణ — Sea-sickness.

ఆమిల్ వైట్రిసు; అంటిపయిరిక్, కోకా, కొకేన్, క్లోరల్, క్లోరోఫారం, స్క్వెల్లిగ్లినా; మార్షిన్ (నూదితో రక్తములానికి యింజిప్టు చేయుట,) బ్రామెల్లెస్ వైట్ రెట్టు, రిసార్సిన్, కోలా సంబంధములు.

కడుడు నొప్పి — Gastralgia.

స్పిరిట్ ఈతరిసు, కనేబిసు; కోకా; కొడీక్; చిస్మత్ సంబంధములు; క్లోరోఫారం; టింక్చరు క్లోరోఫారం అండ్ మార్షియా; క్రియసోట్; పెప్పిన్.

కర్ణరోగములు — Ear-Diseases.

1. చెవిలోనుండి స్రవించుట :—

గ్లిసెరిన్ ఆసిడ్ ట్యానికు; బోరిక్ ఆసిడ్.

2. చెవిపోటు:—కొకేన్; ఆట్రాపీక్.

కాలరా — Cholera.

క్రియసోట్; గ్వయియల్; టింక్చరు క్లోరోఫారం అండ్ మార్షియా; కాంఫర్; హైడ్రాజ్జరీ పెర్ క్లోరిడ్; మార్షిన్; రిసార్సిన్; సాలాల్.

కారిజము యొక్క పుండు — Liver Congestion or Abscess.

పొటాఫ్యులిక్; హైడ్రాజ్జరీ సబ్ క్లోరిడ్ (రసహస్యము).

కుబ్జపులు (అధికకాలము మంచము పట్టుటచే వీపుమీదగాని తుంటిమీదగాని లేచుకొట్టి)

Bedsore.

కలూడియం; గ్లిసెరిన్; గ్లిసెరినం ఆసిడ్ ట్యానికు; అయోడోఫారం అయింటు మెంటు; బింకు ఆక్సైడ్ అయింటు మెంటు.

కుబ్జపులు — రాచపుండు — Boils or Carbuncles.

ఆర్సెనిక్; ఫెర్రయి పెర్ క్లోరీ; నికసు ఆఫ్ హైడ్రోఫాసు ఫయింటు; నిరవ్ ఆఫ్ సల్ఫోంటు; సల్ఫుముడు; కార్బులిక్ ఆయిల్; జెలడోనా గ్లిసెరిక్.

కుష్ఠరోగము — Leprosy

ఆనాకార్డియం; బాల్సం గర్జక్; పీలియం గ్లనోకార్డి.

కుశ్మకంఠజేసెడు వస్తువులు — Antiseptics ✓

ఆసిడ్ బోరిక్; ఆసిడ్ కార్బులిక్, ఆసిడ్ సాలిసైలిక్; క్యాంఫర్; క్యాంఫర్ ఫెనాల్; క్యాంఫర్ నాఫ్తాల్, క్లోరల్, క్రియసోట్; గ్వయియల్, యూకలిప్టసు; హై

డ్రాగ్రి పెర్క్లొర; ఆయోడోఫారం; నాఫ్తలిన్, పొటాసు పర్మాంగనేట్; రిసార్సిన్, సోడై బెంజోను; సోడై సల్ఫును; టెరిబిన్; టైమోల్; జింకు క్లోరైడ్, జింకు సల్ఫును.

కొంకరులు వోపుట (చంటిబిడ్డ గుణము వగైరా)-Convulsions

సింకోనా సంబంధములు (క్విసీక్ వగయిరా, బ్రావైడ్లు బెలడోనా, మార్షిక్, హయోసామిక్: సల్ ఫోసల్, వెరీరియ నేటును.

కొరియా (ఒకవిధమగు కొంకరులు పుట్టించు రోగము)-Chorea

అర్సినిక్, కార్బియం క్లోరైడ్, క్లోరల్, యెర్బాక్, హయోసామిక్, కాడోలివరు చమరు, ఫాసుఫరసు, ఈసరీక్, స్ట్రిక్మనీక్: వెరీరియ నేటును, సల్ ఫోసల్.

కొలుకు రోగము--Syphilis

అమోనియా ఆయోడైడ్, గోల్డ్ క్లోరైడు; సోడియం క్లోరైడ్, థెర్యి ఆయోడీడ్, రస సంబంధములు, ఆయోడైడ్లు, ఆయోడిన్; రస సంబంధములు తేవనములుగా నుపయోగించ వలయును.

కొలుకు సంబంధమగు చర్మరోగములు--Syphilitic Skin Diseases

రస సంబంధములు (అనగా ఆయింటు మెంటుగాని పలాస్త్రులుగాని:) రిసార్సిన్, ఆయోడో ఫారం.

కొలుకు సంబంధమగు పుండ్లు--Syphilitic Ulcers

లైకర్ హెడ్రాగ్రిడ్, నైట్రిక్ ఆసిడ్, రససంబంధముగు ఆయింటుమెంటు, లోషన్లు ఆయోడోఫారం, రిసార్సిన్, జింకు క్లోరైడ్.

కొలుకు పుండు (మేహరోగము)--Cancer

అర్సినిక్, క్లోరల్, మార్షిక్: పాస్కనండులు, ఆయోడోఫారం; క్రోమిక్ ఆసిడ్, క్విసీక్ సాలిసైలు, జింకు క్లోరైడ్:

గనోరియా [సెక్]-Gonorrhoea

కొకేక్ ఇంజక్షన్; విరక్ సాల్టులు (అహముతో గూడిన లవణములు:) పొటాసు సంబంధములు, ఓలియం సెంటాల్ (చెందనీ) బెలడోనా, ఓలియం యూకలిప్టసు: హెడ్రాగ్రిడ్లు, ఆయోడోఫారం; పొటాసు పర్మాంగనేటు; జింకు క్లోరైడు: జింకు సల్ ఫసు: జింకు పర్మాంగనేటు, సాలిక్సు నైగ్రీ.

గర్భవత్సంబంధ మగు వాంతులు--Vomittings of Pregnancy

కొకేక్, విస్కల్: క్వింసెంటు, ఇక్ గ్లుబిక్, మార్షిక్, పెర్సిక్, క్విసీక్.

వాంతులు—Vomittings:

బిస్కత్; కొకేక్, కార్బూలిక్ ఆసిడు, క్లోరల్, ఇన్‌స్టుబిన్; ట్రైట్రాగ్లి సేట్; పోడా వాటర్.

గర్భస్రావము—Abortion.

ఆలెజ్జీను, కొడీక్; హైడ్రాస్టిక్, మార్ఫీక్, వైబర్నం.

గర్భాశయము మడుచుకొని పోవుటకు—Uterine Contractors

యెర్గాటు సుబంధములు, హెమామిలిను, హైడ్రాస్టిను.

గాయములు; బెణుకులు—Bruises & Sprains ✓

అమ్మోనియా క్లోరైడులోషక్, హెమామిలిను, హాజీక్; టింక్చర్ హైడ్రాస్టిను.

గాయములు (నిష్కవలన లేక వస్త్రాగ్రాసిన నీటివలన) —Burns

ఆసిడ్ బోరిక్, ట్రైమాల్ ఆయింటు మెంటు, వాసలిక్, జింకు ఆయింటు మెంటు,

క్యూరక్ ఆయిల్, ల్యూనోలిక్.

గుండెరోగములకును గుండెకాయ యొక్క బలములు వృద్ధిచేయుటకును,

మందులు—Cardiac Tonics

ఫీక్, డిజిటాలిను, స్ట్రాఫాంకసు.

గురకతో గూడిన దగ్గు - Whooping Cough

వేసర్ ఆసిడ్ కార్బూలిక్; అమ్మోనియా బ్రొమైడ్, అలం (పటిక) బెంజోయిన్, బ్రామైడు, కెఫేలిను, క్లోరల్, యెర్గాటు, గ్రిండేలియా, స్ప్రీమేరియం, ఫెనాసిటిక్, జింకు ఆకునైడ్, జింకు సల్ఫను.

గొంతు రోగములు—Throat affections

1. కొండనాళకయొక్క వాపుదల—Tonsillitis

ఆసిడ్ బోరిక్, క్రియసోటు; బెబెడోనా, క్విసీక్ సాలిసైలిను, బెక్జోయిన్.

2. గొంతు సడలించుటకు—Relaxed Throat

కార్బూలిక్, ఆసిడ్ తో చేయబడిన గంధూషము [పుక్కిలించెడి మందు] కొకేక్, ట్యూరిక్ ఆసిడ్ గ్లిసరీక్, క్లోరైట్సుతో చేయబడిన గంధూషములు అమ్మోనియా క్లోరైడ్ లోనికి పీల్చుట, ఫెర్రయి పెర్క్లోర్, హైడ్రాస్టిను గంధూషము.

3. స్వస్థపేటికయొక్క వాపుదల—Laryngitis ✓

అక్రానైటు, ఆసిడ్ ల్యూకుటిక్ [పైన రాయుటకు] క్రియసోటు (లోనికి పీల్చుటకు రసభస్మము; మెంతాల్ [పైనరాయుటకు])

గొటు [వాతరోగము] — Gout

ఆమోనియా బెంజోను, లిరియం లవణములు, మెంగనీసు లవణములు, పొటాను ఆయోడైడు, మార్షిసు [నూడితో లానికి జొచ్చుటయల చేయుట]

గృహణి — Dysentery

ఆసిడు కార్బులికు, ఆసిడు ల్యుట్టికు, బిస్మత్ సాలిసైలికు, క్యాలియై సాలిసైలికు, కేసేలిసు, స్ట్రోమాడిక్, యూకలిప్టు ఆయిల్, ఫెర్రయి సాలిసైలికు, పలిసు యిసికాకుళా పొడాఫయిలిక్, ఓలియం రెసెనా [చిట్టాముదము] సోడియై ఫాస్ఫసు, బేల్.

చెంపపై పొక్కులు — Lupus

ఆసిడు సిస్మితిం, ఆసిడు ల్యుకుటికు (విగ్మెంటు) ఫాస్ఫరసు, కాడ్లివర్ చమురు, పొటాను ఆయోడైడ్ నూనె హైడ్రోరీ పెర్ క్లోరైడ్ నూనె, ఆయోడో ఫారం, జింకు ఆయంటుమెంటు.

చర్మరోగములు [క్రిమిజాలములతో గూడినవి] — Parasitic Skin-diseases

కార్బులికు ఆసిడ్ ఆయంటుమెంటు, క్రిసోటొయిన్, క్యాలియై సోడాఫయిడ్ బోషసు, క్రియసోలు ఆయంటుమెంటు, సోడా హైడ్రోపానల్సు, టైమార్.

నీడ లేక గజ్జి — Itch.

వాఫలిక్; జింకు ఆక్సైడ్; జింకు ఆయంటుమెంటు.

చెమట (అధికచగు) — Excessive Perspiration

ఆసిడ్ సాలిసైలికు; ఆసిడ్ బోరిక్; ఆసిడ్ కార్బులికు; జింకు పీలియసు.

జ్వరనివారిణులు — Antipyretics.

క్రియసోట్; గ్వయిమల్; ఫెనాసిటిన్; పొటాను సిట్రిక్; క్విన్; సాలి సిక్; సాలోల్.

చలిజ్వరము: — [రిమింటెంటు = నడుమ నడుమ తగ్గుచు పొచ్చుచుండు; ఇంటర్మిటెంటు = విడిది విడిది వచ్చెడు] — Malarial Fever.

అమిల్ టెట్రైన్ అర్పినిక్; క్రియసోట్; గ్వయిమల్; ఆసిడ్ సాలిసైలిక్; సాలిసన్; యూకలిప్టు గ్లాబ్యులస్; హైడ్రాస్టిన్; క్విన్; టింక్చర్ వార్బర్గ్; ఫెనాసిటిన్.

టైఫాయిడ్ జ్వరము — Typhoid Fever

మిస్ట్యురా ఆసిడ్ కార్బులికు; సాలిసైలేట్సు; ఆమోనియా కార్బనస్, యూకలిప్టు గ్లాబ్యులస్; గ్వయిమల్ కార్బనస్; సాఫ్తార్; ఫెనాసిటిన్; టైమార్.

సరములతో సంబంధించిన తలనొప్పి—Nevrous Headache

పైత్యసంబంధమగు తలనొప్పి—Bilious Headache

యూనమిక్; హైడ్రాస్టిసు; పాడాఫయిలిక్; సోడా సంబంధమగు పొంగువచ్చు పదార్థములు; మెగ్నీషియా సల్ఫేట్.

జలుబు, చడిసెము సంబంధమగు తలనొప్పి—Headache from Cold

ఆమ్మోనియా క్లారిడ్; హైడ్రార్జర్ ఫ్లవ్ క్లారిడు (రసభస్మము); సాలిసైలేట్లు.

దగ్గు—Cough

బాలెని గర్జక్; బెలడోనా యిపికాకు మాత్రలు; టింక్చర్ క్యాంఫర్ కో; క్లొరో డీక్; కొడిక్; శెల్ఫిమియం; మార్షిక్; ఇపికాకు; టెరీబిక్.

దద్దురోగము (వీరీసిపిలాసు)—Erysipelas

అసిడు బోరిక్, ఆకొనైటు; అసిడు పిక్రిక్; అంటిఫిలిక్; బెలడోనా; డిజిటాలిసు; యెర్గాట్; ఫెర్రయి పెర్ క్లోర్; కలొడియం.

దాహము—Thirst

అసిడు ల్యుకుటిక్; అసిడు ఫాసుఫారిక్ డిల్యూట్; కోకా.

భాతుస్త్వము (మూత్రముద్వారా ఆల్బుమిన్ అనబడు స్వేదభాతువు వర్షముగలు)—

Albuminaria

అసిడు పిక్రిక్; బాబ్యరాండ్; ఆమిలు నైట్రిను; నైట్రోజెన్లు

సంజ (గుండె సంబంధమగు)—Cardiac Dropsy

కఫీక్; డిజిటాలిసు; స్ట్రాఫాంతసు.

సంజ (మూత్రాశయ సంబంధమగు)—Renal Dropsy

ఆమ్మోనియా బెంజోను; సిల్వాలా హయిడ్రార్జర్; సోడా అయిడైడు

నడుము నొప్పి—Lumbago

లిమెంటు బెలడోనా (పెనరాయుటకు); మెథెర్మాట్ ప్లాస్టరు (పెనవేయుటకు)

నపుంస కత్తెము—Impotency

అర్స్నిక్; కనేబిసు; కోకా, కొకేక్, డామియానా; యెర్గాట్; ఫెర్రయి పెర్ క్లోరు; కనేబిసు; ఫాసుఫరస్; స్క్రిమినీక్.

సరముల సంబంధమగు బలహీనత—Nervous Debility

కోకా, అసిడ్ ఫాసుఫారిక్ డిల్యూట్, ఆమ్మోనియం ప్రొమైడ్, క్యాంఫర్, క్లొరస్, ఫాసుఫరసు, క్వీనీన్ సంబంధములు, సాలిసిన్, స్క్రిమినీక్, సోఫోస్, జంతు తెలియేనిసు.

నాడివ్యాధి—Neuralgia

అమ్మోనియా క్లోరీడ్, కేసేరిను, జెల్సినియం, హయోసామిన్, ఫెనానెటిన్, హైట్రాగ్లి సరీన్, ఫాసుఫరసు, క్విన్, బ్రావెల్లు, సాలిపైసేట్లు.

ప్రత్యేకము:—లినిమెంట్ క్లోరోఫారం, లినిమెంటు ఆకొనైట్, మెంతాల్ సంబంధములు.

నిద్రరామి—Insomnia ✓

కేసేరిను సంబంధములు, క్లోరల్, కొడిక్; హయోసామిను, మార్షిక్, బ్రావెల్లు, ఫెనానెటిక్; సల్ ఫోసలు.

నిస్సత్తవ—Debility

ఆర్సెనిక్; ఫాసుఫేట్లు; హైపొఫాసుఫేట్లు; మార్షిక్, క్విన్; సింకోనా సంబంధములు; ఈస్ట్రాన్ సిప్; ఐర్కా సంబంధములు; కాడ్లివర్ నూనె; స్క్రిమిక్, ఫాసుఫరసు. నీరుడు తిత్తియొక్క వాపు (కందుట మంటతో గూడిననొప్పి) — Catarrh of Bladder టెంజోటు; యూరెలిప్తు; హయిడ్రాప్సిస్.

వ్యూమోనియా — Pneumonia

అసిడు సాలిపైసేట్; అమ్మోనియా కార్బనసు; కేసేరి, మార్షిక్; క్విన్

నేత్రవ్యాధులు — Eye-diseases

1. కనుతెప్ప యందున వాపుదల.

అసిడ్ బోరిక్; హయిడ్రాల్బర్ ఆక్సైడు ఫ్లేని ఆయింట్ మెంట్, ఆయింట్ ఫారం; ఆయింట్ మెంటు.

2. కనుతెప్పలకు లోపలిభాగమున సగ్గడియ్యమువలె చిన్న అదాపులేర్పడుట.

అసిడ్ బోరిక్; హైడ్రాల్బర్ ఆక్సైడ్ ఫ్లేని ఆయింట్ మెంట్; జింకు సల్ ఫరసు లోషన్.

3. కంటిలోని పొర Cataract

సిరిరేరియా.

4. కంటిపాపలోని పుండ్లు; పువ్వుచేయుట.

అట్రోపిక్; టెలడోనా; కొకెన్; ఈసరీన్; హైడ్రాల్బర్ ఆక్సైడ్ ఫ్లేని ఆయింట్ మెంటు.

5. కంటిపాప మట్టు తెల్లని పొరగవ్వట.

అట్రోపిక్; టెలడోనా.

6. కనుపాపను ముడుచుకొనునట్లు చేయుట.

జాబరాండి; మార్షిక్; హైట్రాగ్లి; ఈసరీన్.

7. కనుపాపను విస్తరింప జేయుట.

అట్రోపిక్; టెలడోనా; కొకెన్; హయోసామిన్; హయోసీన్.

పడిసెము (క్వాస సంబంధముగ) — Bronchitis

లిక్కరు ఆమ్లనియా అసిటిటిస్; ఆమ్లనియా క్లోరీడు; యూకలిప్టస్; గింగ్గే లియా; ఇసికాకు; మార్బీను; కాడ్ లివరు చమురు; కార్బాలికు ఆసిడ్; క్రియోసోట్ లోనిడి బీల్చి వాసనచూచుట; ఛానాసిటిస్.

పచ్చకామాల వ్యాధి — Jsmundice

ఆమ్లనియా క్లోరీడు; బెంజోట్లు; యూనమిను; రసభస్మము; హైడ్రాస్టినుపాడా ఫయిలిను; సెన్నా; పొగువచ్చు సోడా సంబంధములు.

పక్షవాదులు — Paralysis

హైపోఫోస్ ఫయిట్లు; హయోసామి; ఫోస్ ఫరసు; ట్రికుసిక్; ఐర్క్; ఛెర్రాయి ఆయొడ్డెడు; పెస్సిక్; కాడ్ లివరు చమురు; ఫయిజోస్టి గ్లా.

ప్రసవ సంబంధముగు జ్వరము — Puerperal Fever

ఆసిడ్ బోరిక్; బాబరాండి; ఛెర్రాయి పెర్క్లోర్; క్విసిక్.

పంటి నొప్పి — Toothache

కోశేక్, జెల్ సీమియం; ఆసిడ్ కార్బాలిక్; మెంతాల్ సంబంధములు, క్రియ సోట్, పొటాసు పర్మాంగేట్.

పంటియొక్క చిగుళ్ళవాపు — Inflamed Gums

అలం (పటిక); ఆసిడు కార్బాలిక్; టింక్చర్ ఆయొడిక్; టింక్చర్ ఆక్సాలెట్; పొటాసు క్లోరసు.

పాముకాటు — Snake-bite

లిక్కరు ఆమ్లనియా ఫోర్ట్; పొటాసు పర్మాంగేట్; ట్రికుసిన్.

పొందుకొగము — Anaemia

అర్సెనిక్; హయిపో ఫోసుఫయిట్లు; ఐరను సంబంధములు; ఫోసుఫేటు; ఫోసు ఫరసు; క్విసిన్ సంబంధములు.

స్త్రీహవ్యాధులు... Spleen Affections

క్విసిన్; ఐరను, టింక్చర్ ఆయొడిన్ — పైన రాయుటకు,

పులిసికాయలు ... Warts

ఆసిడు కోగ్నిక్; కోశేక్; కార్బాలిక్, ఆసిడ్; లినిమెంటు ఆయొడిన్.

పురుగులు ... Worms

రసభస్మము; ఛెర్రాయి పెర్క్లోర్; కంటోసిన్; యూకలిప్టసు; పమిగ్నోస్ట్.

పురుగుకాటు ... Insect Bite

కార్బాలిక్ ఆసిడ్ లోను, క్లోరోఫారం, కోశేక్, లిక్కరు ఆమ్లనియా సోడా; బై కార్బోనేటు, తేలుకుట్టునకు ఇసికాకుతో ఉడుకబెట్టిన పిండిట్లు, తైలములు.

పుండు ... Wounds

అసిడు బోరిక్, కార్బాలిక్ అసిడ్ లోషణ్; కలోడియం: ఆయోడోఫారం, ఇన్
తీయల్, పాటాన్ పర్మాంగ్ నేట్, రిసార్సిక్, కైమాల్, జంకు స్ట్రెండు, సాలోల్,
హైడ్రార్జి పెర్క్లోరీడు లోషణ్.

పైత్యోద్రేకము ... Billiousness

అమ్మోనియా క్లోరైడ్, యూనమిక్, హైడ్రాస్ట్రీన్, పాడార్బలిక్, సెడ్జిట్
పపుడర్లు.

పొక్కువండలు ... Caustics

క్రియసోట్, అసిడ్ క్రోమిక్, హైడ్రార్జర్ పెర్క్లోరీడు, పొటాసు పర్మాంగనేట్
జంకు క్లోరీడు, అసిడ్ ఆర్సినీయసు.

పొంగు లేక వేపపువ్వు ... Measles ✓

అకోపైటు, లిక్కరు ఆమ్మోనియో అసిటేటిను, స్పిరిట్ ఈతర్ పైట్రీసు, ఇపికాక్

బట్టతల ... Baldness

క్లోరల్, లినిమెంటు క్యూఫర్ కో, లినిమెంటు క్లోరోఫారం, జాబరాండి.

బూరకాలు ... Elephant Leg

కాల్ సియం సలుసైడు, ఈస్టన్న సిరప్

బొబ్బలు, తావర, దురదలు ... Herpes and Shingles

మెంతాల్, వాసలిక్, కలోడియం, జంకు ఆయింట్ మెంటు, హైడ్రార్జర్
అమ్మోనియో ఆయింటు మెంటు, సలిక్ విరేచన కారులు.

బొల్లి ... Leucoderma ✓

బాలసం గర్జక్, ఓలియం గైనోకార్డి.

మద్యపానము ... Alcoholism

ఆర్సెనిక్, కాపిస్కం, క్లోరలు, కోకా, కోకేట్, హైడ్రాస్ట్రీను, మార్షిక్, ఫాస్
ఫరసు, క్విసిక్.

మలబంధము ... Constipation

కాస్కారా సాగ్రిడా, రసభస్మము పాడార్బలిక్, చిట్టాముదము, సెడ్జిట్
పపుడర్లు, మశాముఖి సంబంధములు, పొంగువచ్చు సోడా సంబంధములు, పొంగువచ్చు
మెర్క్యూరియం సలుఫేటు సంబంధములు.

మహాచి ... Small-Pox

పైకిరాయటకు--అంగ్యయెంటం అసిడు బోరియో, కార్బాలిక్ ఆయిలు, అంగ్యయెంటం అయెడోఫారం, అంగ్యయెంటం హైడ్రాజ్జరీ, కలూడియం, అంగ్యయెంటం జింకు ఓలియేటు.

లోని కిచ్చుటకు--అంటిఫిబ్రిన్, ఆంటిపయిరిను, లైస్సలాలు.

మాంసగ్రంథులయొక్క వాపుదల--Enlarged Glands

కాల్షియం క్లోరైడు, ఆయోడైడ్లు, విరను లవణములు, అయెడోఫారం, అయెడీను-లోని కిచ్చుటకును పైనరాయటకును, హైడ్రాజ్జరీ ఓలియేటు, సోడియో ఆయోడైడు.

మూత్రకోశము యొక్క వాపుదల--Nephritis

గోమూ, ఓలియం సాంటాలం (చండినీ)

రక్తమునందు మూత్రము గలియునట్టి వ్యాధి (యురేమియా--Uraemia

ఆమిలు నైట్రిన్, కేఫీను, డిజిటాలిను, జాబరాండి, నైట్రోగ్లసరీను, సోడైటెంజోను.

మూత్ర గ్రంథులయొక్క క్షీణదశ--Bright's Disease

కేఫీను, డిజిటాలిను, హైడ్రాప్రీన్, జాబరాండి, నైట్రోగ్లసరీను.

మూర్ఛ--Epilepsy

గోల్డెబర్గ్ పైడు, బ్రాపైడుస్, ఆరినిక్ సంబంధములు, విరను లవణములు కేఫీను నైట్రోగ్లసరీను, సోడియో బ్రాపైడు అడు నైట్రిను, స్ట్రిక్నిను, వెరియన్ థీన్సు, జింకు బొగ్గపైడు, జింకు సిట్రేటు, జింకు లాక్టును, జింకు సల్ఫును, సల్ఫోసలం.

మూలశంక -- Piles

కేనాడెసిను, ఆరిస్టాలు, అంగ్యయెంటం కోస్టె, కాస్కరా సాగ్రాడా, హనూ మిలిను, సెన్నా.

మెదడు నృదువగుట--Softening of the Brain

హయిపో ఫాసుఫయిట్సు, విరను సంబంధములు, కాడ్లెవరు చమరు, ఫోస్ఫోరను

మొటిములు--Acne

అంగ్యయెంటం అసిడు సాలిసైలిక్, కెర్రాయి యెటు క్విసీను సిట్రేటు, హైపో ఫోస్ఫో యిట్సు, హైడ్రాజ్జరీ పెరక్లోరైడు లోషను, ఇథరియాలు, కైమాలు ఆయిటు మెంటు.

రక్తస్రావము -- Haemorrhage

అపలికి - అసిడు పెరోగాలికు, హమామలిను, బరను లవణములు

బెలు పలికి - ఆలం (పటిక), ఘెరయి పెరుక్లొరు, హమామలిను

రాత్రి చెమటలు -- Night-Sweats

క్యాంఫారికు అసిడు, క్లొరలు, పల్విసు యిపి కాకు కొ, హైపో పాసు ఫయిట్సు బరను లవణములు, జాబరాండి, సల్ఫూసలు, జింకు ఆకు సైడు.

రికెట్సు - Rickets

క్యాల్షియం లవణములు, ఫాసు ఫేట్సు, అసిడు ఫాసు ఫారికు డిల్యూట్, కాడ్ లినరు చమరు, లోహ సంబంధములు, హైపో ఫాసు ఫయిట్సు.

వాపుదల - Inflammation

1. క్యాస సంబంధముగనది.

అమ్మోనియా క్లొరీడు అవిరి, స్పిరిటు ఈతరు వైట్రీను.

2. అన్యకాళము, పేగుల సంబంధముగనది.

విస్కత్ సంబంధములు; కేఫేను, యూకాలిప్టసు, హయిడ్రాస్టిను.

3. నాసిక సంబంధముగనది.

కార్బులైజ్ డు సాల్టులు, క్యాంఫరు, కొకేను.

4. గర్భాళయ సంబంధముగనది.

అయెడోఫారం, జింకు సల్ఫసు.

వాతరోగము - Rheumatism

1. ఉద్రుతస్థితిలో:- అసిడ్ సాల్ఫైటికు; అసిడ్ క్రియసోటికు, కొటో, ఫర్యియి పెర్క్లొర, ఓజోనికు ఈతరు, పొటాసు సిట్రిను, క్వినిన్, సాల్ఫైటిట్సు, సాల్ఫోన్, ఫెనాసిటిన్.

2. దీర్ఘ వ్యాధక స్థితిలో:- అసిడ్ సాల్ఫైటికు, అమ్మోనియా అయెడో, ఫెలెగో నా, లిని మెంట్ కాట్నీకం, లిని మెంటు క్లొరోఫారం, కొటో, జెల్సిమియం, యూకాలిప్టసు, ఆయిల్ (వైచూల్), పొడాఫయిలిన్, ఓలియం క్రోకార్డి, ఓలియం కాబుబట్, ఓలియం కొక్టోసిన్.

వాంతి పట్టుట - Vomitting.

విస్కత్, కొకేన్, అసిడ్ కార్బాలిక్; క్లొరర; ఇన్ డ్యూవిన్; వైట్రీస్లి సరిన్ పొంగువచ్చుచే ద్రవపదార్థములు; సోడా వాటరు మొదలయినవి.

వాంతి కారకులు - Emetics.

ఆలం (పటిక); ఇపికాక్, అవపిండి; స్పూకు జింకు అసిట్.

దిశ్యములు (పిమ్, సెక్టరు, వలముతో పడుట) - Dysentery.

హమానులిస్; హయిదార్జీర్జీ పెర్క్లార్; ఫల్విసు ఇపికాకుళో; మార్ఫీసు స్వచ్ఛ మగు పెరిబిన్; బేల్; బిస్మత్; సాలిసైలిసు ఓపియం; లెడ్ ఆసిటేట్.

వీర్యవృద్ధము — Spermatorrhoea.

బెలడో నా; యెర్గాట్; థెర్యియ పెర్క్లార్; ఫాసుఫేట్సు ఆఫ్ బిస్మత్ ఆండ్ క్వీనీన్ ఈస్ట్రను సిప్; సాలిక్సు నైగ్రా; డామియూనా.

వెక్కిలి — Hiccough.

స్పిరిట్ ఈతరిసు; క్యాంఫర్; క్లొరల్; ఆమిల్ నైట్రేస్; సోడా బైకార్బనేట్; స్పిరిట్సు క్లోరోఫాం.

వెట్టి — Insanity. ✓

కనేబిస్. బ్రావెన్లు క్లొరల్; డిజీటాలిసు; హయెసామిక్. హయెసీన్. బెల్ని మియం; మార్ఫిన్.

వెట్టికుక్క కాటువలన గలిగెడి రోగము — Hydrophobia.

కాకెన్; క్లొరల్; కనెబిసు, మార్ఫిన్; నైట్రో గ్లిసేరిన్.

క్వాసకోశములనుండి యెర్రనిరక్తము గ్రుక్కట — Haemoptysis. ✓

ఆసిడ్ పైరోగాలిక్; అంటిపైనిన్; ఆలం; డిజీటాలిసు; యెర్గాట్ హమానులిసు.

క్వాసశ్చచ్ఛిము — Dyspnoea.

ఆసిడ్ కార్బాలిక్, స్పిరిట్ ఈతరిసు, ఆమిల్ నైట్రేసు నైట్రోగ్లిసేరిన్, సోడి యైట్రేసు.

శుభ రక్తనాళము యొక్క ఉబ్బుదల — Aneurism. ✓

ఆకానెట్, ఆమిల్ నైట్ నైట్, డిజీటాలిసు, నయట్రోగ్లిసేరిన్, పొటాసు ఆయో డయిడ్.

కూలనొప్పి — Colic,

ఈతర్; ఆమిల్ పెలిరియసు, క్యాంఫర్, క్లొరోఫాం, క్లొరోడీన్, మెంథార్ ఆయిల్ (పెప్పరు మెంటు), కాజిపల్ ఆయిల్.

స్నాయువులకుడు (రోగమువలన) — Spasm. ✓

ఈతిర్, స్పిరిట్సు ఆమ్మోనియా ఆరోమెటిక్; ఆమిల్ నైట్రేసు, క్యాంఫర్, టిం క్చుర్ క్లొరోఫాం యెట్ మార్ఫియా; ఓలియం మెంథాపిక్.

స్కరియేసిసు — Psoriasis:

పైసరాయుటకు; — ఆసిడ్ కార్బాలిక్, క్రియిసారోబయిన్, ఆసిడ్ సాలిసైలిక్ ఓలియం గ్రెనోకార్డి, ఇక్టియాల్, బాల్సంగర్జన్.

లోనికీచ్చుటకు; — ఆర్చెనిక్ ఓలియం గ్రెనోకార్డి, లోహనయఃశములు, కాడ్మి యోమాన్, ఫాస్ఫరసు, క్విస్సు.

స్రోఫ్యూలా—Scrofula.

కాల్పియం లవణములు: ఫానుఫేట్లు, ఫెర్రయి ఆయోడయిడ్, లోహ సంబంధమగు లవణములు, ఆయోడిన్; ఆయోడ్ ఫారం, కాడ్ లివరు నూనె, క్వినిన్.

స్తనములయొక్క—Breast Affections.

1. వాపుదల:—బెలడోనా.

2. పాలను వృద్ధిచేయుటకు:—ఆసిడ్ ల్యూక్టిను; జొబరాండి; మాల్టుయనుష్టాన్; ఆముదపు ఆకులు.

3. పాలను నిలుపుచేయుటకు:—బెలడోనా; లోనియం: యిర్రాన్; ఫలీన్ విరేచనకారులు.

4. స్తనాగ్రములయొక్క పుండు:—గ్లిసరీక్ ఆసిడ్ ట్యూనిక్; లోకేన్ హైడ్రోక్లోర్.

స్మృతి రప్పించెడు మందులు—Anaesthetics.

లోనికి పీల్చుట మూలమున:—ఈతర్; ఆమిల్ హైడ్రేట్; క్లొరోఫారం మెలిక్.

ఆసిడ్ కార్బారిక్; ఈతర్; లోకేన్.

స్వస్థావస్థయం నీయదగిన మందులు (వ్యాధి కదిలిన పిచ్చుట—Tonics.

మిల్క్ (మాంస) సంబంధములు, సింకోనా; ఈస్ట్రును సిరస్; క్వినిన్, కాడ్ లివర్ నూనె; మాల్టు యిక్ స్ట్రాక్.

క్షయరోగము—Phthisis.

లోనికిపీల్చుటకు:—ఆసిడ్ హైడ్రోఫ్యూరిక్; క్రియసోల్; మెంతాల్; పెరివిక్,

లోనికిచ్చుటకు:—ఆసిడ్ సిర్మమికం; ఆర్సెనిక్; ఫలీన్; కాల్పియం లవణములు; లోకేన్; క్రియసోల్; గ్లయివల్ కార్బనస్; యూలిఫిన్; బెంజోయిడ్ కాడ్ లివరు నూనె; పేంక్రియాటిక్; పెప్టిక్; ఫాల్సిఫేట్లు; హైపోఫోస్ఫోరయిట్లు; మాల్టు.

క్షీణగతి—Collapse.

సింకోన్ ఈతర్; స్విరెట్టు ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్; ఆమ్మోనియా లోనికి పీల్చుట; ఆమిల్ నైట్రిస్; అల్కహాల్; టింక్చర్ డిజెనెరేషన్; నైట్రోగ్లిసరీక్; స్పిక్ సిన్.

వెత్తొప్పుచ్చుము—Biliary Calculi.

(వెత్తొనంబంధముగ రోగ్యు యేర్పడుట)

సింకోన్ ఈతర్; ఆమిల్ నైట్రిస్; క్లొరల్; మార్షిక్; హైపోగ్లిసరీక్;

మూత్రకృచ్ఛము — Urinary Calculi.

(మూత్రసంబంధమగు రాళ్ళు యేర్పడుట)

అమ్మోనియా ఫాస్ఫసు; ఆమ్మోనియా బెంజోను; లిథియం లవణములు; సోడా బెంజోను; పైపరబీన్.

సాందర్యరహస్యము

అట్టేలిమూ సమీపమున నున్న న్యూజిలాండు ద్వీపమునందలి స్త్రీలు యొడలంతటినికని బురదను బట్టించుకొని అదియంతయు నారునంతవరకును అటులనే యుండి అనంతరము పరిశుభ్రస్నానము చేసిదానిని గడిగి వేయుదురట. అదియే వారల సాందర్యమనకును ఆరోగ్యమనకును గౌరణమని చెప్పబడుచున్నది. పండి బురదమెచ్చుటకు నరియగుగౌరణమును మనము గ్రహింపజాలక పరిహాసాస్పదముగ బలుకుచుందుము.

కొన్ని ఔషధముల యొక్క వివరములు.

1. అమ్మోనియం క్లోరైడ్ — మోతాదు 5 గ్రా|| మొదలు 20 గ్రా|| 8 లేక 10 గ్రా||యినను మోతాదలలో ఆల్కలైపుగా బుజేయును. పెద్దమోతాదలలో చురుకును కలుగజేయును గ్రంథులపై బుజేయును. స్త్రీహ కారకములయొక్క దీర్ఘవ్యాపిత అస్వస్థతల యందును, నరముల సంబంధమగు తలనొప్పియందును, కీళ్ళనొప్పిలయందును, అమెనోరీయాయందును, బుజేయును.

2. ఇంగువ — మోతాదు 5 గ్రా|| మొదలు 10 గ్రా|| మొదలు 4 గ్రా|| చురుకును బుట్టించుటకును, ఈడ్పును బోగొట్టుటకును. పనిచేయును. హిస్టేరియా యందును, కడుపుబ్బరము నందును, స్త్రీలకు గలుగు నరముల సంబంధమగు అస్వస్థతలయందును, ఉపయోగించును.

3. కర్పూరము (క్యూఫరు). మోతాదు 2 గ్రా|| చురుకును బుట్టించి, చెడుటను వృద్ధిచేయును. 2 డ్రామల క్యూఫరును 9 డ్రామలు రెక్టిఫైడ్ స్పిరిట్ లో గలిపిన స్పిరిట్టు ఆఫ్ క్యూఫరు అగును. దీనిని అయిదు చుక్కల మోతాదులలో వ్రేలి గంటకును

యిచ్చినయెడల జలుబువలన శిరోభాగమును బోగొట్టును. పెక్కిచేలని వరువులకు దరువుగ నుపయోగించిన యెడల, వాటియొక్క అభివృద్ధిని నిలుపుచేయును.

4. క్విన్స్ పల్సేట్... మోతాదు 1 గ్రా॥ మొదలు 10 గ్రా॥ ఇది చల్యవ్యర్థములకు మిగుల ఉపయోగము, జ్వరమును దగ్గించు గణమునూడ కొంతవరకు గలదు. ప్రశ్నకుండ జేయు గుణమును, జీర్ణతయందు సహాయముజేయు గణమును, గలవు. కొన్ని విషయములలో క్విన్స్ గర్భాశయము పలిన బనిచేయునుగాన, గర్భిణి స్త్రీలకు దీనిని బహు జాగ్రత్తతో నియ్యవలయును. కొందరియొక్క శరీరతత్వమునకు క్విన్స్ వరిపడక పోవచ్చును. అట్టి వారలందు యీమందును త్రుచ్చుకొనిన పిమ్మట చెవులలో ధ్వనులు చెప్పదు తలనొప్పి నేత్రములు యెగ్గినగట్లు కండ్ల మసగలు డిప్రీయం దాయాసము ఆగినచేవములు గొంతుయొక్క పచ్చిదనము... యీ లక్షణములు కనుపడవచ్చును. అనేక విధములగు ఆశ్మిగులయందు క్విన్స్ పనిచేయును. మలబంధ ముండియుండిన యెడల విశేషవహికాని నిచ్చినపిమ్మట మరియొక క్విన్స్ ను యియ్యవలయును. జీర్ణసహాయమున గాని, అలసత్కారముగ గాని, పెద్దవారలకు 2 లేక 3 గ్రాముల మోతాదులలో నియ్యవలసి యుండును.

5. క్లారట్ ప్రాడ్రస్- మోతాదు 5 గ్రా॥ మొదలు 20 గ్రా॥ గాడ్డి మోతాదులలో శరీరతత్వమునందు కొంతతలతో గూడిన గుణమును బుట్టించును. పెద్ద మోతాదులలో నరిగింట్ల లోపుగనే నెద్రాను బుట్టించును. ఈనిద్రవలన నేదదీని సౌఖ్యముగ నుండును. ఈ నిద్రాభావమునకుగాని దగ్గుటకుగాని మెలకువను పొందనీయవలె గాఢముగ నుండజేరదు. నిద్రవచ్చుటకుగాను నల్లకుండునకు బదులుగా నిది చాల విషయములలో నియ్యబడును. నల్లకుండునుపయోగించుట యందువలె, దీనియందు సామాన్యముగ, పిమ్మట తలతిరవ్వుట, నగముల సంబంధముగ నిస్సత్తువ, అకలియొక్క క్షీణత, మలబంధము... యీ గుణములు కనుపడవు నగముల సంబంధములగు నొప్పులు శీర్షనొప్పులు మూర్ఖలు ఉల్లసము దగ్గు నిద్రారామి... యీ యాధులయం దీ బౌషధము వాడబడును. ఈ బౌషధము కొందరి తత్వములకు వడక పోవచ్చును. గనుక జాగ్రత్తతో నుపయోగించవలసి యుండును. ఎవరోముగ సంబంధముగ ఆస్మగులలో తెనుడ యొక్కవగా పెడలిపోవుచుండు స్థితియందు దీనిని విశేషించి యిచ్చిన యెడల, నిద్రగుణము వలన తెనుడ వెడలుట అనిపించు, డిప్రీయండు, అయాస మధిక మగును. కాబట్టి, యిట్టి విషయములందు ఎక్కువ జాగ్రత్త అవసరమయి యున్నది. గుండె రోగములయందు దీనిని ఉపయోగించ గూడదు. ఉదీగితను దగ్గించుట కయినయెడల, పెద్ద వారలకు 5 గ్రా॥ మొదలు 10 గ్రా॥ వరకు నియ్యవచ్చును. నిద్రవచ్చుట కయిన యెడల, 15 గ్రా॥ మొదలు 20 గ్రా॥ వరకు నియ్యవలయును. తాగిగడం అలవాటు అయినవారలకు యింతకు పెద్దమోతాదులలో నియ్యవలసి యుండును. లేనిచో నుపయోగించ నేరదు. నీరస స్థితియందున్నవారలకు తక్కువ మోతాదుల నియ్యవలసి యుండును. దీనిని కొంచెమునీర్వులో పంచుకొని, గూడ గలిసి యియ్యవచ్చును. విడ్డలకు సంవత్సరము నకొక గ్రామును చొప్పున మోతాదు నేర్పవలసగును.

6. క్షారాణ్ణి.

బాధ నణదివేయుటకును, చెనుటకు బుట్టించుటకును, దగ్గులు, జలంబులు, ఇకాళ్లు యంజా, చలిజ్వరము... వీటియందు మోతాదు 5 మొదలు 15 చుక్కలు.

ఉద్రుతవ్యాధులయందు ఈమన్ను దగ్గించుటకు, ఉబ్బసము, రొమ్ముపడిపెము, మొదలగు వాటియందు మోతాదు 10 మొదలు 25 చుక్కలు.

అధికప్రావముల నణదివేయుటకు కాలరా, ఆమ విరేచనములు, అతి విరేచనములు కడుపునొప్పి, మొదలగు వాటియందు మోతాదు 15 మొదలు 30 చుక్కలు.

బిడ్డలకు

వయసు	మోతాదు	వయసు	మోతాదు
1 మా మొదలు 3 మా	1 చుక్క మొ 2	3 సం మొ 5 సం	3 చుక్కలు మొ 8
3 ,, 6	2 ,, 4	5 ,, 8	4 ,, 10
6 ,, 12	2 ,, 5	8 ,, 12	8 ,, 12
1 సం మొ 3 సం	3 ,, 6	12 ,, 16	10 ,, 20

దీనిని స్త్రీలలో వేసిగాని, కొద్దిమోతాదు అయిన యెడల చక్కెర ప్రసేపిగాని, పుచ్చకొనవచ్చును. దీనిని ఉపయోగించుటకు ముందుగా బాగుగ గలంపవలసి యుండును. లేనిచో ఆడుగన వుడ్డి పేరుకొని మోతాదు క్రమముగా నుండవలదు.

7. గంధకము— మోతాదు 20 గ్రా|| మొదలు 60 గ్రా|| బిడ్డలకు మోతాదు 2 గ్రా|| మొదలు 5 గ్రా|| టేబ్లాయిడ్ (బిస్క)రూపమున నియ్యవచ్చును. మూలకంకయందు విరేచనకారిక దీనిని లోనిలియ్యవచ్చును. గజ్జ మొదలగు వాటికి ఉపయోగించు అయింట్ మెంట్లు యుండును ఉపయోగించుటకు.

8. చిట్టాముదము ... మోతాదు పెద్దవారలకు అరబొన్న మొదలు బొన్న వరకును, చిట్టలకు అరద్రాము మొదలు 2 ద్రాములవరకును; ఇది విరేచనకారి అయి యున్నది. గర్భిణీ శ్రీలకు గూడ నుపయోగించ వచ్చును.

9. టింక్చర్ క్యాంఫర్ కో ... మోతాదు 30 మినిములు మొదలు 60 మినిములు. దీనిలో టింక్చర్ ఓపియం (నల్లమందు) కలిసియుండును. తెవడ వెవలి పొపుట కుపయోగించు మందులయందు దీనిని సామాన్యముగ వాడుదురు.

10. టింక్చర్ డిజిటాలిసు... మోతాదు 5 మినిములు మొదలు 10 మినిములు డిజిటాలిసును ముఖ్యముగా గుండెకోగముల యందు వయోగించురు. దీనివలన ఖరీదైన రక్త నాళముల యందలి రక్తప్రచార మధికమగును. ఇది యీ మందును వాడుటయందలి ప్రథమగతి అయియున్నది. ఈస్థితియందు గుండెబిల్లుల యొక్క సంఖ్య సుమారు 60 వందు దగ్గును. గుండెబిల్లుల యొక్క సంఖ్యతగ్గును. బలము మాత్రము దీనియొక్క వాడుకయందలి ద్వితీయగతి యందు, గుండెయొక్క స్థితిలో నేమియు మార్పులేదు.

మూత్రాభివృద్ధి కనపడును. ఈ కారణమువలననే, సంజావ్యాధి యందు టింక్చరు డిజిటాలినును 10 లేక 15 మినిముల మోతాదులలో ప్రతి నాలుగు గంటలకును యిచ్చుచుండుట వలన సుపయోగముగ గనగొనబడెను. తృతీయగతియందు గుండెదెబ్బకయొక్క సంఖ్య అధికమయి, దెబ్బయందలి బలము తగ్గిపోవును, ఈస్థితియందు రక్తప్రచారము ఖీణతనందులకారణించును. చతుర్థగతియందు, గుండెదెబ్బ యొక్క క్రమిత తీవ్రతయి, అరుదై, బలహీనతతోగూడి, శరీరమునం దంతటను, రక్తప్రచార హీనత ప్రవేశించుట వలన, మరణము సంభవించును. తృతీయచతుర్థ గతులను జాగ్రత్తో గమనించవలసి యుండును! బలమగునట్టియు జీర్ణమగునట్టియు జీర్ణత నందినట్టియు ఆహారములేకుండ డిజిటాలినును యిచ్చిన యెడల గుండెకు అలసటను కలుగజేయును గాన జీర్ణాశయము యొక్కయు కారణము యొక్కయు పేగుల యొక్కయు క్రమస్థితులను గమనించుచుండ వలయును. గుండెయందు కొర్రవృద్ధి యున్నదిగనితెలియందు డిజిటాలినును యచ్చుటవలన క్రమిత జెడిన ముఖ్యశనమును పగులుటయును గలుగును గాన యీస్థితియందు నీ జైవధమును సేవించరాదు.

11. టింక్చరు జింజరు... మోతాదు 30 మినిములు మొ॥ 60 మినిములు జీర్ణావస్థ తల కుపయోగించవలయును. ముప్పవరెట్టనీళ్ళతో గలిపినపుడు, పచ్చిగొంతునందు గంధూషముగ నుపయోగింపవలయును. ఒక సంవత్సరము వయసుగల బిడ్డకు 1 మొదలు 4 చుక్కల వరకు నియ్యవచ్చును.

12. వర్విను ఇసికాక్ కో... మోతాదు 5 గ్రా॥ మొదలు 15 గ్రా॥ దీనితోవచ్చు పొడరు అను నేరు పేరుకూడ గలదు. దీనిలో 10 వ వంతు ఓపీయం (నల్లమందు) ఉండును. ఎదుర్ మృత్యు అస్వస్థతలు, కీళ్ళనొప్పులు, అమరికచనములు, చలిజ్వరములు... యీ వ్యాధులయందు నీ జైవధ ముపయోగింప వలయును. దీనివలన కడుపులో దీర్ఘబల కలుగునుగాన, ఈ తుండు సుపయోగించిన పెంటనే యితర ఆహారము నేమియు నియ్యరాదు.

13. బేల్ (మాకడు) యక్ష్వాస్త్రిట్ బేల్ లిక్విడ్... మోతాదు 1 ద్రాము మొదలు రెండు ద్రాముల వరకును, దీనియందు ట్యూనికు అసిడ్ ఉండును. పేగులనుండి రక్తస్రావమును గట్టుబాటు చేయును; కొంచెము విరేచనకారిగ గూడ బనిచేయును. దీర్ఘ వ్యాధితులగు ఆశిరచనముల యెడలను, అను విరేచనముల యెడలను, ఉపయోగించును. బిడ్డలయందు దరుచుగ గలుగుచుండు పేగుల యందలి అస్వస్థతలు అనగా, అతి విరేచనములను మలబంధమును ఒకటి విడిచి యొకటి కలుగుచుండుటయందు, యీ జైవధము వాగుగా పనిచేయును.

14. మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ — మోతాదు 2 ద్రాములు మొ॥ 4 ద్రా॥ వరకు. ఇది యొప్పంసాల్లు అనియు పిలువబడును. బలమగు విరేచనకారి.

15. వైసం ఇసికాక్ — తెనుదను పెడల జేయుటకు గాను 10 మినిములు మొదలు 30 మినిముల వరకును; వాంతికారిగ 4 ద్రాములు మొదలరెండు ద్రాముల వరకును, మోతాదుగనకయోగింప వలయును. బిడ్డలయందు వాంతికారిగ, పల్విస్ ఇసికాకును ఉపయోగించుట కంటే, వైసం ఇసికాకును ఉపయోగించుట యొక్కవ పిలుగ నుండును. పల్విస్ ఇసికాకునకును పల్విసు

ఇహికాకు కో కును భేదమునుగూర్చింపనగును; రెండవ దానియందు ఓసియం (నల్లమందు)ను పొటాష్ సల్ఫేటును గలిపియుండును.

16. మెగ్నీషియా సిట్రిస్—దీనిని నీటిలో వేయగనే పొంగును. ఒకటి లేక రెండు పెద్దచెమిచాలతో దీసి, దీనిని ఒకటంబుర్లు నీటిలో వేసి పుచ్చుకొనుట వలన, పాఘ వికేచన కారిగ బనిచేయును. నీరససిద్ధిని వహించియున్న జనులు 20 చుక్కల టింక్చర్ జిజెర్ నుగూడ గలిపి పుచ్చుకొనవగును. ఒకచిన్న చెమిచ కొలత గల దానిని పుచ్చుకొనుటవలన, జ్వరగతుల యందు జ్వరదనమును బుట్టించును; యీస్థితియందు 20 మినిముల స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రిస్ ను గూడ గలంప వచ్చును.

17. లైకర్ స్త్రిక్టస్ హైడ్రోక్లోర్—మోతాదు 2 మినిములు మొదలు 8 మినిములు. స్త్రిక్టసీను, వివముష్టి (నవ్వుపామికా) సంబంధమైనదై యున్నది. ఇదీనరముల యెడల బలవర్ణకృతముగను; పక్షవాతమునందును; మధ్యపాన స్థితియందును, బనిచేయును; లైకర్ ఆర్నికాలినుతో గలిపి దీనిని యియ్యరాదు. ఔరనంబంధమగు పదార్థములతో గలిపియు; నియ్యగూడదు.

18. స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రిసు—మోతాదు, మరలమరల యిచ్చుటకు 20 మినిములు మొదలు 40 మినిముల వరకును, ఒకటే మోతాదుగ నిచ్చునెడల 50 మినిములు మొదలు 90 మినిముల వరకును, యియ్యవగును, చెమటను వృద్ధిపరచి, మూత్రగ్రంథులపై బలిజేయుటవలన, మూత్రము నభివృద్ధి చేయును; జ్వరములందు మిగల ఉపయోగముగ నుండును, ఆరు మాసముల బిడ్డకు 3 చుక్కలు మొదలు 5 చుక్కల వఱకు నియ్యవలయును. ఒక సంవత్సరము వయసునందు 6 మొదలు 10 చుక్కలవఱకు నియ్యవలయును.

19. సిర్టిబుస్ ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక—మరల మరల యిచ్చుటకు 20 మినిములు మొదలు 40 మినిములవఱకును, ఒకటే మోతాదుగ నిచ్చునెడల 60 మినిములు మొదలు 90 మినిముల వఱకును, యియ్యవగును. హిస్టియా, తలనొప్పి, తలతిత్తుట, గుండెలదరు మూర్ఛ, కొన్ని అజీర్ణము, కడుపుబ్బరము—యీవా్యాధులయందు దీక్షోపదము నుపయోగింపవగును.

20. సోడా సల్ఫేట్—మరల మరల యిచ్చునెడల దీనిమోతాదును అరద్రాము మొదలు 2 ద్రామములవఱకు నియ్యవచ్చును ఒకటేమోతాదుగ 3 ద్రామములు మొదలు 4 ద్రామముల వఱకును. అవసరమయిన యెడల ఒకబొంబువరకును గూడ నియ్యవచ్చును. ఇది నీళ్లవికేచనము లగునట్లుచేసి, కొంచెముగా మూత్రగ్రంథులపై గూడ పనిచేయును. పెద్ద మోతాదులుగ నిచ్చినపుడు కఠిన పడిమిని దగ్గించునుగాన, పేగులయొక్క వాపుదలయందును, యితర వాపుదలల యందును; జ్వరములందును గూడ దీనినియ్యవచ్చును. మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ కంటే నిదితక్కువ అసహ్యముగ నుండునుగాన; నుకుమారులగువారు కూడ దీని నుపయోగింపవగును.

21. సెన్నా ఆకులు (సూనాముఖి)—దీనిని వికేచనకారిగ; బిడ్డలకును పెద్దవారలకును, గర్భిణీశ్రీలకును, యియ్యవచ్చును. ప్రస్థము నిచ్చు శ్రీలకు మూత్రము నియ్యరాదు. అట్టిచ్చుటవలన బిడ్డలయందరివికేచనములు పొర్రంభమయి, కడుపునొప్పి యేర్పడవచ్చును.

సునాముఖి కషాయము జేసి, పాలను పంచవారసు గలుపుట వలన, రుచికి తేనూగు నీళ్లవలె నుండును. ఒకబౌన్ను సునాముఖి అకులను, 30 గ్రాయినుల అల్లమును, 10 బౌన్నుల ఉడు ఖనీళ్లలో ఒకగంట కాలముంచి, పిమ్మట వడియగట్టి, దీనినుండి 1 లేక 2 బౌన్నులనుమోతా దుగ నువయోగింపవగును. ఇది పెద్దవారల కువయోగించు మోతాదు అయి యున్నది.

22. లిక్కుర్ ఆమ్లానియా ఆసిటిటిను డిల్యూట్.

1 బౌన్ను ఆమ్లానియా కార్బనసును 10 బౌన్నుల జలములో గలిపి, రుచి తెల్పును. కాగితమును దీనిలో ముంచివయెడల “బ్లూ” కాకుండు నంతవఱకును, బ్లూలిట్టును కాగిత మును దీనిలో ముందివయెడల యెరువు కాకుండు నంతవఱకును, దీనియందుఆసిటిటి ఆసిడును గలిపి, పిమ్మట నిది ఒకపైంటు అగునంతవరకును జలమును గలిపి, అకువన్నసీపాలో నిలు వచేయవలెను. ఆసిటిటిఆసిడును అవసరమైన దానికంటె పెక్కువ గలుపకుండగూడ జాగ్ర తను బుచ్చుకొనవలయును. దీనియొక్క మోతాదు 2 దాిముల వఱకు అయియున్నది.

కల్పిత శ్వాసకృత్యము.

కల్పితమైన శ్వాసకృత్యమనందు, యీక్రింది అంశములను గమనింప వలయును. ఈగి యొక్క శిరమునుగుజములను దిండ్రపైఅనిచ్చి పరుండగట్టి, మొవటగా చేతులను పైకియెత్తి, నిశ్చలముగాను మెల్లిగాను రెండు సెకనుల కాలము లో చేతులను వెనుక వ్రపులకు జూచవల యును; ఇందుమూలమున శ్వాసకోశముల లానికి పరిశుభ్రమగు గాలి ప్రవేశించును. పిమ్మట రోగియొక్క చేతులను ముందుకుద్రిప్పి మడచి, మెల్లిగా రెండు సెకనుల కాలమువరకు ఎదు రొమ్ముపైఅనిచ్చి ఉంచవలయును; ఇందుమూలమున శ్వాసకోశముల యందలి దుర్వాములు బయటికి దోలిపేయబడును. ఈరెండువిధములగు పనులను మినిటుకు పదునైదు పర్యాయ ముల చొప్పున, ఉచ్చాన్నన నిశ్వాసములు వాటంతట అవి కలుగువరకును జేయవలయును.

ఈపనులను జేయుచున్నపుడు స్మెల్లింగ్ సాల్టును వాసన జూపుట వలనను, గొంతు కనందు యీకతో గిలిగింత పెట్టుటవలనను, ముఖమును ఎదురొమ్మును తోముటవలనను: వాటిపైన చిన్నీళ్ళను వేడినీళ్ళను ఒకటి తరువాత నొకటి కొట్టుటవలనను, బొడిగుడ్డలతో ఒడలంతయు రుద్దుటవలనను, ఎలెక్ట్రీక్ బ్యాటరీ అందుబాటునం దుండికయెడల దానిని గుండ్రపైనయియు పెడపైనయియు ప్రయోగించుట వలనను, ఉపయోగ ముండగలదు. ఈప కారము ఒకగంటకాలము చేసిన పిమ్మట, ఉపయోగము లేకపోయినయెడల, మరణము కలిగి యున్నదని నిశ్చయింపవచ్చును.

మఱికొన్ని ఔషధయోగములు

మూత్రబంధము.

స్పిరిట్టు జూనిఫర్	...	ద్రాములు 3
ఆసిటేట్ ఆఫ్ పొటాష్	...	ద్రాములు 4
నైట్రేట్ ఆఫ్ పొటాష్	...	ద్రాములు 2
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రస్	...	ద్రాములు 6
జలము	...	బెన్సులు 12

మూత్రము బంధించినప్పుడు మూడుగంటల ఒక బెన్సు చొప్పున నీయవలయును.

ప్యాటర్నస్సు కాలరా మాత్రలు.

క్యాలొమెల్ (రసభగ్నము)	...	బెన్సు 1 గ్రా 20
సిపియం (నల్లమందు)	...	బెన్సు 1 గ్రా 20
క్యంఫర్	...	బెన్సు 1 గ్రా 20
ఆసిటేట్ ఆఫ్ లెడ్	...	బెన్సు 1 గ్రా 40
ఆసిటికు ఆసిడ్	...	ద్రాము 1
పర్మీసు క్లేటా ఆలోమెటికు	...	బెన్సులు 4 గ్రా 80
జలము	...	చాలినంతవరకు.

ఆసిటేట్ ఆఫ్ లెడ్ ను ఆసిటికు ఆసిడ్ లో మిలితముజేసి కరగించి, రెక్టిఫయిడ్ సిపి ట్ కొన్నిచుక్కలతో కాంఘును పొడిచేసి, వీటినిన్నిటిని వర్ణన చేయవలయును. సిమ్మట ఆంతయు వర్ణన యగునటుల వలసినంత నీటితో క్యాలొమెల్ ను, పర్మీసు క్లేటా ఆలోమెటికును నీటితో విశ్రమముచేసి, ఆంతయు గట్టిముద్ద యగునటుల కల్పములొకొట్టి 1,000 మాత్రలుగా జేయవలయును.

ఒక్కొక్క మాత్రయందు అరగ్రయిను క్యాలొమెల్, అరగ్రయిను సిపియం, అరగ్రయిను క్యాంఫరు, ఒకరగ్రయిను ఆసిటేట్ ఆఫ్ లెడ్, గ్రయినులు పర్మీసు క్లేటా ఆలోమెటికు, ఉండును.

మోతాదు:— 1 లేక 2 మాత్రలు.

నవనీతము,

సరిసమానములగు లివర్ వీడ్ నూనె లేక కొబ్బరినూనెయను, తైంవాటరు (సున్నపు నీళ్లు) యను మర్దనచేసిన యెడల తెల్లని పదార్థము యేర్పడును. దీనికే నవనీతమని పేరు. దీనిని కాలిర పుండ్లకు ఉపయోగింపనగును.

సుఖ సం. పుండ్రకు లోషక

క్యాలామెట్ (రసహస్తము) ... గ్రయినులు 80
తైవాటురు ... జొన్నులు 10

ఈరంటిని బాగుగ కలిపి లోషకగా చేయవలయును. రంటిని కలుపుటలో నల్ల నెరంగు యేర్పడును. సుఖసంబంధమగు పుండ్రము కడుగుటకు ఉపయోగింప నగును.
నరముల నొప్పులు.

టింక్చరు ఓపియం ... ద్రాము 1
టింక్చరు ఆకానైట్ ... ద్రాము 1
టింక్చరుక్లారోఫారం ... ద్రాము 1
సోప్ లినిమెంటు ... జొన్నులు 1½

వీటినిన్నిటిని బాగుగ కలిపి నిలువయుంచి “విషము” అనిగుండ్తు పెట్టుకొన వలయును. నరముల సంబంధమగు నొప్పులకు స్వచ్ఛతోగాని; నీటితోగాని పైన రుద్దవలయును.

గజ్జి.

గంధకపు పలుకులు ... జొన్ను 1
కైఫీటు ఆఫ్ పొటాష్ ... ద్రాము ½
గ్లిసెరిన్ ... ద్రాము 1
లానోలీను ... జొన్నులు 4

లానోలీనును నిల్పవై కరగజెట్టిన విమ్మట కక్కినవాటిని బాగుగ కలుపవలెను. గజ్జి ఉపయోగించును. దీనినే గంధకపు ఆయింటు మెంటు అందురు.

చెవిపోటు.

టింక్చరు ఓపియం ... ద్రాములు 4
గ్లిసెరిన్ ... ద్రాములు 4

ఈ రంటిని కలిపి చెవిలో పోటున వుపయోగింపనగును.

కంటి దురదలు.

(1) అలం (పటిక) పొడి ... గ్రయినులు 20
జలము ... జొన్నులు 8
(2) బోరి కులసిడ్ ... గ్రయినులు 30
జలము ... జొన్నులు 8

బాగుగా కలిపి లోషకగా చేయవలయును. కంటి దురదలకు ఉపయోగింపనగును. పై 2 వ దానినే బోరికు లోషిన్ అందురు.

నేత్రవ్యాధులు.

సల్ఫేట్ ఆఫ్ జింకు ... గ్రయినులు 8
జలము ... జొన్నులు 8

బాగుగా కలిపి లోషిన్ గా చేయవలయును. నేత్రవ్యాధుల వుపయోగింప నగును.

గంధూషములు.

నోటిపూత.

ఆలం (వటిక)	...	ద్రామము 1
జలము	...	బొంబులు 8

ఓలిపిగంధూషముగా జేయవలయును. నోటిపూతకు ఉపయోగింప నగును.

గొంతు నడలింపు.

టింక్చర్ జింజర్	ద్రామము 1
జలము	బొంబులు 8

గొంతునడలింపునకు గంధూషముగా నుపయోగింపనగును.

ఉమ్మిఁజొరుట, నోటిపూత.

గాలికు అసిడ్	గ్రయిములు 20
బ్యాండి	ద్రామము 4
జలము	బొంబులు 8

ఈ మూటిని గలిపి గంధూషముగా జేయవలయును. ఉమ్మిఁజొరుటకును, నోటిపూతకును, ఉపయోగింపనగును.

జింకు సల్ఫేటు	గ్రయిములు 30
జలము	బొంబులు 8

ఈరంటిని గలిపి గంధూషముగా జేయవలయును, ఉమ్మిఁజొరుటకును, నోటిపూతకును, గొంతునొప్పికిని ఉపయోగింప నగును;

కాలరాద్రావ్న.

సల్ఫూరిక్ అసిడ్	మినిములు 8
రెడ్డి ఫ్యూజ్ సిలిక్	మినిములు 24
ఆనిసీ ఆయిల్	మినిములు 30
క్యాబ్జిక్ ఆయిల్ (యాలక ఆరఖు)	మినిములు 30
జానిఫర్ ఆయిల్	మినిములు 30
ఈథరు	ద్రామము 4
టింక్చరు సిస్టమన్	బొంబులు 2

మోతాదు:—2 బొంబుల జలములో 10 మినిములు కేసి యియ్యవలయును. గాజు కార్కు మూతగలి స్థిరాలో వేసి నిలువ యుంచవలయును.

కాలరా సెల్తెన్.

సోడియం క్లోరైడ్	గ్లయినులు	150
సోడా బైకార్బోనేట్	గ్లయినులు	50
సోడా ఫాస్ఫేట్	గ్లయినులు	50
బైకార్బోనేట్ ఆఫ్ పొటాసు	గ్లయినులు	30
క్వారీ నేట్రేడ్ సోడా సాల్ఫ్యూరస్	ద్రామలు	22
జలము	బొమ్మలు	10

మోతాదు:—ఆరబొమ్మ మొదలు ఒకబొమ్మ వరకును.

కార్బాలిక్ ఆసిడ్ లోషన్.

కార్బాలిక్ ఆసిడ్	1 భాగము
సామాన్యపు వేడినీళ్లు	40 భాగములు

రెంటిని కలుప వలయును.

కార్బాలిక్ ఆసిడ్ లోషన్ (గాఢమైన)

కార్బాలిక్ ఆసిడ్	1 భాగము
సామాన్యపు వేడినీళ్లు	20 భాగములు

కార్బాలిక్ ఆయిల్.

కార్బాలిక్ ఆసిడ్	1 భాగము
కొబ్బరినూనె	20 భాగములు

నోటు:—పై బొమ్మ యోగములలో గలవుటకు నియోగించబడిన జలము, ముందుగా మసలకాగి బెట్టబడి చల్లార్చబడిన జలము అయియుండువలయును. నీళ్లు కావలసి అవి రిగా మార్చబడి, చల్లార్చి తిరిగి నీళ్లుగా మార్చబడినది శ్రేష్ఠమేగాని, యిట్టి దకము లభించుట కష్టముగాన, మసల గాచి చల్లార్చబడిన నీళ్లు వాడవచ్చును. లోషన్లు తుమ్మ కొనదగిన ప్రతిబొమ్మను ముందుగా గలుపవలయును.

— . . . —

	పుట		పుట
ఆజీర్ణవ్యాధి	296-297	కొలుకువ్యాధి	309
ఆతిమాతృమ	293	కొలుకుపుండు	291
ఆతివిరేచనములు	293-294-295	కొరింతదగ్గు	305
ఆతిసారవిరేచనములు	320	గజ్జ	308-356
అధిక కాలము మంచముపట్టుటవలన		గర్భస్రావము	285
గలుగుపుండ్లు	290	గర్భిణియందు వాంతులు	309
అస్థింజెంట్లు	314-315-316	గవడలు	318
ఆకుచచ్చ విరేచనములు	294	గంధూషములు	357
అఘ్రాణివణములు	308	గండ్రాద్రు	305
అల్లరెటిఫులు	313	గండ్రెంజు	305
ఉబ్బసము	286-287	గండ్రెవ్యాధి	311
ఋతుస్రావవ్యాధులు	296-297	గొంతుబొంగులోవుట	308
ఎలుకలు	309	,, (హిస్టీరియాలో)	287
ఏటికపాములు	312	గొంతునొప్పి	307
ఒడలు దురదలు	310	గొంతుయొక్క రేగుదల	310
కడుపుబ్బరము	312-314	గొంతునొప్పి గంధూషము	308
కనుకప్పుల ఉబ్బువల	287	గోరుచుట్టు	319
కఫహరులు	316-317	గౌట్ (వాతరోగము)	301
కంటి దురదలు	356	చలిజ్వరము	303
కాలరా	291-292		పుట
కాలరాద్రాప్స	357	చిడుము	308
కార్బులిక్ లోషన్	353	చిన్న బిడ్డగుణము	294
కార్బులిక్ ఆయిల్	358	చుండు	286
కంతుకర్పడుట	310	చెనిపోటు	297-355
కారిజముయొక్క డ్రిణత	290	జలుబు	296
కారిజవ్యాధులు	296	జలొదరము	285
కాలిన గాయములు	287	జ్వరము	311
కాళ్లు, చేతులు స్వాధీనము		జ్వరభరితమగుబల్ల	304
నండి తప్పిగంతులు వేయుట	292	జగ్గలవిరేచనములు	299
కీళ్లనొప్పి	307	జీర్ణకారి	292
కురుపులు	286	జయూరిటిక్సు	315-316
కుష్ఠవ్యాధి	313	జయూరిటిక్సు	315, 316
కుసుమవ్యాధి	299	కలనొప్పి	302

	పుట.	పుట.
తలవెండ్రుకల వృద్ధి	309	305
తామర	311	300
తాగిగుడునందు ఆభిలాషను		312
మాన్యుటకు	292	288
తాగిగుబోతునకు గలగు సంధి		317;318
గుణము	293	303
తిమురువాయువు	288	288
తేనెటీగకాటు	288	290
తేలు కాటు	321	
డగ్గు	289	305
ధాతునవ్వము x	288	290-294
చిర్ల వ్యాపితమగు కీళ్ళనొప్పి	307	308
దుర్భాసపులను, క్రిమి		299
జాలములను నశింపజేయు		297
మందులు	297	300
నరముల సంబంధమగు బలహీనత	304	318
నల్లులు	288	288
నవనీతము	355	308
సంజా	296	304
నరముల నొప్పులు	356	291
నులిపురుగులు	312	298
స్వమీనియా	306	311
నేత్రవ్యాధులు	356	
పంటినొప్పి	310	
పండ్లపాడి	310	61
పండ్లు వచ్చునపుడు గలగు కలత	308	67
పచ్చమాకాల	303	142
పసిరికెలు	308	71
పొము కాటు	321	80
పొందుకోగము	288	
పొట్టబిచ్చునని కాలరామాత్రము	355	142
పిత్తాశయ సం. తాగ్గు.	300	148
ప్లీహవ్యాధులు	295	145
పురుగుకాటు	291	87
పులిపురికాయలు	321	81

	పుట	పుట
అకస్మిక ఆజ్ఞార్థవాద	64	యుండట 103
అటలమృ	250	కారిజముయొక్కవాపుదల 104
అనువిరేచనములు	11	కారిజముయొక్క పుండులేక
అనోగ్యకాస్తలాభములు	12	వ్రణము 106
అహారనియమములు	28	కాలాఅజార్ 274
ఇక్షుప్తాయంజా	167	శింకవాయువు 108
ఈగలు	54	శీర్షనొప్పులు 258
ఈడుపువాయువు	75	కుక్కముండ్లు 149
ఈ పురిటిలోని	76	కురుపులు 110
ఉబ్బినము	77	కుష్ఠరోగము 114
ఉబ్బినజ్వరము	79	కొరియా 116
ఉమ్మి ఉరిరుట	79	కొంకరలు వోవుట 115
ఉష్ణశీతి	9	మెదడుయొక్క పారల వాపుదల 304
ఉష్ణి	8	రక్త స్రావము 300
ఉష్ణి	81	రాచకురుపులు 286
ఋతుప్రావసంబంధమగు వ్యాధులు	89	రొమ్మ పడినము 287, 288
ఎదురొమ్మ నొప్పి	148	లైంవాటరు 313
ఎర్రనిపొక్కులు	86	వ్రణములు 266
ఎండబెట్ట	88	నాంతులు 320
ఎండబెట్టవలసిజ్వరము	90	విరేచన కారణము 294, 295, 296
ఏనుగు కాల	90	విర్యనష్టము 320
ఏనుగుగజ్జ	198	వక్కలి 302
ఒడలుపైతామర	278	శీత కాలపుగజ్జ 289
ఒళ్లుపట్టుట	91	కులనొప్పి 291
ఒడలో గలుగు కడుపుదిప్పు	138	సన్ని పాతజ్వరము 300
కక్కువాయుదగ్గు	94	సెగవ్యాధి 300
కడుపునొప్పి	98	హిస్టిరియా 302
కర్ణరోగములు	96	క్షయవ్యాధి 301, 305, 306
కాలరా	100	
కాలరాయుండలి పిమ్మటిగుణము	220	
కంటిపాదలోనిపుండ్లు	218	
కండ్లకలక	281	
కంపొడింగ	102	
కారిజవ్యాధులు		
కారిజమునందొరక్తము గూడుకొని		

	పుట.	వెబిలోనుండి ప్రసించుట	...	95
కొలుకురోగము	117	చెవుడు	...	96
కొండనాలుకయొక్క పాడగుంచుట	135	చీడ	...	151
కోరింతదగ్గు — (గురకతోగూడిన దగ్గు చూడడు)	133	జ్వరము — ఇంటర్ మిటెంట్	...	159
గజ్జి	122	,, ఇన్ ఫ్లూయెంజా	...	167
గనోరియా	123	,, కాటక	...	153
గర్భవత్సంబంధమగు వాంతులు	125	,, చలి	...	159
గర్భస్రావము	126	జ్వరము టైఫాయిడ్	...	169
గవడలు	128	,, డెంగ్యూ	...	190
గవడకాయల పుద్ది	...	,, తావ	...	88
గాయములు	...	,, న్యూమోనియా	...	211
గాయిటర్	...	,, పశునవసంబంధమగు	...	226
గురకతోగూడినదగ్గు	...	,, పునఃప్రకోవ (కాటక)	...	158
గుండెకోగములు	...	,, టిమిటెంట్	...	164
గుండెలదరు	...	,, విషము	...	157
గుండెపరిత	...	,, సన్నిపాతము	...	169
గుండెవ్యాధియందుచికిత్స	...	జ్వరరోగి కుపచారములు	...	12
గుండ్రనిపురుగులు	...	జలుబు	...	50-
గొంతురోగములు	...	శీర్షకము	...	61
గొంతుబొంగుబోవుట	...	లేళ్ళ పురుగులు	...	234
గొంతుయొక్క వాపుదల	...	డయబీటిస్ మెరీటస్	...	68
గోరుచుట్టు	...	,, ఇన్ సిడిస్	...	70
గొట్	...	డమరీయా	...	142
గ్రహణి	...	డిస్ పెన్సోరియా	...	82
చర్మరోగములు	...	తలనొప్పి	...	191-192
చెల్లి	...	తలనొప్పి శీర్షసంబంధమగు	...	194
చెల్లెపిన్నానములు	...	,, జలుబువలని	...	195
చెఱపప్రెహ్మలు	...	తలనొప్పి	...	151
చెడుట	...	తలనొప్పి తామర	...	195
,, మర్దంధ సహితమగు	...	తావజ్వరము	...	88
చెమరకాయలు	...	తామర	...	195
చెవిలోను	...	తిమరువాాయవు	...	196
చెవిలోగుల్లి	...	తొంటినొప్పి	...	198

తెల్లని బొబ్బలు	...	277	పంకాలు	...	43
తెర్మా మెటరు నువయోగించుంధము		13	పంటినాస్సి		225
దగ్గు	...	199	పంటిచిగురులవాపు		227
దద్దురోగము	...	200	పాదములమీద నయ్యెడు కాయలు		234
దాహము	...	201	పాముకాటు		228
దీర్ఘఊపిరియొక్క ఆరోగ్యత	...	52	పార్శ్వపునాస్సి		193
దేహపరివోధన విధానము	...	22	పాల్చి లేవన్		132
ధనుర్యాయువు	...	75	పాండురోగము		229
ధాతునష్టము	...	201x	స్తీహవ్యాధులు		232
నడుమునొప్పి	...	208x	పురుగులు		234
నల్లంసకత్వము	...	206x	పులిపిరికాయలు		234
నల్లనిమచ్చలు	...	278	నైతోస్క్లెరేకము		238
నంజు	...	203	పేగులయొక్కవాపుదల		93
నాడి	...	38x	పొంగు		238
నాడిపరీక్ష	...	5x	బట్టకల		239
నాడివ్యాధి(తలనొప్పి చూడుడు)...		203	బిళ్ళ సంకటము		241
నాలికురుపు	...	208	బూరకాలు(ఏనుగు కాలు చూడుడు)		90
నాలుక	...	16	బెణుకులు		240
నిద్ర	...	44	బొబ్బలు		240
నిద్రరామి	...	208x	బొబ్బలరోగము		242
నిద్రరోగము	...	209	బొల్లి		244
నిద్రించుగదులు	...	44	బ్యూటానోజేన్		242
నిస్త్రాణ	...	87	స్టెన్సి		150
నీరడుతిత్తియొక్కవాపుదల	...	210	కుచ్చలు		149
నీ, కేగుదల	...	211	మధ్యపానసంధి		245
నుదురుపోటు	...	193	మధ్యపానస్థితి		245
నులిపురుగులు	...	237	మలబంధము		246
స్వయంమోనియా	...	211	మసూచి		256
శ్లేష్మరోగములు	...	213	మాడుపోటు		194
వడిసెను (క్వానసంబంధముగు)	...	221	మానసికచికిత్స		28
వచ్చుకామాల	...	228	మాండదగ్గు		136
వనిపిల్లలయందలికాలరా	...	102	మిలియేరియా		150
వక్షవాయువు	...	223	మూత్రపరీక్ష		25

	పుట		పుట
మాతృసంబంధమగు వ్యాధి ...	250	విటామిన్	58
మాతృగ్రంథాలయొక్క క్షీణదశ	201	విద్యాలయములు	44
మాతృకృష్ణము	253	విరేచనములు (ఆమ)	260
మూర్ఛ	87, 250	వీర్యసము	262
మూలశంక	254	వెక్కిలి	262
మెదడుమృదువగుట	252	వెండ్రుకలు లూడిపోవుట	269
మెనింజైటిస్	252	వెళ్లి	263
మెనోరేజియా	85	వెళ్లి కుక్క కాటు	263
మెసాజ్	278	వేపపువ్వు	268
యూరేమియా	250	వైద్యశాస్త్ర పరిశోధనాలయములు	90
రక్తముయొక్క ఉపయోగములు	39	శరీర వేడిమి	9
రక్తస్రావము:—		శాశభక్షణము	58
శ్వాసకోశమలముండి	264	శ్వాసకృష్ణము	266
జీర్ణాశయమునుండి	265	శ్వాసకోశపరీక్ష	24
ప్రసవసంబంధమగు	270	శూలనొప్పి (కడుపునొప్పి చూడడు)	
రాచపుండు	256	సన్ననిపొక్కులు	160
రాత్రిచెడుటలు	257	సన్న పాతజ్వరము	169
రక్తబిందు	257	సప్తదిశజ్వరము	273
రొమ్ము పడినెము	221	సప్తవేటికయొక్క నాపుదల	133
రోగితాపరము	46	స్కర్వీ	268
రోగినిగూర్చి జాగ్రత్తలు	45	స్కార్లెట్ జ్వరము	269
రోగినిబరితీంచుట	1	స్తనవ్యాధులు	267
లుకోరియా	85	స్థిర ఆజీర్ణ వ్యాధి	65
ల్యూకోడెర్మా	244	స్థనపు సంబంధము కడుడుపునొప్పి	94
పట్టిలేళ్ళ తడికలు	44	సూర్యకిరణసాన్నివము	29
వ్రోణములు	110	స్కృప్త్యాల	266
వాయుపు	33	సెగరోగము	128
వాతరోగము	258	పారియేసిస్	266— (హెప్పి-276)
వాయుప్రచారము	42	హృదయకోశము	22
వారములు	259	హిల్ డయేరియా	144
వ్యాధిచికిత్స	93	హిస్టీరియా	78
వ్యాధిచికిత్సానిధానములు	25	హైడ్రోఫోబియా	263
వ్యాధిలక్షణములు	20	హైపోథాల్మిక్	270
వ్యాధియొక్క ముందుదశ	21	హయవ్యాధి	270-30

